



SB
767
H832
V. I
ENT.

12/19.07.

C. HOUARD
Docteur ès sciences
Lauréat de l'Institut



Les Zoocécidies des Plantes d'Europe et du Bassin de la Méditerranée



- Description des Galles ● ●
- Illustration ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- Bibliographie détaillée ● ●
- Répartition géographique ● ●
- Index bibliographique ● ●

1365 figures dans le texte
2 planches hors texte
4 portraits



TOME PREMIER

Cryptogames, Gymnospermes, Monocotylédones,
Dicotylédones (1^{re} Partie)

LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE A. HERMANN
6, RUE DE LA SORBONNE, PARIS (V^e)

1908



MARCELLIA

(RIVISTA INTERNAZIONALE DI CECIDOLOGIA)

Rédigée par le Professeur A. TROTTER, AVELLINO (Italie)

Avec la collaboration d'éminents spécialistes : Beijerinck, De Stefani, Houard, Kieffer, Küster, Massalongo, Molliard, Rübсааmеn, Schlechtendal, Tavares, Thomas, etc.

C'est le seul Journal dédié exclusivement à l'étude des Galles. Il publie des travaux originaux dans toutes les langues, avec planches et figures dans le texte. Il paraît 6 fascicules par an, chaque fascicule contenant une partie spéciale dédiée à la bibliographie cécidologique et tératologique. Prix d'abonnement : 15 fr. Les nouveaux abonnés qui s'adresseront directement au Rédacteur pourront avoir les années arriérées (1902-1907) chacune au prix de 7 fr. 50 au lieu de 15.

“ CECIDOTHECA ITALICA ”

Di TROTTER A. e CECCONI G.

Padova-Avellino 1899-1908

Collection de Galles italiennes (1), préparées et déterminées, comprenant aussi les formes nuisibles aux plantes agricoles. Chaque espèce est accompagnée d'une description et d'indications bibliographiques, biologiques, etc. Chaque fascicule comporte un portefeuille in-4° et un double index des plantes et des parasites, pouvant se classer à volonté. Jusqu'ici il a été publié 18 fascicules, comprenant 475 espèces. Prix de chaque fascicule : 10 fr. ; tous les fascicules parus 180 fr. Envoi franco contre mandat-poste. — Pour tout ce qui se rapporte à la « Cecidotheca italica » s'adresser au Professeur A. TROTTER, R. Scuola Enologica, AVELLINO (Italie).

(1) L'Italie est le pays le mieux placé pour donner une idée de la flore cécidologique de l'Europe moyenne ou méridionale et des pays baignés par la Méditerranée.

LIBRAIRIE A. HERMANN

ANDRÉ (Ed. et Em.)

SPECIES DES HYMÉNOPTÈRES D'EUROPE ET D'ALGÉRIE

Ouvrage paraissant par fascicules trimestriels

Prix de l'abonnement annuel. 15 fr.
— (Etranger) 16 fr.

Tome I. — Introduction. — Mouches à scie. — CXCVI, 644 et 76* pages, avec 24 planches. N'est pas vendu séparément.

Tome II — Fourmis. — Guêpes, 928 et 48* pages, avec 36 planches. Prix : 60 fr.

Tome III. — Sphéigiens, 349 et 30* pages, avec les planches I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X et XIV. Prix 20 fr.

Les planches VIII, XI, XII, XIII et XV n'ont pas paru et seront fournies ultérieurement. Ce volume, resté incomplet par suite de la mort de son auteur, sera terminé plus tard, quand l'étude des dernières tribus aura pu être achevée.

Tome IV. — Braconides (1^{re} partie), X et 609 pages avec 48 planches. Prix : 30 fr.

Tome V. — Braconides (2^e partie), 635 pages avec 20 planches. Prix. 30 fr.

Tome V bis. — Braconides (3^e partie-Supplément), 392 et 82* pages, avec 15 planches. Prix 30 fr.

Tome VI. — Chrysidés, XII, 759 et 22* pages, avec 32 planches. Prix 45 fr.

Tome VII. — Cynipides (1^{re} partie), 687 pages, avec 27 planches. Prix 40 fr.

Tome VII bis. — Cynipides (2^e partie) 40 fr.

Tome VIII. — Mutillidés, avec 15 pl. col. et n. 30 fr.

Tome IX. — Proctotrypidés, par J.-J. Kieffer, avec 21 planches 30 fr.

Tome X. — Proctotrypidés. Partie II (En cours de publication).

Il reste quelques exemplaires complets. Prix 400 fr.

FRIEDRICH THOMAS
1840



1756 · G. A. OLIVIER · 1814 ·



1759 · L. A. G. BOSCH · 1825 ·



D. H. R. v. SCHLECHTENDAL
1834


G. MAYER, DEL.

C. HOUARD

Docteur ès sciences
Lauréat de l'Institut



Les Zoocécidies *des Plantes d'Europe* *et du Bassin de la Méditerranée*



Description des Galles	• •
Illustration	• • • • • • • •
Bibliographie détaillée	• •
Répartition géographique	•
Index bibliographique	• •

~~~~~  
1365 figures dans le texte

2 planches hors texte

4 portraits



TOME PREMIER

Cryptogames, Gymnospermes, Monocotylédones,  
Dicotylédones (1<sup>re</sup> Partie)

~~~~~  
LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE A. HERMANN
6, RUE DE LA SORBONNE, PARIS (V^e)

—
1908

PRÉFACE PROVISOIRE

La Préface définitive paraîtra avec le Tome II.

L'étude des productions végétales si curieuses, connues sous le nom de Galles ou de Zoocécidies, est poursuivie avec une telle activité depuis quelques années, et si féconde en découvertes éparses dans une foule de périodiques, qu'il est devenu très difficile pour le Naturaliste, sinon impossible, de les connaître toutes et même de les déterminer. Aussi avons-nous pensé qu'il était temps de grouper les déformations signalées jusqu'à présent sur les différentes espèces de la Flore de l'Europe et de la région méditerranéenne. L'apparition de notre premier volume des *Zoocécidies des Plantes d'Europe et du Bassin de la Méditerranée* sera rapidement suivie de celle du second, actuellement sous presse.

Notre Ouvrage se distingue de tous les Catalogues de Galles d'Europe publiés jusqu'ici par une méthode d'exposition entièrement nouvelle et par les nombreux renseignements de bibliographie et de répartition géographique qu'il contient :

1^o Les cécidies, longuement décrites, y sont groupées par familles végétales; chaque famille est précédée d'un résumé dans lequel ont été signalés les caractères généraux des galles qu'elles renferment, les points litigieux sur lesquels doit se porter l'attention des Cécidologues et les recherches qui restent à entreprendre ;

2^o Les figures, très claires, originales pour la plupart ou

copiées d'après les meilleurs auteurs, complètent le texte descriptif ; leur ensemble constitue la collection la plus considérable de dessins de galles qui ait été publiée jusqu'à ce jour ;

3° Chaque cécidie est accompagnée de nombreuses indications bibliographiques, avec renvoi au volumineux Index qui terminera l'Ouvrage ; ces indications ont été choisies, de préférence, parmi les travaux modernes qui contiennent les meilleures descriptions des galles ou des cécidozoaires ou encore qui possèdent d'excellentes figures ; les échantillons publiés dans les herbiers cécidologiques n'ont pas été oubliés ;

4° La répartition géographique se trouve indiquée, à propos de chaque cécidie, par quelques lettres placées dans la marge de droite.

Nous espérons que par la clarté de son texte, par ses nombreuses illustrations, par les renseignements bibliographiques qu'il contient, cet Ouvrage rendra quelque service aux Entomologistes, aux Botanistes, aux Forestiers et aux Agriculteurs.

C. Houard

Paris, 15 juillet 1908.

TABLEAU DES ABRÉVIATIONS

1^o Abréviations relatives au texte :

- Acre.** — Acrocécidie (galle terminale).
Ac.fr. — Acrocécidie déformant le fruit.
Ac.ep. — Acrocécidie déformant le capitule.
Ac.inf. — Acrocécidie déformant l'inflorescence.
Ac.fl. — Acrocécidie déformant la fleur.
Ac.ti. — Acrocécidie déformant l'extrémité de la tige.
Ac.bg. — Acrocécidie déformant le bourgeon.
Plrc. — Pleurocécidie (galle latérale).
Pl.ra. — Pleurocécidie déformant la racine.
Pl.ti. — Pleurocécidie déformant la tige.
Pl.fe. — Pleurocécidie déformant la feuille.

M.C. — Métamorphose dans la cécidie.
M.T. — Métamorphose dans la terre.
I.H.III. — Chiffre indiquant l'année où éclôt l'insecte parfait.

2^o Abréviations relatives à la répartition géographique :

- | | |
|---|--|
| <p> A. Allemagne.
 AF-N. Afrique du Nord.
 A-H. Autriche-Hongrie.
 AL. Algérie.
 A-M. Asie-Mineure.
 B. Belgique.
 B-M. Bassin de la Méditerranée.
 BU. Bulgarie.
 D. Danemark.
 E. Espagne.
 E-C. Europe centrale (y compris l'Allemagne et parfois le nord de l'Italie).
 E-E. Europe de l'Est.
 E-N. Europe du Nord.
 E-O. Europe de l'Ouest.
 E-S. Europe du Sud.
 E-T. Europe totale (tout au moins l'aire de répartition de la plante).
 ÉG. Égypte.
 F. France.
 G. Grèce.
 H. Hollande.
 I. Italie.
 I-B. Îles Britanniques.
 M. Monténégro.
 MA. Maroc. </p> | <p> N. Norvège.
 P. Portugal.
 P-B. Péninsule des Balkans.
 R. Russie et Transcaucasie.
 RO. Roumanie.
 S. Suisse.
 SE. Serbie.
 SIB. Sibérie.
 SV. Suède.
 SY. Syrie et Palestine.
 T. Turquie.
 TR. Tripolitaine.
 TU. Tunisie.

 a. Açores.
 b. Baléares.
 c. Corse.
 ca. Canaries.
 ch. Chypre.
 co. Corfou.
 cr. Crète.
 j. Jersey.
 m. Madère.
 s. Sardaigne.
 si. Sicile.

 <i>exc.N.,S,E,O.</i> excepté le Nord, le Sud, etc. </p> |
|---|--|
-

CATALOGUE DES ZOOCÉCIDIES

I. — EMBRANCHEMENT DES THALLOPHYTES

Classe des Champignons

Il est encore prématuré de comprendre parmi les Zoocécidies les déformations observées sur les champignons par Boudier (1893), Rübssaamen (1899), Vogler (1899) et Riedel (1900) ; nous les rapportons cependant avec détails afin d'attirer l'attention des Cécidologues sur ces intéressantes productions.

A la suite de nombreuses observations, Boudier s'est convaincu que tous les tubercules, gros ou moyens, aperçus par lui sur des Agaricinées tiraient leur origine de la présence d'un corps étranger ; les plus gros contenaient un œuf de diptère, les autres une parcelle d'humus ou un grain de sable, le plus souvent une déjection de larve de diptère. D'après Riedel, le producteur de la cécidie décrite par Vogler serait un diptère du genre *Ditomyia* dont plusieurs espèces possèdent des larves qui vivent dans les champignons ligneux.

Il est intéressant de comparer ces observations avec le cas signalé par Ch. Thom (Bot. Gaz., Chicago, Ill., 1903, p. 223-225, 6 fig.) aux États-Unis : *Omphalia campanella* Batsch déformé par une larve de diptère.

Enfin, on ne doit pas oublier que plusieurs espèces d'*Hypomyces*, d'*Eleuteromyces* et de *Nectria* vivent en parasites sur les Polypores et peuvent y provoquer l'apparition de véritables Mycocécidies.



Polyporus

Diptère (n° 2)

Fig. 1. — Im Rübss.

FAMILLE DES POLYPORACÉES

**Polyporus fomentarius** L.

Plrc. — A la face inférieure du champignon, petites proéminences de taille variable (10-15 mm. de hauteur), isolées ou groupées ; leur extrémité arrondie présente une ouverture de 1-1.5 mm. de diamètre conduisant dans un canal long de 7-8 mm.

Diptère 1

Vogler, 1899, p. 345, 3 fig., ⊕ ; Riedel, 1900, p. 9.

A.

Polyporus sp.

Plrc. — Cécidie subcylindrique, terminée en pointe mousse, de 5-8 mm. de haut avec au sommet une ouverture assez grande, cratériforme, entourée d'une zone noir brillant ; l'ouverture donne accès dans un tube de 7-10 mm. de long, dont les parois sont plus consistantes que le reste du champignon. Ces galles peuvent être groupées (fig. 1) et, dans certains cas, conrescentes.

[Diptère] 2

Rubsaaen, 1899, p. 234, n° 14, pl. I. 1. ⊕ : 1900, p. 136.

E-C.

FAMILLE DES AGARICACÉES

Clitocybe 7, Pleurotus 3, Tricholoma 4-6.

**Pleurotus ostreatus** JACQ.

Plrc. — Sur les lames, petits tubercules oblongs ou arrondis, de 1 mm. de diamètre environ, formés par une fine pubescence blanchâtre qui enveloppe un œuf.

Diptère 3

Boudier, 1893, p. 29-35.

F.



Tricholoma personatum FRIES

Plrc. — Voir n° 3.	Diptère	4
Boudier, 1893, p. 29-35.		F.

Tricholoma sordidum FRIES

Plrc. — Voir n° 3.	Diptère	5
Boudier, 1893, p. 29-35.		F.

Tricholoma nudum BULLIARD

Plrc. — Voir n° 3.	Diptère	6
Boudier, 1893, p. 29-35.		F.

~~~~~  
**Clitocybe** sp.

|                            |         |    |
|----------------------------|---------|----|
| Plrc. — Voir n° 3. . . . . | Diptère | 7  |
| Boudier, 1893, p. 29-35.   |         | F. |

*Classe des Algues*

On connaît des Zoocécidies chez les Algues vertes (genre *Vaucheria*), les Algues brunes (genres *Ascophyllum* et *Desmarestia*) et les Algues rouges (genres *Ahnfeltia*, *Chondrus*, *Furcellaria*, *Rhodymenia*).

Une quinzaine de Vauchéries possèdent des protubérances spéciales habitées par un Rotifère, qui sera sans doute identifié, dans tous les cas, avec le *Notommata Wernecki*. Ces Zoocécidies ont donné lieu aux travaux importants de Vaucher (1863), Balbiani (1878), Benkő (1882), Debray (1890), Rothert (1896), et d'un très grand nombre d'autres chercheurs; un historique très complet de la question existe dans le célèbre mémoire de Balbiani. Leur étude présente beaucoup d'intérêt car elle a permis de supprimer d'anciennes espèces de Vauchéries: *Vaucheria sacculifera* de Kützing n'est autre que *Vaucheria geminata* déformé par le Rotifère; de même pour *Conferva dilatata* et ses variétés *bursata*, *clavata*, etc. D'autre part, la présence d'une cécidie sur *Woroninia dichotoma* autorise à rapprocher ce genre du genre *Vaucheria*, avec lequel, pour d'autres raisons, on le confond aujourd'hui. Enfin, il est à remarquer que la cécidie du *Notommata Wernecki* a été signalée aussi dans l'Amérique du Nord, en Pensylvanie, par Wollé.

Quant aux déformations tuberculeuses offertes par les Algues brunes et rouges, leur connaissance est encore bien incertaine; le véritable produc-

teur de la cécidie reste douteux dans la plupart des cas car l'on trouve réunis, dans les cavités gallaires, des Copépodes et des *Tylenchus*. Jusqu'à présent la recherche de ces galles a été localisée principalement à la côte anglaise (Barton, 1891, 1892, 1901; De Man, 1892); nul doute qu'on ne les rencontre aussi abondantes ailleurs et nous engageons vivement les Cécidologues à s'occuper de cette intéressante question.

Pour la bibliographie générale des cécidies des Algues brunes et rouges, nous renvoyons au travail de Trotter « La Cecidogenesi nelle Alghe » où sont énumérées les zoocécidies et les phytocécidies connues à cette époque (1901°).

### FAMILLE DES VAUCHÉRIACÉES



#### **Vaucheria**

(y compris le genre *Woroninia*)

**Plrc.** — Cécidie plus ou moins volumineuse, en forme de poche ou de capsule très allongée, d'aspect excessivement variable, présentant parfois de longs prolongements (fig. 2) qui peuvent se réduire à de simples tubercules (fig. 3). Parfois encore cette cécidie a la forme d'une petite corne, simple ou ramifiée. A l'intérieur de la galle on aperçoit, à un faible grossissement, un petit point noir qui est le corps de l'animal producteur de la cécidie.

**Rotifère**

*E-T,*  
*AL.*

De semblables cécidies ont été signalées sur les espèces suivantes :

|                                                                                             |                              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>V. appendiculata</b> DC. . . . .                                                         | [Notommata Wernecki EHRENB.] | 8               |
| Vaucher, 1803, p. 35-36, pl. III, 11, ⊕ ; Balbiani, 1878, p. 2.                             |                              | <i>F.</i>       |
| <b>V. aversa</b> HASSAL . . . . .                                                           | [Notommata Wernecki EHRENB.] | 9               |
| Bennett, 1889, p. 172, 173.                                                                 |                              | <i>I-B.</i>     |
| <b>V. caespitosa</b> AGARDH. . . . .                                                        | Notommata Wernecki EHRENB.   | 10              |
| Ehrenberg, 1834, p. 72 ; Balbiani, 1878, p. 3-4.                                            |                              | <i>E-C.</i>     |
| <b>V. clavata</b> LYNGBYE . . . . .                                                         | Notommata Wernecki EHRENB.   | 11              |
| Unger, 1828, p. 428-444, pl. XVI, ⊕ ; Morren, 1839, p. 298-302 ; Balbiani, 1878, p. 3, 4-5. |                              | <i>A-II, B.</i> |


**V. dichotoma** AGARDH  
 (**Woroninia dich.** SOLMS-L.). . . Notommata Wernecki EHRENB. 12  
 Lyngbye, 1819, p. 83; Ehrenberg, 1838, p. 429; Balbiani, 1878, p. 4; Benkó, 1882, p. 146-152. *E.C.*

**V. Dillwyni** AGARDH . . . . . Notommata Wernecki EHRENB. 13  
 Bennett, 1889, p. 172, 173. *I.B.*


**V. geminata** VAUCHER . . . . . Notommata Wernecki EHRENB. 14  
 Magnus, 1876<sup>b</sup>, p. 125; 1877, p. 497-499; Debray, 1890, p. 222-242, fig. 1-7, pl. XI, ⊕. *E-G, AL.*

**V. pachyderma** WALZ . . . . . Notommata Wernecki EHRENB. 15  
 Debray, 1890, p. 231. *AL.*

**V. racemosa** WALZ . . . . . Notommata Wernecki EHRENB. 16  
 Vaucher, 1803, p. 17-18, 32-33, pl. III, 8, ⊕; Ehrenberg, 1838, p. 429; Benkó, 1882, p. 146-152; Forti, 1905, p. 1751-1752. *E-G, I.*



*Vaucheria terrestris* et *V. geminata*  
*Notommata Wernecki* (nos 18 et 14)  
 Fig. 2 (a). — Im. BALBIANI  
 Fig. 3 (b). — Im. DEBRAY



*Rhodymenia palmata*  
*Harpacticus chelifera* (no 96)  
 Fig. 4 (a). — Im. BARTON  
 Fig. 5 (b). — Im. BARTON  
 Fig. 6 (c). — Im. BARTON

**V. sessilis** DC. . . . . Notommata Wernecki EHRENB. 17  
 Benkó, 1882, p. 146-152; Bennett, 1889, p. 172-174, fig. 5, ⊕; Debray, 1890, p. 231, fig. 8, 9 ⊕. *A-II, I-B, AL.*

VAUCHÉRIACÉES

22

- V. terrestris** LYNGBYE . . . . . Notommata Wernecki EHRENB. 18  
Balbiani, 1878, p. 1-40, pl. IV, ⊕ ; Debray, 1890, p. 231. F.I.A.L.
- V. uncinata** KÜTZING . . . . . Notommata Wernecki EHRENB. 19  
Wollny, 1877, p. 163 ; 1878, p. 5 ; 1878<sup>b</sup>, p. 97 ; Benkő, 1882, p. 146-152. E-C.
- V. Walzi** ROTHERT . . . . . Notommata Wernecki EHRENB. 20  
Rothert, 1896, p. 527-594, pl. VIII-IX, ⊕. R.
- Vaucheria** sp. . . . . Notommata Wernecki EHRENB. 21  
Olivier, 1860, p. 263, 1 pl., ⊕ ; Bennett, 1890, p. 300. I-B.

FAMILLE DES DESMARESTIACÉES



**Desmarestia aculeata** LAMOUROUX

- Plrc.** — Déformation du thalle. . . . . [Copépode] 22  
Barton, 1892 ; Trotter, 1901\*, p. 11. I-B.

FAMILLE DES FUCACÉES



**Ascophyllum nodosum** LE JOLIS

- Plrc.** — Renflements mûrifomes du thalle, avec cavités internes.  
Tylenchus fucicola DE MAN 23  
Barton, 1891, p. 65 ; 1892 ; De Man, 1892, p. 121, 3 fig., pl. XVI, ⊕ ; Trotter, 1901\*, p. 11. I-B.

## FAMILLE DES GIGARTINACÉES

Ahnfeltia 25, Chondrus 24.

~~~~~  
Chondrus crispus STACKHOUSE

Plrc. — Renflements irréguliers du thalle. **Tylenchus** 24
 Barton, 1901, p. 49-51, pl. CCCCXVIII, 5-6, ⊕. I-B.

~~~~~  
**Ahnfeltia plicata** FRIES (**Gymnogongrus plicatus** HUDSON)

**Plrc.** — Protubérances tuberculeuses sur le thalle, munies d'une  
 cavité interne qui s'ouvre au dehors. [Copépode] 25  
 Gomont, 1894, p. 132 ; Trotter, 1901<sup>e</sup>, p. 11, note 1. E-O.

## FAMILLE DES RHODYMÉNIACÉES

~~~~~  
Rhodymenia palmata GREVILLE

Plrc. — Nombreuses papilles sur le thalle (fig. 4-6).
Tylenchus ou **Harpactius chelifer** O. F. MÜLLER 26
 Barton, 1891, p. 65-68, pl. CCGIII, 1-7, ⊕ ; Trotter, 1901^e, p. 11. I-B.

FAMILLE DES NÉMASTOMACÉES

~~~~~  
**Furcellaria fastigiata** LAMOUROUX

**Plrc.** — Renflements irréguliers du thalle.  
 [Tylenchus fucicola DE MAN] 27  
 Barton, 1901, p. 49-51, pl. CCCCXVIII, 1-4, ⊕. I-B.

## Lichens

## FAMILLE DES USNÉACÉES

**Ramalina kullensis** ZOPF

**Plrc.** — Sur le thalle boursoufflé, renflements épars, irréguliers, contenant une cavité de 1-1.5 mm. de diamètre. **Ériophyide**

27A

Zopf, 1907, p. 233-237, pl. VIII, e — Pour de plus amples détails, consulter le Supplément placé à la fin de ce Catalogue.

SUD.

## II. — EMBRANCHEMENT DES MUSCINÉES

On ne connaît que deux cécidies déformant des Hépatiques. Par contre, le nombre des galles, chez les Mousses proprement dites, va grandissant au fur et à mesure que les recherches se poursuivent : les ordres des Sphagnacées, Andréacées, Archidiacées n'en présentent aucune ; trois familles seulement de l'ordre des Bryacées (sur plus de quinze familles que comporte cet ordre) en possèdent.

Il serait facile d'augmenter le nombre des cécidies des Muscinées par l'examen des herbiers de mousses ou par leur recherche dans la nature et nous attirons spécialement l'attention des bryologues sur ce point. Le côté expérimental serait aussi très intéressant et fécond en résultats.

Les cécidies des Muscinées consistent toujours en amas de feuilles, en forme d'artichaut, situés à l'extrémité des tiges ; à l'intérieur d'une masse charnue vivent des *Tylenchus*, qui semblent être dans tous les cas le *Tylenchus Darwinii* et qui sont souvent accompagnés de Rotifères ou de filaments de champignons parasites.

Comme travaux d'ensemble, signalons les mémoires de Schiffner (1906) et de Houard (1907).



Zieria julacea

Tylenchus (no 36)

Fig. 7 (a). — Im. Mass.

Fig. 8 (b). — Im. Mass.



*Classe des Hépatiques*

## FAMILLE DES JUNGERMANNIACÉES

**Lophocolea bidentata** DUM.

- Ac. ti.** — Tiges longues, arquées, enroulées en crosse et portant à leur sommet un amas de feuilles. Tylenchus 28  
 E. Marchal, 1906, p. 106. B.

**Cephalozia connivens** DICKSON var. **laxa** NEES

- Ac. ti.** — A l'extrémité de la tige, renflement globuleux, vert foncé, de 1 mm. de diamètre. Tylenchus 28A  
 Warnstorf, 1906, p. 194, 3 fig., ⊕. E-C.

*Classe des Mousses*

## FAMILLE DES DICRANACÉES

**Dicranum scoparium** HEDWIG

- Ac. ti.** — Amas terminal de feuilles. Voir n° 33. Tylenchus Davainii BASTIAN 29  
 Schiffner, 1905, p. 221 ; 1906, p. 167-168, n° 3. E-C.

**Dicranum majus** SMITH

- Ac. ti.** — Voir n° 33. . . . . Tylenchus Davainii BASTIAN 30  
 Schiffner, 1905, p. 222. E-C.


**Dicranum montanum** HEDWIG

Ac. ti. — Voir n° 33 . . . . . Tylenchus Davainii BASTIAN 31  
Schiffner, 1898, p. (18-20) ; 1905, p. 220-221. E-C.

**Dicranum longifolium** EHRLHART

Ac. ti. — Voir n° 33 . . . . . Tylenchus Davainii BASTIAN 32  
Schiffner, 1898, p. (18-20) ; 1905, p. 218-220. E-C.

FAMILLE DES POTTIACÉES



**Didymodon alpicus** VENTURI

Ac. ti. — Les entre-nœuds terminaux demeurent courts et les feuilles, ainsi rapprochées, forment une cécidie terminale en artichaut. Tylenchus 33  
E. Löw, 1885<sup>b</sup>, p. 472 ; Schiffner, 1906, p. 171. E-C.

**Didymodon giganteus** YURATZKA  
(*Geheobia cataractarum* SCHIMP.)

Ac. ti. — Voir n° 33 . . . . . Tylenchus 34  
Chalubinsky, 1882, p. 83, pl. XII, 36 39. ⊕ ; Hy, 1884, p. 120-122 note 1 ; Schiffner, 1906, p. 171. E-C.

FAMILLE DES GRIMMIACÉES



**Rhacomitrium sudeticum** (FUNCK.) BRY. EUR.

Ac. ti. — Voir n° 33 . . . . . Tylenchus 35  
Ross, 1904, p. 16, fig. 8. ⊕ ; Schiffner, 1906, p. 171. E-C.

## FAMILLE DES BRYACÉES

**Plagiobryum Zieri** LINDBERG (**Zieria julacea** SCHIMP.)

- Ac. ti.** — A l'extrémité des rameaux stériles, qui sont un peu plus allongés que d'ordinaire, corpuscules globuleux de 1 mm. de diamètre (fig. 7), formés par de nombreuses feuilles hypertrophiées, étroitement imbriquées et vert foncé. La loge intérieure renferme des anguillules (fig. 8). **Tylenchus** 36
- Massalongo, 1898<sup>b</sup>, p. 87-89, pl. IV, ⊕ ; Schiffner, 1906, p. 171. I.

## FAMILLE DES MNIACÉES


**Mnium cuspidatum** LEYSSER

- Ac. ti.** — Voir n° 33. . . . . **Tylenchus** 37
- Schiffner, 1906, p. 167, n° 2, p. 171. E-G.

**Mnium Seligeri** JURATZKA

- Ac. ti.** — Voir n° 33. . . . . **Tylenchus Davainii** BASTIAN 38
- Schiffner, 1906, p. 166-167, n° 1, p. 171. E-G.

## FAMILLE DES POLYTRICHACÉES


**Pogonatum aloides** PALISOT

- Ac. ti.** — Extrémité des tiges déformée ; les entre-nœuds terminaux demeurent courts et il se forme de petits amas de feuilles. **Tylenchus** 39
- Hy, 1884, p. 122 (note) ; Schiffner, 1906, p. 171. F.

**Pogonatum nanum** PALISOT

Ac. ti. — Voir n° 39. . . . . Tylenchus 40  
Hy. 1884, p. 132 (note) ; Schiffner, 1906, p. 171. E.

FAMILLE DES LEUCODONTACÉES



**Leucodon sciuroides** SCHW.EGR.

Ac. ti. — Voir n° 33. . . . . Tylenchus Davainii BASTIAN 41  
Schiffner, 1906, p. 169, n° 5, p. 171. E-G.

FAMILLE DES LESKÉACÉES.

Pseudoleskea 43, Pterigynandrum 42.



**Pterigynandrum filiforme** HEDWIG

Ac. ti. — Boutons terminaux verts, de forme conique ou ovale.  
Tylenchus 42  
Matouschek, 1904, p. 343-345 ; Schiffner, 1906, p. 171 ; Geheeb, 1906, p. 58-59. A-H.E.



**Pseudoleskea atrovirens** (DICKSON) BRY. EUR. var. **tenella**

Ac. ti. — Voir n° 33. . . . . Tylenchus 43  
Matouschek, 1904, p. 343-345 ; Schiffner, 1906, p. 171. E-G.

## FAMILLE DES HYPNACÉES

Eurhynchium 47, Homalothecium 44, Hyloconium 55, Hypnum 50-54,  
Rhynchostegium 48, Scleropodium 45-46, Thamnium 49.

~~~~~  
Homalothecium sericeum (L.) BRY. EUR.

Ac. ti. — Voir n° 54. Tylenchus Davainii BASTIAN 44
Schiffner, 1906, p. 169-170, n° 6, p. 171. E-G.

~~~~~  
**Scleropodium caespitosum** BRY. EUR. (**Hypnum caesp.** WILSON)

Ac. ti. — Voir n° 54. . . . . Tylenchus 45  
Hy, 1884, p. 122 (note); Schiffner, 1906, p. 171. F.

**Scleropodium illecebrum** BRY. EUR. (**Hypnum illec.** VAILLANT)

Ac. ti. — Voir n° 54. . . . . Tylenchus 46  
Hy, 1884, p. 122 (note); Schiffner, 1906, p. 171. F.

~~~~~  
Eurhynchium Swartzii CURNOW


Ac. ti. — Voir n° 54. Tylenchus 47
Dixon, 1905, p. 252; Schiffner, 1906, p. 171. I-B.

~~~~~  
**Rhynchostegium rusciforme** (NECKER) BRY. EUR.

Ac. ti. — Voir n° 54. . . . . Tylenchus 48  
Matouschek, 1904, p. 343-345; Schiffner, 1906, p. 171. E-G.

**Thamnium alopecurum** (L.) BRY. EUR.  
(**Porotrichum alop.** MITTEN)

Ac. ti. — Voir n° 54. . . . . Tylenchus 49  
Dixon, 1905, p. 251-252 ; Schiffner, 1906, p. 171. I-B.



**Hypnum capillifolium** WARNSTORF

Ac. ti. — Voir n° 54. . . . . Tylenchus 50  
Warnstorff, 1903, p. 395 ; Schiffner, 1906, p. 171. E-G.

**Hypnum aduncum** HEDWIG

Ac. ti. — Voir n° 54. . . . . Tylenchus 51  
Warnstorff, 1903, p. 395 ; Schiffner, 1906, p. 171. E-G.

**Hypnum pseudo-fluitans** WARNSTORF

Ac. ti. — Voir n° 54. . . . . Tylenchus 52  
Sanio, 1887, p. 159 ; Warnstorff, 1903, p. 395 ; Schiffner, 1906, p. 171. A.

**Hypnum fluitans** L.

Ac. ti. — Voir n° 54. . . . . Tylenchus 53  
Mönkemeyer, 1902, p. 22-23, fig. 1-12, ⊕ ; Matoušek, 1904, p. 343 ; Schiffner, 1906, p. 171. A.

**Hypnum cupressiforme** L.

Ac. ti. — Amas terminal, en forme d'artichaut, de feuilles dont les  
externes sont normales, les médianes minces, élargies et  
moins pointues, les internes très larges et très minces, à bout  
arrondi replié vers l'intérieur ; la cécidie a 2 mm. de long envi-  
ron. Tylenchus 54  
F. Löw, 1885, p. 471-472 ; Ritzema-Bos, 1888, p. 263, n° 34 ; Frank, 1896, p. 34, n° 17 ;  
Schiffner, 1905, p. 221 ; 1906, p. 171. E-G.



**Hylaconium splendens** (DILLENIUS) BRY. EUR.

Ac. ti. — Voir n° 54. . . . . Tylenchus 55  
Schiffner, 1906, p. 168-169, n° 4, p. 171. E-G.

### III. — EMBRANCHEMENT DES CRYPTOGAMES VASCULAIRES

Les Zoocécidies des Cryptogames vasculaires sont fort peu nombreuses et localisées sur les feuilles, à l'exception de la galle de la tige d'une Sélaginelle. On les connaît encore assez mal et de nouvelles recherches seraient nécessaires pour préciser le mode d'action des larves d'*Anthomyia signata* dans les enroulements de frondes ou celui des *Selandria analis* et *temporalis* : deux galles de pétioles, rapportées à des Cynipides, n'ont encore été signalées que par Schenck (1863) et Appel (1891).

Le *Pteris aquilina* possède plusieurs galles qui n'ont pas été rencontrées sur les autres Fougères.

#### *Classe des Filicinées*

#### FAMILLE DES POLYPODIACÉES

Athyrium 63-64, Nephrodium 56-61, Polystichum 62, Pteris 65-71.



#### **Nephrodium Filix-mas** STREMPER

- Pl. fe.** — Extrémité de la fronde enroulée par en bas ; dans chaque lobe vit une larve blanche. M. T. **Anthomyia signata** BRISCHKE 56  
Schlechtendal, 1890, p. 4, n° 1 ; Dalla Torre, 1892, p. 143 ; Rostrup, 1896, p. 4, n° 2 ; Lagerheim, 1903, p. 342. E-G, E-O.
- L'extrémité des divisions principales de la fronde est enroulée en hélice ou en spirale, avec lobes courbés par en bas. [Ériophyide] 57
- Tavares, 1905, p. 43, pl. X, 17. ⊕. P.
- Pustule du limbe des lobes. . . **Selandria analis** THOMS. 58  
Dalla Torre, 1894, p. 140-141 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 386. E-G, E-O.

**Nephrodium Oreopteris** DESV.

Pl. fe. --- Extrémité de la fronde enroulée et tordue par en bas.

Diptère 59

Dalla Torre, 1893<sup>b</sup>, p. 13.

A-H.

**Nephrodium spinulosum** DESV.

Pl. fe. — Fronde enroulée. Voir n° 56. . **Anthomyia signata** BRISCHKE 60

Rostrup, 1896, p. 4, n° 3.

D.

**Nephrodium Robertianum** PRANTL

Pl. fe. — Renflement à la base du pétiole. . . . . Cynipide 61

Appel, 1891, p. 644 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 373 ; 1905, p. 523.

S.




**Polystichum aculeatum** ROTH

Pl. fe. — Voir n° 69. . . . . [Perrisia pteridicola KIEFF.] 62

Trotter, 1903<sup>b</sup>, p. 8, n° 5.

I.



**Athyrium Filix-femina** ROTH

Pl. fe. — Fronde enroulée. Voir n° 56. . **Anthomyia signata** BRISCHKE 63

Trail, 1878, p. 78 ; Liebel, 1889, p. 299, n° 341 ; Hieronymus, 1890, p. 124, n° 385 ;  
Rostrup, 1896, p. 4, n° 1 ; Tavares, 1905, p. 5.


E-G,  
E-O.

**Athyrium alpestre** NYL.

Pl. fe. — Fronde enroulée. Voir n° 56. . **Anthomyia signata** BRISCHKE 64

Lagerheim, 1903, p. 342.

A.



**Pteris aquilina** L.

Pl. fe. { Déformation de la fronde entière..... A.  
          { Déformation d'une pinnule..... B.  
          { Déformation de la base de la fronde..... C.


A. — Fronde enroulée. Voir n° 56. . **Anthomyia signata** BRISCHKE 65

Liebel, 1889, p. 303 n° 371 ; Schlechtendal, 1890, p. 4, n° IV ; Cecconi, 1901<sup>s</sup>, p. 735,  
n° 31.

A,I.



— Fronde déformée : ses segments ne restent pas dans un même plan, comme c'est le cas normal, et sont pennatiséqués



*Pteris aquilina*  
*Eriophyes pteridis* (n° 66)  
Fig. 9. — Cliché MOLLARD

une fois de plus (fig. 9) ; leurs bords sont recourbés très fortement par en bas.

**Eriophyes pteridis** MOLL.

66

Molliard, 1898, p. 93-96, fig. 18-20, ⊕ ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 284.

*F.*

— Fronde presque atrophiée et plus ou moins déroulée ; son extrémité, rougeâtre, présente des pinnules modifiées, hypertrophiées, peu distinctes, enroulées à la pointe et couvertes de poils denses, allongés, d'un brun rougeâtre.

**Ériophyide**

76

Cecconi, 1901<sup>b</sup>, p. 351, n° 19 ; Tavares, 1905, p. 46, pl. XII, 1, 8, ⊕.


*L.P.*

B. — Enroulement marginal d'une pinnule par en bas (fig. 10) ;

HOUBARD, *Zoocécidiées*.

3

la partie enroulée, fortement hypertrophiée (fig. 11), est de



*Pteris aquilina*

*Perrisia filicina* (n°68)

Fig. 10 (a). — D'ap. nat.

Fig. 11 (b). — D'ap. nat.

couleur claire au début, mais devient plus tard d'un noir brillant. Larve unique jaune orangé pâle. M.T.

**Perrisia filicina** KIEFF. 68

A. Müller, 1871, p. 99-100 ; Trail, 1878, p. 77-78 ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. X, n° 288, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VI, n° 126, ⊕ ; Kertész, 1903, p. 37 ; Tavares, 1905, p. 46.

E-T.

— Pinnule partiellement repliée par en bas, faiblement hypertrophiée et décolorée. Larves grégaires blanches. M.T.

**Perrisia pteridicola** KIEFF. 69

Brischke, 1882, p. 192 ; Kieffer, 1888, p. 113 ; 1901<sup>e</sup>, p. 19-20.

A, E-C.

— Pinnule renflée et décolorée contenant plusieurs œufs ; à leur éclosion les larves se répandent sur la fronde.

**Selandria temporalis** THOMS. 70

Dalla Torre, 1894, p. 146 ; Kieffer, 1894, p. 297.

SU.A.

C. — Renflement fusiforme, multiloculaire, à surface irrégulièrement bosselée.

[Cynipide] 71

Schenck, 1863, p. 249, n° 69 ; Mayr, 1876, p. 3 ; Schlechtendal, 1890, p. 4, n° V.

A.

*Classe des Lycopodiniées*

## FAMILLE DES SÉLAGINELLACÉES

***Selaginella pentagona*** SPRING.

**Plc.** — A la base d'un rameau, cécidie uniloculaire, fusiforme, de 20 mm. de long sur 2 mm. de large.

Diptère

72

Strasburger, 1873, p. 105-108.

A.

## IV. — EMBRANCHEMENT DES PHANÉROGAMES

*Classe des Gymnospermes*

## FAMILLE DES CONIFÈRES

*Abies* 111-121, *Cedrus* 85, *Cupressus* 122, *Juniperus* 123-149, *Larix* 86-92, *Picea* 93-110, *Pinus* 73-84, *Taxus* 150-156.

Les Zoocécidies des Conifères d'Europe et d'Asie-Mineure sont particulièrement intéressantes par leur forme et par les animaux qui les engendrent.

Les acrocécidies des Genévriers, des Ifs et des Épicéas, les plus communes de toutes, affectent l'extrémité des pousses jeunes et dérivent du raccourcissement des entre-nœuds supérieurs. Deux facteurs entrent en jeu pour les caractériser : la position des cécidozoaires et la phyllotaxie des espèces végétales. Chez le Genévrier, il n'y a pour chaque galle qu'une seule larve, celle d'un diptère ; elle occupe la place du bourgeon terminal et elle est enveloppée par un ou plusieurs verticilles de trois à cinq aiguilles, selon les espèces. L'ensemble constitue une cécidie très régulière offrant un aspect bien caractéristique de bourgeon. Le cécidozoaire est encore unique et placé de même dans la cécidie de *Oligotrophus taxii* ;

mais les feuilles étant, cette fois, disposées suivant une spirale à l'extrémité des pousses, et non en verticilles, un plus grand nombre d'entre elles sont déformées; l'ensemble constitue une galle en artichaut.

La phyllotaxie de l'Épicéa est aussi complexe que celle du *Taxus* et les parasites des pousses toujours fort nombreux. Ceux-ci se logent à l'aisselle des feuilles jeunes, arrêtent complètement l'élongation des entre-nœuds supérieurs et provoquent en même temps une hypertrophie exagérée des aiguilles. Ainsi se constituent ces fameuses galles, dites en ananas, répandues partout, dans lesquelles les cécidozoaires, placés à l'aisselle des feuilles, jouent le même rôle que les ovules situés à la base des feuilles carpellaires; ainsi peut s'expliquer la ressemblance frappante, entre les cônes jeunes d'Épicéa et les galles d'*Adelges strobilobius*, sur laquelle de nombreux auteurs ont déjà attiré l'attention.

Le Pin et le Mélèze, contrairement aux espèces précédentes, possèdent des rameaux de deux sortes et des feuilles dépourvues de bourgeons axillaires; ces feuilles ne sont pas attaquées comme celles des Épicéas, bien qu'elles hébergent parfois les formes émigrantes des mêmes cécidozoaires; elles subissent simplement une légère hypertrophie ou bien elles se courbent (cécidies de *Thecodiplosis brachyptera*, *Brachonyx pineti*; *Adelges geniculatus*, *Adelges abietis*, etc.).

La biologie des *Adelges* producteurs de galles sur les Épicéas est très complexe, comme l'on sait, et nous l'avons résumée, dans ce Catalogue, d'après les données de Dreyfus, d'Eckstein et les nombreux travaux de Cholodkovsky, en nous servant beaucoup, pour l'illustration de notre texte, de son dernier mémoire (1906), malheureusement écrit tout entier en russe (1). Nous avons signalé également les recherches toutes récentes et si instructives de P. Marchal (1906, 1906<sup>b</sup>, 1907<sup>b</sup>, 1907<sup>c</sup>). Il y a quelques années, Schouteden (1903, p. 180; 1903<sup>b</sup>, p. 96) a donné un tableau des principaux *Adelges* et de leurs galles, qui peut rendre quelque service.

Signalons encore ce fait intéressant que les renflements caulinaires dus à l'*Eriophyes pini* ne sont connus que sur les Pins; cependant une variété de cet acarien (*Eriophyes pini* var. *floricola*) déforme les bourgeons floraux de l'*Abies pectinata* et produit une cécidie dont l'aspect rappelle beaucoup celle qui a été décrite par Cholodkovsky sur l'*Abies nobilis* var. *glauca* et rapportée à l'action de l'*Adelges piceae* var. *Bouvieri*.

Un grand nombre de galles de Gymnospermes demanderaient à être mieux connues. Les forestiers auraient grand intérêt à observer avec attention les déformations dues aux *Retinia* et aux *Grapholitha* et à indiquer si on peut en classer quelques-unes parmi les Zoocécidies. Nous en avons indiqué plusieurs d'après les belles illustrations des ouvrages de Ratzeburg, d'Altum, etc. Une grande indécision règne également sur les Lépidoptéro-cécidies des tiges des Génévriers. Ces mêmes plantes présentent aussi, en Asie-Mineure de nombreuses galles de diptères qu'on ne connaît guère qu'à l'état sec; il serait fort intéressant d'en obtenir les éclosions.

Enfin, nous avons signalé dans le texte de ce Catalogue, mais sous toutes réserves, quelques galles assez douteuses, celle du *Perrisia strobi* et celle du *Cedrus Deodara*, espérant ainsi attirer sur elles l'attention des Cécidologues.




(1) Une traduction en allemand vient de paraître (Cholodkovsky, 1907). — Note ajoutée pendant l'impression.

**Pinus silvestris L.**

- Ac. ti.** — Jeune pousse courbée et déformée, arrêtée dans sa croissance. **Adelges corticalis KALT.** 73  
 Kaltenbach, 1874, p. 702; Schouteden, 1903<sup>b</sup>, p. 97. 1.

- Pl. ti.** — Nodosité arrondie atteignant la taille d'une noix, formée principalement aux dépens de la couche corticale du rameau. **Eriophyes pini NAL.** 74  
 Hartig, 1836, p. 737; Schlechtendal, 1882, p. 27, n° 21, pl. III, 5-6. ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 22 22 a. ⊕; Molliard, 1902, p. 22-26, pl. I, 1-6. ⊕; Houard, 1903<sup>c</sup>, p. 191-195 fig. 77-80, ⊕; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XI, n° 261, ⊕; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 29. ⊕. E-T.

- Galle résineuse (fig. 12-15). **Evetria resinella L.** 75  
 Ratzeburg, 1840, p. 210-212, n° 4, pl. XIV, 1, ⊕; Henschel, 1895, p. 414-415, fig. 149. ⊕; Connold, 1901, pl. XXXVII, ⊕; Houard, 1903<sup>c</sup>, p. 379-382, fig. 364-374, ⊕; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n° 24, ⊕. E-G, E-O.



Pinus silvestris  
*Evetria resinella* (n° 75)  
 Fig. 12-15 (a-d). — D'ap. nat.

- Pl. fe.** — Aiguilles décolorées, courtes, épaissies; une larve rougeâtre dans la gaine. M.T. **Thecodiplosis brachyntera SCHW. EGR.** 76  
 Schwägrichen, 1835, p. 162; Ratzeburg, 1844, p. 160-161, n° 2, pl. X, 15, ⊕; Henschel, 1895, p. 474; Rubsaamen, 1901, p. 94, n° 61, p. 122, n° 110, fig. 14, ⊕; Kertész, 1902, p. 102. E-T.

— Aiguilles restées courtes, épaissies en leur milieu, étroitement accolées et constituant une cécidie en forme de fuseau à

l'intérieur de laquelle vit une larve blanchâtre, velue, à tête noire. M. C. **Brachonyx pineti** PAYK.

77

Henschel, 1895, p. 89, n° 1; Rübssamen, 1901, p. 122, n° 109; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 276. A, F.

— [Gaine des aiguilles déformée et élargie en forme de coupe.

**Adelges pini** RATZ.]

78

A. Muller, 1876, p. 21, n° 88; Kieffer, 1901b, p. 556, 11°.

I-B.

**Pinus montana** MILLER (**P. Pumilio** HENKE, **P. Mughus** SCOP.)

Pl. ti. — Voir n° 74. **Eriophyes pini** NAL.

79

Thomas, 1885b, p. 62, n° 87; Dalla Torre, 1892, p. 141; Massalongo, 1893c, p. 422, n° 19; Bezzi, 1899, p. 24, n° 51; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVI, n° 416, ⊕.

E-G, I.

Pl. fe. — Voir n° 76. **Thecodiplosis brachyntera** SCHWLEGR.

80

Rostrup, 1896, p. 5, n° 11.

D.

**Pinus Pinea** L.

Pl. fe. — Aiguilles très raccourcies et disposées en spirale sur un rameau. **Thecodiplosis brachyntera** SCHWLEGR.]

81

Masters, 1869, p. 89, fig. 41, ⊕; Mik, 1886, p. 102, n° 5.

**Pinus Strobus** L.

Pl. ti. — Minimes bosselettes. **Lestes viridis** VAN DER LIND.]

82

Rocquigny-Adanson, 1903, p. 56

F.

Pl. fe. — Gaine des aiguilles déformées. **Adelges corticalis** KALT.]

83

Eckstein, 1890, p. 88-89; Schouteden, 1903b, p. 97.


A.

— Voir n° 104A. **Adelges orientalis** DREYFUS

84

P. Marchal, 1906b, p. 181 (expérimental).

F.




**Cedrus Deodara** LOUD.

Pl.ra. — Renflements volumineux. **Biorrhiza aptera** BOSCH]

85

A. Muller, 1873, p. 27.

I-B.



**Larix europæa** DC. (**L. decidua** MILLER, **Pinus Larix** L.)

- Ac.bg.** — Bourgeon déformé, gonflé, mesurant 5 mm. de diamètre, à écaillés brunes couvertes de résine. Larve rouge minium. M.C.H. **Perrisia laricis** F.LÖW 86  
 Henschel, 1875, p. 183-185, fig. 1-4, ⊕; F. Löw, 1878b, p. 393-395; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. IX, n° 260, ⊕; Kieffer, 1900c, pl. XLIII, 8, ⊕. *E-G.*
- Bourgeon terminal ou axillaire gonflé et épaissi. **Eriophyes laricis** TUBEUF 87  
 Tubeuf, 1897, p. 120-124, 3 fig.; Nalepa, 1898, p. 7. *A.*
- Pl. ti.** — Nodosité ou renflement fusiforme. M.C.H. **Grapholitha zebeana** RATZ. 88  
 Ratzeburg, 1868, p. 68 7<sup>e</sup>, pl. XL ⊕; Altum, 1882, p. 195-196, fig. 19, ⊕; Borgmann, 1892, p. 749-754; 1894, p. 395. *E-G.*
- Pl. fe.** — Aiguilles courbées. . . . . [**Adelges lariceti** ALTUM] 89  
 Kieffer, 1901b, p. 554, 3<sup>e</sup>; Schouteden, 1903b, p. 95, c. *E-G.*
- Aiguilles courbées vers le milieu, en angle presque droit. Puceron brun foncé ou noir, lanugineux. **Adelges geniculatus** RATZ. 90  
 Eckstein, 1890, p. 88; Schouteden, 1903, p. 177; 1903b, p. 95, b. *E-G.*
- Aiguilles doublement courbées, de telle sorte que les parties distale et proximale restent dans le même plan. Puceron jaune soufre, non lanugineux. **Adelges abietis** KALT. 91  
 Eckstein, 1890, p. 88; Schouteden, 1903, p. 177; 1903b, p. 95, a. *E-G.*

**Larix leptolepis** GORDON

- Pl. fe.** — Voir n° 91. . . . . **Adelges abietis** KALT. 92  
 Cecconi, 1904b, p. 181, n° 11. *I.*

**Picea excelsa** LINK (**Abies excelsa** DC., **Pinus Abies** L.)

- Ac.fr.** — [Petits épaississements verruqueux à la face interne des écaillés du cône ou bien cônes stériles. **Perrisia strobi** WINN.] 93  
 Winnertz, 1853, p. 234, n° 20; Kihlman, 1890; Kertész, 1902, p. 50. *E-G., E-V.*


**Ac. ti.** — Cécidie de forme très variable, généralement terminale, ressemblant à un ananas (fig. 16), de teinte jaune de cire, blanchâtre ou vert pâle, plus rarement rougeâtre, souvent couronnée par un petit bouquet d'aiguilles. La cécidie résulte d'un raccourcissement des entre-nœuds supérieurs rapprochant les aiguilles qui s'hypertrophient et se soudent dans leur partie basilaire ; des cavités se délimitent ainsi dont le bord est glabre et parfois garni de bandes rosées ou rougeâtres. Fondatrice aptère, petite, brun sombre ou noire, donnant naissance à des larves brunes qui se transforment en ailés rouge jaunâtre et plus tard rouge sombre.

**Adelges strobilobius** KALT.

94

Ratzeburg, 1844, p. 200-201, n° 1, pl. XII, 1, X, Z, F, E. ⊕ ; Kieffer, 1891, p. 43, n° 39, fig. 4. ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VI, n° 191, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. III, n° 72, ⊕ ; Schouteden, 1903, p. 180 ; Cholodkovsky, 1906, p. 18-24, n° 3, pl. I, 3, pl. II, 6<sup>b</sup>, pl. III, 17-21, ⊕.

E-T.



*Picea excelsa*  
*Adelges strobilobius* (n° 94)  
Fig. 16. — D'ap. nat.

*Picea excelsa*  
*Adelges cozeinus* (n° 96)  
Fig. 17-20 (a-d). — Im. Cholodk.

— Cécidie semblable à la précédente.

**Adelges lapponicus** CHOLODK.

95

α. var. **PRÆCOX** CHOLODK. : ailés rouge clair, sans sécrétion cirreuse ; galle mûre en juin.  
β. var. **TARDUS** DUBYETS : ailés rouge sombre, avec sécrétion cirreuse ; galle mûre fin juillet, commencement août.

Schouteden, 1903, p. 180 ; 1903<sup>b</sup>, p. 96 ; Cholodkovsky, 1906, p. 24-27, n° 4, pl. III 22.

E-G,  
E-N.



— Cécidie semblable aux précédentes, mais non cirreuse et sans bandes rouges ou rosées au bord des cavités (fig. 17-20).

**Adelges coccineus** CHOLODK. 96

Schouteden, 1903, p. 180 ; Cholodkovsky, 1906, p. 30-34, n° 6, pl. 1, 4, pl. IV, 25-27, pl. V, 28-30, ⊕.

E-G.  
E-N.

— Cécidie semblable à la précédente. L'ailé en diffère par le 5<sup>e</sup> article des antennes qui est plus long que le quatrième.

**Adelges funitectus** DREYFUS 97

Schouteden, 1903<sup>b</sup>, p. 96 ; Cholodkovsky, 1906, p. 35-37, pl. V, 31-32.

E-G.  
E-N.

**Pl. ti.** — Nodosité. . . . . **Gelechia electella** ZELL. 98

Sorhagen, 1898, p. 115-116 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 377.

E-G.

— Cécidie pluriloculaire, de 6-9 mm. de longueur sur 4-6 mm. de diamètre, provenant de l'hypertrophie du parenchyme cortical. Larve couleur minium. M.C. \***Perrisia piceæ** HENSCHEL 99

Henschel, 1881, p. 505-508, fig. 27-30, ⊕ ; 1895, p. 474, n° 1 ; Kertész, 1902, p. 45.

\* Probablement synonyme de *Perrisia abietiperda* Henschel (Mik, 1890, p. 288).

E-G.

— Cécidie en forme de tonnelet située dans l'épaisseur de l'écorce et du bois des jeunes pousses ; celles-ci restent un peu plus courtes, en partie sans aiguilles et parfois courbées. Larve couleur minium. M.C. **Perrisia abietiperda** HENSCHEL 100

Henschel, 1880, p. 371-372 ; 1895, p. 474, n° 2 ; Massalongo, 1894<sup>b</sup>, p. 83-84, n° 7 ; Kertész, 1902, p. 30.

E-G, I.

**Pl. fe.** — Cécidie en ananas, atteignant 20-30 mm. de long, placée sur le côté d'un rameau qu'elle n'entoure pas (fig. 21, 25) et formée par la juxtaposition et la soudure (fig. 29) d'un certain nombre d'aiguilles fortement épaissies et élargies dans leur partie basilaire (fig. 28, 30) ; les bords des ouvertures qu'elles laissent entre elles sont toujours poilus et teints de rouge ou de brun ou encore blanchâtres. Fondatrice aptère, petite, jaune de miel après la 3<sup>e</sup> mue, verdâtre sale ou vert clair après la ponte ; larves vert clair ou vert jaunâtre, plus tard jaunâtres ; ailés jaune clair puis jaune sombre. **Adelges abietis** KALT. 101

Ratzeburg, 1844, p. 201-202, n° 2, pl. II, 2, X, L, L', E, F, ⊕ ; 1866, p. 256-258, pl. XXVIII, 1, 2, pl. XXX, 5, ⊕ ; Kieffer, 1891<sup>f</sup>, p. 23, n° 38, fig. 5, ⊕ ; Massalongo, 1893, p. 45-47, n° 10, pl. II, 4, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. I, n° 15, ⊕ ; Connold, 1901, pl. XXXIV, ⊕ ; Houard, 1903<sup>c</sup>, p. 170-188, fig. 42-73, ⊕ ; Cholodkovsky, 1906, p. 13-18, n° 2, pl. III, 15-16 ; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n° 10, ⊕.

E-T.

— Cécidie absolument semblable à la précédente (fig. 22).

**Adelges viridis** RUTZ. 102


Schouteden, 1903, p. 180 ; Cholodkovsky, 1906, p. 5-13, n° 1, pl. I, 1-2, pl. II, 7-12. ⊕. E-V.



*Picea excelsa*  
*Adelges abietis* (n° 101).  
Fig. 21. — D'ap. nat.



*Picea excelsa*  
*Adelges viridis* (n° 102)  
Fig. 22. — Im. Cholodk.



*Picea excelsa*  
*Adelges sibiricus* (n° 103)  
Fig. 23. — Im. Cholodk.

— A l'extrémité des rameaux toujours courbés (parfois raccourcis), les aiguilles insérées sur l'un des côtés, qui est le plus souvent le côté concave, sont épaissies dans leur partie basilaire (fig. 23) ; celle-ci est ponctuée de rouge. Fondatrice brun chocolat.

**Adelges sibiricus** CHOLODK. 103

Cholodkovsky, 1900, p. 265-283 ; 1906, p. 39-42, n° 9, pl. I, 5, pl. IV, 25b, pl. VI, 35-37 ⊕ ; Schouteden, 1903, p. 180. E-V, B.


***Picea orientalis* L.**

**Ac. ti.** — Voir n° 97. . . . . **Adelges funitectus** DREYFUS 104

P. Marchal, 1906, p. 111-114 ; 1907c, p. 368-370, qv. F.

**Pl. fe.** — Cécidie allongée et fusiforme constituée par les aiguilles, épaissies à la base et non concrescents (fig. 26-27), de l'extrémité d'un rameau ; celui-ci n'est ni raccourci ni tordu.

**Adelges orientalis** DREYFUS 104A



HOCARD phot.

HERMANS édit.

*Picea excelsa*

Rameaux déformés par les cécidies de *Adelges strobilobius* (n° 94)  
et de *Adelges abietis* (n° 101).



Hieronymus, 1890, p. 114, n° 335 ; Lemée, 1903<sup>b</sup>, p. 33 ; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n° 335, ⊕ ; P. Marchal, 1906<sup>b</sup>, p. 179-180 ; 1907<sup>b</sup>, p. 340, note 2 ; Chodkovsky, 1906, p. 42-44, n° 10, pl. VI, 38-39, ⊕, p. 44-48, n° 11. E-O,  
E-E.

**Picea alba** AITON

Pl. fe. — Voir n° 101. . . . . **Adelges abietis** KALT. 105

Hieronymus, 1890, p. 113, n° 331 ; Schlechtendal, 1890, p. 5 (note). A.




Fig. 24 : N

Fig. 25 : A

*Picea excelsa*. — Comparaison entre un rameau normal (N) et un rameau (A) arrêté dans son développement par suite de la présence d'une cécidie d'*Adelges abietis* dans sa partie inférieure (d'ap. nat.). — Voir aussi Planche I.

**Picea nigra** AITON

Pl. fe. — Voir n° 101. . . . . **Adelges abietis** KALT. 106


Hieronymus, 1890, p. 114, n° 334 ; Schlechtendal, 1890, p. 5 (note). A.

**Picea Morinda LINK**

Pl. fe. — Voir n° 101. . . . . *Adelges abietis* KALT. 107  
 Geeconi, 1900, p. 229, n° 1. I.

**Picea Menziesi CARR.**

Ac. ti. — Voir n° 94. . . . . *Adelges strobilobius* KALT. 108  
 Lemée, 1903b, p. 63. F.



*Picea orientalis* : *Adelges orientalis* (n° 104). — Fig. 26, 27 (a, b). — Im. NISTCHE  
*Picea excelsa* : *Adelges abietis* (n° 101). — Fig. 28, 29, 30 (c, d, e). — Im. NUSCHE

Pl. fe. — Voir n° 101. . . . . *Adelges abietis* KALT. 109  
 Lemée, 1903b, p. 63. F.

**Picea carulea LINK**

Pl. fe. — Voir n° 101. . . . . *Adelges abietis* KALT. 110  
 Lemée, 1903b, p. 63. F.


**Abies pectinata DC. (A. alba MILLER, v. vulgaris POIR.)**

Ac. ti. — A l'extrémité des pousses, dont les entre-nœuds sont un peu raccourcis, les aiguilles déformées et légèrement hyper-

trophiées s'appliquent contre l'axe (fig. 31). Aphides en société entre les feuilles, revêtus de substance céroïse blanche.


**Mindarus abietinus** KOCH 111

Koch, 1857, p. 275; Schouteden, 1903, p. 168; Cecconi, 1904<sup>b</sup>, p. 178, n° 1; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. III, n° 301, ⊕. *E-C, L.*



*Abies pectinata*  
*Mindarus abietinus* (n° 111)

Fig. 31. — D'ap. nat.



*Abies pectinata*  
*Eriophyes pini* var. *floricola* (n° 112)

Fig. 32. — D'ap. nat.

**Ac.bg.** — Bourgeons floraux atrophiés, déformés (fig. 32).

**Eriophyes pini** NAL. var. *floricola* TROTTER 112

Cecconi, 1904<sup>b</sup>, p. 341-342, n° 1, pl. IX, 4, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VII, n° 151, ⊕. *L.*

**Pl. ti.** — Renflement. . . . . **Gelechia electella** ZELL. 113

Lemée, 1902, p. (26) n° 1. *F.*

**Pl. fe.** — Aiguille légèrement renflée à la base, surtout à la face inférieure. Larve jaune orangé. **Cécidomyide** 114

Escherich et Wimmer, 1903, p. 119-122, 4 fig. *A.*

— [Voir n° 101. . . . . *Adelges abietis* KALT.]  
 Focken, 1890, p. 235-236.

115

F.

***Abies Nordmanniana* LINK**

**Pl. ti.** — Sur le coussinet d'une aiguille, renflement allongé contenant une cavité larvaire de 5 mm. de long sur 1,5 mm. de large ; la pousse est un peu renflée et paraît raccourcie.

***Perrisia abietiperda* HENSCHEL**

116

Martel, 1891, p. 28-29, n° 54 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 378-379.

F.



*Abies nobilis* var. *glauca*  
*Adelges piceæ* var. *Bouvieri* (n° 120)

Fig. 33 (a, b). — D'après nat.

**Pl. fe.** — Aiguilles courbées, légèrement hypertrophiées.

***Adelges Nordmannianæ* ECKSTEIN**

117

Eckstein, 1890, p. 90 ; Schouteden, 1903, p. 168 ; 1903<sup>b</sup>, p. 91, n° 2.

E-C.



- Aiguilles terminales des jeunes pousses recourbées et rapprochées de l'axe. Puceron lanugineux ; ailé à abdomen vert orné de bandes transversales noires, vivant à la base des feuilles. **Mindarus abietinus** KOCU 118  
Schouteden, 1903<sup>b</sup>, p. 91, n° 1. A.

**Abies nobilis** LINDL.

- Ac. ti.** — Jeunes pousses raccourcies, à entre-nœuds épaissis ; feuilles incurvées vers la base du rameau, décolorées et réduites dans leurs dimensions. **Aphide** 119  
Houard, 1904<sup>b</sup>, p. 313-318, fig. 36-47, ⊕. F.

**Abies nobilis** LINDL. var. **glauca**

- Ac. ti.** — Jeunes pousses épaissies ; bourgeons hypertrophiés et rapprochés en amas (fig. 33). **Adelges piceæ** RATZ. var. **Bouvieri** CHOLODK. 120  
Cholodkovsky, 1903, p. 258-259, pl. I, 1-3, ⊕ ; 1906, p. 37-39, n° 8, pl. VI, 34, ⊕ ; Schouteden, 1903<sup>b</sup>, p. 91. F.

**Abies Finsapo** BOISSIER

- Pl. ti.** — Renflement. . . . . [**Gelechia electella** ZELL.] 121  
Lemée, 1902, p. (26), n° 1. F.



**Cupressus funebris** ENDL. (**C. pendula** STAUNT.)

- Ac. bg.** — Bourgeons axillaires fortement grossis ; extrémité des tiges brunie. **Ériophyide** 122  
Sorauer, 1886, p. 827 ; Frank, 1896, p. 66. A.



**Juniperus communis** L. (et **J. nana** WILLD., **alpina** GAUD.)

- Ac. fr.** — Baie grossie, à écailles incomplètement soudées, laissant au

sommet une ouverture formée de trois fentes irradiées (fig. 34); les ovules hypertrophiés font saillie par ces fentes.

**Eriophyes quadrisetus** THOMAS

123

Massalongo, 1890, p. 460-462 : 1891, p. 91, n° 22, pl. II, 11-16, ⊕ ; Lagerheim, 1899, p. 114-121, pl. V, 1-2, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIV, n° 328, ⊕.

E-N,  
E-G,I.

- Ac. ti. { Cécidie non en forme de bourgeon ..... A.  
 { Cécidie en forme de bourgeon } comportant 1 verticille d'aiguilles... B.  
 { de } comportant 2 verticilles d'aiguilles... C.  
 { bourgeon } comportant plus de 2 verticilles d'aiguilles... D.


A. — Aiguilles terminales d'une pousse fortement hypertrophiées à la base et réunies en amas par suite de la non-élongation des entre-nœuds supérieurs (fig. 35).

**Eriophyes quadrisetus** THOMAS

124

Massalongo, 1890, p. 461 : Lagerheim, 1899, p. 114-121, fig. A, B, C, D, pl. V, 3-4, ⊕.

E-G,  
E-N,I.




a




b

Juniperus communis  
*Eriophyes quadrisetus* (n° 123-124)  
 Fig. 34 (a). — Im. LAGERHEIM  
 Fig. 35 (b). — Im. LAGERHEIM



a



b

Juniperus communis  
*Oligotrophus* (n° 125)  
 Fig. 36 (a). — Im. RÜBS.  
 Fig. 37 (b). — Diagramme

B. — Les 3 aiguilles du verticille terminal restent courtes et s'accolent latéralement pour former une petite cécidie de 3 mm. de long (fig. 36-37). Larve orangée. M.C. **Oligotrophus**

125


Rubsamen, 1890, p. 38, pl. II, 10<sup>c</sup>, ⊕ ; Lagerheim, 1899, p. 123 ; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. XXXV, 6, ⊕ ; Bouard, 1905<sup>c</sup>, p. 200-201, fig. 1-2, ⊕.

E-N,  
A,F.

C. — Cécidie terminale, formée aux dépens des deux derniers verticilles de la pousse, longue de 6-12 mm. et large de 3-5 mm. (fig. 38-40); les trois aiguilles externes sont élargies dans leur moitié inférieure, très effilées dans leur moitié supérieure (fig. 41) et elles cachent celles du verticille interne, plus courtes et plus étroites, qui délimitent la chambre larvaire. Larve orangée. M.C. **Oligotrophus Panteli** KIEFF. 126

Kieffer, 1898, p. 18; 1900<sup>c</sup>, pl. XXXV, 5, ⊕; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. X, n° 250, ⊕; Tavares, 1905, p. 31, pl. VIII, 18, 25, ⊕; Houard, 1905<sup>c</sup>, p. 201-204, fig. 3-5, 15-16, ⊕; 1905<sup>d</sup>, p. 79-84, fig. 18-29, ⊕.

E-T.



**Juniperus communis**  
*Oligotrophus Panteli* (n° 126)  
Fig. 38 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 39 (b). — D'ap. nat.  
Fig. 40 (c). — Diagramme.

**Juniperus communis**  
*Oligotrophus Panteli* (n° 126)  
Fig. 41 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 42 (b). — D'ap. nat.  
Fig. 43 (c). — Diagramme.

**Juniperus communis**  
*Oligotrophus* (n° 127)  
Fig. 44 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 45 (b). — D'ap. nat.  
Fig. 46 (c). — Diagramme.

— Cécidie terminale formée aux dépens des deux derniers verticilles. Les feuilles du verticille externe, élargies et épaissies dans toute leur longueur se touchent par leurs bords; leurs pointes se recourbent en dehors lorsque la galle est éclosée et desséchée et l'ensemble constitue alors une sorte de calice (fig. 44-46). Les aiguilles du verticille interne, petites et appliquées étroitement les unes contre les autres, abritent la larve. M.C.

**Oligotrophus** 127

1. FORME ALPINE OU ARCTIQUE (12 mm. de longueur : Schlechtendal, 1895, p. 3; Lager-Houard, *Zoocécidies*.


E-T.

heim, 1899, p. 122-125, pl. V, 56, ⊕ : Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. XXXV, 4, ⊕ : Houard, 1905d, p. 74-79, fig. 7-17, ⊕.


H. FORME DE BLAISE du Bassin parisien (10 mm. de longueur) : Houard, 1905<sup>c</sup>, p. 204-205, fig. 17-18, ⊕ : 1905<sup>d</sup>, p. 70-73, fig. 1-6, ⊕. — En raison des caractères histologiques régressifs que possède cette seconde forme de cécidie (fig. 42), il est possible qu'elle dérive d'une galle d'*Oligotrophus Panteli* modifiée dans son développement par une action parasitaire (Lagerheim, 1899, p. 124-125 « *Doppelcécidium* » : Houard, 1905<sup>b</sup>, p. 79, note 1).

— Cécidie constituée comme les précédentes et à pointes recourbées en arrière. Coccide 128

Schlechtendal, 1895, p. 3. — En dehors de cette indication bibliographique, nous ne pouvons citer que l'observation suivante : nous avons fréquemment rencontré des Coccides à l'aisselle des feuilles du verticille externe de la cécidie précédente (Forme H) lorsque celle-ci était ouverte et en forme de calice. A.F.



*Juniperus communis*  
*Oligotrophus juniperinus* (n° 129)  
Fig. 47. — D'ap. nat.



*Juniperus communis*  
*Oligotrophus juniperinus* (n° 129)  
Fig. 48 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 49 (b). — D'ap. nat.  
Fig. 50 (c). — Diagramme.

D. — Cécidie terminale fusiforme (fig. 47) rappelant un gros bourgeon : elle est formée en général aux dépens des trois derniers verticilles (fig. 48) : quelquefois un quatrième verticille prend part à la constitution de la galle (fig. 49). Les aiguilles du premier verticille (1) sont raccourcies, fortement colorées en marron et elles délimitent la chambre larvaire (fig. 50) ; les

aiguilles du second verticille (2) sont un peu allongées, fortement carénées et épaissies à la base ; celles du troisième (3) conservent la taille normale, mais elles s'élargissent et s'épaississent dans leur partie inférieure. Une larve orangée. M.C.

**Oligotrophus juniperinus L. 129**

Hieronymus, 1890, p. 144-145, n° 457. Trotter et Cecconi, 1900, fasc. I, n° 11, ⊕ ; E-T.  
 Houard, 1899, p. 298-304, fig. 1-4 pl. XX. ⊕ ; 1905<sup>c</sup>, p. 208-213, fig. 9-12, 21 22, ⊕.

**Pl. ti. — Renflement noueux. . . . . Gelechia electella ZELL. 130**

**Sesia cephiroformis OCHSENL. 131**


**Grapholitha duplicana ZETT. 132**

**Lobesia permixtana HÜBNER 133**

A. Muller, 1870, p. 23-24 ; Kallenbach, 1874, p. 680, n° 6, p. 681, n° 17 ; Sorhagen, 1898, p. 115-116 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 345, 559. E-T.

— [Petite nodosité hémisphérique, ligneuse. . . . Diptère] 134

Fitch, 1883, p. 6, 1 fig., ⊕. I-B.



**Juniperus Oxycedrus**  
*Rhopalomyia Valerii* (n° 135)  
 Fig. 51. — D'ap. nat.

**Juniperus Oxycedrus**  
*Rhopalomyia Valerii* (n° 135)  
 Fig. 52 (a). — D'ap. nat.  
 Fig. 53 (b). — Diagramme.

**Juniperus Oxycedrus**  
*Oligotrophus* (n° 136)  
 Fig. 54 (a). — D'ap. nat.  
 Fig. 55 (b). — Diagramme.

**Juniperus Oxycedrus L.**

**Ac.ti.** — Cécidie en forme de cône (fig. 51), de 10-12 mm. de longueur sur 8-10 mm. de diamètre à la base (fig. 52), compor-

tant un verticille interne d'aiguilles brunâtres atrophiées qui délimitent la chambre larvaire (fig. 53) et un verticille externe d'aiguilles très épaisses, très larges, soudées à la base et un peu raccourcies. Larve unique. M.C.

**Rhopalomyia Valerii TAVARES** 135

Hieronymus, 1890, p. 145, n° 458; Houard, 1899, p. 304-310, fig. 4-6, ⊕; 1905<sup>d</sup>, p. 89-90, fig. 36-39 ⊕; Tavares, 1904<sup>b</sup>, p. 299-301; 1905, p. 31, pl. VIII, 23-24, ⊕. *F, E, P, AL.*

— Cécidie formée par deux verticilles d'aiguilles (fig. 54-55) et rappelant par son aspect élancé la galle décrite au n° 126; le plus souvent un 3<sup>e</sup> verticille de feuilles, épaissies à la base, mais de longueur normale, entoure la cécidie. Larve orangée. M.C.

**Oligotrophus** 136

Houard, 1901<sup>d</sup>, p. 704, n° 33; 1905<sup>d</sup>, p. 84-89, fig. 30-35, 40-45, 47-50, ⊕; Trotter, 1903, p. 28, n° 54. *AL, A-M.*

**Juniperus macrocarpa SMITH et SIBTH.**

**Ac.ti.** — Cécidie en forme de gros bourgeon. Voir n° 129.

**[Oligotrophus juniperinus L.]** 137

Bezzi, 1899, p. 11, n° 15; Houard, 1905<sup>e</sup>, p. 215. *I.*

**Juniperus Sabina L.**

**Ac.ti.** — Cécidie terminale vert jaunâtre (fig. 56), ovoïde, formée de plusieurs paires d'aiguilles grossies et déformées, atténuées brusquement à la base, accolées sur toute la longueur de leurs bords jusqu'à la pointe et munies d'un profond sillon dorsal (fig. 58). Quand l'insecte a abandonné la galle, les pointes s'écartent (fig. 57), puis les aiguilles brunissent et tombent. Larve unique, courte.

**Cécidomyide** 138


Thomas, 1892, p. 373, n° 13, fig. 6, pl. VII, 11-12, ⊕; Houard, 1905, p. 58; 1905<sup>d</sup>, p. 91-93, fig. 51-55, pl. I, N, A, ⊕. *E-C.*

— Extrémité des pousses déformée (fig. 59) et transformée, par suite de l'arrêt de développement des entre-nœuds, en un amas prismatique, de 13 mm. de longueur environ, comprenant 3-7 paires d'aiguilles (fig. 60), fortement grossies (fig. 61); cécidi-

die vert jaunâtre au début, plus tard couleur rouille ou brune.  
M.C. **Oligotrophus sabinæ** KIEFF. 139

Thomas, 1892, p. 373, n° 14, fig. 7, pl. VII, 11, 13, ♀; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. XXXV, 7, ♂; Kertész, 1902, p. 75; Houard, 1905, p. 58; 1905<sup>d</sup>, p. 94-95, fig. 56-58, pl. I, A', ♂.


E-G.



**Juniperus Sabina**

*Cécidomyide* (n° 138)

Fig. 56 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 57 (b). — D'ap. nat.  
Fig. 58 (c). — D'ap. nat.



**Juniperus Sabina**

*Oligotrophus sabinæ* (n° 139)

Fig. 59 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 60 (b). — D'ap. nat.  
Fig. 61 (c). — D'ap. nat.

— Cécidie terminale ellipsoïdale (1,5-2 mm. sur 3-4 mm.), à parois très minces, surmontée par une petite pointe oblique au-dessous de laquelle se trouve le trou de sortie.

[Asphondylia]

140

E.

Kieffer, 1898, p. 17; 1901<sup>b</sup>, p. 345.

**Juniperus phœnicea L.**

**Ac.ti.** — Cécidie en rosette. . . . . **Cécidomyide** 141

Frauenfeld, 1855, p. 21; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 346; Houard, 1905<sup>c</sup>, p. 219.

A-II.

— Cécidie en bouquet fusiforme de 12 mm. de long sur 5 mm. de diamètre, constitué par des aiguilles élargies appliquées les unes sur les autres. **Cécidomyide** 142

Thomas, 1892, p. 374; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 346; Houard, 1905<sup>c</sup>, p. 219.


A-H.

**Juniperus phœnicea L. var. prostrata**

**Ac.ti.** — Cécidie identique à la précédente, mais isodiamétrique ou même plus large que longue. **Cécidomyide** 143  
 Thomas, 1892, p. 374; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 346; Houard, 1905<sup>c</sup>, p. 219. *E.*

**Juniperus excelsa WILLD. (J. foetidissima WILLD.)**

**Ac.ti.** — Bouquet terminal de feuilles, fusiforme (2 mm. d'épaisseur sur 5 mm. de long), élancé (fig. 62,A). **Cécidomyide** 144  
 Thomas, 1892, p. 374; Rùbsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 268-269, n° 40, pl. XIII, 16<sup>b</sup>, 21, ⊕. *A.-M.*  
 — Cécidie plus arrondie (7 mm. sur 4-5 mm.) ; aiguilles très élargies à la base (fig. 63,B). **Cécidomyide** 145  
 Rùbsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 269, n° 41, pl. XIII, 16<sup>a</sup>, 18, ⊕. *A.-M.*



*Juniperus excelsa*  
 Cécidomyide (n° 144-148)  
 Fig. 62 (A) — 63 (B) — 64 (C) — 65 (D) — 66 (E). — Im, Rùbs.

— Cécidie terminale allongée, prismatique, longue de 10 mm., large de 3-4 mm., formée d'aiguilles courtes appliquées les unes contre les autres (fig. 64,C). **Cécidomyide** 146  
 Thomas, 1892, p. 374 (sur *J. macropoda* Boissier); Rùbsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 269-270, n° 42, pl. XIII, 20, ⊕.  
 Nous avons signalé cette cécidie de Perse, bien qu'elle soit un peu en dehors de l'aire géographique adoptée dans ce Catalogue, en raison de la présence de son image dans le cliché ci-dessus.  
 — Cécidie ovoïde formée de grosses écailles atténuées brusquement à la base (fig. 65,D). **Cécidomyide** 147  
 Rùbsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 270, n° 43, pl. XIII, 22, ⊕. *A.-M.*



— Cécidie ovoïde, longue de 7-9 mm., épaisse de 4-5, atteignant son plus grand diamètre transversal au milieu de la hauteur (fig. 66, E) ; écailles à carène d'un vert grisâtre, élargies et à pointe obtuse.

Cécidomyide 148

Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 270-271, n° 44, pl. XIII, 17, 19, ⊕.

A-M.

### **Juniperus intermedia** SCHUR

**Ac.ti.** — Cécidie en forme de gros bourgeon. Voir n° 129.

[*Oligotrophus juniperinus* L.] 149


Dalla Torre, 1895, p. 146.

E-G.




### **Taxus baccata** L.

**Ac.ti.** — A l'extrémité de la tige, cécidie en artichaut formée de nombreuses feuilles demeurées courtes et molles (fig. 67) ; feuilles externes vertes, de teinte plus claire que les feuilles



*Taxus baccata*  
*Oligotrophus taxi* (n° 150)  
Fig. 67. — Im. Mik



*Taxus baccata*  
*Eriophyes psilapsis* (n° 153)  
Fig. 68. — D'ap. nat.

normales ; feuilles internes décolorées. Larve unique rouge.  
M.C.

*Oligotrophus taxi* LICHN. 150

Mik, 1885, p. 65, pl. I, 1, ⊕ ; F. Low, 1885<sup>c</sup>, p. 494-495 ; Rübsaamen, 1901, p. 86, 93, 133, fig. 18-19, ⊕ ; Connold, 1901, pl. CCVIII, ⊕ ; Houard, 1904<sup>b</sup>, p. 334-338, fig. 83-93, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVIII, n° 443, ⊕.

E-T.

— A l'extrémité d'une pousse, feuilles petites et rapprochées en rosette. [Ériophyide]

151

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 525 ; Cecconi, 1902<sup>b</sup>, p. 363, n° 53.

I.

— Cécidie située à l'extrémité d'une pousse et composée de 8 à 16 masses arrondies, brunes, confluentes.

**Adelges taxi** BUCKTON

152

Buckton, 1886, p. 327-328, pl. VII, 1-3, ⊕ ; Frank, 1896, p. 167, n° 4.

I-B.

**Ac.bg.** — Bourgeon grossi, atteignant jusqu'à 8 mm. de diamètre (fig. 68) ; il demeure complètement ou à moitié fermé et prend une teinte plus claire, jaune, parfois rouge ; les parties attaquées deviennent charnues et sont couvertes de petites verrues.

\* **Eriophyes psilaspis** NAL.

153

F. Löw, 1878, p. 144, n° 24, pl. II, 7, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1905, fasc. XIII, n° 373, ⊕ ; Connold, 1901, pl. LX, ⊕ ; Reijndraan et Leeuwen, 1907, 14 p., 2 pl.

E-G.

E-O.

\* Commensal ; *Epitrimerus gemmicola* Nal. (Nalepa, 1898, p. 6, n° 3, p. 62, n° 1).

**Taxus adpressa** GORDON

**Ac.ti.** — Voir n° 150. . . . . **Oligotrophus taxi** INCHB.

154

Lemée, 1903, p. (93).

F.

**Taxus Dovastoni** HORT.

**Ac.ti.** — Voir n° 150. . . . . **Oligotrophus taxi** INCHB.

155

Lemée, 1903, p. (93).

F.

**Taxus hibernica** HOOKER

**Ac.ti.** — Voir n° 150. . . . . **Oligotrophus taxi** INCHB.

156

Lemée, 1903, p. (93).

F.

FAMILLE DES GNÉTACÉES



**Ephedra atte** C. A. MEYER

**Ac.ti.** — Cécidie terminale en artichaut formée par la réunion d'un certain nombre de feuilles rapprochées par suite de l'arrêt de développement des entre-nœuds.

**Insecte**

157

Foeken, 1892, p. 155-156, sur *Ephedra alta* Cass. [?]. Sur cette galle vit l'*Eriophyes ephedra* Foeken (Foeken, 1892, p. 155-156, 2 fig. ; Nalepa, 1898, p. 7, n° 4) ; Massart, 1898, p. 291.

AL.

SY.

**Ephedra distachya L.**

- Pl. ti.** — Renflement ovoïdal de 7 mm. de long sur 4 mm. de diamètre, à parois épaisses (1 mm.), et ligneuses ; surface vert jaunâtre ; cavité larvaire allongée. **Cécidomyide** 158  
 Darboux, 1899, p. 269 ; Houard, 1903<sup>c</sup>, p. 350-355, fig. 322-331, ⊕. *F.*

**Ephedra sp.**

- Ac. bg.** — Bourgeon terminal ou axillaire transformé en un amas globuleux de feuilles hypertrophiées qui enveloppe un réceptacle scléreux, convexe, creux, pluriloculaire. **Insecte** 159  
 Focken, 1895, p. 501-502, pl. XIV, 6 8, ⊕. *SY.*

*Classe des Monocotylédones***FAMILLE DES POTAMOGETONACÉES****Potamogeton natans L.**

- Pl. fe.** — Feuilles jeunes enroulées. Puceron vert foncé, queue pâle, cornicules renflés. **Rhopalosiphum nymphææ L.** 160  
 Schouteden, 1903, p. 183. *A.*

**FAMILLE DES JUNCAGINACÉES****Triglochin palustre L.**

- Ac. fl.** — Fleurs déformées. . . . . 161  
 Schlechtendal, 1895, p. 7. *A.*

## FAMILLE DES ALISMACEES

*Alisma Plantago* L.

- Pl. ti. — [Galles des tiges. . . . . *Lasioptera alismæ* WINN.] 162  
 Winnertz, 1853, p. 198, Remarque; Kaltenbach, 1874, p. 712, n°8. — Cécidie douteuse. A.

*Sagittaria sagittifolia* L.

- Pl. fe. — Feuilles jeunes parfois enroulées. 163  
*Rhopalosiphum nymphææ* L. B.  
 Schouteden, 1903, p. 186.

## FAMILLE DES GRAMINÉES

*Elytropus* 256, *Agropyrum* 308-326, *Agrostis*, 185-197, *Aira* 219-221, *Alopecurus* 183-184, *Ammophila* 211, *Andropogon* 164A, *Anthoxanthum* 168-169, *Apera* 212, *Aristida* 171, *Arrhenatherum* 234-235, *Avena* 222-233, *Bromus* 285-295, *Brachypodium* 296-302, *Calamagrostis* 198-210, *Cynodon* 236-237, *Dactylis* 257-258, *Diplachne* 248, *Elymus* 349-351, *Festuca* 274-284, *Glyceria* 271-273, *Hierochloa* 170, *Holcus* 213-218, *Hordeum* 342-348, *Koeleria* 253-255, *Lolium* 303-307, *Milium* 178, *Molinia* 249-252, *Phalaris* 166-167, *Phleum* 179-182, *Phragmites* 238-247, *Poa* 259-270, *Secale* 338-341, *Setaria* 165, *Stipa* 172-177, *Triticum* 327-337, *Zea* 164.

La famille des Graminées étant très homogène, homotype, il est tout naturel de rencontrer des déformations produites par un animal déterminé sur plusieurs espèces d'un même genre ou sur des genres voisins et de constater les plus grandes ressemblances entre les Zoocécidies qui affectent les diverses parties du végétal (Organes floraux, tiges, feuilles).

Les épillets et leurs fleurs présentent souvent des phénomènes de chloranthie (allongement des différentes pièces, en particulier des glumelles) sous l'influence d'Ériophyides dont le plus répandu est *Eriophyes tenuis* (*Avena*, *Holcus*, *Festuca*, *Aira*, surtout *Bromus*). Divers *Tarsonemus* déforment l'épillet ou enroulent l'inflorescence en tire-bouchon (*Agrostis*, *Cala-*

*magrostis*, *Avena*). Enfin l'ovaire est plus particulièrement habité et hypertrophié fortement par des *Tylenchus* (*T. phalaridis* et *T. agrostidis* sur divers *Phleum*, *Agrostis*, *Calamagrostis*, *Koeleria*, *Poa*, *Triticum*), qui parasitent les graines elles-mêmes (*Tylenchus tritici* du Blé vibrioné).

Avant de quitter l'inflorescence, rappelons que *Stipa tortilis* et un *Aristida* indéterminé présentent tous les deux une galle très curieuse, ovoïdale, située sur le prolongement de l'axe de la fleur.

Les déformations terminales des tiges sont fort nombreuses chez les Graminées où elles constituent de très belles cécidies. Par suite de la présence d'une larve d'*Isosoma* (*I. graminicola*, *I. hyalipenne*, *I. brachypodii*) ou de diptère (*Mayetiola lanceolata*, *Chlorops cingulata* et *C. tenuipus*, *Orseolina*, *Lonchva*, *Lipara*, etc.) à l'extrémité du chaume, dans la région médullaire, l'élongation des entre-nœuds supérieurs ne s'effectue pas, et les feuilles de la pousse, réduites en général à leur gaine élargie, se trouvent agglomérées en un gros bourgeon ou en une tresse allongée. On rencontre de semblables galles dans les genres les plus divers : *Calamagrostis*, *Brachypodium*, *Ammophila*, *Cynodon*, *Agropyrum*, *Triticum*, *Phragmites*, etc.

Par suite d'une réaction identique, mais plus généralisée, et sous l'influence de Diptères et d'Anguillulides fort préjudiciables aux cultures, un grand nombre de Graminées cultivées se renflent à la base, deviennent bulbueuses et arrêtent leur croissance. Tel est le cas bien connu de *Mayetiola destructor*, la Mouche de Hesse, qui attaque les Blés et les Seigles de l'Ancien et du Nouveau Continent, et de *Mayetiola avenae* dont l'habitat est l'Avoine, en Europe occidentale. Tel est encore le cas du *Tylenchus devastatrix*, étudié depuis longtemps par Ritzema Bos, vivant sur le Seigle, le Blé et diverses graminées sauvages (*Holcus*, *Anthoxanthum*, *Poa*, *Lolium*).

Bien différentes des précédentes sont les galles du chaume proprement dit : ou bien elles consistent, à la surface de l'épiderme, en de simples hirsutifères papilleuses, dues à des *Tarsonemus* (*T. Canestrinii* et *T. graminis* sur *Stipa*, *Agropyrum*, etc.), ou bien elles constituent des renflements de tailles variées, en général unilatéraux. Parmi ces derniers des saillies peu marquées sont engendrées par des Diptères ou des Hyménoptères (*Mayetiola hierochloae*, *M. moliniae*, *M. dactylidis*, etc., *Oscinis frit*, *Isosoma aivae*, *I. stipae*, etc.) ; on en a signalé au moins six sur la tige de l'*Agropyrum repens* (nos 316 à 321), mais nous pensons que des recherches ultérieures en réduiront le nombre. D'autres saillies plus accentuées, en forme de selle, sont produites par *Clinodiplosis equestris* et plusieurs *Mayetiola* sur *Triticum*, *Calamagrostis*, *Brachypodium*, *Hordeum*. Enfin, on peut rapporter au même groupe les galles chevelues des Paturins dues à *Mayetiola poae* et *M. radicifica*.

Le limbe des feuilles des Graminées ne présente, en général, que des renflements violacés, saillants sur les deux faces et allongés parallèlement aux nervures : ces galles sont dues à des *Tylenchus* (*Alopecurus*, *Calamagrostis*, *Poa*, *Glyceria*, *Festuca*, *Agropyrum*). Le limbe peut être encore enroulé ou légèrement déformé par des Pucerons (*Brachycolus stelarivae*, *Ugalopectus*, divers *Siphæ*). Enfin, l'*Aphis padi* gonfle et décolore les gaines d'un grand nombre d'espèces appartenant aux genres *Phleum*, *Agrostis*, *Alopecurus*, *Avena*, *Triticum*, *Hordeum*.

Faisons remarquer, en terminant, que les galles des Graminées offrent le plus grand intérêt pour les Agriculteurs, comme pour les Cécidologues,

et qu'on ne saurait trop recommander la lecture des Mémoires si intéressants de Ritzema-Bos (1888, 1892), Lindeman (1888) et P. Marchal (1895, 1897).

~~~~~

Zea Mays L.

Pl.ra. — Nodosités. **Heterodera radicecola** GREEFF 164
Frank, 1896, p. 22.

~~~~~

**Andropogon distachyus L.**

Acre. — Par suite du raccourcissement des entre-nœuds, bourgeons floraux transformés en galles allongées, de 40-50 mm. de longueur sur 5-6 mm. de largeur. Larve unique rouge intense logée entre les écailles centrales. **Cécidomyide** 164A  
Trotter, 1907<sup>c</sup>, p. 102, n° 1. I.

~~~~~

Setaria italica PALISOT

Acre. — Inflorescence modifiée à la base; glumes et glumelles hypertrophiées et vertes. [**Ériophyide**] 165
Tavares, 1905, p. 101, pl. XIV, 4, 16, ⊕. P.

~~~~~

**Phalaris brachystachys LINK**

Ac. fl. — Glumes hypertrophiées jusqu'à atteindre 10 mm. de long; organes reproducteurs non altérés. [**Ériophyide**] 166  
Rübsaamen, 1902<sup>d</sup>, p. 63, n° 15. ca.

**Phalaris canariensis L.**

Pl. fe. — Gaines boursoufflées, gonflées, un peu décolorées. Puceron vert. **Aphis padi L. avenæ FABR.** 167  
Rostrup, 1890, p. 9, n° 38; Schouteden, 1903, p. 179. D.

~~~~~

Anthoxanthum adoratum L.

Ac. fl. — Fleurs déformées : organes reproducteurs le plus souvent atrophiés, glumes tordues et irrégulièrement repliées, teintes parfois de rouge sombre ou de violet ; panicule paraissant avoir été froissé. [Ériophyide] 168

Rübsaamen, 1899, p. 226, n° 1. A.

Ac. ti. — Tige devenant bulbueuses à la base. Voir n° 338. **Tylenchus devastatrix KÜHN.** 169

Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 68 ; 1892, p. 228, n° 28 ; Frank, 1896, p. 31. E-O.

Hierochloa repens PALISOT

Pl. ti. — Vers la base de la tige, renflement peu marqué d'un nœud ; larves grégaïres vivant dans un enfoncement de la tige, sous la gaine. **Mayetiola hierochloæ LIND.** 170

Lindeman, 1888, p. 50-52 ; Kertész, 1902, p. 79. E-E.

Aristida sp.

Acre. — Axe de l'épi se prolongeant sur une longueur de 40-50 mm. et portant en son milieu une galle ovoïde (fig. 69) de 9 mm. de long sur 5 mm. de diamètre, lisse, à cavité larvaire axiale (fig. 70). **Isosoma** 171

Frauenfeld, 1859, p. 328-329, pl. VII, 23. ⊕. E.G.

Stipa pennata L.

Pl. ti. — Sur l'axe de l'inflorescence, renflements peu marqués pouvant atteindre 10 mm. de long et portant deux ou trois expansions latérales en forme d'ailes. **Isosoma Scheppeggi SEML.** 172

Hieronimus, 1890, p. 191-192, n° 607 ; Schlechtendal, 1890, p. 10, n° 70. A.


— A la face interne des gaines et sur la partie du chaume qu'elles recouvrent (fig. 71) ou bien sur les bractées ou bien encore, dans l'inflorescence, sur l'axe et les glumelles, certaines cellules épidermiques s'hypertrophient et donnent naissance à des tubercules subovoïdes ou claviformes (fig. 72) disposés en séries longitudinales; les tubercules, d'abord incolores, deviennent plus tard roussâtres ou noirâtres et peuvent former une sorte de croûte. *Erineum stipæ* MASS.

* *Tarsonemus Canestrinii* MASS. 173

Massalongo, 1897^b, p. 103-110, pl. IV, 1-10, ⊕.

* Il est vraisemblable, mais non démontré, que *Tarsonemus Canestrinii* MASS. est identique à *Tarsonemus graminis* KRAMER.

I.



Aristida sp.

Isosoma (n° 171)

Fig. 69 (a). — Im. FRAUENF.

Fig. 70 (b). — Im. FRAUENF.

Stipa pennata

Tarsonemus Canestrinii (n° 173)

Fig. 71 (a). — Im. MASS.

Fig. 72 (b). — Im. MASS.

Stipa tortilis

Isosoma stipæ (n° 177)

Fig. 73 (a). — D'ap. nat.

Fig. 74 (b). — D'ap. nat.

Stipa capillata L.

Ac. fl. — Concrecence des glumes et des diverses pièces florales dont l'ensemble constitue une cécidie fusiforme. Adulte II.

Isosoma cylindricum SCHL. 174

Schlechtendal, 1890, p. 10, n° 67.

A.

Pl. ti. — Renflement à peine sensible du chaume au-dessus du troisième ou du quatrième nœud. Adulte H.

Isosoma aciculatum SCHL. 175

Schlechtendal 1890, p. 10, n° 68.

A.

— Minimales émergences hyalines, sur l'axe ou le dessous des gaines, semblables à celles qui sont décrites au n° 173.

Tarsonemus graminis KRAMER 176

Kramer, 1886, p. 260-263, pl. XII, 19-22 ; Schlechtendal, 1890, p. 10, n° 69.

A.

Stipa tortilis DESF.

Pl. ti. — Renflement subglobuleux (5-6 mm. sur 3-4), lisse, uniloculaire, situé sur le prolongement de l'axe de l'inflorescence (fig. 73-74). M.C.

Isosoma stipæ STEFANI 177

Hieronymus, 1890, p. 192-193, n° 608 ; Trotter, 1900, p. 202, n° 21, pl. IX, 7, ⊕ ; Trotter et Ceconi, 1904, fasc. XII, n° 288, ⊕ ; Tavares, 1905, pl. XIV, 1, 5-6, ⊕.

Isi. P.



Milium effusum L.

Pl. ti. — [Cécidie semblable à celle de *Mayetolia poæ* sur *Poa nemoralis*. Voir n° 264.

Cécidomyide] 178

Rudow, 1875, p. 90 ; Bergenstamm et Löw, 1876, p. 84, n° 467 ; Kieffer, 1898, p. 59.

A.



Phleum pratense L.

Ac. fl. — Glumelle allongée, épaissie, atteignant 5-7 mm. de long, enroulée en cornet autour du pistil et prenant une teinte vert jaunâtre clair ; l'ovaire acquiert la forme d'une fiole ou d'un fuseau et devient rouge jaunâtre ou brun pourpre sombre ; les étamines avortent.

Tylenchus phalaridis STEINB. 179

Steinbuch, 1799, p. 257, pl. V, 6-7 ; Hieronymus, 1890, p. 55, n° 11.

E-C.

Pl. ti. — Renflement à peine sensible de l'un des nœuds inférieurs.
Larves vivant entre la gaine et le chaume. M.C. **Mayetiola** 180
Lindeman, 1888^b, p. 243 ; Kieffer, 1901^b, p. 374. R.

Pl. fe. — Gaines gonflées et décolorées. **Aphis padi** L. (*avenæ* FABR.) 181
Schlechtendal, 1890, p. 9, n° 57 ; Rostrup, 1896, p. 9, n° 40. A, D.

Panicum Behmeri WIBEL

Ac. fl. — Voir n° 179. Fig. 75-76, page 68. **Tylenchus phalaridis** STEINB. 182
Horn-Waren, 1889, p. 139-156, pl. I-II, ⊕ ; Massalongo, 1894, p. 42-43 ; Rübsaamen, E-T.
1895, p. 399, n° 2, pl. XIII, 6, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, nos 21-21 a, ⊕ ;
Lagerheim, 1905, p. 5.



Alopecurus geniculatus L.

Pl. fe. — A la base du limbe, renflement de forme allongée. **Tylenchus** 183
Hieronymus, 1890, p. 54, n° 6 ; Schlechtendal, 1890, p. 7, n° 27. A.

Alopecurus pratensis L.

Pl. fe. — Gaine présentant des parties fortement épaissies. Puceron
d'un vert foncé mat ou pâle avec la région des cornicules rou-
geâtre. **Aphis padi** L. (*avenæ* FABR.) 184
Kieffer, 1901^b, p. 251 ; Schouteden, 1903, p. 169. A.



Agrostis alba L.

Ac. fl. — Ovaire allongé, de teinte violette ; glumelles hypertrophiées.
Tylenchus agrostidis STEINB. 185
Hieronymus, 1890, p. 54, n° 2 ; Schlechtendal, 1890, p. 6, n° 23. A, F.

Pl. fe. — Feuilles allongées, se recouvrant les unes les autres ; entre-
nœuds de la pousse un peu raccourcis. Pucerons fort allongés,
pulvérulents. **Brachycolus stellaris** HARDY 186
Trail, 1885 ; Kieffer, 1901^b, p. 247 ; Schouteden, 1903, p. 168. I-B.

— Renflement allongé (30-50 mm. de long sur 10-20 mm. de large), violet ou rougeâtre, situé sur les feuilles et généralement vers la base du limbe. Se trouve souvent aussi sur la tige et l'inflorescence.

Tylenchus 187

Hieronymus, 1890, p. 54, n° 3 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 151, ⊕ ; Rostrup, 1896, p. 7, n° 24.

*D, A,
I-B.*

Agrostis silvatica HUDSON

Ac. fl. — Voir n° 185. **Tylenchus agrostidis** STEINB. 188

Steinbuch, 1799, p. 241, pl. V, 1-5 ; Kühn, 1858, p. 183-184, 192. *A.*

Pl. fe. — Voir n° 187. **Tylenchus** 189

Kieffer, 1892, p. 225, n° 2. *A.*

Agrostis vulgaris WITH.

Ac. fl. — Voir n° 185. **Tylenchus agrostidis** STEINB. 190

Schlechtendal, 1890, p. 7, n° 24 ; Frank, 1896, p. 33. *A.*

— Épillets hypertrophiés et teints de violet au milieu seulement, leur base et leur pointe restant blanchâtres ; les glumes ne sont pas modifiées.

Tarsonemus Kramerii KÜHN 191

Kühn, 1883, p. 212 ; Schlechtendal, 1890, p. 7, n° 25 ; Misciatielli, 1899, p. (6), n° 11. *A, I.*

Pl. fe. — Voir n° 187. **Tylenchus** 192

Karsch, 1880, p. 308, n° 41 ; Schlechtendal, 1885, p. 2 ; Rübsaamen, 1890, p. 248, n° 229. *A.*

Agrostis canina L.

Ac. fl. — Voir n° 185. **Tylenchus agrostidis** STEINB. 193

Kieffer, 1892^d, p. 225, n° 1. *A.*

Pl. ti. — Renflement ovoïde de la tige avec cavité intérieure et ouverture à la partie inférieure. **[Isosoma]** 194

Trail, 1878 ; Kieffer, 1901^b, p. 247 ; [Lagerheim, 1903, p. 344]. *I-B, A.*

Pl. fe. — Renflement noir bleuâtre. Voir n° 187. **Tylenchus** 195

Magnus, 1876, p. 61 ; Hieronymus, 1890, p. 54, n° 4. *A.*

Agrostis polymorpha HUDSON (A. stolonifera L.)

- Ac. fl.** — Voir n° 185 **Tylenchus agrostidis** STEINB. 196
Schlechtendal, 1890, p. 7, n° 24; Frank, 1896, p. 33. A.
- Ac. ti.** — Stolons raccourcis. **Aphide** 197
Geisenheyner, 1902, p. 193, n° 22. A.

**Calamagrostis Epigeios ROTH**

- Ac. fl.** — Déformation très marquée : appareils reproducteurs atrophiés ; glumes très courtes irrégulièrement tordues et enroulées. [Ériophyide ou Tarsonemus] 198
Rübsaamen, 1899, p. 226-227, n° 3 (L'Aut. ur fait remarquer que la plante déformée ressemble à un *Lolium*). A.
- Pl. ti.** — Très faible renflement du chaume au-dessus du deuxième ou du troisième nœud. Insecte printemps II. **Isosoma calamagrostidis** SCHL. 199
Schlechtendal, 1890, p. 8, n° 41; Kieffer, 1893, p. 22. A.
- Sur le chaume, à l'aisselle d'une des feuilles inférieures et sous la gaine, légère dépression entourée d'une zone présentant un épaississement à peine sensible. Larves en société. **Lasioptera calamagrostidis** RÜBS. 200
Rübsaamen, 1893, p. 164-165, n° 8; Kertész, 1902, p. 16. A.

Calamagrostis lanceolata ROTH

- Ac. ti.** — Les entre-nœuds supérieurs étant fortement raccourcis, les gaines des feuilles supérieures déformées constituent un amas de 30-35 mm. de long sur 3-5 mm. de large. Larves blanches, isolées ou grégaires. M.C. **Mayetiola lanceolatae** RÜBS. 201
Rübsaamen, 1895^b, p. 7-8, n° 4, fig. 1, ⊕; 1895^c, p. 181, n° 7. A.
- Cécidie le plus souvent souterraine et ayant l'aspect d'un gros bourgeon : entre-nœuds raccourcis, gaines élargies et épaissies, feuilles étiolées. **Chlorops** 202
Rübsaamen, 1899, p. 227, n° 4. A.

- Pl. ti.** — Renflement fusiforme, à peine sensible, du chaume au-dessus d'un nœud. Larve unique, blanche, vivant à l'intérieur de la tige M.C.H. **Isosoma** 203
Schlechtendal, 1895, p.5. A.
- Chaume légèrement renflé ; larves grégaires vivant à l'intérieur. **Lasioptera graminicola** KIEFF. 204
Kieffer, 1898c, p.58 ; Kertész, 1902, p.17. F.
- Sur le chaume, dépression allongée parallèlement à l'axe et se terminant à chaque extrémité par une petite nodosité ; dans son ensemble la cécidie a la forme d'une selle de 10-12 mm. de long. [**Mayetiola**] 205
Rübsaamen, 1895b, p.6-7, n°3, 1 fig., ⊕ ; Schlechtendal, 1895, p.6. A.
- Sur le chaume, légère dépression de 3-4 mm. de long, recouverte d'une pellicule mince, noire et luisante. Larve jaune orangé logée sous cette pellicule. M.C. **Lasioptera cerealis** LIND. 206
Rübsaamen, 1895b, p.6, n°2 ; Schlechtendal, 1895, p.6. A.
- A la partie supérieure du chaume, dépression peu marquée dans laquelle se trouve logée une larve qui donnera plus tard une puppe lisse et brillante, à extrémité postérieure bifide. **Mayetiola** 207
Rübsaamen, 1895b, p.9-10, n°6, fig. 1-5 ; Schlechtendal, 1895, p.6. A.
- Déformation semblable à la précédente ; larve jaunâtre ; puppe spinuleuse, à extrémité anale pointue. **Mayetiola** 208
Rübsaamen, 1895b, p.9-10, n°5, fig. 1-3 ; Schlechtendal, 1895, p.6. A.
- Pl. fe.** — Cécidie du limbe. **Tylenchus** 209
Schlechtendal, 1895, p.5. A.


Calamagrostis lapponica WAHL.

- Ac. fl.** — Ovaire hypertrophié, en forme de petite fiole, de couleur sombre, atteignant 5 mm. de long sur 2 mm. de large ; les parois en sont épaissies et la partie supérieure, étroite et tubuleuse, est un peu rugueuse. Inflorescence réduite. **Tylenchus** 210
Massalongo, 1899, p.163. SIB.



***Ammophila arundinacea* Host**
(***Psamma arcuaria* REM. et SCHULT.**)

Ac.ti. — Chaume épaissi au sommet où les entre-nœuds sont raccourcis ; les feuilles ainsi rapprochées, souvent réduites à



Phleum Bæhmeri

Tylenchus phalaridis (n° 182)
Fig. 75 (a). — Im. HORN-WAREN
Fig. 76 (b, c). — Im. HORN-WAREN

Ammophila arundinacea

Isosoma hyalipenne (n° 211)
Fig. 77 (a). — D'ap. nat.
Fig. 78 (b). — D'ap. nat.

Avena sativa

Tarsonemus spirifer (n° 225)
Fig. 79 (a). — Im. MARCHAL
Fig. 80 (b). — Im. MARCHAL

leur gaine élargie, forment un amas allongé (fig. 77-78). Insecte avril-mai II.

***Isosoma hyalipenne* WALK. 211**

Giard, 1885, p. 285-286 ; Hieronymus, 1890, p. 190-191, n° 605 ; Connold, 1901, *D. E. O.* pl. XLI. ⊕ ; Houard, 1902b, p. 39.

~~~~~

***Apera* (*Agrostis*) *Spica-Venti* PALISOT**

**Pl.ti.** — Sur la tige, à l'aisselle d'une feuille, légère dépression à bords épaissis.

***Lasioptera calamagrostidis* RÜBS. 212**

Kieffer, 1901b, p. 247.

A.



**Holcus lanatus L.**

- Ac. fl.** — Fleurs chloranthiées et tordues ; épillets prolifères. **Ériophyide 213**  
 Kieffer, 1897<sup>a</sup>, p. 20, n° 2 ; 1901<sup>b</sup>, p. 339. A.
- Ac. ti.** — Plante bulbeuse à la base. Voir n° 338. **Tylenchus devastratrix KÜHN 214**  
 Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 29 ; 1892, p. 228, n° 29 ; Frank, 1896, p. 31. E-O.
- Pl. ti.** — Épaississement en forme de selle, de teinte violacée, situé au voisinage immédiat d'un nœud, sous la gaine de la feuille correspondante. Larves grégaires blanches. **Mayetiola holci KIEFF. 215**  
 Whitehead et Gray, 1887, p. 7 ; Lindeman, 1888<sup>b</sup>, p. 242-243. E-O.
- Pl. fe.** — Feuilles agglomérées et raccourcies. Puceron vert ou brunâtre à dos brillant. **Sipha maidis PASS. 216**  
 Rubsaamen, 1901, p. 118, n° 84, p. 142, n° 56 ; Schouteden, 1903, p. 176. A.

**Holcus mollis L.**

- Pl. ti.** — Galle en forme de selle. Voir n° 333. **Mayetiola holci KIEFF. 217**  
 Kieffer, 1897<sup>a</sup>, p. 20, n° 1 ; Kertész, 1902, p. 79. E-O.
- Pl. fe.** — Feuilles rapprochées, se recouvrant à la base. Puceron allongé, pulvérulent, vert pâle. **Brachycolus stellaris HARDY 218**  
 Buckton, 1879, p. 147-149, pl. LXXXV, 1-3 ; Schouteden, 1903, p. 176. I-D.
- Voir n° 228. . . . . **Aphis padi L. (avenæ FABR.) 218A**  
 Rostrup, 1896, p. 8, n° 35. D.

**Aira caespitosa L.**

- Pl. ti.** — Renflement à peine perceptible du chaume au-dessus du premier ou du second nœud. Larve dans le chaume. **M. C. II. Isosoma airæ SCHL. 219**  
 Schlechtendal, 1890, p. 7, n° 26 ; Kieffer, 1892<sup>a</sup>, p. 45, n° 501. A.

**Aira flexuosa L.**

**Ac. fl.** — Épillet déformé. . . . . **Eriophyes tenuis NAL.** 220  
Lindroth, 1899, p. 7. *R.*

**Pl. ti.** — Sous une gaine, léger renforcement du chaume.  
**Lasioptera calamagrostidis RÜBS.** 221  
Kieffer, 1897<sup>e</sup>, p. 17 : 1898<sup>e</sup>, p. 3 : 1901<sup>b</sup>, p. 248 : Kertész, 1902, p. 16. *E-O.*

**Avena sativa L.**

**Acrc.** — Épillets chloranthiés et allongés, émettant en leur milieu de nouveaux épillets. [**Eriophyes tenuis NAL.**] 222  
Kieffer, 1898<sup>e</sup>, p. 99, n<sup>o</sup> 78 : 1901<sup>b</sup>, p. 267. *F.*

— Plante renflée en une sorte de bulbe dans sa région basilaire au-dessus du premier ou du second nœud ; la plante reste naine et se termine par un bouquet de feuilles desséchées. Larves grégaires au niveau des nœuds 1, 2 ou plus rarement 3 et 4.

**Mayetiola avenæ MARCHAL** 223  
P. Marchal, 1895<sup>b</sup>, p. 272-274 : 1897, p. 42-52, pl. I, 1-3, 5, 7-11, pl. II, 14-18, pl. III, 20, 22, 24-25, pl. IV, 32, ⊕. *F.*

— A la base du chaume, fort renflement parfois tuberculeux ; feuilles courtes, le plus souvent épaissies, quelquefois ondulées et herbacées. Parfois, la plante entière est déformée.

**Tylenchus devastatrix KÜHN** 224  
Ritzema-Bos, 1888, p. 263, n<sup>o</sup> 30 : 1892, p. 228, n<sup>o</sup> 30, p. 279 : Schlechtendal, 1895, p. 5 ; Frank, 1896, p. 27. *E-O.*

— Axe des épis, encore enfermés dans la gaine foliaire ou incomplètement dégagés (fig. 79), contourné en forme de vrille ou de tire-bouchon sur une longueur de deux ou trois centimètres (fig. 80, page 68).

**Tarsonemus spirifex MARCHAL** 225  
P. Marchal, 1902, p. 98-104, fig. 1-4, ⊕ ; O. Kirchner, 1904, p. 13-18, pl. I ; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n<sup>o</sup> 327, ⊕. *E-O.*

**Pl.ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radicolica GREEFF** 226  
Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 267 ; Hieronymus, Pax, etc., 1906, fasc. XIV, n<sup>o</sup> 379, ⊕. *E-G.*



**Pl. ti.** — A la base de l'inflorescence, léger renflement des entrenœuds du chaume. **Oscinis frit L.** 227  
Rostrup, 1896, p. 7, n° 27. *D.*

**Pl. fe.** — Gaines gonflées; feuilles enroulées et contournées, enveloppant sur leur face supérieure des pucerons verts. **Aphis padi L. (avenæ FABR.)** 228  
Kaltenbach, 1874, p. 756; Schlechtendal, 1890, p. 8, n° 37; Rostrup, 1896, p. 7, n° 28. *D, E-O.*

### **Avena fatua L.**

**Pl. fe.** — Feuilles contournées et enroulées. Voir n° 228. **Aphis padi L. (avenæ FABR.)** 229  
Schlechtendal, 1890, p. 8, n° 37; Rostrup, 1896, p. 7, n° 25; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 267. *D, E-C.*

### **Avena orientalis SCHREB.**

**Pl. fe.** — Feuilles contournées et enroulées. Voir n° 228. **Aphis padi L. (avenæ FABR.)** 230  
Rostrup, 1896, p. 7, n° 26. *D.*

### **Avena strigosa SCHREB.**

**Pl. fe.** — Feuilles contournées et enroulées. Voir n° 228. **Aphis padi L. (avenæ FABR.)** 231  
Rostrup, 1896, p. 8, n° 29. *D.*

### **Avena pratensis L.**

**Ac. fl.** — Chloranthic; les épillets demeurent agglomérés. **Eriophyes tenuis NAL.** 232  
Schlechtendal, 1890, p. 8, n° 38.  
\* En compagnie de *Phyllocoptes dubius* NAL. (Nalepa, 1898, p. 7, n° 5, p. 46, n° 1). *E-C.*

**Pl. fe.** — Renflements allongés et purpurins. . . . **Tylenchus** 233  
Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 267. *A.*

### **Arrhenatherum elatius MERT. et KOCH**

**Ac. fl.** — Épillets vivipares : glumes différant peu des normales,

mais organes floraux remplacés par une petite pousse feuillée verte, longue de 20-30 mm. [Aphide]

234

Trotter, 1905<sup>b</sup>, p. 97-98, n° 2.

I.

**Pl. ti.** — Renflement latéral du chaume situé à peu de distance du sol et mesurant 10-12 mm. de longueur sur 5-6 mm. de diamètre; chambre larvaire spacieuse. **Isosoma**

235

Tavares, 1902, p. 99, n° 238; 1905, p. 4.

P.

~~~~~  
Cynodon Dactylon PERS.

Ac. ti. — Cécidie ovoïde constituée, à l'extrémité des pousses, par la réunion de 5-6 feuilles déformées; les gaines élargies des feuilles inférieures forment, en se recouvrant mutuellement, une sorte de tube d'où émerge la feuille terminale complètement enroulée. Larve unique. M.C.

Orseolia cynodontis KIEFF. et MASS.

236

Massalongo, 1893, p. (234-235) n° 182, pl. XXV, 1, ⊕; 1902, p. 54-59, fig. 1-16;

Houard, 1902^b, p. 39-40, n° 17.

I.F.
A.L.C.

— Au voisinage du collet ou sur une tige rampante, cécidie en forme de tresse à tours serrés (fig. 81), de 40-80 mm. de long sur 5-10 mm. de large; elle résulte du renflement de la partie terminale d'une jeune pousse dont les entre-nœuds sont raccourcis et portent des feuilles à contour ovale, réduites à leurs gaines dilatées, imbriquées. Larve unique blanchâtre. M.C. Adulte avril-mai H. **Lonchæa lasiophthalma** MACQ.

237

Giraud, 1861, p. 486, pl. XVII, 6, ⊕; Massalongo, 1893, p. (84-86), n° 47, pl. XIII, 1-3, ⊕; Houard, 1904^b, p. 370-377, fig. 171-187, ⊕; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. III, n° 62, ⊕.

E.T.
A.L.

~~~~~  
**Phragmites communis** TRIN.

**Ac. ti.** — Cécidie terminale, fusiforme, de la longueur et de la grosseur du doigt et même davantage (fig. 82); l'axe est demeuré court par suite de l'arrêt de développement subi par les 12 à 15 entre-nœuds terminaux (fig. 83); la cavité centrale a 2-3 mm. de diamètre sur 50-80 mm. de longueur et ses parois (fig. 84) sont très épaisses et lignifiées. Une seule larve.

**Lipara lucens** MEIGEN

238

Giraud, 1863, p. 1252-1254, n° 1; Connold, 1901, pl. XXXII, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 55-55 a, ⊕; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 43, ⊕.

E.C.  
E.O.

— Cécidie fusiforme, terminale, analogue à la précédente, mais l'épaississement est beaucoup moins marqué; en outre les parois ne sont pas lignifiées. Une seule larve. Adulte II.

**Lipara similis** SCHNER

239

Giraud, 1863, p. 1256-1258, n° 3 $\frac{1}{2}$ ; Schlechtendal, 1890, p. 8, n° 35.

E-G.


**Cynodon Dactylon***Lonchocera lasiophthalma* (n° 237)

Fig. 81. — D'ap. nat.


**Phragmites communis***Lipara lucens* (n° 238)

Fig. 83 (a). — D'ap. nat.

Fig. 83 (b). — D'ap. nat.

Fig. 83 (c). — D'ap. nat.


**Poa nemoralis***Mayetiola poae* (n° 264)

Fig. 85. — Im. P. PALMER

Fig. 86. — Im. P. PALMER

— Cécidie semblable à la précédente, mais cylindrique. Adulte II.

**Lipara rufitarsis** H. LÖW

240

Giraud, 1863, p. 1254-1256, n° 2; Rostrup, 1896, p. 9, n° 41; Baldrati, 1900, p. 55, n° 131.

D.E-G.

E-O.

— Rameaux latéraux demeurant courts; les parois des entrenœuds terminaux sont épaissies et durcies; l'intérieur du chaume est rempli d'une masse grumelleuse, noirâtre, dans laquelle un certain nombre de larves jaune rougeâtre vivent isolées dans autant de galeries distinctes.

**Lasioptera arundinis** SCHNER

241

Giraud, 1863, p. 1262-1263, n° 7; Kertész, 1902, p. 15.

E-G.

— Entre-nœuds terminaux raccourcis; les gaines des feuilles

ainsi rapprochées sont déformées, boursoufflées, plissées en long et en large et présentent à la face interne une pilosité brune anormale.

**Tarsonemus phragmitidis** SCUL.

242

Hieronymus, 1890, p. 62-63, n° 45; Schlechtendal, 1897, p. 428-429; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. 1, n° 2, ⊕.

E-G.  
E-N.

Pl. ti. — Les entre-nœuds terminaux, qui ne sont nullement raccourcis, sont très légèrement renflés et leur cavité est remplie d'une masse granuleuse noire contenant de nombreuses larves.

**Lasioptera flexuosa** WINN.

243

Giraud, 1863, p. 1261-1262, n° 6; Kertész, 1902, p. 17.

E-G.  
E-O.

— Renflement à peine sensible du chaume, multiloculaire.

**Isosoma**

244

Schlechtendal, 1895, p. 5.

A.

— A l'intérieur du chaume, excroissances isolées ou groupées, absolument invisibles du dehors, et rappelant un grain de riz enveloppé de sa balle; solidement attachées à la paroi interne, ces cécidies ont au plus 7 mm. de long; leur surface est sèche, jaune paille ou brune; leurs parois, minces, sont cependant assez dures. Une larve blanche. M.C.

**Perrisia inclusa** FRAUENF.

245

Giraud, 1863, p. 1258-1260, n° 4; Hieronymus, 1890, p. 122, n° 381; Kertész, 1902, p. 40.

E-G.  
E-O.

— A la face externe du chaume, sous l'épiderme, excroissances de la grosseur d'un grain de blé.

**Porricondyla phragmitis** GIRAUD

246

Giraud, 1863, p. 1260-1261, n° 5; Kertész, 1902, p. 134.

E-G.

Pl. fe. — Petites dépressions à la face supérieure du limbe. Puceron allongé, pulvérulent, vert ou brun.

**Hyalopterus arundinis** FABR.

247

Buckton, 1879, p. 111-113, pl. LXXV, 4-5; Schouteden, 1903, p. 179.

I.B.

### **Diplachne scrotina** LINK

Ac. ti. — Pousses se terminant par un amas fusiforme de 30-50 mm. de long, sur 5-7 mm. de diamètre, formé par les gaines dilatées

de nombreuses feuilles rapprochées par suite du raccourcissement des entre-nœuds ; seules, les feuilles externes et les feuilles supérieures possèdent un limbe plus court d'ailleurs que le limbe des feuilles normales ; le chaume est épaissi. **Isosoma** 248  
 Massalongo, 1893, p. (235-236), n° 183, pl. XXVI, ⊕ ; 1893<sup>b</sup>, p. 32. I.

~~~~~  
Molinia caerulea MÖNCH

- Pl. ti.** — Base du chaume épaissie et ventrue. **Oligotrophus ventricolus** RÜBS. 249
 Rübsaamen, 1899^b, p. 566, note 1 ; Kertész, 1902, p. 75. E-C.
- Léger renflement du chaume, sous une gaine, et au niveau du sol. Larve blanche. M. C. **Mayetiola moliniæ** RÜBS. 250
 Rübsaamen, 1895^b, p. 12-13, n° 8, fig. 1-3 ; 1895^c, p. 180, n° 6. E-C.
- Tige légèrement gonflée. Grosse larve orangée de 5 mm. de long. **Lasioptera** 251
 Rübsaamen, 1895^b, p. 11, n° 7 ; Schlechtendal, 1895, p. 6. E-C.
- Pl. fe.** — Gaine fortement renflée à son origine ; tige atrophiée. Grosse larve blanche de 5 mm. de long. **Cécidomyide** 252
 Rübsaamen, 1895^b, p. 13-14, n° 9, fig. 1-4, ⊕ ; Schlechtendal, 1895, p. 6. E-C.

~~~~~  
**Koeleria cristata** PERS.

- Ac. fl.** — Ovaire transformé en une galle fusiforme violacée longue de 2-3 mm., large de 1 mm. ; glumelle inférieure présentant un renflement ovoïdal ou ellipsoïdal d'un beau violet, situé à sa base ou sur un bord. **Tylenchus** 253  
 Massalongo, 1901<sup>b</sup>, p. 1-2. I.

**Koeleria glauca** DC.

- Ac. fl.** — Ovaire déformé. Voir n° 253. **Tylenchus** 254  
 Münter, 1865 ; Braun, 1875, p. 387 ; Horn-Waren, 1889, p. 153. A.

**Ac.ti.** — Tige fortement raccourcie ; les feuilles ainsi agglomérées n'ont qu'un limbe très court et forment un bouquet lâche.

[Chloropine] 255

Rübsaamen, 1899, p. 228, n° 8, pl. II, 2, ⊕.

A.

~~~~~  
Eleuopus littoralis PARL.

Ac.ti. — Feuilles rapprochées en un bouquet fusiforme.

Ériophyide 256

Peglion, 1905, p. 103-105, 2 fig., ⊕.

I.

~~~~~  
**Dactylis glomerata** L.

**Ac.fl.** — Épillets hypertrophiés, plus ou moins contournés, parfois teintés de bleuâtre ; fleurs chloranthiées.

\* Eriophyes tenuis NAL. 257

Kieffer, 1898<sup>c</sup>, p. 100, n° 85 ; Schlechtendal, 1903, p. 129 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 254. *E-C, F.*

\* Commensal : *Phyllocoptes dubius* Nal. (Nalepa, 1898, p. 7, n° 5, p. 46, n° 1).

**Pl.ti.** — Renflement à peine perceptible situé immédiatement au-dessus du premier ou du deuxième nœud de la tige ; sous la gaine, larves blanches. M.C. **Mayetiola dactylidis** KIEFF 258

Kieffer, 1896, p. 217, n° 2 ; 1897<sup>a</sup>, p. 19 ; Kertész, 1902, p. 76.

*E-C,  
E-O.*

~~~~~  
Poa annua L.

Ac.fl. — Ovaire gonflé surtout à la base, terminé en pointe et teinté de violet.

Tylenchus 259

Slechtendal, 1890, p. 9, n° 58 ; Frank, 1896, p. 33.

A.

Ac.ti. — Plante bulbeuse à la base. Voir n° 338.

Tylenchus devastatrix KÜHN 260

Ritzema Bos, 1888, p. 263, n° 31 ; 1892, p. 298, n° 31 ; Frank, 1896, p. 31.

E-O.

Pl.ra. — Nodosités. **Heterodera radicolica** GREEFF 261

Greff, 1879, p. 169 ; Braun, 1875, p. 388, n° 8 ; Hieronymus, 1860, p. 55-56

A.

Poa nemoralis L.

Pl. ti. — Renflement fusiforme, de la grosseur d'un grain d'orge, brillant, lisse, vert jaune à l'état frais, strié longitudinalement. Une larve rouge orangé. **Isosoma poæ** SCHL. 262
Schlechtendal, 1883, p. 5, n° 10, fig. 3, ⊕; Liebel, 1889, p. 303, n° 379; Corti, 1902, p. 237, n° 153. A.L.

— Deuxième ou troisième nœud de la tige faiblement gonflé. Larves blanches situées à l'intérieur de la gaine. M.C.

Mayetiola Joannisi KIEFF. 263

Kieffer, 1896, p. 216, n° 1; 1897^e, p. 22, n° 1; Kertész, 1902, p. 79. E-G, E-O.

— Renflement portant de nombreux filaments semblables à des racines, disposés régulièrement d'un seul côté (fig. 85-86); la cécidie est située dans la partie moyenne ou supérieure de la tige et fixée au-dessus d'un nœud. Larves blanches. M.C.

Mayetiola poæ BOSQ 264

Prillieux, 1853, p. 191-196, pl. XVII, ⊕; Beijerinck, 1885, p. 305-315, 321-332, pl. III, ⊕. E-T.

— Renflement portant de nombreux filaments semblables à des racines, disposés sans ordre et sortant de la gaine de la feuille; la cécidie est située dans la partie tout à fait inférieure de la tige. **Mayetiola radifica** RÜBS. 265

Rübsaamen, 1895^b, p. 14-16, n° 10, fig. 1-2; 1895^c, p. 179, n° 5. A.

Pl. fe. — Renflements allongés, teintés de rouge vif ou de violacé.

Tylenchus 266

Schlechtendal, 1890, p. 9, n° 60; Corti, 1902, p. 236, n° 152. A, F, L.

Poa palustris ROTU

Pl. fe. — Renflements rouge violacé. **Tylenchus** 267

Hieronymus, 1890, p. 56, n° 13; Schlechtendal, 1890, p. 9, n° 63. A.

Poa pratensis L.

Ac. fl. — Épillet déformé. **Eriophyes cornutus** REUTER 268

Reuter, 1902, p. 331. A.

— Ovaire déformé, ventru à la base et terminé en pointe ;
glumelles atteignant le double ou le triple de leur longueur
normale.

Anguillulide 269

Rübsaamen, 1899, p. 233, n° 13.

A.


Poa bulbosa L. var. **vivipara**

Ac. fl. — Glumelles renflées à la base, très allongées et teintées de
rouge.

Tylenchus 270

Penzig, 1894, p. 471 ; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 278

E.F.



Glyceria aquatica WAHL. (**G. spectabilis** MERT. et KOCH)

Pl. fe. — Feuilles enroulées et contournées. Puceron allongé, vert,
pubescent ; quene et cornicules à peu près nuls.

Sipha glyceriæ KALT. 271

Schlechtendal, 1895, p. 6 ; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 262.

A.F.

Glyceria fluitans R. BROWN

Pl. fe. — Voir n° 271. Sipha glyceriæ KALT. 272

Kaltenbach, 1874, p. 751 ; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 262.


A.F.

Glyceria maritima WAHL.

Pl. fe. — Renflements allongés sur le limbe. . . . Anguillulide 273

Rostrup, 1896, p. 8, n° 34.

D.



Festuca gigantea VILL.

Pl. ti. — Renflement à peine sensible au-dessus du deuxième ou du
troisième nœud. M.C. Insecte printemps II.

Isosoma Giraudi SCHL. 274

Schlechtendal, 1890, p. 8, n° 45.

A.

Festuca heterophylla LAMK.

Pl. ti. — Renflement jaunâtre, fusiforme et unilatéral de la tige, au-dessus d'un nœud : longueur 5-15 mm., largeur 2 mm.

Isosoma 275

Cecconi, 1902b, p. 348, n° 12 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 258.

I.F.

Festuca rubra L.

Pl. ti. — Renflements. Isosoma 276

Rostrup, 1896, p. 8, n° 32 ; Lagerheim, 1905, p. 19.

E-N.L.

Pl. fe. — Renflements violacés sur le limbe. Voir n° 283.

Tylenchus graminis HARDY 277

Rostrup, 1896, p. 8, n° 33 ; Lagerheim, 1905, p. 19.

E-N.

Festuca glauca SCHRAD.

Pl. ti. — Renflement fusiforme dur, teinté de jaune à maturité, pouvant atteindre 10 mm. de longueur sur 5-6 mm. de large, et situé au-dessus du deuxième ou du troisième nœud. M.C.

Insecte printemps H.

Isosoma Hieronymi SCHL. 278

Hieronymus, 1890, p. 191, n° 606 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. 1, n° 14. ⊕ ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 317.

A.F.

Festuca ovina L.

Ac. fl. — La fleur supérieure de l'épillet est épaissie au double de la normale et raccourcie de plus de moitié ; les glumelles sont très raccourcies et ventrues ; l'ovaire est fortement hypertrophié et un peu aplati ; il n'y a pas trace d'étamines.

Ériophyide 279

Rübsaamen, 1899, p. 227, n° 5.

A.

— Fleur supérieure de l'épillet chloranthiée et virescente.

Ériophyide 280

Thomas, 1877, p. 385, n° 25 ; Schlechtendal, 1890, p. 9, n° 49

A.L.

— Ovaire gonflé, déformé, violet pourpre, prenant la forme d'une bouteille.

Tylenchus 281

Schlechtendal, 1890, p. 9, n° 50 ; Frank, 1896, p. 33.

A.

Pl. ti. — Renflement de forme irrégulière, de teinte vert jaunâtre le plus souvent, situé au-dessus du premier ou du deuxième nœud. M. C. Insecte printemps II. **Isosoma depressum** WALK. 282
Walker, 1871, p. 451 ; Kieffer, 1891, p. 231, n° 426 ; Tavares, 1905, p. 22. E-O.

Pl. fe. — A la face inférieure du limbe, renflements ovalaires ou allongés, verdâtres ou d'un noir bleuté, de 1-2 mm. de long. **Tylenchus graminis** HARDY 283
Hardy, 1850, p. 182 ; F. Löw, 1885b, p. 475 ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. X, n° 241, ⊕. D, E-C, E-O.

Festuca duriuscula L.

Pl. ti. — Renflement fusiforme, en général de la grosseur d'un grain d'orge, mais pouvant parfois atteindre 30 mm. de long sur 3 mm. de large ; quand elle est latérale, cette cécidie occasionne une torsion de la tige. M. C. Insecte printemps II. **Isosoma** 284
Kieffer, 1891, p. 230-231, n° 425 ; Schlechtendal, 1895, p. 6. A.

Bromus tectorum L.

Ac. fl. — Épillet déformé comme au n° 291, mais les fleurs sont beaucoup plus profondément modifiées. * **Eriophyes tenuis** NAL. 285
F. Löw, 1879, p. 717, n° 5 ; Schlechtendal, 1882, p. 47, n° 4. a. pl. II, 4-5, ⊕ ; Molliard, 1895, p. 209-222, pl. XIII 8, ⊕. E-C, E-O.
* En compagnie de *Phyllocoptes dubius* Nal. (Molliard, 1895, p. 210).

— Étamines et ovaire atrophiés ; glumes un peu tordues, chiffonnées, épaissies et couvertes par places d'un revêtement granuleux. [Tarsonemus] 286
Rübsaamen, 1899, p. 226, n° 2. A.

Pl. ti. — Tige faiblement renflée immédiatement au-dessus du nœud sous la gaine de la première ou de la deuxième feuille. M. C. **Mayetiola** 287
Kieffer, 1896f, p. 132 ; 1901b, p. 275. A.

Bromus sterilis L.

Ac. fl. — Épillet déformé. Voir n° 291. . . * **Eriophyes tenuis** NAL. 288
Schlechtendal, 1890, p. 8, n° 40 ; Massalongo, 1901, p. 83, n° 31. E-C, I.
* En compagnie de *Phyllocoptes dubius* Nal. (Nalepa, 1898, p. 46, n° 1).

Bromus erectus HUDSON

Ac. fl. — A l'extrémité des épillets, cécidie fusiforme produite par l'enroulement de la glumelle inférieure, dilatée et allongée, de la fleur terminale. Cette glumelle n'a pas d'arête et elle est tapissée à sa face interne par de nombreux poils rameux. Étamines et ovaire avortés. * **Eriophyes tenuis** NAL. 289

F. Löw, 1874, p. 8, n° 14, pl. I. A. 6, ⊕; Massalongo, 1901, p. 88, III, pl. I, 3, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. 5, n° 104. *E-C, E-O.*

* En compagnie de *Phyllocoptes dubius* Nal. (Nalepa, 1898, p. 7, n° 5, p. 46, n° 1).

— Ovaire gonflé, à paroi assez mince, généralement un peu tordu; styles atrophiés, étamines avortées et glumelles écartées. **Tylenchus** 290

F. Löw, 1885^b, p. 472-473; Frank, 1896, p. 33. *E-C.*

Bromus secalinus L.

Ac. fl. — Glumelles allongées et élargies, molles, pâlies, se recouvrant les unes les autres dans toute leur longueur, en sorte qu'on ne distingue plus les différentes fleurs dont l'ensemble forme une masse ovoïde (comparer les fig. 92, 93, page 85); fleurs d'autant plus modifiées qu'elles sont plus voisines du sommet de l'épillet (fig. 91) et pouvant se réduire à leur glumelle inférieure. * **Eriophyes tenuis** NAL. 291

Molliard, 1895, p. 209-222, pl. XIII, 9-18, pl. XIV, 2-9, ⊕. *F.*

* En compagnie de *Phyllocoptes dubius* Nal. (Molliard, 1895, p. 210).

Pl. ti. — Très faible renflement de la tige sous la gaine de la première ou de la deuxième feuille, immédiatement au dessus du nœud. M.C. **Mayetiola** 292

Kieffer, 1896^f, p. 132; 1901^b, p. 257. *A.*

Bromus arvensis L.

Ac. fl. — Chloranthie. Glumes charnues; glumelles, étamines et ovaire atrophiés ou complètement avortés. * **Eriophyes tenuis** NAL. 293

F. Löw, 1879, p. 717, n° 5; Hieronymus, 1890, p. 65, n° 59. *E-C, L.*

* En compagnie de *Phyllocoptes dubius* Nal. (Nalepa, 1898, p. 7, n° 5, p. 46, n° 1).

HOARD, *Zoocécidies*.

Bromus racemosus L.

Ac. fl. — Chloranthie ; épillet déformé. . . [Eriophyes tenuis NAL.] 294
A.
Schlechtendal, 1890, p. 8, n° 40.

Bromus mollis L.

Ac. fl. — Chloranthie ; épillet déformé. . . *Eriophyes tenuis NAL. 295
E-C.
F. Löw, 1874, p. 4-5, pl. I, A. 1-5, ⊕ ; Schlechtendal, 1882, p. (8), pl. II, 1-3, ⊕.
* En compagnie de *Phylloctetes dubius* Nal. (Nalepa, 1898, p. 7, n° 5, p. 46, n° 1).

**Brachypodium silvaticum** ROEM. ET SCHULT.

Ac. ti. — A l'extrémité d'une pousse, amas allongé de feuilles courtes et larges (20-40 mm. sur 7-12 mm.), à gaine élargie, ressemblant aux écailles d'un bulbe (fig. 87). Larve blanche. 296
Chlorops cingulata MEIGEN
Rübsaamen, 1895^b, p. 16-17, n° 11, fig. 1-3, ⊕ ; Schlechtendal, 1895, p. 5. A.



Brachypodium silvaticum
Chlorops cingulata (n° 296)
Fig. 87. — Im. Rübs.



a



b



c

Brachypodium silvaticum
Diptère (n° 297)
Fig. 88 (a). — D'ap. nat.
Fig. 89 (b). — D'ap. nat.
Fig. 90 (c). — D'ap. nat.

Pl. ti. — Renflement en forme de selle situé au-dessus d'un nœud et faisant légèrement saillie en dehors de la gaine (fig. 88-90) ;

la surface des bourrelets, d'abord marron devient plus tard noirâtre. Diptère 297

Houard, 1903^c, p.157-164, fig. 22-36. ⊕ : C. Zimmermann, 1907, p.104, n° 105. F.

Brachypodium pinnatum PALISOT

Acrc. — Inflorescence déformée ; port de la plante modifié. 298
Eriopeltis brachypodii GIARD

Giard, 1893, p.199, 3^e. F.

Ac. fl. — Chloranthie des fleurs avec allongement des épillets. 299
[Eriophyes tenuis NAL.]

Schlechtendal, 1903, p. 120. A.

— Chloranthie et viviparisme. **Anguillulide** 300

Geisenbeyner, 1902, p.195, n° 7. A.

Ac. ti. — Renflement fusiforme à l'extrémité de la tige ; les entrenœuds sont raccourcis et les feuilles ainsi rapprochées forment une touffe entourant le sommet du chaume. Insecte II. 301
Isosoma brachypodii SCHL.

Brischke, 1881, p.176 ; Houard, 1902^b, p.37, n° 9 ; Trotter, 1903^b, p. 9, n° 8. A, F, I.

Brachypodium ramosum REM. et SCHULT.

Ac. ti. — Bourgeon terminal déformé. Voir n° 296. 302
[Chlorops cingulata MEIGEN]

Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. X, n° 277, ⊕. A.



Lolium perenne L.

Ac. ti. — Plante raccourcie et épaissie ; feuilles crispées. 303
Tylenchus devastatrix KÜHN

Rostrup, 1896, p.9, n° 37. D.

— Bouquet terminal de feuilles imbriquées dont la gaine est élargie et un peu gonflée ; la cécidie est décolorée. Bien que

les entre-nœuds supérieurs soient courts, il n'y a pas d'épaississement appréciable de la tige. **Isosoma** 304

Baldrati, 1900, p. 68, n° 171, pl. VI, 1, ⊕ : C. Marchal et Chateau, 1905, p. 269. *I, F.*

— Petits bouquets de feuilles déformées situés à l'extrémité des tiges. **Diptère** 305


Dalla Torre, 1892, p. 136. *E-G.*

Pl. ti. — Renflement latéral et fusiforme situé à la base du chaume. **Isosoma** 306

Tavares, 1905, p. 34. *P.*

Pl. fe. — Feuilles enroulées en forme de cylindres. **Brachycolus Korotnewi MORDWILKO** 307

Mordwilko, 1901 : Schouteden, 1903, p. 177. *R.*



Agropyrum junceum PALISOT

Ac. ti. — Le sommet épaissi de la tige est entouré d'un bouquet de feuilles, réduites à leurs gaines hypertrophiées, emboîtées étroitement et surmontées par un limbe très court. Cavité larvaire axiale et allongée. Insecte II.

Isosoma graminicola GIRAUD 308

Schlechtendal, 1890, p. 10, n° 71 ; Houard, 1902^b, p. 49, n° 56 : 1904^b, p. 364-370, fig. 157-170, ⊕ : Reijnvaan et Leeuwen, 1907^b, p. 68-101, fig. 15, 18, 30, 31, 34-36, pl. 1.1-2, 4-5, ⊕. *D, E-O.*

— Cécidie fusiforme allongée, longue de 50 mm., large de 5 mm., composée de feuilles imbriquées ; chambre larvaire située dans l'axe de la tige. M.C. **Chlorops tæniopus** MERGEN 309

Tavares, 1903, p. 160, n° 1 ; 1905, p. 114-115, pl. 1, 5, ⊕. *P.*

Pl. ti. — Renflement latéral de la taille d'un grain de riz ; entre-nœud courbé irrégulièrement. **Isosoma** 309A

Reijnvaan et Leeuwen, 1907^b, p. 92-93, fig. 32, pl. 1.3, ⊕. *H.*

Agropyrum glaucum REM. et SCHULT.

Ac. ti. — Les entre-nœuds terminaux demeurent courts ce qui entraîne la formation d'une cécidie fusiforme constituée par

les gaines élargies des 10-12 feuilles supérieures, nettement imbriquées ; le limbe de ces feuilles est normal, sauf celui de la feuille la plus interne qui est enroulé et entoure la chambre larvaire.

Isosoma 310

Baldrati, 1900, p. 66, n° 167.

I.


Agropyrum repens PALISOT

Ac.fl. — Épillets déformés. **Eriophyes cornutus** REUTER 311

Reuter, 1902, p. 331.

A.

Ac.ti. — Le chaume, épaissi dans sa partie supérieure, a des entrenœuds courts (fig. 94) ; les feuilles, à gaine élargie (fig. 95)




Bromus secalinus

Eriophyes tenuis (n° 291)

Fig. 91 (a). — Im. MOLL.

Fig. 92 (b). — Im. MOLL.

Fig. 93 (c). — Im. MOLL.



Agropyrum repens

Isosoma graminicola (n° 312)

Fig. 94 (a). — D'ap. nat.

Fig. 95 (b). — D'ap. nat.

sont rapprochées et forment une sorte de bouquet terminal ; la chambre larvaire axiale est bordée par d'épaisses parois.

M.C.

Isosoma graminicola GIRAUD 312

Giraud, 1863 b, p. 1293-1294, n° 2, pl. XXII, 2, ⊕ ; Houard, 1904 b, p. 360-364, fig. 149-156, ⊕ ; Reijnders et Leeuwen, 1907 b, p. 68-101, fig. 16, 19-22, 26-27, 29, pl. I, 7, 10-11, 13, ⊕.

D.E.-C.

E.-O.

— Jeune plante renflée à la base en forme de bulbe. Voir n° 330.

[*Mayetiola destructor* SAY] 313

Lindeman, 1888^b, p. 243 ; Kertész, 1902, p. 76-79.

R.

Ac.bg.— Bourgeon hypertrophié, allongé, courbé, dilaté en fuseau.
Larve unique. *Lonchæa parvicornis* MEIGEN 314

Perris, 1839, p. 29-37.

F.

Pl.ra. — Nodosités. *Heterodera radicolica* GREEFF 315

Schlechtendal, 1890, p. 10, n° 73 ; Frank, 1896, p. 22.

A.

Pl.ti. { Renflement du chaume..... A.
{ Autre forme de galle..... B.

A. — Au voisinage de l'épi, renflement arrondi ou fusiforme, pluriloculaire, très dur, déchirant l'épiderme ; généralement l'épi est plus ou moins déformé et reste enfermé à l'intérieur de la gaine de la feuille supérieure. Larves jaunes. M.C. Adulte juin. *Isosoma agropyri* SCHL. 316

Schlechtendal, 1888, p. 415-419 ; Kieffer, 1891, p. 255-256, n° 491 ; Rübbsaamen, 1890, p. 54, n° 217 ; Reijnvaan et Leeuwen, 1907^b, p. 86-90, fig. 17, 23 24, 28, pl. I, 9, 12, 14, ⊕.

A.P.

— Cécidies semblables à la précédente, souvent groupées.

Isosoma 316A

Reijnvaan et Leeuwen, 1907^b, p. 90-92, fig. 25, 33, pl. I, 6, ⊕.

H.

— Dans la région basilaire de la tige, renflement allongé, fusiforme, pluriloculaire, ne déchirant pas l'écorce. Larves jaunes. M.C. *Isosoma* 317

Kieffer, 1891, p. 256, n° 492 ; 1901^b, p. 537.

A.

— Immédiatement au-dessus d'un nœud, épaissement noueux du chaume. *Isosoma* 318

Schlechtendal, 1895, p. 7.

A.

— Renflement court en forme de fuseau épais, de la grosseur environ d'un grain d'orge. *Isosoma* 319

Schlechtendal, 1895, p. 7.

A.

— Renflement en forme de fuseau allongé, parfois courbé.

Isosoma 320

Schlechtendal, 1895, p. 7.

A.

— Renflement à peine sensible d'un nœud. **Isosoma** 321
Schlechtendal, 1895, p. 7. A.

B. — A la surface du chaume, dans la partie cachée par une gaine, les cellules épidermiques s'hypertrophient et se transforment en de petites excroissances hyalines, puis brunâtres, disposées en crêtes longitudinales parallèles ou bien en plaques brunes encroûtantes. **Tarsonemus** 322
Schlechtendal, 1890, p. 10, n° 74. A.

— Sous la gaine, légère dépression du chaume, dans laquelle vit une larve jaune orangé dissimulée sous un amas de paillettes d'un noir brillant. M. C. **Lasioptera cerealis** LIND. 323
Rübsaamen, 1895^b, p. 3-6, n° 1 ; Schlechtendal, 1895, p. 7. A.

Pl. fe. — Feuilles décolorées se développant incomplètement et restant enroulées dans le bourgeon. **Callyntrotus hystrix** NAL. 324
Nalepa, 1896, p. 110 ; 1898, p. 68, n° 1 ; 1905, p. 141-142, pl. III, 3-4 ; Schlechtendal, 1903, p. 138. A.

— A la base du limbe, renflement allongé parallèlement aux nervures, d'abord vert puis d'un rouge plus ou moins vif, mesurant environ 8 mm. de long sur 1 mm. de large et surtout saillant à la face inférieure de la feuille. **Tylenchus** 325
Kieffer, 1898^e, p. 103, n° 99 ; Molliard, 1904^e, p. CVIII-CXII, fig. 4-5, ⊕. F.

— Voir n° 228. **Aphis padi (avenæ FABR.)** 325A
Rostrup, 1896, p. 7, n° 23. D.

Agropyrum caninum RÖEM. et SCHULT.

Ac. ti. — Voir n° 308. **Isosoma** 326
Frank, 1896, p. 222, n° 3. A



Triticum vulgare VILL. (**T. sativum** LAMK.)

Ac. fl. — Épi demeurant petit. Les graines déformées, arrondies, de couleur brun foncé, à surface ridée et durcie, contiennent

des anguillules. Maladie connue sous le nom de « Blé vibrioné ».

Tylenchus tritici ROFFREDI

327

André, 1849, p. 432-440 ; 1850, p. 367-372 ; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n° 348, ⊕.

E-C,
E-O.

— Pièces florales hypertrophiées et soudées ; fleur transformée en une masse uni. ou pluriloculaire. Maladie connue sous le nom de « Blé niellé ».

Tylenchus

328

Davaine, 1855, p. 435-438 ; 1856, p. 148-152 ; 1857 ; Prillieux, 1882, p. 226-228.

E-O.

Ac.ti. — Les entre-nœuds supérieurs demeurent courts et s'épaississent à l'intérieur du fourreau formé par les feuilles rapprochées. Cavité axiale allongée contenant une larve blanc jaunâtre. M.C.I.

Chlorops tæniopus MEIGEN

329

Frauenfeld, 1869, p. 602-603 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n° 225, ⊕.

E-C.

— Le chaume, arrêté dans sa croissance, présente au voisinage du sol un renflement bulbeux formé par la tige épaissie entourée des gaines rapprochées et déformées. Sous ces gaines, larves grégaires blanc jaunâtre. M.C.II.

Mayetiola destructor SAY

330

P. Marchal, 1895, p. 134-136, 302-303 ; 1897, p. 3-105, fig. 1-2, pl. I, 4-6, pl. III, 19, 21, 23, 26, 27, pl. IV, 28-31, pl. V, 33-34 ; Kertész, 1902, p. 76-79.

E-T.

— Entre-nœuds raccourcis à la base du chaume. Voir n° 338.

Tylenchus devastatrix KÜHN

331

Ritzema-Bos, 1888, p. 263, n° 32 ; 1897, p. 229, n° 32, p. 279-280, pl. III, ⊕ ; Schlechtendal, 1890, p. 11, n° 81.

E-O.

— Déformation de la partie supérieure du chaume, au niveau du dernier entre-nœud.

[Thrips]

332

Laubert, 1904, p. 886-887.

E-C.

Pl.ti. — Sous la gaine, légère dépression ovalaire du chaume limitée par un petit bourrelet à chaque extrémité du grand axe, de sorte que la cécidie a l'aspect d'une selle minuscule. Larves rouge sang. M.T. Adulte mai-juin II.

Clinodiplosis equestris WAGNER

333

Wagner, 1871, p. 414-423, pl. IV ; P. Marchal, 1897, p. 70-71 ; Kertész, 1902, p. 121.

E-C,
E-O.

Pl.fe. — Limbe enroulé par en haut en spirale ou en cornet et déco-

- loré. Puceron vert foncé ou pâle avec la région des cornicules rougeâtre. *Aphis padi* L. (*avenæ* FABR.) 334
Schlechtendal, 1890, p. 11, n° 79; Schouteden, 1903, p. 189. E-O.

***Triticum rigidum* SCHRAD.**

- Ac. fl.** — Inflorescence gonflée et déformée. . . . [Cécidomyide] 335
Karsch, 1880, p. 308, n° 36. R.

***Triticum* sp.**

- Ac. ti.** — Entre-nœuds raccourcis; feuilles se recouvrent. Puceron fort allongé, pulvérulent vert. *Brachycolus stellaris* HARDY 336
Schouteden, 1903, p. 189 (sur *Triticum* var. sp.) E-O.

- Pl. ti.** — Entre-nœud renflé, avec cavités larvaires petites, ellipsoïdales (3 mm. sur 0,7 mm.), distinctes. [Isosoma] 337
Tavares, 1905, p. 106. P.



***Secale cereale* L.**

- Ac. ti.** — Le port de la plante acquiert un diamètre anormal, la tige restant courte; les gaines des feuilles sont élargies; leur limbe raccourci demeure étroit et ses bords sont ondulés; l'épi n'apparaît pas ou reste rudimentaire.

Tylenchus devastatrix KÜHN 338

Ritzema-Bos, 1888, p. 263, n° 33; 1892, p. 229, n° 33, p. 257-279; Schlechtendal, 1890, p. 10, n° 65; Frank, 1896, p. 25; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n° 1, ⊕. E-O.

— A l'intérieur de la gaine de la feuille supérieure, la partie terminale du chaume demeure courte et s'épaissit beaucoup. Une larve blanc jaunâtre, atteignant jusqu'à 7 mm. de long. M.C.I.

Chlorops tæniopus MEIGEN 339

Schlechtendal, 1890, p. 9-10, n° 64; Frank, 1896, p. 83, fig. 23-24, ⊕. A.

— Au voisinage du collet, épaississement bulbeux du chaume

enveloppé par les gaines rapprochées et déformées. Larves grégaires blanc jaunâtre. M.C.H. **Mayetiola destructor** SAY

340

Schlechtendal, 1890, p. 10, n° 66 ; Frank, 1896, p. 81-82, fig. 22.

E-T.

Pl. ti. — Sur le chaume, fossette longue et profonde abritant une (parfois deux) larve jaune orangé dissimulée sous une membrane mince, noire, desséchée, et cachée en outre par la gaine qui enveloppe la tige. M.C. Adulte mai-juin.

Lasioptera cerealis LAND.

341

Lindeman, 1880, p. 133-138, fig. 5-7, ⊕ ; 1880^b, p. 386-389 ; Inebald et Meade, 1888, p. 193-197, 2 fig. ; P. Marchal, 1897, p. 73-77, fig. 8, ⊕.

R.

Hordeum distichum L.

Ac. ti. — Extrémité de la tige renflée et demeurée courte. Voir n° 329.

Chlorops tæniopus MEIGEN

342

Schlechtendal, 1890, p. 9, n° 51 ; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n° 330, ⊕

A.

Pl. ti. — Sur le premier ou le second nœud, renflement à peine sensible du chaume ; sur les plantes jeunes, la base du chaume peut présenter un renflement ovoïde.

[**Mayetiola destructor** SAY]

343

Schlechtendal, 1895, p. 6 ; Frank, 1896, p. 81.

A.

Pl. fe. — Gainés gonflées ; feuilles enroulées en spirale. Puceron vert foncé ou pâle, la région des cornicules rougeâtre.

Aphis padi L. (avenæ FABR.).

344

Kaltenbach, 1874, p. 735 ; Schlechtendal, 1890, p. 9, n° 52.

A.

Hordeum vulgare L.

Ac. ti. — Extrémité de la tige renflée et raccourcie. Voir n° 329.

Chlorops tæniopus MEIGEN

345

Kaltenbach, 1874, p. 734 ; Schlechtendal, 1890, p. 9, n° 51 ; Weiss, 1902, p. 62-64.

D, L.

Pl. ti. — Voir n° 343. [**Mayetiola destructor** SAY]

346

Ormerod, 1887, p. 1-6, 7 fig., ⊕ ; Enock, 1891, p. 329-366, pl. XVI, ⊕.

I-B.

- Cécidie en forme de selle, située sous une gaine. Voir n° 333.
Cécidomyide 347
 Nowicki, 1874, p. 356-358 ; Kieffer, 1897, p. 122 ; 1901^b, p. 340. *E.-G.*
- Pl. fe.** — Voir n° 228. **Aphis padi** L. (*avenæ* FABR.) 348
 Kaltenbach, 1874, p. 735 ; Schlechtendal, 1890, p. 9, n° 52. *A.*



Elymus arenarius L.

- Pl.ra.** — Renflements avec cavité interne.
Heterodera radicola GREEFF 349
 Warming, 1877, p. 93-96 ; G. Müller, 1883, p. 12 ; Schlechtendal, 1890, p. 8, n° 43. *E.-N.*
- Nodosités à la pointe des radicelles.
Tylenchus [*hordei* SCHÖYEN] 350
 Rostrup, 1896, p. 8, n° 30 ; Kieffer, 1897, p. 24 ; 1901^b, p. 309. *D., F.-B.*
- Pl. ti.** — Renflement. **Isosoma Brischkei** SCHL. 351
 Schlechtendal, 1890, p. 8, n° 44 ; Kieffer, 1901^b, p. 309. *A.*

FAMILLE DES CYPÉRACÉES

Carex 355-394, Cyperus 352, Elyna 354, Heleocharis 353.

Les galles des *Carex* sont assez nombreuses, mais mal connues jusqu'à présent, les descriptions et les figures qui en ont été données étant peu détaillées ou peu claires. Aussi avons-nous cru utile, pour jeter quelque clarté sur ce sujet, de constituer un tableau d'ensemble (fig. 96-103) contenant la plupart des dessins publiés par les Auteurs.

Les cécidies des *Carex* ne ressemblent en rien à celles des Graminées. Il est intéressant de remarquer que la galle du *Cyperus longus* (n° 352) rappelle celle du *Cynodon Dactylon* ; elle n'a malheureusement pas été retrouvée sur ce substratum depuis Vallisneri.



Cyperus longus L.

- Ac. ti.** — Galle en forme de tresse. . . [Lonchæa lasiophthalma MACQ.] 352
Osten-Sacken, 1883, p. 187-188. I.

Heleocharis palustris R. BROWN

- Pl. ra.** — Nodosités. **Heterodera radicecola** GREEFF 353
Lagerheim, 1905, p. 5, 26. E-N.

Elyna spicata SCHRAD.

- Pl. fe.** — Feuilles hypertrophiées de couleur jaune paille ou d'un 354
brun luisant. **Ériophyide**
Dalla Torre, 1892, p. 121 (sous le nom de *Phytoptus Peyritschii* Dalla Torre). E-G.

Carex Davalliana SMITH

- Pl. ti.** — Sur la tige, à la base et à l'aisselle d'une feuille, excrois-
sances uniloculaires de forme allongée, pouvant atteindre
8 mm. de long, blanchâtres ou jaune paille, brillantes, à parois
ligneuses et très minces. Larve blanche avec une spatule ster-
nale munie d'une tige. M.C. **Hormomyia** 355
Kieffer, 1897^e, p. 18 ; 1900^e, pl. XXXII, 6. A.

Carex disticha HUDSON

- Ac. fl.** — Utricules déformés. **Cécidomyide** 356
Rostrup, 1896, p. 6, n^o 17. D.

Carex arenaria L.

- Ac. fl.** — Utricule grossi, long de 8 mm., piriforme, se terminant
par une petite pointe brune. Larve rosée, à spatule sternale
sessile en forme de croissant. **Cécidomyide** 357
F. Löw, 1885^e, p. 501-502 ; Schlechtendal, 1890, p. 6, n^o 13. E-G.

Plrc. — Petites cécidies pluriloculaires, situées sur les feuilles et les tiges, le plus souvent sous terre.

Hormomyia arenariæ RÜBS. 358


Hieronimus, 1890, p. 126, n° 399 ; Rübsaamen, 1899^b, p. 602, n° 47, note 4. *E.-G.*

Carex Schreberi SCHRANK (**C. præcox** SCHREB.)

Acre. — A la base de la tige, les pousses latérales sont déformées ; leurs entre-nœuds demeurent courts et la pousse prend l'aspect d'un bourgeon.

Cécidomyide 359

Schlechtendal, 1890, p. 6, n° 20. *A.*



Galles de Carex

- Fig. 96 (a). — *Carex muricata* : *Perrisia muricata* (n° 362). Im. KIEFF.
- Fig. 97 (b). — *Carex acuta* : *Perrisia* (n° 379). Im. KIEFF.
- Fig. 98 (c). — *Carex pallescens* : *Hormomyia cornifex* (n° 381). Im. KIEFF.
- Fig. 99 (d). — *Carex stellulata* : *Pseudhormomyia granifera* (n° 367). Im. KIEFF.
- Fig. 100 (e). — *Carex stellulata* : *Hormomyia* (n° 368). Im. KIEFF.
- Fig. 101 (f). — *Carex stricta* : *Dichroma gallarum* (n° 375). Im. RÜBS.
- Fig. 102 (g). — *Carex stricta* : *Hormomyia* (n° 377). Im. KIEFF.
- Fig. 103 (h). — *Carex tomentosa* : *Cécidomyide* (n° 387). Im. TROTTER

Plrc. — Renflement caulinaire semblable à celui de *Pseudhormomyia subterranea* sur *Carex divulsa*. Voir n° 366.

Pseudhormomyia 360

Trotter, 1904^c, p. 72, n° 5. *I.*

Carex vulpina L.

- Ac. fl.** — Utricule hypertrophié, pouvant atteindre 8 mm. de long. Une larve orangée. Voir n° 362. [**Perrisia muricatæ MEADE**] 361
 Hieronymus, 1890, p. 127, n° 463 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 59, ⊕ ; Trotter, 1904, p. 8, n° 6 ; Tavares, 1905, p. 8, pl. XIV, 3, ⊕.
E-G,
E-O.

Carex muricata L.

- Ac. fl.** — Utricule agrandi et allongé, subcylindrique, aminci au sommet, long de 8 mm. (fig. 96). Larve orangée, avec spatule sternale munie d'une tige et profondément divisée à son bord antérieur par une incision en angle aigu. Cocon blanc. M. C. H. **Perrisia muricatæ MEADE** 362
 H. Löw, 1850, p. 30 ; Inebald et Meade, 1886, p. 152-154 ; Kieffer, 1900^c, pl. XLIII, 6, ⊕.
E-G,
E-O.

Carex contigua HOPPE

- Ac. fl.** — Utricule déformé. Voir n° 362. . **Perrisia muricatæ MEADE** 363
 Kieffer, 1897^c, p. 17-18 ; 1901^b, p. 283. *A.*

Carex contigua HOPPE var. umbrosa

- Ac. fl.** — Utricule déformé. Voir n° 362. . **Perrisia muricatæ MEADE** 364
 Kieffer, 1897^c, p. 18 ; 1901^b, p. 283. *A.*

Carex divulsa GOOD.

- Ac. fl.** — Utricule déformé. Voir n° 362. . **Perrisia muricatæ MEADE** 365
 Kieffer, 1897^c, p. 18 ; 1901^b, p. 283. *A.*

- Pl. ti.** — Galle uniloculaire, souterraine, ovoïde, lisse, brillante, à paroi mince, longue de 5 mm. environ, fixée sur la tige par une large base, près de l'insertion d'une feuille. M. C. **Pseudhormomyia subterranea KIEFF. et TROTTER** 366
 Kieffer et Trotter, 1904, p. 65 ; Trotter, 1904^c, p. 72, n° 4. *I.*

Carex stellulata Good.

Pl.ti. — Au voisinage du niveau du sol, renflement uniloculaire de la tige, de la forme et de la grosseur d'un grain de blé (fig. 99), glabre, lisse, brillant, d'un brun noir. M.C.

Pseudhormomyia granifex KIEFF. 367

Kieffer, 1898 c, p. 58 ; 1900 c, pl. XLIII, 1, ⊕ ; Kertész, 1902, p. 85. A.

— Galle ovoïde, pointue, uniloculaire, longue de 2 mm. et large de 1,25 mm., fixée à la base des tiges, au niveau du sol (fig. 100). [Hormomyia] 368

Kieffer, 1900 c, pl. XLIII, 2, ⊕ ; 1901 b, p. 284. A.

Carex Goodenowi GAY (**C. vulgaris** FRIES. **acuta** L.)

Ac.fl. — Utricule déformé, agrandi, allongé, laissant saillir le style.

Cécidomyide 369

Schlechtendal, 1890, p. 6, n° 15 ; Lagerheim, 1893, p. 173-174. E-V.

Pl.re. — Sur les feuilles et la tige, cécidies allongées, lisses, d'un brun brillant, le plus souvent situées juste au-dessus du sol. Une larve blanche. **Dichrona gallarum** RÜBS. 370

Rübsaamen, 1890 b, p. 542-543, note 1, p. 569-570 ; Kertész, 1902, p. 81. A.

— A la base d'une feuille de l'un des nœuds inférieurs, excroissance pluriloculaire de forme allongée, mesurant 5-8 mm. de long, de couleur blanche, à parois ligneuses et très minces. M.C. **Hormomyia Rosenhaueri** RÜBS. 371

Rübsaamen, 1892 b, p. 394-395, n° 3, pl. XV, 8, pl. XVI, 11-12, pl. XVIII, 19. A.

Carex stricta Good.

Acre. — Utricule gonflé, oviforme, pouvant atteindre 3 mm. de long.

Une larve orangée. **Cécidomyide** 372

Hieronymus, 1890, p. 127, n° 402 ; Schlechtendal, 1890, p. 6, n° 21 ; 1895, p. 5. A.

— Pousse arrêtée dans son développement, épaissie en une cécidie ressemblant à une longue corne.

Hormomyia cornifex KIEFF. 373

Kieffer, 1898 c, p. 60 ; Kertész, 1902, p. 82. A.

- Plrc.** — Au collet, cécidies brunes de la grosseur d'un grain de blé. Voir n° 367. **Pseudhormomyia granifex** KIEFF. 374
 Kieffer, 1898^c, p. 58; Rübsaamen, 1901, p. 95, n° 64, p. 114, n° 39; Kertész, 1902, p. 85. A.
- Sur la tige ou les feuilles, cécidies allongées (fig. 101), lisses, le plus souvent d'un brun brillant, généralement situées au voisinage immédiat du sol. Larve blanche. **Dichrona gallarum** RÜBS. 375
 Rübsaamen, 1899^b, p. 54^a-543, note 1, p. 569-570; 1901, p. 95, n° 63, p. 114, n° 38, fig. 11, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 154, ⊕. A.
- Petites boursofflures à la base des feuilles. **Hormomyia tuberifica** RÜBS. 376
 Rübsaamen, 1899, p. 603, n° 49, note 1; Kertész, 1902, p. 84. A.
- Renflement allongé, unilatéral, situé à la base des feuilles (fig. 102). **Hormomyia** 377
 Kieffer, 1900^c, pl. XLIII, 3, ⊕; 1901^b, p. 284. A.

Carex caespitosa L.

- Ac. fl.** — Utricule ovulaire, renflé, à face externe convexe, à face interne concave, finement ponctué, à extrémité obtuse, entière, rarement bifide. **Cécidomyide** 378
 Lagerheim, 1893, p. 169-170, 174; Kieffer, 1901^b, p. 283. E-N.

Carex acuta FRIES

- Ac. fl.** — Utricule obovale et long de 3 mm (fig. 97). **Perrisia** 379
 Kieffer, 1900^c, pl. XLIII, 7, ⊕; 1901^b, p. 283. A.

Carex gracilis KIT.

- Plrc.** — Sur les feuilles et la tige, cécidies lisses, le plus souvent d'un brun brillant, allongées, généralement situées juste au-dessus du sol. Larve blanche. **Dichrona gallarum** RÜBS. 380
 Rübsaamen, 1899^b, p. 54^a-543, note 1, p. 569-570; Kertész, 1902, p. 81. A.

Carex pallescens L.

- Ac.ti.** — Pousse arrêtée dans son développement, gonflée et ressemblant à une longue corne (fig. 98). **Hormomyia cornifex** KIEFF. 381
Kieffer, 1898^c, p. 60; 1900^c, pl. XLIII, 4, ⊕; Kertész, 1902, p. 82. A.
- Pl.ti.** — Au collet, cécidies brunes de la grosseur d'un grain de blé. Voir n° 367. **Pseudhormomyia granifex** KIEFF. 382
Kieffer, 1898^c, p. 58; Kertész, 1902, p. 85. A.
- Pl.fe.** — Renflement allongé, unilatéral, situé à la base des feuilles. **Hormomyia** 383
Kieffer, 1901^b, p. 284. A.

Carex pilosa Scop.

- Pl.fe.** — Entre les gaines des feuilles basilaires, excroissances pluriloculaires de forme allongée, de 5-8 mm. de long, de couleur blanche, à parois ligneuses, minces. M.C. **Hormomyia Fischeri** FRAUENF. 384
Frauenfeld, 1867, p. 781, n° 3; Kaltenbach, 1874, p. 730, n° 40. E-C.

Carex panicea L.

- Ac.fl.** — Utricule déformé, allongé et épaissi. . . **Cécidomyide** 385
Lindblom, 1839; Lagerheim, 1893, p. 169-170. E-V.

Carex praecox Jacq.

- Ac.fl.** — Utricule déformé, allongé et agrandi. . . **Cécidomyide** 386
Rostrup, 1896, p. 6, n° 18. D.

Carex tomentosa L.

- Pl.fe.** — Petites cécidies subovoïdes, glabres, jaune brunâtre brillant, de 1,5-2 mm. de long, perforant la feuille (fig. 103); cécidies uniloculaires, à parois minces et consistantes. **[Pseudhormomyia granifex KIEFF.]** 387
Trotter, 1900, p. 190, n° 2, pl. IX, 1, ⊕. I.
HOVARD, *Zoocécidies*.

Carex Pseudo-Cyperus L.

Pl. fe. — Petite boursouffure à la base des feuilles.

Hormomyia tumorifica RÜBS. 388Rübsaamen, 1899^b, p. 663, n° 50, note 2 ; Kertész, 1902, p. 84. A.**Carex rostrata** WITH. (**C. ampullacea** Good.)

Pl. fe. — Cécidie semblable à celle décrite au n° 371. M.C.

Hormomyia 389Hieronymus, 1890, p. 127, n° 401 ; Rübsaamen, 1892^b, p. 394-395, pl. XVIII, 18. A.**Carex hirta L.**

Ac. fl. — Utricule déformé, allongé et épaissi. . . . Cécidomyide 390

Schlechtendal, 1890, p. 6, n° 16. A.

Carex fulva L.

Ac. fl. — Utricule gonflé et vide. . . . [Hormomyia] 391

Kieffer, 1895, p. 172. A.

Carex Pairei F. SCHULTZAc. fl. — Utricule déformé. Voir n° 362. . . . **Perrisia muricatæ** MEADE 392Kieffer, 1897^e, p. 18 ; 1901^b, p. 283. A.**Carex rigida** GOOD.

Ac. fl. — Utricule déformé, allongé et épaissi. . . . Cécidomyide 393

Lagerheim, 1893, p. 168-169 ; Kieffer, 1901^b, p. 283. E-V.**Carex verna** CHAIX

Ac. fl. — Utricule hypertrophié, long de 3 mm. . . . Cécidomyide 394

Trotter, 1903^b, p. 10, n° 13. I.

FAMILLE DES ARACÉES

On ne connaît qu'une Zoocécidie sur une espèce ornementale, d'origine extra-européenne.



Dieffenbachia sp.


Pl.ra. — Nodosités avec cavité interne. **Heterodera radicolica** GREEFF 395
 Kieffer, 1897, p.13 ; 1901^b, p.306. 4.

FAMILLE DES JUNCACÉES

Beaucoup d'espèces du genre *Juncus* ont leurs pousses transformées, par l'action d'un Psyllide, le *Livia juncorum*, en curieux amas de feuilles connus depuis fort longtemps et signalés dans de nombreux mémoires de tératologie (Consulter : Penzig, t. 2, 1894, p. 434). Il n'a été décrit jusqu'à présent qu'une seule autre Zoocécidie : elle affecte les racines du *Juncus Gerardii* et on peut la rapprocher des nodosités irrégulières produites par des Champignons du genre *Entorrhiza*.



Juncus



Juncus lamprocarpus
Livia juncorum (n° 403)
 Fig. 104. — D'ap. nat.

Acre. — Les différents rameaux de l'inflorescence sont transformés, par cladomanie et phyllomanie, en amas de feuilles serrées (fig. 104), de couleur roussâtre, raccourcies, à gaine élargie et à limbe atrophié. Larves nombreuses dans les gaines.

Livia juncorum LATR.

Cette cécidie a été rencontrée sur les espèces suivantes :

Juncus alpinus VILL.

(**J. fusco-ater** SCHREB.) **Livia juncorum** LATR. 396

F. Löw, 1888, p.10, n° 1 ; Hieronymus, 1890, p. 107-108, n° 294 ; Dalla Torre, 1892, p.134 ; 1895, p.145 ; Lagerheim, 1905, p.21. E.C. E.N.

Juncus articulatus L. Livia juncorum LATR. 397
 Schlechtendal, 1895, p. 4 ; Connold, 1901, p. 238, pl. CIII, ⊕. E-C,
 E-O.

Juncus atricapillus DREI. Livia juncorum LATR. 398
 Rostrup, 1896, p. 6, n°13. D.

Juncus conglomeratus L. Livia juncorum LATR. 399
 Scott, 1876, p. 565-566 ; F. Löw, 1888, p. 10, n°1 ; Schlechtendal, 1890, p. 5, n° 12. I-B,
 E-C.

Juncus effusus L. Livia juncorum LATR. 400
 F. Löw, 1888, p. 10, n°1 ; Schlechtendal, 1890, p. 5, n°12. E-C.

Juncus fuscatus SCHREB. Livia juncorum LATR. 401
 Schlechtendal, 1890, p. 5, n°12 ; 1895, p. 4. A.

Juncus glaucus EHRH. Livia juncorum LATR. 402
 Dalla Torre, 1892, p. 134 ; Schlechtendal, 1895, p. 4. E-C.

Juncus lamprocarpus EHRH. Livia juncorum LATR. 403
 Massalongo, 1893, p. (38-39), n° 4, pl. II, 3, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VI, n° 188, ⊕ ;
 Rubsaamen, 1901, p. 86, 119, 147, fig. 12-13, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. V,
 n°114, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 31, pl. VIII, 14, ⊕. E-T.

Juncus obtusiflorus EHRH. Livia juncorum LATR. 404
 Kaltenbach, 1874, p. 727, n° 6 ; Schlechtendal, 1890, p. 5, n° 12. A.

Juncus silvaticus REICHARD. Livia juncorum LATR. 405
 Hieronymus, 1890, p. 108, n° 296 ; Bezzi, 1899, p. 21, n°40. E-C, I.

Juncus supinus MÖNCH
(J. uliginosus MEYER). Livia juncorum LATR. 406
 Hieronymus, 1890, p. 108, n° 297 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 157, ⊕ ;
 Lagerheim, 1903, p. 341 ; Tavares, 1905, p. 31 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 267. E-C,
 P, F.

Juncus Gerardi LOIS.

Aerc. — Amas de feuilles. Livia juncorum LATR. 407
 Lagerheim, 1905, p. 22, 26. E-N.

Pl ra. — Nodosités. Heterodera radicecola GREEFF 408
 Lagerheim, 1905, p. 5, 26. E-N.

FAMILLE DES LILIACÉES

Allium 411-415, *Asparagus* 428-431, *Dracana* 427, *Gallonia*, 420,
Hemerocallis 410, *Hyacinthus* 425-426, *Lilium* 416-419, *Scilla* 421-424,
Tofieldia 409.

La plupart des Zoocécidies des Liliacées sont engendrées par le *Tylenchus devastatrix*, parasite redouté des horticulteurs et des maraîchers car il s'attaque surtout aux plantes à bulbes (Jacinthes, Scilles, Oignons, etc.). Le *Tylenchus devastatrix* provoque une réaction assez faible de la Liliacée, mais comme dit Ritzema-Bos (1892, p. 239) « quoiqu'il ne cause jamais une galle proprement dite, il occasionne un phénomène analogue : hypertrophie des tissus ». Les tissus parasités sont souvent envahis par d'autres anguillules, par des bactéries et par des champignons qui en achèvent la destruction.

Prillieux, Chatin, Ritzema-Bos ont étudié spécialement les maladies dites « annulaire » et « vermiculaire », provoquées par le *Tylenchus devastatrix* ; nous avons relaté leurs travaux dans les pages qui suivent.

~~~~~  
***Tofieldia calyculata* WAILL.**

**Acre.** — Inflorescence raccourcie, presque globuleuse ; les feuilles caulinaires inférieures ou bien toutes les feuilles caulinaires sont froissées. **Ériophyide** 409

Thomas, 1886, p. 305 ; Dalla Torre, 1892, p. 167 ; Lagerheim, 1905, p. 4.

*E.-D.*  
*E.-S.*

~~~~~  
***Hemerocallis fulva* L.**

Ac. fl. — Boutons déformés, boursoufflés et demeurant fermés. Larves grégaires brun pâle. M.T.I-II.

***Contarinia quinquenotata* F. Löw** 410

F. Löw, 1885^a, p. 503-504 ; 1888^b, p. 235 ; Schlechtendal, 1895, p. 4 ; Kertész, 1902, p. 98.

E.-C.

~~~~~  
***Allium Cepa* L.**

**Acre.** — Plante trapue, contournée et difforme : tige épaisse ; feuilles hypertrophiées irrégulièrement ; gaines courtes et fort épaisses avec ça et là, à la face externe, des tumeurs mamelonnées. *Maladie vermiculaire des oignons.*

***Tylenchus devastatrix* Kühn** 411

Chatin, 1885, 57 p., 2 pl. ; 1888, p. 159-162 ; 1888<sup>b</sup>, p. 1431-1433 ; Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 24 ; 1892, p. 228, n° 24, p. 281-295, pl. IV-VI, ⊕ ; Frank, 1896, p. 28, c.

*E. O.*

- Pl.ra. — Renflement fusiforme. . . . . *Heterodera radicolica* GREEFF 412  
 Vuillemin et Legrain, 1894, p. 549-551. AL.

**Allium proliferum**

- Acre. — Voir n° 411. . . . . *Tylenchus devastatrix* KÜHN 413  
 Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 25 ; 1892, p. 228, n° 25 ; Frank, 1896, p. 31. E-O.

**Allium Schönoprasum L.**

- Acre. — Voir n° 411. . . . . *Tylenchus devastatrix* KÜHN 414  
 Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 27 ; 1892, p. 228, n° 27. E-O.

**Allium vineale L.**

- Acre. — Voir n° 411. . . . . *Tylenchus devastatrix* KÜHN 415  
 Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 26 ; 1892, p. 228, n° 26. E-O.

**Lilium candidum L.**

- Ac. fl. — Fleur demeurant fermée. Larves blanches, puis jaunâtres.  
 M.T. *Liriomyza urophorina* MIK 416  
 Thomas, 1893, p. 300-303, n° 10 ; Mik, 1894, p. 284. E-C.

**Lilium Martagon L.**

- Ac. fl. — Fleur fermée. Voir n° 416. . . . . *Liriomyza urophorina* MIK 417  
 Mik, 1894, p. 284-290, pl. III ; Cecconi, 1900, p. 230-231, n° 3. E-C, I.  
 — Bouton gonflé demeurant fermé. Larves grégaires jaune  
 pâle. M.T. *Contarinia* 418  
 F. Löw, 1885<sup>c</sup>, p. 505-506 ; Thomas, 1893, p. 298-300, n° 9. E-C.

**Lilium speciosum THUNB.**

- Pl. fe. — Limbe crispé. . . . . *Aphide* 419  
 Tavares, 1903, p. 170, n° 32 ; 1905, p. 33. P.

**Lilium bulbiferum L.**

- Pl. fe. — Limbe crispé. . . . . *Aphide* 419A  
 Mariani, 1907, p. 65, n° 10. I.





**Galtonia candicans** DECAISNE

Pl. fe. — Cotylédon épaissi et souvent plus ou moins crispé.

**Tylenchus devastatrix** KÜHN 420

Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 23 ; 1892, p. 228, n° 23, p. 333-334 ; Frank, 1896, p. 29. *E.-O.*

**Sella campanulata** AITON

Acre. — Feuilles très crispées et très épaissies en certains points, avec, par places, des taches blanches dues à une infiltration d'air sous l'épiderme. *Maladie annulaire du bulbe.*

**Tylenchus devastatrix** KÜHN 421

Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 19 ; 1892, p. 228, n° 19, p. 335-337, pl. X, 1 ; Frank, 1896, p. 29. *E.-O.*

**Sella cerua** JANKA

Acre. — *Maladie annulaire du bulbe.* Voir n° 421.

**Tylenchus devastatrix** KÜHN 422

Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 20 ; 1892, p. 228, n° 20, p. 335-337, pl. X, 2, 3. *E.-O.*

**Sella sibirica** ANDREWS

Acre. — Tige florale demeurant courte ; feuilles tordues, crispées, épaissies par places, présentant des taches jaunes. *Maladie annulaire du bulbe.*

**Tylenchus devastatrix** KÜHN 423

Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 18 ; 1892, p. 228, n° 18, p. 334-335. *E.-O.*

**Sella maritima** L.

Pl. ti. — Renflement fusiforme assez gros ; chambre larvaire petite et allongée.

**Insecte** 424

Stefani, 1903, p. 105, n° 21 ; 1906, p. 186.

*si.*

**Hyacinthus orientalis** L.

Acre. — La hampe florale peut être arrêtée dans son développement si l'attaque est précoce ; si l'attaque est plus tardive, l'inflo-

rescence n'apparaît qu'à moitié. Sur une tige âgée il se forme des épaississements et des renflements noueux. La fleur peut être attaquée ; les pétales demeurent courts et s'épaississent. Dans les bulbes, les tuniques sont épaissies et leur substance devient gommeuse ; des taches jaunes avec plis et gerçures apparaissent sur les feuilles. *Maladie annulaire des Jacinthes.*

*Tylenchus devastatrix* KÜHN 425

Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 21 ; 1892, p. 228, n° 21, p. 295-332. E-O.

**Hyacinthus romanus** DESF. (**II. praecox** JORDAN)

Acre. — *Maladie annulaire.* Voir n° 425. *Tylenchus devastatrix* KÜHN 426

Prillieux, 1881, p. 253-260 ; Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 22 ; 1892, p. 228, n° 22, p. 295-332. E-O.



**Dracaena rosca**

Pl.ra. — Nodosités. . . . . *Heterodera radicolica* GREEFF 427

Frank, 1896, p. 22 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 308. A.



**Asparagus acutifolius** L.

Acre. — Jeunes rameaux irrégulièrement renflés et courbés, terminés par des bouquets de feuilles comprimées, élargies à la base, décolorées ou rougeâtres. Une ou plusieurs larves couleur chair. [M.T.] [*Perrisia turionum* KIEFF. et TROTTER] 428

Trotter, 1903, p. 8, n° 4, fig. 1, ⊕ ; 1906, p. 111-112, n° 3 ; Massalongo, 1907, p. 33-34, n° 2 ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVI, n° 384, ⊕. I, f.

Pl. ti. — Turions anormaux hypertrophiés de diverses façons. Larve couleur chair. M.T. *Perrisia turionum* KIEFF. et TROTTER 429

Trotter, 1904, p. 6-7, n° 3. I.

**Asparagus aphyllus** L.

Acre. — A l'extrémité des jeunes rameaux, renflements formés de petites épines, serrées les unes contre les autres, élargies à la base, contournées et décolorées. Larves blanches en société vivant entre les épines. M.T. I-II. *Perrisia asparagi* TAVARES 430

Tavares, 1900, p. 61-62, n° 101 ; 1902, p. 119-120, n° 382 ; 1905, p. 5, pl. I, 18-19, ⊕. P.

**Asparagus officinalis L.**

- Pl. ti. — Petits renflements. . . . . [Cécidomyide] 431  
 Kieffer, 1901 b, p. 262. E-G.
- Renflement localisé à l'aisselle des jeunes rameaux.  
Cécidomyide 431A
- Trotter, 1907 c, p. 102-103, n° 3. I.

**FAMILLE DES AMARYLLIDACÉES**

*Eucharis* 433, *Narcissus* 432.

~~~~~

Narcissus tazetta L.

- Pl. re. — Maladie du bulbe. Voir n° 421. *Tylenchus devastatrix* KÜHN 432
 Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 17 ; 1892, p. 228, n° 17 ; Frank, 1896, p. 29 E-O.
- ~~~~~

Eucharis sp.

- Pl. fe. — Taches jaunes, plus tard brunes, accompagnées d'une profonde dépression à la face inférieure.
Tylenchus [hyacinthi PRILLIEUX] 433
- Sorauer, 1886 b, p. 533 ; Frank, 1896, p. 29. A.

FAMILLE DES DIOSCORÉACÉES

Dioscorea 434, *Tamus* 435.

~~~~~

**Dioscorea illustrata**

- Pl. re. — Sur le tubercule, excroissance en forme de verrue, faisant saillie à travers les crevasses de l'épiderme.  
Heterodera radicola GREEFF 434
- Quéva, 1894, p. 629-633, fig. 1-4, ⊕. F.
- ~~~~~

**Tamus communis L.**

**Ac. fl.** — Les boutons floraux, normalement subglobuleux, ne s'épanouissent pas et prennent en se gonflant une forme presque cylindrique. Larve solitaire. **Schizomyia tami KIEFF.**

435

Massalongo, 1899<sup>b</sup>, p. 146, n° 71 ; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. XXXII, 2.

I.

**FAMILLE DES MUSACÉES**

*Heliconia* 440, *Musa* 437-439, *Strelitzia* 436.

Les plantes de cette famille et des familles précédentes qui présentent des Zoocécidies sont surtout ornementales et cultivées dans les serres ou les jardins. Leurs organes souterrains sont attaqués par des Anguillulides, surtout par l'*Heterodera radiculicola*, qui cause de grands dégâts dans les cultures de Bananiers en Égypte.



**Strelitzia Nicolai** REGEL et KOCH

**Pl.ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radiculicola** GREEFF  
C. Müller, 1883<sup>b</sup>, p. 13-14 ; Frank, 1896, p. 22.

436

A.



**Musa Cavendishi** LAMB. (**M. chinensis** SWEET)

**Pl.ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radiculicola** GREEFF  
C. Müller, 1883<sup>b</sup>, p. 13-14 ; Delacroix, 1902, p. 672-678.

437

A, ÉG.

**Musa dacca** (**M. sapientum** L.)

**Pl.ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radiculicola** GREEFF  
C. Müller, 1883, p. 9.

438

A.

**Musa rosacea** JACQ.

**Pl.ra.** — Nodosités arrondies ou fusiformes.  
**Heterodera radiculicola** GREEFF  
C. Müller, 1883, p. 8-9, 17-23, pl. I, 1-2, ⊕.

439

A.



**Heliconia pulverulenta** LINDL.

Pl.ra. — Nodosités. . . . . **Heterodera radicolica** GREEFF 410  
 C. Müller, 1883<sup>b</sup>, p. 13-14; Frauk, 1896, p. 22. A.

## FAMILLE DES ORCHIDÉACÉES

Cattleya 442-453, Dendrobium 457, Disa 441, Laelia 454-456,  
 Odontoglossum 458.

Les Zoocécidies des Orchidées offrent un très grand intérêt pratique, en raison de la valeur parfois énorme de ces plantes d'ornement. Deux d'entre elles produites par *Isosoma orchidearum* et *Cecidomyia cattleyæ* sont particulièrement dangereuses : leur apparition dans les serres nécessite une désinfection totale et souvent des sacrifices énormes de la part des Horticulteurs. L'introduction des insectes en Europe s'est effectuée par l'Angleterre.

Nous signalons ici la plupart des galles observées en Angleterre, sur des échantillons importés en général du Brésil, parce qu'il est assez probable que les maladies se répandront dans les serres d'Europe.

Nous renvoyons pour les détails historiques concernant les galles de l'*Isosoma orchidearum* aux travaux de Westwood, parus presque tous dans le *Gardner Chronicle*, en particulier aux deux suivants : 1869 (p. 1230, fig., ⊕), 1882<sup>a</sup> (p. 322-325, pl. XIII, ⊕), et aux mémoires très documentés de Decaux (1897, p. 233-237, 7 fig.) et de Del Guercio (1897, p. 192-196, pl. VII, 6-14, ⊕).

Les points les plus importants relatifs à la biologie du producteur des galles des racines sont contenus dans les articles de Westwood (1885, p. 84, fig. 19, ⊕) et de Molliard (1902<sup>b</sup>, p. 165-170, pl. II, ⊕).

Les genres *Disa* et *Odontoglossum* seuls présentent des Tylenchocécidies rappelant celles qui ont été signalées pour les familles précédentes de Monocotylédones.

**Disa grandiflora** L.

Acre. — Base des feuilles blanchâtre et transparente.

**Tylenchus** [devastatrix KÜHN] 441

Smith, 1881, p. 824.

I-B.



**Cattleya** sp.

Plrc. — Tige à surface inégale présentant des renflements distincts et des taches irrégulières de nécrose, percées d'ouvertures circulaires ou ovalaires donnant accès dans des cavités de forme très variable. La base des feuilles et, plus souvent, des gaines florales, présente des régions épaissies et est toute bosselée ; sur les autres parties des feuilles et des gaines on trouve des cécidies isolées formant une saillie arrondie. Les bourgeons attaqués sont raccourcis et épaissis jusqu'à devenir globuleux.

**Isosoma orchidearum** WESTW. 442

Del Guercio, 1897, p. 192-196, pl. VII, 6-14. ⊕.

**Cattleya Sanderiana** HORT.

Pl.ra. — Renflements arrondis très apparents pouvant atteindre la taille d'un pois, situés près de l'extrémité des racines aériennes, en général uniloculaires. M.C. **Cecidomyia cattleyæ** MOLL. 443  
Molliard, 1902<sup>b</sup>, p. 165-170, pl. II, ⊕.

F.

**Cattleya Mendeli** HORT.

Pl.ra. — Renflements. Voir n° 443. . . **Cecidomyia cattleyæ** MOLL. 444  
Molliard, 1902<sup>b</sup>, p. 165.

F.

**Cattleya Warneri** MOORE

Pl.ra. — Renflements. Voir n° 443. . . **Cecidomyia cattleyæ** MOLL. 445  
Molliard, 1902<sup>b</sup>, p. 165.

F.

**Cattleya labiata** LINDL.

Plrc. — Renflements. Voir n° 442. . . **Isosoma orchidearum** WESTW. 446  
Decaux, 1897, p. 233 (expérimental).

F.

**Cattleya Mossiae** PARKER

Pl.ra. — Renflements. Voir n° 443. . . **Cecidomyia cattleyæ** MOLL. 447  
Molliard, 1902<sup>b</sup>, p. 165.

F.

- Plrc. — Renflements. Voir n° 442. . . *Isosoma orchidearum* WESTW. 448  
Del Guercio, 1897, p. 192-196

***Cattleya labiata-autumnalis* LINDL.**

- Plrc. — Renflements. Voir n° 442. . . *Isosoma orchidearum* WESTW. 449  
Sorauer, 1896, p. 114-116 ; Del Guercio, 1897, p. 192-196. A.

***Cattleya Trianaei* LINDEN et REICH.**

- Plrc — Renflements. Voir n° 442. . . *Isosoma orchidearum* WESTW. 450  
Fitch, 1884, p. 11-12 ; Dalla Torre, 1898, p. 349 ; Del Guercio, 1897, p. 192-196. I-B.

***Cattleya amethystoglossa* LINDEN et REICH.**

- Plrc. — Renflements. Voir n° 442. . . *Isosoma orchidearum* WESTW. 451  
Del Guercio, 1897, p. 192-196.

***Cattleya Bowringiana* VEITCH**

- Plrc. — Renflements. Voir n° 442. . . *Isosoma orchidearum* WESTW. 452  
Del Guercio, 1897, p. 192-196.

***Cattleya Gaskelliana* HORT.**

- Plrc. — Renflements. Voir n° 442. . . *Isosoma orchidearum* WESTW. 453  
Del Guercio, 1897, p. 192-196.



***Laelia purpurata* LINDL. et PAXT.**

- Pl.ra. — Renflements. Voir n° 443. . . *Cecidomyia cattleyæ* MOLL. 454  
Molliard, 1902 b, p. 165. A.

- Plrc. — Renflements. Voir n° 442. . . *Isosoma orchidearum* WESTW. 455  
Sorauer, 1896, p. 114. F.

**Laelia** sp.

Pl.rc — Renflements. Voir n° 442. . **Isosoma orchidearum** WESTW. 456  
 Decaux, 1897, p. 233. F.



**Dendrobium** sp.

Pl.ra. — Vers la pointe des radicelles, galls ayant la grosseur et la  
 forme d'un grain de blé, avec cavité ovoïde. Une larve jaune  
 orangé. **Cécidomyide** 457  
 Westwood, 1885, p.84, fig.20, ⊕; Frank, 1896, p.88. I-B.



**Odontoglossum** sp.

Pl.fe. — Sur le limbe, petites protubérances noires et arrondies. **Anguillulide** 458  
 Smith, 1886, p.41, fig.7, ⊕; Frank, 1896, p.33. I-B.

*Classe des Dicotylédones*

FAMILLE DES JUGLANDACÉES

*Juglans* 460-465, *Pterocarya* 459.


Cécidies peu variées sur les feuilles du Noyer, mais très communes; la galle des tiges se rencontre également sur le genre voisin, *Pterocarya*. Deux espèces fossiles du genre *Juglans* présentent des cécidies que l'on peut rapprocher de déformations actuellement connues.





**Pterocarya caucasica MEYER**


Pl. ti. — Minimes bosselettes. . . . [Lestes viridis VAN DER LIND.] 459  
Rocquigny-Adanson, 1903, p. 56. F.




**Juglans regia L.**

Pl. ti. — Petites bosselettes. . . . Lestes viridis VAN DER LIND. 460  
Rocquigny Adanson, 1903, p. 56. F.

Pl. fe. — Cécidies arrondies, brunâtres, produisant à la face supérieure une saillie hémisphérique (fig. 105) de 2 mm. de diamè-



Juglans regia  
*Eriophyes tristriatus* (n° 461)  
Fig. 105 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 106 (b). — D'ap. nat.  
Fig. 107 (c). — D'ap. nat.



Juglans regia  
*Eriophyes tristriatus* var. *crinea* (n° 462)  
Fig. 108 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 109 (b). — D'ap. nat.

tre, apparaissant sur l'autre face sous la forme d'une saillie conique, quelquefois incurvée (fig. 106) ; cavité interne irrégulière (fig. 107). *Cephaloneon bifrons* BREMI.

**Eriophyes tristriatus NAL.** 461

F. Löw, 1874, p. 6, n° 3, pl. I, A, 7-8, ⊕ ; Massalongo, 1891, p. 110, n° 60, pl. III, 24, ⊕ ; Rübssaamen, 1895, p. 409, n° 22, pl. XV, 7, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. V, n° 113, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n° 331, ⊕. F.-L.

— Sur l'une des faces, qui est le plus souvent la face supérieure, saillie très marquée à surface bosselée (fig. 108) ; il lui correspond à la face opposée une dépression assez profonde (fig. 109) dont les parois sont recouvertes par de longs poils blancs, filiformes. *Erineum juglandis* SCULEICH, *Erineum juglandinum* PERS. **Eriophyes tristriatus** NAL. var. *erinea* NAL. 462

Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 72, ⊕ ; Trotter et Cerconi, 1900, fasc. I, n° 10, ⊕ ; Connold, 1901, pl. LXX, ⊕. *E-T.*

— Feuilles bruniées. . . . . **Phyllocoptes unguiculatus** NAL. 463

Schlechtendal, 1903, p. 131 ; Nalepa, 1898, p. 48, n° 7. *E-C.*

[**Juglans acuminata** BRAUN] (fossile)

Pl. fe. — Nombreuses petites galles arrondies . . . . . 464

Heyden, 1862, p. 80-81, pl. X, 4, ⊕ (*Cecid. ? dubia*) ; Trotter, 1903<sup>e</sup>, p. 14. — Il est fort probable que l'on a affaire ici à une cécidie semblable à celle que produit l'*Eriophyes tristriatus*. *E-C.*

**Juglans parsechlugiana** UNGER (fossile)

Pl. fe. — Macules arrondies. *Phyllerites parsechlugianus* ETTINGSH. **Eriophyidites** 465

Meschinelli, 1892, p. 807-808, n° 12 ; 1898, p. 106, pl. XXX, 4, ⊕ ; Trotter, 1903<sup>e</sup>, p. 17. *E-C.*

FAMILLE DES MYRICACÉES



**Myrica Faya** AITON

Pl. fe. — Partie antérieure du limbe repliée par en bas ; boursoufflures peu visibles, à contour irrégulier. [Ériophyide] 466

Tavares, 1905<sup>b</sup>, p. 224, n° 45. *m.*

**Myrica lignitum** SAPORTA (fossile)

Pl. fe. — Macules arrondies du limbe, de 1,5-4 mm. de diamètre. *Phyllerites palavo-myrica* ETTINGSH. **Eriophyidites** 467

Ettingshausen, 1888, p. 264, pl. I, 1, ⊕ ; Meschinelli, 1892, p. 807, n° 7 ; 1898, p. 106, pl. XXIX, 12, ⊕ ; Trotter, 1903<sup>e</sup>, p. 17. *A-H.*

— Taches à la surface du limbe. *Phyllerites lignitum* ETTINGSH.

Eriophyidites 468

Meschinelli, 1892, p. 807, n° 8; 1898, p. 106, pl. XXIX, 10-11, ⊕; Trotter, 1903<sup>e</sup>, p. 17.

A-H.

## FAMILLE DES SALICACÉES

*Populus* 469-566, *Salix* 567-1036.

Les deux genres *Populus* et *Salix*, de la famille des Salicacées, présentent des cécidies très nombreuses et très intéressantes.

I. *POPULUS*. — Les galles des Peupliers sont, en général, bien différentes de celles des Saules; seules les cécidies dues au *Saperda populnea*, à l'*Agromyza Schineri* et à un *Cryptocampus* affectent également les deux sortes de végétaux.

Toutes les parties aériennes des Peupliers peuvent être attaquées, sauf les organes reproducteurs sur lesquels on rencontre pourtant plusieurs mycécidies, en particulier celle du *Taphrina Johansonii* Sad.

Les galles terminales des tiges consistent en amas de feuilles produits par des Pucerons (*Pachypappa vesicalis*, *Pemphigus varsoviensis*, *Schizoneura tremulæ*) ou par un Acarien, l'*Eriophyes dispar*; elles n'ont pas encore été signalées sur le Peuplier noir.

Les bourgeons de presque toutes les espèces de Peupliers (par exemple *Populus alba*, *P. Tremula* et *P. nigra*) sont hypertrophiés et transformés en masses irrégulières, spongieuses à aspect de chou-fleur, sous l'influence de l'*Eriophyes populi*; seul le *Populus nigra* possède de magnifiques cécidies, remarquables par leur taille et leur coloris, engendrées par les *Pemphigus bursarius* et *vesicarius*.

Les renflements des tiges sont fort nombreux chez les Peupliers car presque toutes les espèces en présentent; ils sont dus pour la plupart à un Coléoptère, le *Saperda populnea*, et à un Diptère, l'*Agromyza Schineri*. Les galles engendrées par le *Gyssonoma aceriana*, Microlépidoptère de la famille des Tortricidés, existent certainement sur presque tous les Peupliers; on les a déjà signalées sur *Populus alba* et *P. nigra*. Le Peuplier blanc et le Tremble possèdent en commun les cécidies de deux diptères; *Rhabdophaga Giraudiana* et *Harmandia petioli*, cette dernière espèce provoquant aussi l'apparition de galles sur les pétioles et sur les feuilles; par contre, les renflements produits par un Tenthréinide, le *Cryptocampus populi*, ne sont connus que sur *Populus Tremula* et *Populus nigra*.

Les cécidies des feuilles des Peupliers sont les plus nombreuses et les plus intéressantes: elles siègent aussi bien sur le pétiole que sur le limbe. Les hirsuties foliaires dues à des Acariens se rencontrent chez presque toutes les espèces du genre *Populus*; leurs producteurs (*Eriophyes varius*, *Phyllocoptes populi*, etc.) sont encore mal connus et de nouvelles recherches seraient nécessaires.

*Populus alba* et *P. Tremula* présentent en commun: un léger renflement

HOVARD, Zoocécidies.

du pétiole dû à un *Nepticula*, les galles du pétiole et du limbe produites par les larves de l'*Harmandia petioli*, la si curieuse cécidie du *Lasioptera populnea* et enfin les cécidies globuleuses de l'*Harmandia tremula* et de l'*Harmandia cavernosa*. On connaît, en outre, sur *Populus Tremula*, quatre ou cinq autres cécidies, assez semblables à celle de l'*Harmandia cavernosa*, mais ayant des tailles différentes et des parois d'épaisseur variable ; leurs producteurs n'ont pas encore été obtenus et il faut s'attendre à ce que des recherches nouvelles, fort désirables, viennent réduire le nombre de ces galles, presque toutes signalées sommairement par Kieffer. Le Tremble, seul parmi tous les Peupliers, possède une cécidie fort intéressante formée aux dépens des glandes situées à la base du limbe : l'auteur est l'*Eriophyes diversipunctatus*.

Les cécidies foliaires du Peuplier noir, du Peuplier pyramidal et des espèces voisines ont un aspect spécial. Presque toutes sont dues à des Pucerons, des *Pemphigus* : *P. spirothecæ*, *protospiræ*, *populi*, *marsupialis*, etc. Leur étude a été poursuivie par Courchet (1879) et surtout par J. Lichtenstein dont nous avons rapporté les travaux principaux ainsi que les excellentes figures qui accompagnent ses mémoires de 1885 et de 1886. Jusqu'à présent la cécidie du *Pemphigus spirothecæ*, seule parmi toutes les autres, a été signalée sur le Tremble, mais cette découverte demanderait confirmation. Pour toutes ces galles, consulter surtout le travail récent de Del Guercio (1905).

Notons enfin que les enroulements de limbe dus au *Rhinocola speciosa* existent sur *Populus nigra* et sur *Populus alba*.

H. SALIX. — Les galles des Saules sont extrêmement abondantes (près de 500 numéros dans ce Catalogue), en raison du nombre considérable d'espèces de *Salix* que l'on connaît en Europe et en raison aussi du grand nombre de cécidozoaires qui ont été signalés jusqu'à présent (plus de 60). C'est ce qui nous a porté à simplifier cette partie du Catalogue en faisant précéder l'étude des cécidies propres à chaque espèce de Saule par un tableau général des déformations (Voir page 132). Ce tableau permet de saisir rapidement les caractères communs que présentent les cécidies formées aux dépens des mêmes parties des Saules et de voir que tous les organes de ces plantes peuvent porter des galles (inflorescences, bourgeons, tiges, feuilles, etc.) ; aussi n'insisterons-nous pas.

Notons seulement, au point de vue des cécidozoaires, que ce sont des Hyménoptères appartenant aux genres *Pontania* et *Cryptocampus* qui engendrent les cécidies volumineuses des tiges et des feuilles (Voir en particulier S. 28, S. 35, S. 45, S. 46 ; S. 64, S. 65, S. 66, S. 67). Nous avons adopté, pour la classification de ces espèces cécidogènes, les résultats fournis par Konow dans *Genera Insectorum, Hymenoptera, Fam. Tenthredinida* (1905) ; les synonymes que cet Auteur signale simplifient beaucoup les anciennes dénominations des cécidies, en faisant disparaître la plupart des noms adoptés jusqu'à présent, notamment pour les *Pontania*. Nous avons cependant jugé utile, devant les grandes difficultés que présente la synonymie, d'en rappeler un certain nombre.

Pour les espèces cécidogènes du genre *Cryptocampus*, nous avons utilisé, en outre, les récents travaux de Nielsen 1905, 1905<sup>b</sup>, 1906).

Plusieurs Diptéro-cécidies sont très anciennement connues et bien étudiées. Mais il reste encore nombre de points à élucider et beaucoup d'éclosions à obtenir en ce qui concerne les galles des bourgeons et des tiges.

Les cécidies caulinaires produites par des Lépidoptères (voir S. 44) ne sont, du reste, pas mieux étudiées et exigent de nouvelles recherches.

La question des Acarocécidies des Saules est encore très embrouillée, que l'on considère les petites galles céphalonéiformes des feuilles (S. 62), les bourrelets marginaux des limbes (S. 53, S. 56) ou encore les belles déformations des inflorescences (S. 1), connues en Allemagne sous le nom de « Wirrzöpfe ». Plusieurs espèces d'Acariens se rencontrant constamment et en nombre variable dans toutes ces déformations, il est fort difficile de se prononcer sur le véritable producteur, malgré les recherches patientes et les efforts louables de Nalepa dont nous signalons les principaux travaux. Comme pour les *Pontania* et les *Cryptocampus*, nous avons indiqué, en texte fin, à la suite de ces cécidies, les noms des Ériophyides considérés comme écridogènes et ceux des principaux commensaux.

Rappelons qu'il reste à préciser le rôle d'un Puceron, l'*Aphis amenticola*, que l'on trouve sur la plupart des galles dénommées « Wirrzöpfe ».

~~~~~

Populus alba L.

Ac.ti. — Par suite du raccourcissement des entre-nœuds supérieurs, il se forme des amas de feuilles à limbe boursofflé, vert pâle, garni de taches blanches; pétiole épaissi.

Pachypappa vesicalis KOCH 469

Koch 1857, p. 272; Rübssaamen, 1890, p. 41, n° 97; Schouteden, 1903, p. 182; Del Guercio, 1904, p. 306-315, fig. 4, 6. E-C, I.

— Feuilles terminales courbées et rapprochées en touffe.

Pemphigus varsoviensis MORDWILKO 470

Mordwilko, 1896; Schouteden, 1903, p. 182; 1903^b, p. 98. E. N.

Ac.bg. — Atrophie du bourgeon qui, resté petit, est légèrement déformé et ne s'ouvre pas. Une larve rouge. **Cécidomyide**

471

Kieffer, 1901^b, p. 388. E-C.

— Bourgeon hypertrophié, transformé en une production verdâtre ou rougeâtre, glabre ou velue, pouvant atteindre la grosseur du poing (fig. 110).

Eriophyes populi NAL. 472

Houard, 1901^d, p. 705, n° 45; Corti, 1904^b, p. 251-252; Tavares, 1905, p. 43, pl. XII, 20, ⊕; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIV, n° 342, ⊕. B-M, A.L.

* Commensal : *Phyllocoptes reticulatus* Nal. (Nalepa, 1898, p. 48, n° 8).

— Galle vésiculeuse, ligneuse, de la taille d'une noix. Voir n° 523.

Pemphigus bursarius L. 473

Cecconi, 1901, p. 140, n° 16. S.

- Pl. ti.** — Sur un rameau, petit renflement uniloculaire en forme de bosse. Une larve verdâtre. M.C. **Agromyza Schineri** GIRAUD 474
 Kaltbach, 1874, p. 560, n° 241; Wachtl, 1882, p. 277, n° 16; Schlechtendal, 1890, p. 35, n° 282. A-H.
- Sur une jeune tige, renflement allongé et fusiforme, de plusieurs centimètres de long; l'écorce est solidement adhérente partout. **Rhabdophaga Giraudiana** KIEFF. 475
 Giraud, 1861, p. 479-481, n° 4; Kieffer, 1901^b, p. 387. A-H.



Populus alba
Eriophyes populi (n° 472)
 Fig. 110. — D'ap. nat.

- Sur un rameau, renflement fusiforme ou arrondi, avec, dans la moelle, une chambre larvaire en forme de point d'interrogation. Grosse larve blanc jaunâtre, mesurant jusqu'à 25 mm. de longueur. M.C. **Saperda populnea** L. 476
 Rostrup, 1896, p. 9, n° 43; Eggers, 1896, p. 579; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 76, ⊕. D.A., I.F.
- Sur un rameau, renflement uni ou pluriloculaire, arrondi, portant un prolongement conique qui, à maturité, s'ouvre circulairement. Une larve orangée dans chaque loge. M.T. **Harmandia petioli** KIEFF. 477
 Kieffer, 1901^b, p. 387. A.

— Léger renflement allongé des jeunes rameaux dont la ramification est altérée (fig. 111-112). **Gyponoma aceriana** Dup. 478
 Kaltenbach, 1874, p. 553-554, n° 183; Honard, 1903, p. 363-378, fig. 344-363, ⊕. E.-O.



Fig. 111

Fig. 112

Populus alba : Influence de la cécidie du *Gyponoma aceriana* (n° 478) sur la ramification (d'ap. nat.)

Pl. fe. { Cécidie du pétiole..... A.
 { Cécidie du limbe..... B.

A. — Sur le pétiole, au voisinage immédiat du limbe, renflement peu apparent, allongé. **Nepticula turbidella** ZELL. 479
 Hieronymus, 1890, p. 260-261, n° 778; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 24, ⊕; Szépligéti, 1895, p. 216, n° 39. E.-C.

— Sur le pétiole, cécidie arrondie de 5 mm. de diamètre, généralement teinte de rouge et pubescente ; cette cécidie uni ou

pluriloculaire possède un prolongement conique qui, à maturité s'ouvre latéralement par un orifice circulaire.

Harmandia petioli KIEFF. 480

Kieffer, 1901b, p. 388.

A.

B. — Cécidie verte ou rougeâtre, à peu près aussi saillante sur l'une que sur l'autre face, et de taille plus ou moins considérable suivant qu'elle est multiloculaire ou uniloculaire ; la saillie est généralement conique à la face supérieure et hémisphérique à la face inférieure. Une galle interne. M.T.

Lasioptera populnea WACHTL 481

Wachtl, 1883, p. 477 ; 1886b, p. 308-310, pl. V, 1-3, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1907, fasc. XV, n° 411, ⊕.

E-C.

— Cécidie globuleuse. Voir n° 506. **Harmandia tremulæ** WINN. 482

F. Löw, 1877, p. 34-35, n° 6 ; Szépligéti, 1890, p. 18 ; Kertész, 1902, p. 104-105. E-C.

— Cécidie subsphérique. Voir n° 508.

Harmandia cavernosa RÜBS. 483

Kieffer, 1901b, p. 389-390.

A.

— Limbe enroulé par en haut. . . . **Rhinocola speciosa** FLOR 484

F. Löw, 1888, p. 12, n° 9 ; Schlechtendal, 1890, p. 35, n° 284 ; Rostrup, 1896, p. 10, n° 44. E-C, D.

— Limbe crispé et enroulé par en bas.

Idiocerus ustulatus M.R. 484A

Tavares, 1907b, p. 121-122.

P.

— Érinécum à la face inférieure du limbe. . . . **Ériophyide** 485

Rübsaamen, 1901, p. 123, n° 120.

A.

Populus Tremula L.

Ac.ti. — Entre-nœuds demeurés courts (fig. 113) ; les feuilles ainsi rapprochées sont plus petites, crispées, épaissies, teintées de jaune ou de rouge ; elles présentent en outre un enroulement marginal étroit (fig. 114 à 116).

Eriophyes dispar NAL. 486

Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 25, ⊕ ; Trotter et Ceconi, 1900, fasc. I, n° 20 ⊕ ; Küster, 1904, p. 60-63 ; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n° 52, ⊕.

E-C.

E-C.

— Par suite de la courbure des pétioles, les feuilles de l'extrémité de la tige, fortement réunies entre elles, forment une touffe épaisse.

Schizoneura tremulæ DE GEER 487

Kaltenbach, 1874, p. 562, n° 252 ; Corti, 1902, p. 241-242, n° 157 ; Lagerheim, 1905, p. 22.

E-T.

Ac.bg. — Galle en chou-fleur. Voir n° 472. . . * *Eriophyes populi* NAL. 488

F. Löw, 1878, p. 136, n° 14, pl. II, 1, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 81, ⊕; E-T.
Rostrup, 1896, p. 10, n° 49; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XI, n° 268, ⊕.

* Commensal : *Phyllocoptes reticulatus* Nal. (Nalepa, 1898, p. 12, n° 21).


Pl. ti. — Renflement arrondi. Voir n° 476. . . *Saperda populnea* L. 489

Pissot, 1889, p. 119-120, 5 fig., ⊕; Connold, 1901, pl. LXXI-LXXII, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VII, n° 173, ⊕; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n° 25, ⊕. E-T.

— Renflement presque sphérique. Voir n° 525.

Cryptocampus populi HARTIG 490

Kaltenbach, 1874, p. 557, n° 219; Dalla Torre, 1894, p. 277-278. A.



Populus Tremula

Eriophyes dispar (n° 486)

Fig. 113 (a). — D'ap. nat.

Fig. 114 (b). — D'ap. nat.

Fig. 115 (c). — D'ap. nat.

Fig. 116 (d). — D'ap. nat.



Populus Tremula

Nepticula argyropeza (n° 495)

Harmandia petioli (n° 493)

Fig. 117 (a). — D'ap. nat.

Fig. 118 (b). — D'ap. nat.

Fig. 119 (c). — Im. Rüks.



Populus Tremula

Harmandia petioli (n° 497)

Fig. 120 (a). — D'ap. nat.

Fig. 121 (b). — D'ap. nat.

— Renflement allongé. Voir n° 475.

Rhabdophaga Giraudiana KIEFF. 491

Kieffer, 1898, p. 159; Kertész, 1902, p. 22. E-C.

— Léger renflement en forme de bosse. Voir n° 474.

Agromyza Schineri GIRAUD 492

Wachtl, 1882, p. 277, n° 16; Trotter, 1898, p. 26, n° 38. E-C, I.

— Renflement avec prolongement conique (fig. 118-119). Voir n° 477.

Harmandia petioli KIEFF. 493

Rübsaamen, 1890, p. 258, n° 252, pl. VIII, 21e, 24, ⊕; Houard, 1903, p. 214-221, fig. 111-120, ⊕. E-T.

— Petite bossette. **Lestes viridis** VAN DER LIND.

494

Pierre, 1902, p. 185.

F.

Pl fe.	{	Cécidie du pétiole.....	A.
		Déformation des glandes situées à la base du limbe	B.
		Enroulement marginal du limbe	C.
		Cécidie sphérique du limbe, visible d'un côté seulement de la feuille	D.
		Cécidie sphérique du limbe, visible des deux côtés :	
		α. Ouverture en fente ; pas de galle interne.....	E.
		β. Ouverture circulaire ; une galle interne.	F.
Érinoïse	G.		

A. — L'extrémité supérieure du pétiole, voisine du limbe, présente un renflement allongé (fig. 117).

Nepticula argyropeza ZELL.

495

Rübsaamen, 1890, p. 251, n° 243, pl. VIII, 21 a, ⊕ ; Kieffer, 1897^c, p. 23.

A, F.

— L'extrémité inférieure du pétiole et le coussinet sur lequel il s'insère sont renflés ; la sortie a lieu par un orifice situé à la base du coussinet.

496

[**Cécidomyide**]

A.

Kieffer, 1901^b, p. 388.

— Renflement arrondi sur le pétiole ou à la base du limbe (fig. 120-121). Larve orangée. M. T. Voir n° 480.

Harmandia petioli KIEFF.

497

Rübsaamen, 1890, p. 257, n° 251, pl. VIII, 21 d, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VII, n° 172, ⊕ ; Honard, 1903^c, p. 221-223 fig. 121-125, ⊕.

E-T.

— [Pétiole déformé en spirale. Voir n° 535.

Pemphigus spirothecæ PASS.]

498

Cecconi, 1897, p. 447.

L.

B. — Les glandes situées à la base du limbe, de part et d'autre de l'extrémité du pétiole, se transforment en petites productions rouges, irrégulièrement arrondies ou mamelonnées.

Eriophyes diversipunctatus NAL.

499

Thomas, 1876, p. 270-273, pl. X, 17 20, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. V, n° 121, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n° 338, ⊕ ; Küster, 1903, p. 380-384, fig. 1, ⊕ ; Lagerheim, 1905, p. 10, n° 1.

E-T.

C. — Enroulement marginal étroit, à surface couverte de rides ; pas de pilosité anormale.

Ériophyide


500

Liebel, 1886, p. 554, n° 172 ; Hieronymus, 1890, p. 81, n° 170.

E-G.

- Enroulement marginal par en haut avec constriction; pilosité abondante sur les deux faces du limbe, et sur le pétiole.
Èriophyide 501
 Schlechtendal, 1883, p. 15, n° 13; Hieronymus, 1890, p. 81, n° 171. A.F.
- Enroulement marginal par en haut, à tours peu serrés, à surface glabre et brillante. Larves sautant. **Contarinia** 502
 Kieffer, 1897^e, p. 23, n° 2; 1901^b, p. 388. A.
- Enroulement marginal par en haut, à tours peu serrés, avec pilosité anormale abondante sur la partie enroulée. Larve blanche. M.T. **Perrisia populeti** RÜBS. 503
 Rüksaamen, 1889, p. 57-59; 1890, p. 21 (note), p. 41, n° 101, pl. III, 30; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. IX, n° 264, ⊕; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 280. E-C, F.
- Bord du limbe recourbé. **Chaitophorus leucomelas** KOCH 504
 Liebel, 1886, p. 553, n° 165; Cecconi, 1901^d, p. 269, n° 26; Trotter, 1901^d, p. 368, n° 27; Del Guercio, 1905, p. 375-385, fig. 14-15, ⊕. A, I, F.
- D. — Cécidie arrondie, de 2,5 mm. de haut sur une largeur un peu moindre, généralement colorée en rouge carmin sombre, et à parois minces (fig. 122); la cécidie, fixée à la face supérieure du limbe, s'ouvre par une fente à la face inférieure; elle n'est pas rétrécie à la base (fig. 123). Larve jaune rougeâtre. M.T. **Harmandia globuli** RÜBS. 505
 Rüksaamen, 1889, p. 49-51, n° 5; 1890, p. 257, n° 250, pl. VIII, 21 i, 22 a, b, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. I, n° 21, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 160, ⊕. E-T.
- Cécidie arrondie, de 3-4 mm. de diamètre, insérée à la face supérieure du limbe (fig. 124) et fortement étranglée dans sa partie basilaire (fig. 126); cette cécidie a des parois épaisses, généralement colorées en rouge intense, et elle s'ouvre à la face inférieure (fig. 125) par une fente entourée d'un bourrelet. Larve unique, jaunâtre. M.T. **Harmandia tremulæ** WINN. 506
 E. Löw, 1874^b, p. 160-161, pl. II, 10, ⊕; Rüksaamen, 1890, p. 256, n° 248, pl. VIII, 21c, 23, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. I, n° 22, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 161, ⊕; Kerlész, 1902, p. 104-105. E-T.
- Cécidie de même taille et de même forme que la précédente, mais à parois minces, verte ou très légèrement teintée de rouge; en outre la fente n'est pas entourée d'un bourrelet. **Cécidomyide** 507
 Rüksaamen, 1890, p. 257, n° 249, pl. VIII, 21h, ⊕. A.

E. — Cécidie subglobuleuse, un peu allongée, de 4-5 mm. de diamètre (fig. 127), verte ou rougeâtre ; le tiers seulement de la cécidie dépasse la face supérieure (fig. 128) et la paroi, très épaisse dans la région inférieure, va en s'amincissant jusqu'à




Populus Tremula

Harmandia globuli (n° 505)

Fig. 122 (a). — D'ap. nat.

Fig. 123 (b). — D'ap. nat.



Populus Tremula

Harmandia tremula (n° 506)

Fig. 124 (a). — D'ap. nat.

Fig. 125 (b). — D'ap. nat.

Fig. 126 (c). — D'ap. nat.



Populus Tremula

Harmandia cavernosa (n° 508)

Fig. 127 (a). — D'ap. nat.

Fig. 128 (b). — D'ap. nat.

L'ouverture qui est munie d'un bourrelet interne. Larve solitaire. M.T.

Harmandia cavernosa RÜBS. 308

Rübsaamen, 1890, p. 255, n° 244, pl. VIII, 21/6, 27, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. V, n° 120, ⊕.

E.T.

— Cécidie différant de la précédente par sa forme nettement arrondie (fig. 129), par son diamètre qui n'est que de 2 mm., par ses parois minces (fig. 130) et l'absence de bourrelet interne.

Cécidomyide 309

Rübsaamen, 1890, p. 255, n° 245, pl. VIII, 21/6, ⊕; 1895, p. 456, n° 78.

A, R, F.

— Cécidie arrondie de 3-4 mm. de diamètre, dont le quart supérieur dépasse seul le limbe ; elle est verte ou rougeâtre, à parois très minces et son ouverture en fente présente un bourrelet interne.

Cécidomyide 310

Kieffer, 1892 e, p. 63, n° 529.

A.

— Cécidie semblable à la précédente, mais n'ayant que 2 mm. de diamètre et dépourvue de bourrelet interne.


Cécidomyide 311

Kieffer, 1892 e, p. 63, n° 530.

A.

F. — Cécidie faisant à la face supérieure une saillie conique et à la face inférieure une saillie hémisphérique un peu moins haute (fig. 131). Voir n° 481. **Lasioptera populnea** WACHTL 312

Rübsaamen, 1890, p. 256, n° 247, pl. VIII, 21b, 26, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1905, fasc. XIII, n° 358, ⊕. *E-C, R.*



Populus Tremula
Cécidomyide (n° 509)

Fig. 129 (a). — D'ap. nat.
Fig. 130 (b). — D'ap. nat.

Populus Tremula
Lasioptera populnea (n° 512)
Diplosine (n° 513)

Fig. 131 (a). — D'ap. nat.
Fig. 132 (b). — D'ap. nat.

Populus Tremula
Phyllocoptes populi (n° 514)

Fig. 133 (a). — D'ap. nat.
Fig. 134 (b). — D'ap. nat.

— Pustules circulaires de 3 mm. de diamètre, à parois minces ; ouverture généralement épiphyllé (fig. 132). **Diplosine** 313

Rübsaamen, 1890, p. 255, n° 246, pl. VIII, 21g, 25, ⊕. *A.*

G. — A la face inférieure, et le plus souvent dans une dépression à laquelle correspond une saillie sur la face opposée (fig. 133-134), émergences d'abord blanchâtres, puis brunâtres. **Erineum populinum** PERS. ***Phyllocoptes populi** NAL. 314

Greville, 1827, pl. CCL, 2, ⊕; Rübsaamen, 1895, p. 412, n° 27, pl. XV, 3, ⊕; Trotter et Cecconi 1902, fasc. V, n° 122, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 25, ⊕. *E-T.*

* En compagnie de *Phyllocoptes agrinus* Nal. (Nalepa, 1898, p. 48, n° 9, p. 48-49, n° 10).

— Sur les deux faces du limbe, érinéum rouge sang devenant brun plus tard. **Eriophyes varius** NAL. 315

Martel, 1894, p. 7, n° 203; Lindroth, 1899, p. 12; Lagerheim, 1905, p. 10, n° 3. *E-T.*

Populus canescens SMITH

- Ac.ti.** — Feuilles de l'extrémité de la tige réunies en touffe. Voir n° 487. **Schizoneura tremulæ** DE GEER 516
Kaltenbach, 1874, p. 562 ; Schlechtendal, 1890, p. 36, n° 287. A.
- Pl.ti.** — Gros renflement. Voir n° 476. . . . **Saperda populnea** L. 517
Eggers, 1896, p. 579. A.
— Jeunes rameaux renflés (18 mm. sur 24). Voir n° 478. **Gypsonoma aceriana** DUP. 518
Gonnold, 1901, p. 102, pl. XXXVI, ⊕. I-B.
- Pl.fe.** — Voir n° 481. **Lasioptera populnea** WACHTL 519
Wachtl, 1883, p. 477 ; 1886, p. 368 ; Schlechtendal 1890, p. 36, n° 288. E-C.

Populus euphratica OLIV.

- Pl.fe.** — Sur le limbe, galles subglobuleuses de 4 mm. de diamètre, dures, uniloculaires, à parois minces, de couleur verte, disséminées sur l'une et l'autre face le long des nervures ou groupées à la base de la feuille. Une larve blanc rosé. **Cécidomyide** 520
Focke, 1894, p. 219-223, fig. 1-4, ⊕ ; 1897, p. 25-29, fig. 1-4, pl. XIV, 9, ⊕. SY.

Populus nigra L.


- Ac.bg.** — Bourgeon déformé, transformé en une galle lobulée, muriforme, blanche. **Adelges populi** DEL GUERCIO 521
Del Guercio, 1900 ; Schouteden 1903, p. 183. I.
— Sur un rameau ou sur le tronc, un bourgeon se transforme en une masse verdâtre ou rougeâtre, glabre ou velue, offrant un peu l'aspect d'un chou-fleur et pouvant atteindre la grosseur du poing. **Eriophyes populi** NAL. 522
Malpighi, 1687, p. 126, fig. 63 ⊕ ; Trotter, 1903, p. 35, n° 79 ; Tavares, 1905, p. 43, pl. XIV, 13, ⊕. E-S, P-B.
— Bourgeon déformé en une cécidie vésiculeuse de la gros-

seur d'une noisette (fig. 135), présentant à sa partie terminale une ouverture arrondie ; plusieurs cécidies sont souvent pressées étroitement les unes contre les autres.

Pemphigus bursarius L. 523

Lichtenstein 1885, pl. III, 1, ⊕ ; Massalongo, 1893, p. (52-54), n° 15, pl. IV, 5, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. V, n° 116, ⊕.

E-T.



Populus nigra
Pemphigus bursarius (n° 523)
Fig. 135. — Im. LICHT.



Populus nigra
Pemphigus vesicarius (n° 524)
Fig. 136. — Im. LICHT.

— Bourgeon transformé en une cécidie de grande taille, boursouflée, noirâtre à maturité, présentant de nombreux prolongements de forme irrégulière (fig. 136).

Pemphigus vesicarius Pass. 524

Lichtenstein, 1885, pl. IV, 1-2, ⊕ ; Massalongo, 1893, p. (57-58), n° 19, pl. VI, 4, 5, 6 a, ⊕.

E-S,
A-M.

Pl. ti. — Sur un rameau, renflement globuleux dont la cavité ovoïde, contenue dans la couche médullaire, ne renferme qu'une larve.

Cryptocampus populi HARTIG 525

Kieffer, 1901^b, p. 387.

A.

— Renflement. Voir n° 476. . . . **Saperda populnea L.** 526

Pissot, 1889, p. 119-120 ; Eggers, 1896, p. 579 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 280.

A, E-S,
P-B.

— Hypertrophies noueuses sur les rameaux de un ou deux ans.

Sciapteron tabaniforme ROTT. 527

Stefani, 1901, p. 546-549, n° 44 ; 1903, p. 103, n° 15 ; 1906, p. 140 ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVI, n° 421, ⊕.

Isi.

— Voir n° 474. **Agromyza Schineri** GIRAUD 528
 Liebel, 1886, p. 553, n° 162 ; 1892, p. 268, n° 112 ; Schlechtendal, 1895, p. 12. I.

— Cécidie bursiforme, avec ouverture linéaire, ressemblant beaucoup à celle décrite au n° 523, mais toujours située sur la tige qui est renflée à cet endroit ; elle est formée aux dépens de la couche ligneuse du rameau et elle émerge en rompant l'écorce. Surface rugueuse. Dimensions : 20 mm. sur 2,5 mm.
Pemphigus bursarius L. 529

Tavares, 1900, p. 89, n° 173 ; 1905, p. 43, pl. VII, 6, ⊕. P.
 N.B. — Il nous semble que cette cécidie n'est qu'un cas particulier de la galle des bourgeons décrite plus haut.

— Rameaux renflés. Voir n° 478. . . **Gypsonoma aceriana** DUP. 530
 Trotter, 1904^e, p. 74, n° 11. I.

Pl. fe. { Sur le pétiole ; cécidie non spiralée. A.
 { Sur le pétiole ; cécidie spiralée. B.
 { Sur la nervure médiane. C.
 { Sur le limbe. D.

A. — Épaississement piriforme de teinte verte (fig. 137), rougeâtre à la face supérieure et présentant latéralement, au foud d'une légère dépression, une ouverture arrondie.

Pemphigus piriformis LICHT. 531

Lichtenstein, 1885, pl. I, 1 5, ⊕ ; 1886, p. 29, n° 4, pl. I, 1-4, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. V, n° 117, ⊕ ; Del Guercio 1905, p. 379-382, fig. 23-27, ⊕. E-S. A-M.

— Grosse cécidie piriforme, à surface irrégulièrement sillon-
 née et mamelonnée, implantée latéralement sur un rameau et
 portant à sa base une feuille réduite à un limbe plus ou moins
 atrophié. [**Pemphigus piriformis** LICHT.] 532

Massalongo, 1892^b, p. 24, n° 20 ; 1893, p. 159, n° 30, pl. VIII, 1, ⊕. Del Guercio, 1905, p. 379-382. I.

— Cécidie allongée, haute de 10-15 mm., large de 8-10 mm.,
 insérée à l'une de ses extrémités sur le pétiole et présentant,
 à l'extrémité opposée, une ouverture arrondie.

Pemphigus bursarius L. 533

Martel, 1891, p. 31, n° 61, pl. III, 6, ⊕ ; Connold, 1901, pl. CIV, ⊕. E-T.

— Petite tuméfaction unilatérale. **Insecte** 534
 Trotter, 1905^b, p. 102, n° 18. I.

B. — Pétiole fortement hypertrophié et présentant dans la par-

tie attaquée un enroulement spiralé (fig. 138-140) à tours contigus : la cécidie ainsi formée peut atteindre 15-30 mm. de long sur 8-12 mm. de large ; elle est mûre, c'est-à-dire contient



Populus nigra
Pemphigus piriformis (n° 531)
Fig. 137. — Im. Lichr.



Populus nigra
Pemphigus spirothecæ (n° 535)
Fig. 138 (a). — D'ap. nat.
Fig. 139 (b). — D'ap. nat.
Fig. 140 (c). — D'ap. nat.

des insectes ailés dans la grande cavité interne (fig. 139), à l'automne seulement.

***Pemphigus spirothecæ* Pass.**

535

Lichtenstein, 1885, pl. III, 3-4, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 78, ⊕; Connold, 1901, pl. CV, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. V, n° 119, ⊕.

E-T.
A-N.

— Cécidie semblable à la précédente, mais arrivant à maturité dès le mois de mai ou en juin.

***Pemphigus protospiræ* Lichr.**

536

Lichtenstein, 1885, pl. III, 5-6, ⊕; Tavares, 1905, p. 44, pl. VII, 4, ⊕.

E-S.
B-M.

C. — A la base du limbe, et au voisinage immédiat du pétiole qui est généralement courbé à angle droit (fig. 141), cécidie de forme globuleuse, à surface bosselée, verte ou souvent rougeâtre, présentant à maturité une petite ouverture bilabée, allongée (fig. 142).

***Pemphigus populi* COURCHET**

537

Courchet, 1879, p. 50, 90, pl. III, 2, pl. V, 2, pl. VI, 1, 5, ⊕; Lichtenstein, 1885, pl. IV, 3-4, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. V, n° 118, ⊕; Del Guercio, 1905, p. 383, fig. 29, 31, ⊕.

E-S.
A-M.

— La nervure médiane, épaissie et pliée en gousse (fig. 143) parallèlement à sa longueur, forme une cécidie saillante à la

face supérieure (fig. 145), qui s'ouvre en fente sur l'autre face (fig. 144) et mesure 15-20 mm. de long sur 7-10 mm. de large.

Pemphigus marsupialis COURCHET

538

Lichtenstein, 1885, pl. II, 1-3, ⊕ ; Courchet, 1879, p. 53, 91, pl. III, 4, pl. V, 3, pl. VI, 2-7, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 79, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 44, pl. VII, 22, ⊕ ; Del Guercio, 1905, p. 382-383, fig. 28, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIV, n° 343, ⊕.

E-T.


— Cécidie semblable à la précédente, mais sans fente linéaire en dessous, les deux moitiés du limbe ne restant pas dans le même plan que la galle et recouvrant la fente.

Pachypappa marsupialis KOCH

539

Kieffer, 1901^b, p. 390-391; Schouteden, 1903, p. 183.

A.



Populus nigra
Pemphigus populi (n° 537)
Fig. 141 (a). — D'ap. nat.
Fig. 142 (b). — D'ap. nat.

Populus nigra
Pemphigus marsupialis (n° 538)
Fig. 143 (a). — D'ap. nat.
Fig. 144 (b). — D'ap. nat.
Fig. 145 (c). — D'ap. nat.

Populus nigra
Pemphigus affinis (n° 541)
Fig. 146. — D'ap. nat.

D. — Soulèvement allongé du limbe vers la face supérieure, vert jaunâtre, à surface irrégulière et sinueuse ; ostiole à la face opposée.

Pemphigus

540

Trotter, 1905^b, p. 101-102, n° 17 ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIV, n° 344, ⊕.

I.

— Sous l'influence des pucerons qui vivent à la face inférieure du limbe, les deux moitiés de la feuille se recourbent en arrière, s'accolent par leurs bords, se couvrent de petites boursofflures et se teintent de jaune et de rouge (fig. 146). Par-

fois il n'y a qu'une partie du bord du limbe qui est repliée
(10-12 mm. de long sur 3 mm.). **Pemphigus affinis** KALT. 541

Chaitophorus leucomelas KOCH 541A

Lichtenstein, 1885, pl. II, 4-5, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 77, ⊕; Tavares, 1905, E-T.
p. 44-45, pl. VII, 2, 10, ⊕; Del Guercio, 1905, p. 375-385, fig. 14-23, ⊕.

— Feuilles enroulées par en haut sous l'influence des larves
qui vivent à la face supérieure. **Rhinocola speciosa** FLOR 542

F. Löw, 1888, p. 12, n° 9; Massalongo, 1899^b, p. 144-145, n° 68; Trotter et Cecconi, 1907, E-C,
fasc. XVII, n° 422, ⊕. F.I.

— Dans un enfoncement de la face inférieure, émergences
parenchymateuses verdâtres, longues de 1 mm. environ et à
sommet irrégulièrement dilaté. **Erineum populinum** PERS.

Ériophyide 543

Hieronymus, 1890, p. 80, n° 168; Massalongo, 1891, p. 115, n° 75; Houard, 1902^a, p. 93, n° 23. E-C, E-S.

Populus pyramidalis ROZIER

(**P. dilatata** AITON, **fastigiata** POIR., **italica** DUROI)

Ac.bg. — Voir n° 522. **Eriophyes populi** NAL. 544

Thomas, 1869, p. 352-353, n° 29; P. Marchal, 1897^b, p. 23, 2^e. E-T, AL.

— Voir n° 523. **Pemphigus bursarius** L. 545

Hieronymus, 1890, p. 115, n° 345; Martel, 1891, p. 31, n° 61; Grevillius et Niessen, 1907, E-T.
fasc. II, n° 39, ⊕.

Pl. ti. — Voir n° 476. **Saperda populnea** L. 546

Pissot, 1889, p. 119-120; Eggers, 1896, p. 579. F, A.

Pl. fe. { Sur le pétiole; cécidie non spiralée. A.
Sur le pétiole; cécidie spiralée. B.
Sur la nervure médiane. C.
Sur le limbe. D.

A. — Voir n° 531. **Pemphigus piriformis** LIGHT. 547

Trotter, 1898, p. 32, n° 58; Baldrati, 1900, p. 34, n° 66. E-S.

— Voir n° 533. **Pemphigus bursarius** L. 548

Hieronymus, 1890, p. 115, n° 345; Rostrup, 1896, p. 10, n° 46. Baldrati, 1900, p. 33, n° 63. E-T.

B. — Voir n° 535. **Pemphigus spirothecæ** PASS. 549

Hieronymus, 1890, p. 115, n° 346; Trotter, 1898, p. 32, n° 59; Lagerheim, 1905, p. 22, n° 1. E-T.

HOUARD, *Zoocécidies*.

- Voir n° 536. **Pemphigus protospiræ** LIGHT. 550
Lichtenstein, 1886; Schlechtendal, 1895, p. 11; Kieffer, 1901^b, p. 391. E-S.
- C. — Voir n° 537. **Pemphigus populi** COURCHET 551
Baldrati, 1900, p. 34, n° 65. A, F, I.
- Voir n° 538. **Pemphigus marsupialis** COURCHET 552
Martel, 1894, p. 7, n° 200; Lagerheim, 1905, p. 22, n° 2; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n° 14, ⊕. E-T.
- Voir n° 539. **Pachypappa marsupialis** KOCH 553
Rübsaamen, 1890, p. 40, n° 96; Kieffer, 1901^b, p. 390-391. E-T.
- D. — Voir n° 541. **Pemphigus affinis** KALT. 554
Baldrati, 1900, p. 33, n° 62; Lagerheim, 1905, p. 22, n° 3; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 38, ⊕. E-T.
- Voir n° 542. **Rhinocola speciosa** FLOR 555
F. Löw, 1888, p. 12, n° 9; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 281. E-C, F.

Populus virginiana DESF.

- Pl. ti. — Petites bosselettes. **Lestes viridis** VAN DER LIND. 556
Pierre, 1902, p. 185. F.
- Gros renflement. Voir n° 476. **Saperda populnea** L. 557
Pissot, 1889, p. 119-120. F.

Populus ontariensis DESF.

- Pl. ti. — Gros renflement. Voir n° 476. **Saperda populnea** L. 558
Eggers, 1896, p. 579. A.

Populus canadensis MICHX.

- Pl. ti. — Gros renflement. Voir n° 476. **Saperda populnea** L. 559
Eggers, 1896, p. 579; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 50, ⊕. A.

Populus balsamifera L. (**P. suaveolens** FISCH.)

Ac. bg. — Sur le tronc, cécidie bursiforme de 10-15 mm. de long, pen-

dante, avec orifice situé à l'opposé du point d'attache, glabre ou présentant quelques poils au bord de l'ouverture ; cette cécidie est insérée à la base d'un jeune rameau ou d'un pétiole.

[**Pemphigus**] 560

Rübsaamen, 1899, p. 245, n° 49, pl. I, 8, ⊕.

R.

— Cécidie bursiforme, insérée perpendiculairement au rameau, avec orifice à l'opposé du point d'insertion, et présentant à mi-hauteur une zone rétrécie ; sur toute la surface, poils courts, raides, plus nombreux au voisinage de l'ouverture.

[**Pemphigus**] 561

Rübsaamen, 1899, p. 245, n° 49, pl. I, 9, ⊕.

R.

Pl. ti. — Gros renflement. Voir n° 476. . . . **Saperda populnea** L. 562

Eggers, 1896, p. 579.

A.

Pl. fe. — Pétiole enroulé en spirale. Voir n° 535.

Pemphigus spirothecæ PASS. 563

Rostrup, 1896, p. 10, n° 45.

D.

Populus heterophylla L.

Pl. ti. — Gros renflement. Voir n° 476. . . . **Saperda populnea** L. 564

Eggers, 1896, p. 579.

A.

Populus latior A. BRAUN (fossile)

Pl. fe. -- Amas de poils sur le limbe. . . . **Eriophyidites** 565

Meschinelli, 1892, p. 781-782, n° 8 ; Trotter, 1903^e, p. 18.

E-C.

Populus sp. (fossile)

Pl. fe. — Galles arrondies sur les nervures. . . . **Cécidomyide** 566

Heer, 1865, p. 395, fig. 322 (*Cecid. ? Bremii*) ; Bergenstamm et Löw, 1876, p. 98, n° 606 ;

Trotter, 1903^e, p. 14.

E-C.



Salix

Ac. fl. voir p.132		Pl. ti. voir p.138
Ac. ti. voir p.133		Pl. fe. voir p.141
Ac. bg. voir p.136		

Ac. fl. — Déformation des chatons, avec hypertrophie des organes reproducteurs, qui tombent plus tard. Les bractées florales sont agrandies ; à leur aisselle se développent des bourgeons anormaux, donnant naissance à des rameaux dont les entrenœuds restent courts et qui portent des feuilles très petites, ressemblant à des bractées. La cécidie ainsi formée aux dépens d'un chaton (fig. 147) a une taille qui varie de la grosseur d'une noix à celle du poing et au-delà ; plusieurs chatons voisins peuvent être attaqués et former par leur réunion une masse qui atteint 15-20 centimètres de diamètre. *Wirrzopf, Heerenbesen, Donnerbesen.* * **Ériophyide** S.1

* Les espèces d'Ériophyides que l'on rencontre le plus souvent sont : *Eriophyes triradiatus* Nal., *Eriophyes salicis* Nal., *Phyllocoptes parvus* Nal., *Ph. magnirostris* Nal., *Ph. phytoptoides* Nal., *Ph. phyllocoptoides* Nal. et *Epitrimerus salicobius* Nal. (Nalepa, 1898, p. 13, nos 25, 27, p. 49, nos 11-13, p. 63, n° 7).

Salix acatifolia, alba, amygdalina, aurita, babylonica, bicolor, Caprea, elegantissima, fragilis, incana, nigra, nigricans, purpurea, purpurea × incana, Russelliana, triandra, viminalis, vitellina.

— Chlorantie des chatons avec phyllomanie et cladomanie. Puceron à cornicules non renflés. **Aphis amenticola** KALT. S.2

Salix alba, amygdalina, aurita, babylonica, Caprea, cinerea, elegantissima, fragilis, incana, nigra, nigricans, purpurea, Russelliana, viminalis.

— Les chatons ♀, ou plus rarement les chatons ♂, sont un peu épaissis et tordus (fig. 148) ; les fruits deviennent jaunes. Dans l'axe vit une larve à tête brune. * **Curculionide** S.3

* Peut-être *Dorytomus tenuatus* Fabr. dans tous les cas ?
Salix aurita, Caprea, cinerea.

— Axe d'un chaton renflé et raccourci. . . . **Lépidoptère** S.4
Salix Caprea.

— Chatons ♂ déformés ; les filets des étamines et les écailles sont épaissis et portent une épaisse pilosité laineuse blanche (fig. 149 a). Grandes grégaires. M.C.I.

Rhabdophaga heterobia H. Löw S.5

Salix amygdalina, purpurea, triandra.


— Ovaire gonflé, déformé et durci ; les carpelles demeurent courts et sont élargis à la base, où ils peuvent atteindre 3,5 mm. de diamètre, très épaissis, de couleur jaunâtre ou rougeâtre pâle. Cette déformation ne se produit, en général, que sur une partie du chaton, et les ovaires attaqués sont accolés les uns aux autres.

Cécidomyide S.6

Salix purpurea, reticulata.



Salix. — S. 1
Eriophyide
Fig. 147. — D'ap. nat.



Salix. — S. 3
Dorytomus tenuatus
Fig. 148. — Cliché MOLL.



Salix. — S. 5, S. 10
Rhabdophaga heterobia
Fig. 149 (a, b). — Im. KIEFF.

- Ac. ti. { Amas de petits rameaux couverts de feuilles anormales..... A.
Cécidie en forme de rosette non velue ou en cône de pin..... B.
Cécidie en forme de rosette anormalement velue..... C.
Cécidie en forme de bouquet de feuilles dressées..... D.
Cécidie en forme de massue..... E.

A. — Sur les pousses de l'année, tous les entre-nœuds demeurent courts ; les feuilles ainsi rapprochées sont plus ou moins déformées, et il se produit à l'aisselle de chacune d'elles des bourgeons anormaux qui donnent naissance à des rameaux très courts portant des feuilles bractéiformes. La cécidie ainsi formée peut dépasser la taille du poing (Voir S. 1). **Eriophyide**

S.7

Salix alba, amygdalina, aurita, babytonica, bicolor. Caprea, elegantissima, fragilis, incana, nigra, nigricans, purpurea, Russelliana, viminalis.


B. — Les entre-nœuds terminaux subissant un arrêt de développement, les feuilles ainsi rapprochées demeurent courtes et s'éta-
lent plus ou moins en une rosette (fig. 150); au centre vit une
larve rouge pâle abritée par un faisceau de feuilles linéaires
dressées. Parfois toutes les feuilles entrant dans la constitution
de la cécidie demeurent dressées et la galle prend alors un
aspect strobiliforme (fig. 151). M.C.II.

Rhabdophaga rosaria H. Löw S.8

Salix alba, amygdalina, aurita, babylonica, Caprea, cinerea, depressa, fragilis var.
decipiens, grandifolia, hastata, helix, incana, nigricans, pedicellata, purpurea, repens,
rubra, silesiaca, triandra.

— Petite rosette de 3-5 mm. de diamètre seulement, située à
l'aisselle d'une feuille (fig. 155). **Rhabdophaga rosariella** KIEFF. S.9

Salix aurita, cinerea.




Salix. — S. 8
Rhabdophaga rosaria

Fig. 150 (a). — D'ap. nat.
Fig. 151 (b). — D'ap. nat.



Salix. — S. 10
Rhabdophaga heterobia

Fig. 152. -- D'ap. nat.



Salix. — S. 14, S. 15, S. 9
Perrisia terminalis
Rhabdophaga clavifera
Rhabdophaga rosariella
Fig. 153 (a). — Im. KIEFF.
Fig. 154 (b). — Im. KIEFF.
Fig. 155 (c). — Im. KIEFF.

C. — Les feuilles terminales, rapprochées par suite de l'arrêt de
développement des entre-nœuds qui les séparent, forment une
sorte de rosette à texture lâche (fig. 149 b, 152) et présentent

une pilosité plus ou moins longue, laineuse, blanche, peu abondante. Larves grégaires. M.C.I.

Rhabdophaga heterobia H. Löw S.10

Salix aurita, amygdalina, Caprea, fragilis, purpurea, repens, triandra.

— Cécidie ovoïde ou arrondie, de la grosseur d'une noisette, formée par la réunion en un amas serré des feuilles terminales, couvertes d'une abondante pilosité anormale. Larves grégaires de couleur rouge orangé. M.T. **Perrisia iteobia** KIEFF. S.11

Salix Caprea, cinerea.

— Les entre-nœuds terminaux demeurant courts, les feuilles terminales, élargies, sont rapprochées ; à l'aisselle de chacune d'elles, naît une agglomération de feuilles anormales qui constituent avec les premières une cécidie ressemblant à un gros bourgeon ; toutes ces feuilles montrent une pilosité anormale.

Eriophyes gemmarum NAL. S.12

Salix aurita, herbacea.

— Déformation de l'extrémité des rameaux en forme de rosette.

Ériophyide S.13

Salix aurita, glauca, nigricans × *Caprea, phyllicifolia, repens* var. *rosmarinifolia.*

D. — A l'extrémité des rameaux, les feuilles sont rapprochées par suite de l'arrêt de développement des entre-nœuds (fig. 153) ; elles demeurent dressées, enroulées les unes sur les autres, épaissies et plus ou moins déformées. La cavité fusiforme ainsi constituée se dessèche après la sortie de la larve ou de l'insecte. M.T. ou M.C.I. Larves grégaires rougeâtres.

Perrisia terminalis H. Löw S.14

Salix alba, amygdalina, fragilis, hastata, pentandra, purpurea, repens, viridis, vitellina.

E. — L'extrémité d'un rameau, dont les entre-nœuds supérieurs sont demeurés courts, se renfle en une massue dont la longueur varie de 8 à 15 mm. (fig. 154) ; les bourgeons insérés sur cette massue sont déformés, couverts comme la tige elle-même d'une pilosité blanche anormale, et renferment chacun une large rougeâtre. M.C.II.

Rhabdophaga clavifex KIEFF. S.15

Salix aurita, Caprea, cinerea, viridis.

— Les entre-nœuds terminaux demeurent courts ; les bour-

geons portés par la partie déformée sont un peu épaissis, restent fermés et s'insèrent sur un coussinet renflé. **Cécidomyide** S.16

Salix alba, Caprea, lapponum, purpurea.

- Ac. bg. { Cécidie déformant à la fois le bourgeon et l'extrémité de la tige. A.
 { Cécidie déformant, outre le bourgeon, le coussinet ou la base du pétiole. B.
 { Cécidie déformant le bourgeon seulement. C.

A. — Entre-nœuds raccourcis. Voir S.15 : *Rhabdophaga clavifex*.
 — Entre-nœuds raccourcis. Voir S.16 : *Cécidomyide*.
 — Plusieurs bourgeons, fermés et épaissis, sont réunis sur la partie terminale de la tige, qui est faiblement épaissie. Dans chaque bourgeon vit une larve rouge. **Cécidomyide** S.16'
Salix repens.

B. — Bourgeon épaissi, en partie entouré par la base renflée du pétiole. M.T.H. **Cryptocampus lætus** ZADD. S.17

Salix viminalis.

— Le coussinet est faiblement épaissi ; le bourgeon, demeuré court, est aplati et ressemble à une écaille arrondie, très épaisse, de couleur terne. Une larve jaune pâle. **Cécidomyide** S.18

Salix aurita.

— Coussinet fortement épaissi (fig. 156) ; le bourgeon reste plus petit que le bourgeon normal ; le plus souvent la tige présente une dépression triangulaire, longue de 4-5 mm., dont la base se trouve au point d'insertion du bourgeon et dont la pointe est tournée vers l'extrémité du rameau. Une larve rouge pâle ; éclosion se faisant par le bourgeon. M.C.H. Nymphes inermes. **Rhabdophaga pulvini** KIEFF. S.19

Salix alba, aurita, Caprea, cinerea, purpurea, triandra.

— Cécidie identique à la précédente, mais l'éclosion a lieu par la base du coussinet. **Rhabdophaga insignis** KIEFF. S.20

Rhabdophaga perforans KIEFF. S.21

S. 20 : *Salix purpurea* ; S. 21 : *Salix* sp.

— Sur le coussinet, fortement hypertrophié, s'implante un bourgeon de forme conique allongée, trois fois aussi gros que le bourgeon normal (fig. 157). **Rhabdophaga** S.22


Salix aurita.

C. — Le bourgeon, fortement gonflé, demeure fermé et finit par se dessécher. Une seule larve (fausse chenille). M.T.II.

(Fig.158-160). . . . * **Cryptocampus saliceti** FALL. S.23
Cryptocampus ater JURINE S.24

*Synonymes : *Cryptocampus saliceti* Fall. = *C. gemmarum* Zadd. ; *Cryptocampus ater* Jurine = *C. angustus* Hartig = *Euura nigritarsis* Cameron (KONOW, 1905, p. 51, nos 2, 13).

S. 23 : *Salix amygdalina* × *purpurea*, *aurita*, *cinerea*, *daphnoides*, *viminalis*.
 S. 24 : *Salix Caprea*, *cinerea*, *fragilis*.



Salix. — S.19 : *Rhabdophaga pulvini*. Fig.156 (a)..... IM. KIEFF.
 Salix. — S.22 : *Rhabdophaga*. Fig.157 (b)..... IM. KIEFF.
 Salix. — S.23 : *Cryptocampus saliceti*. Fig.158-160 (c, d, e).... IM. NIELSEN

— Le bourgeon, faiblement grossi, renferme une larve jaune sombre. **Rhabdophaga gemmicola** KIEFF. S.25

Salix aurita, *Caprea*, *cinerea*.

— Le bourgeon prend une forme cylindrique ; les feuilles qui le composent sont transformées en écailles longues et grêles. La larve vit à la partie supérieure du bourgeon ainsi déformé.

Rhabdophaga superna KIEFF. S.26

Salix aurita, *Caprea*, *cinerea*.

— Le bourgeon demeuré fermé, s'épaissit à la base et se termine en pointe ; il est couvert d'un feutrage blanc. Larve blanche située dans une cavité basilaire. **Cécidomyide** S.27

Salix aurita, *repens*.

— Bourgeon transformé en une petite rosette de feuilles de 3-5 mm. de diamètre (fig.155). Voir S. 9 : *Rhabdophaga rosariella*.

Pl. ti. { Cécidie unilatérale, en forme de bosse ou de verrue A.
 { Cécidie embrassant tout le pourtour du rameau. } Épaississement faible. B.
 { } Épaississement très marqué. C.

A. — Renflement long de 8-20 mm. (fig.161-162), avec cavité interne spacieuse, creusée dans la couche ligneuse et renfermant une fausse chenille dont la tête brune, bien distincte du reste du corps, porte deux yeux noirs ; cette larve s'enveloppe plus tard d'un cocon brun. M.C.H. **Cryptocampus ater** JURINE S.28

Salix alba, amygdalina, aurita, Caprea, cinerea, purpurea, viminalis, vitellina.

— Renflement de 5-10 mm. de long, à cavité interne très petite, située dans le tissu ligneux, sous l'écorce, et contenant une larve blanc verdâtre, longue de 2-2.5 mm., sans tête distincte. M.C. **Agromyza Schineri** GIRAUD S.29

Salix aurita, babylonica, Caprea, cinerea, purpurea, vitellina.

— Cécidie dure, pouvant atteindre la grosseur d'une noisette, de forme ovoïde irrégulière ; elle est formée aux dépens de la couche ligneuse et contient une fausse chenille blanchâtre. Des galles pluriloculaires peuvent résulter de la fusion de plusieurs cécidies semblables dont l'ensemble atteint parfois la taille d'une noix. Loges larvaires dans la moelle. M.C.H. *** Cryptocampus medullarius** HARTIG S.30

* Synonymes : *Nematus amerinae* Dahlbom, *N. pentandra* Thoms., *Euura gallae* Newman, *Cryptocampus mucronatus* Vollenh. (Konow, 1905, p.51, n°6).

Salix alba, amygdalina, aurita, Caprea, cinerea, fragilis, pentandra, purpurea, repens, viminalis.

— Renflement rappelant la cécidie précédente. **Pontania collactanea** FÖRSTER S.31

Salix cuspidata, repens.

— Petit renflement unilatéral des jeunes rameaux (fig.163), le plus souvent uniloculaire. Larve orangée, solitaire, perforant la paroi en automne. M.C.H. **Rhabdophaga albipennis** WINN. S.32

Salix alba, cinerea.

— Minime bosselette. . . . **Lestes viridis** VAN DER LIND. S.33


Salix alba, aurita, babylonica, Caprea, cinerea, purpurea, viminalis, vitellina.

B. — Sur les rameaux de l'année, renflement fusiforme ou cylin-

drique (fig. 164-165), de 5-20 mm. de long sur 3 mm. d'épaisseur; au centre du renflement, une cavité allongée contient une larve jaune citron sombre. M.C.H.

Rhabdophaga Karschi KIEFF. S.34

Salix aurita, cinerea.



Salix. — S. 28 : *Cryptocampus ater*. Fig. 161, 162 (a, b). . . . Im. NIELSEN.

Salix. — S. 32 : *Rhabdophaga albipennis*. Fig. 163 (c). . . . D'ap. nat.

Salix. — S. 34 : *Rhabdophaga Karschi*. Fig. 164, 165 (d, e). . . Im. KIEFF. et d'ap. nat.

Salix. — S. 35 : *Grapholitha Servilleana*. Fig. 166, 167 (f, g). . . D'ap. nat.

— Sur les rameaux plus âgés, renflement fusiforme de 10-20 mm. de long sur 5-8 mm. de diamètre (fig. 166-167), avec une cavité centrale allongée où vit une chenille. M.C.H.

Grapholitha Servilleana DUP. S.35

Salix aurita, Caprea, cinerea, daphnoides, incana, purpurea, repens, viminalis.

— Sur des branches plus ou moins grosses, une hypertrophie de la couche ligneuse produit un épaississement irrégulier et très léger; au centre, dans le bois, se trouve la chambre larvaire. Ces écidies sont généralement en grand nombre sur une même branche qui présente, après l'éclosion, de nombreux trous de sortie; l'écorce de la branche se fendille et finit souvent par tomber. Larve jaune citron sombre. M.C.H.

Rhabdophaga saliciperda DUFOR S.36

Salix alba, aurita, Caprea, cinerea, fragilis, helix, nigra, purpurea, triandra, viminalis, viridis.


— Renflement peu apparent, contenant des loges larvaires disposées perpendiculairement à l'axe de la branche (fig. 168) et enfoncées dans le bois.

Rhabdophaga Pierrei KIEFF. S.37

Salix alba, aurita, Caprea, cinerea, fragilis.

— Faible épaissement. **Cryptocampus** S.38

Salix viminalis.



Salix. — S. 37 et S. 42
Rhabdophaga Pierrei
Perrisia
Fig. 168 (a). — Im. KIEFF.
Fig. 169 (b). — Im. PIERRE



Salix. — S. 40
Rhabdophaga salicis
Fig. 170. — D'ap. nat.



Salix. — S. 41
Rhabdophaga dubia
Fig. 171 (b). — D'ap. nat.

— Léger renflement muni d'une cavité larvaire, de 2,5-3 mm. de long sur 0,7-1 mm. de large, creusée dans le bois et la moelle. Quand 4 ou 5 cécidies sont fusionnées, l'ensemble de la déformation atteint environ 10 mm. Larve rouge. M.C.

Rhabdophaga Nielsenii KIEFF. S.39

Salix sp.

C. — Cécidie fusiforme ou sphérique, due à une hypertrophie de la couche ligneuse, atteignant 10 mm. de diamètre (fig. 170) et située sur les rameaux de l'année; sa surface est bosselée, sa consistance celle du liège; elle est multiloculaire et chaque cavité contient une larve rougeâtre. Nymphe possédant une dent à la base de chaque étui antennaire. M.C.II.

Rhabdophaga salicis SCHRANK S.40

Salix alba, arbuscula, aurita, aurita × *repens, canariensis, Caprea, cinerea, fragilis, hastata, helvetica, incana, Myrsinites, nigra, pentandra, purpurea, repens, retusa, salvifolia, viminalis.*

— Cécidie semblable à la précédente, mais uniloculaire.

Cécidomyide S.40'

Salix repens.

— Cécidie de tous points semblable à celle de *Rhabdophaga salicis* (S. 40), mais les cavités larvaires ne sont pas nettement séparées les unes des autres; la surface de la galle est lisse (fig. 171). Larves jaune citron. Nymphe non armée.

Rhabdophaga dubia KIEFF. S.41

Salix aurita, Caprea, cinerea, helvetica.

— Renflement ovoïde ou conique, de 5-15 mm. de long, à parois minces, facilement compressible, contenant une grande cavité où vivent des larves rouges; la surface de la cécidie, qui porte des feuilles normales (fig. 169), est tomenteuse, à fond vert ou rosé; cette galle est mûre fin mai. M.C.H.

Perrisia S.42

Salix cinerea.

— Renflement arrondi avec cavité larvaire en forme de point d'interrogation.

Saperda populnea L. S.43

Salix alba, aurita, Caprea, fragilis.

— Nodosités ou excroissances ligneuses plus ou moins arrondies; grande cavité larvaire contenant une chenille.

* **Lépidoptère** S.44

* *Grapholitha zebeana* Ratz., *Pamene splendidulana* Guenée, *Borckhausenia formosella* Fabr., parfois cités comme cécidogènes sur des Saules (Hornig, Sorhagen, 1898, p.115,116) sont fort douteux. De nouvelles observations seraient à désirer. Il en est de même pour *Sesia formicaformis* Esper (Sorhagen, 1898, p.115; G.de la Barre, 1903, p.38; Bellevoye, 1903, p.89-90).

Salix aurita, Caprea, cinerea, viminalis.

— Voir aussi S.29 : *Agromyza Schineri.*


Pl. fe.	{	Renflement du pétiole ou de la nervure médiane.	{	sans décoloration.....	A.
				avec décoloration.....	B.
	{	Déformation du bord.	{	Enroulement marginal serré.....	C.
				Enroulement marginal lâche.....	D.
				Autre déformation.....	E.
	{	Déformation du limbe.	{	Cécidie largement ouverte et pileuse.....	F.
				Cécidie présentant sur l'une des faces une très petite ouverture.....	G.
				Cécidie fermée, saillante sur les deux faces.....	H.
				Cécidie fermée, saillante sur l'une des faces seulement.	K.

- A. — Renflement pouvant atteindre 2 mm. de diamètre ; il s'étend le plus souvent sur toute la longueur du pétiole (fig. 172) et peut même empiéter sur la nervure médiane. La cavité larvaire est axiale ou un peu latérale (fig. 173). **Cryptocampus venustus** ZADD. S.45

Salix aurita, Caprea, purpurea.

- Sur le pétiole ou sur la nervure médiane, renflement fusiforme pouvant atteindre 10 mm. de long sur 3 mm. de diamètre. **Cryptocampus testaceipes** ZADD. S.46

Salix alba, amygdalina, daphnoides, fragilis, glabra, lanceolata, purpurea, triandra, viridis.



Salix. — S. 45

Cryptocampus venustus
Fig. 172 (a). — IM. NIELSEN
Fig. 173 (b). — IM. NIELSEN

Salix. — S. 47

Oligotrophus capreae var. *major*
Fig. 174, 175 (a, b). — D'ap. nat.
Fig. 176, 177 (c, d). — D'ap. nat.

- B. — Sur la nervure, renflement ligneux de forme irrégulière s'étendant aussi parfois sur la base des nervures latérales (fig. 174-175) ; il est le plus souvent coloré en rouge à la face supérieure, et en vert jaunâtre ou jaune paille à la face opposée. Le renflement contient 2-10 chambres larvaires (fig. 176-177), renfermant chacune une larve rouge. M.T.

Oligotrophus capreae WINN. var. *major* KIEFF. S.47

Salix aurita, Caprea, cinerea, incana, purpurea × *grandifolia, Schraderiana.*

— Renflement ovoïde uniloculaire, glabre, vert jaunâtre ou

jaune, souvent teinté de rouge, dur, à parois épaisses, renfermant une larve d'abord blanchâtre, plus tard rouge.

Rhabdophaga salicis SCHIRANK S.48

Salix aurita, incana.

— Renflement uniloculaire très petit, de 4 mm. de long sur 2 mm. de large, jaunâtre, renfermant une seule larve ; le limbe est souvent déformé et replié. M.C.

Rhabdophaga nervorum KIEFF. S.49

Salix aurita, Caprea, cinerea, nigra, purpurea.

— [Renflement de la nervure médiane. **Apion minimum** HERBST] S.50

Cécidie fort douteuse, à supprimer sans doute : Perris (1863, p.462) a trouvé cet *Apion* dans des galles de *Pontania* et Loisele [1903, p.(6)] l'a obtenu de galles d'*Oligotrophus capree* var. *major*. — *Salix cinerea*.

C. — Le bord est enroulé par en bas (fig. 178-179) et la partie déformée, difficile à dérouler, présente un nombre assez grand de taches jaunâtres ou rouges, au niveau desquelles le limbe est épaissi et coriace. Chacune de ces taches est produite par une larve dissimulée à l'intérieur de la partie enroulée. M.C.I.

Perrisia marginemtorquens WINN. S.51

Salix alba, aurita, Caprea, cinerea, fragilis, incana, lapponum, repens, triandra, viminalis.

— Enroulement marginal par en bas, serré, constituant une cécidie étroite, courte, amincie aux deux bouts, courbée en croissant. Une seule larve.

Perrisia Incbaldiana MIK S.52

Salix alba.

— Enroulement marginal très serré, par en haut ou par en bas (fig. 180-181) ; la partie enroulée, verdâtre, glabre, est à peine épaissie et la déformation est peu apparente. * **Ériophyide** S.53

* Les espèces que l'on rencontre le plus souvent sont : *Eriophyes truncatus* Nal., *E. tetanothrix* Nal. et *Phyllocoptes magnirostris* Nal. (Nalepa, 1898, p.13-14, nos 26, 28, p.49, nos 11 ; 1900, p.216-217).

Salix alba, alpicena, amygdalina, arbuscula, casia, cinerea, fragilis, fragilis var. *decipiens, glabra, grandifolia, hastata, hastata* × *nigricans, helvetica, herbacea, incana, lapponum, Mielichhoferi, Myrsinites, Myrsinites* var. *Jacquiniana, myrtilloides, nigra, purpurea, retusa, serpyllifolia, triandra, viminalis.*

D. — Le bord du limbe est rabattu par en bas ou montre un enroulement lâche.

* **Pontania** S.54

* Les espèces les plus fréquemment citées sont : *Pontania puella* Thoms. (Syno-


nyme : *Nematus pueti* André), *Pontania leucosticta* Hartig (Synonyme : *Nematus crassulus* Thoms.), *Pontania scolaspis* Förster et *Pontania viminalis* Hartig (Synonymes : *Nematus leucostigmus* Cameron, *nigrolineatus* Cameron, *nigratarsis* Cameron, *prassicus* Zadd., *politus* Zadd., *Bridgmani* Cameron, *purpureæ* Cameron).
Synonymie d'après Konow, 1905, p. 52, n° 26, p. 53, n° 46, p. 54, n° 52 et 60.

Salix alba, *aurita*, *babylonica*, *Caprea*, *cinerea*, *daphnoides*, *fragilis*, *glauca*, *grandifolia*, *helix*, *pentandra*, *purpurea*, *viminalis*, *vitellina*.

— Feuilles des jeunes pousses enroulées. Puceron vert à cornicules renflés. **Siphocoryne pastinacæ** L. S. 55

Salix Caprea, *cinerea*, *viminalis*.

— Voir aussi S. 56.



Salix. — S. 51
Perrisia marginentorquens
Fig. 178 (a). — D'ap. nat.
Fig. 179 (b). — D'ap. nat.

Salix. — S. 53
Ériophyide
Fig. 180 (a). — D'ap. nat.
Fig. 181 (b). — D'ap. nat.

Salix. — S. 59
Ériophyide
Fig. 182, 183 (a, b). — D'ap. nat.
Fig. 184, 185 (c, d). — D'ap. nat.

E. — Le bord épaissi et coriace forme un bourrelet ondulé ; sa surface présente de petites verrues ou de petites émergences auxquelles correspond une dépression de la face opposée. Le bord ainsi déformé peut être replié sur l'une ou l'autre face ou présenter un enroulement très lâche. **Ériophyide** S. 56

Salix alba, *Caprea*, *fragilis*, *glabra*, *nigricans*, *purpurea*, *purpurea* × *viminalis* var. *rubra*, *Russelliana*.

— Sur une étendue souvent assez considérable du bord, les dents s'allongent beaucoup et forment par leur réunion une

sorte de petit peigne qui fait saillie en dehors du contour général du limbe.

Ériophyide S.57

Salix alba, fragilis.

F. — A la face inférieure du limbe, dépression garnie de poils.

Erineum effusum KUNZE.

Ériophyes effusus CAN. S.58

Salix daphnoides.

— A la face inférieure du limbe, dépression orbiculaire ou arrondie (fig. 182-183), dont le fond présente de petits tubercules couverts de poils (fig. 184) : le limbe est épaissi ; des cécidies voisines peuvent confluer. Enfin, le bord de la feuille est souvent attaqué et déformé (fig. 185).


Ériophyide S.59

Salix aurita, pentandra, purpurea,

— Nervure médiane spiralée et limbe plié par en haut ; pilosité anormale. Larves à la face supérieure de la feuille, au voisinage de la nervure.

Cécidomyide S.60

Salix Caprea.




Salix. — S.61

Oligotrophus caprea

Fig. 186 (a). — D'ap. nat.

Fig. 187 (b). — D'ap. nat.



Salix. — S.62

Ériophyide

Fig. 188 (a). — D'ap. nat.

Fig. 189 (b). — D'ap. nat.

Fig. 190 (c). — D'ap. nat.

G. — Cécidie uniloculaire, presque sphérique, de 1-1,5 mm. de diamètre (fig. 186), faisant saillie sur les deux faces, d'abord vert

HOARD, *Zoocécidies.*

jaunâtre, plus tard jaune paille, souvent veinée de violet ou de rouge pourpre à la face supérieure ; elle présente, à la face inférieure (fig. 187), une ouverture arrondie donnant accès dans la cavité larvaire. Une larve d'abord blanche puis orangée, enfin rouge. M.T.H. **Oligotrophus capreae** WlNn. S.61

Salix aurita, *aurita* × *silesiaca*, *Caprea*, *Caprea* × *silesiaca*, *cinerea*, *cinerea* × *purpurea*, *cinerea* × *viminalis*, *daphnoides*, *grandifolia*, *hastata* × *silesiaca*, *latifolia*, *nigricans*, *oleifolia*, *reticulata*, *silesiaca*.

— Cécidie céphalonéiforme (fig. 188-190). * **Ériophyide** S.62

Les cécidies de cette section, d'ailleurs mal connues encore, varient beaucoup suivant l'espèce de Saule sur laquelle on les rencontre, et, probablement aussi, suivant l'espèce d'Ériophyide qui les produit.

On peut, d'après RÜBSAAMEN (1895, p. 417-418, n° 34, pl. XV, 12, 13, 14, 18, ⊕), les diviser en 4 groupes, selon qu'elles font saillie sur l'une des faces seulement, ou sur les deux, et que l'intérieur de la cécidie est lisse ou pré-



Salix. — S.62
Ériophyide

Fig. 191 (a). — Fig. 192 (b). — Fig. 193 (c). — Im. Rüss.

sente des excroissances qui subdivisent sa cavité en petits compartiments communiquant entre eux :

a. Cécidie saillante sur les deux faces ; cavité interne à parois lisses (fig. 191) ;

b. Cécidie saillante sur les deux faces : cavité interne subdivisée par des excroissances (fig. 192) ;

c. Cécidie saillante sur l'une des faces seulement ; cavité interne subdivisée par des excroissances (fig. 193) ;

d. Cécidie saillante sur l'une des faces seulement ; cavité interne à parois lisses.

* Les espèces d'Ériophyides que l'on rencontre le plus souvent sont : *Eriophyes tetanothrix* Nal., *E. salicis* Nal., avec *E. triradiatus* Nal. comme commensal (Nalepa, 1898, p. 13, n° 25, 26, 27 ; 1900, p. 213-215) ; mais il est difficile de savoir lequel des deux premiers Ériophyides est le véritable producteur des cécidies céphalonéiformes des Saules.


Salix acutifolia, *alba*, *amygdalina*, *arbuscula*, *aurita*, *aurita* × *myrtilloides*, *canariensis*, *Caprea*, *cinerea*, *fragilis*, *glauca*, *grandifolia*, *hastata*, *helvetica*, *herbacea*, *incana*, *Medemii*, *Myrsinites* var. *Jacquiniana*, *lanata*, *livida*, *lapponum*, *nigricans*, *nigricans* × *Caprea*, *pentandra*, *purpurea*, *repens*, *reticulata*, *retusa*, *rotundifolia*, *Russelliana*, *salviifolia*, *serpyllifolia*, *viminalis*.

H. — Cécidie faisant également saillie sur les deux faces, semblable à une grosse fève (fig. 194), de teinte vert clair ou souvent brune, occupant toute la demi largeur de la feuille entre la nervure médiane et le bord, occasionnant même parfois un élargissement du limbe à son niveau. La paroi en est mince (fig 195) et dans la cavité spacieuse vit une larve de 15 mm. de long, vert olivâtre, avec extrémités rougeâtres et taches noires au-dessus des pattes. M.T. * **Pontania vesicator** BREMI S.63

*Synonymes: *Nematus helicinus* Brischke, *N. betulinus* Brischke (Konow, 1905, p. 54, n° 59).

Salix arbuscula, daphnoides, helix, lapponum, laurina, purpurea, purpurea \times *viminalis* var. *Forbyana, retusa, vitellina*.

— Cécidie uniloculaire, allongée parallèlement à la nervure médiane, fortement saillante à la face supérieure (fig. 196) où elle apparaît comme un petit bourrelet de 2,5-3,5 mm. de large,



Salix. — S. 63

Pontania vesicator

Fig. 194 (a). — D'ap. nat.

Fig. 195 (b). — D'ap. nat.




Salix. — S. 64

Pontania femoralis

Fig. 196 (a). — D'ap. nat.

Fig. 197 (b). — D'ap. nat.



Salix. — S. 65

Pontania proxima

Fig. 198 (a). — D'ap. nat.

Fig. 199 (b). — D'ap. nat.

Fig. 200 (c). — D'ap. nat.

d'abord vert sombre, plus tard brun, à peine saillante à la face inférieure où elle est vert jaunâtre. Le plus souvent une même feuille porte deux cécidies semblables, une de chaque côté de la nervure médiane (fig. 197). Larve longue de 7 mm., jaunâtre clair avec tête brune et yeux noirâtres.

* **Pontania femoralis** CAMERON S.64

* Synonyme : *Nematus ischnocerus* Zadd. (Konow, 1905, p. 52, n° 17).

Salix arbuscula, glabra, incana, lapponum, laurina, nigricans, phylicifolia, purpurea, purpurea < *viminalis* var. *Forbyana, retusa*.

— Cécidie uniloculaire, à parois épaisses et charnues (fig. 198), saillantes sur les deux faces, mais surtout à la face inférieure (fig. 199); elle est allongée ou réniforme, peut atteindre 10 mm. de long sur 5 mm. de large, en moyenne, et sa surface, souvent mamelonnée, est verte ou teintée d'un rouge plus ou moins clair (fig. 200). La larve est verte sur le dos, un peu plus claire en dessous, avec tête brune. Cocon blanc. M.T. ou M.C.

* **Pontania proxima** LEPEL.

S. 65

* Synonymes : *Nematus gallicola* Steph., *N. Vallisnerii* Hartig, *N. herbaceae* Cameron, *N. capreae* Rudow (Konow, 1905, p. 53, n° 45).

Salix alba, amygdalina, arbuscula, aurita, babylonica, Caprea, cinerea, cuspidata, daphnoides, ferruginea, fragilis, fragilis var. *decipiens, grandifolia, helvetica, herbacea, incana, lapponum, Myrsinites, nigricans, pentandra, purpurea, repens* var. *rosmarinifolia, reticulata, retusa, silesiaca, triandra, undulata, viminalis, viridis, vitellina*.

K. — Cécidie sphérique, uniloculaire, de 7-12 mm. de diamètre, glabre, jaune, verte ou rouge (fig. 201), attachée par un point




Salix. — S. 66

Pontania salicis

Fig. 201 (a). — D'ap. nat.

Fig. 202 (b). — D'ap. nat.



Salix. — S. 67

Pontania pedunculii

Fig. 203 (a). — D'ap. nat.

Fig. 204 (b). — D'ap. nat.

seulement à la face inférieure du limbe; sa présence est révélée, à la face supérieure, par une tache jaune rougeâtre, arron-

die (fig. 202), parfois légèrement saillante. Cocon lâche, terreux.

M. T. II.

* **Pontania salicis** CHRIST S. 66

* Synonymes : *Nematus gallarum* Hartig, *N. vinivindis* Vollenhoven, *N. Vollenhoveni* Cameron (Konow, 1905, p. 53, n° 51).

Salix acutifolia, alba, amygdalina, arbuscula, aurita, babylonica, casia, cinerea, daphnoides, daphnoides × *argenteo-repens, depressa, fragilis, glabra, hastata, helix, helvetica, incana, lapponum, Myrsinites, nigricans, nigricans* × *sp.*, *pentandra, phyllifolia, puberula, purpurea, repens, reticulata, rubra, salviifolia, viminalis.*

— A la face inférieure, cécidie uniloculaire, arrondie ou de forme plus ou moins irrégulière (fig. 203), présentant une surface velue, verte, jaune ou blanchâtre, souvent veinée de rouge; sa présence est révélée à la face supérieure (fig. 204) par une tache arrondie brun jaunâtre, encadrée de rouge ou entièrement rouge. Larve unique. M. T.

* **Pontania pedunculi** HARTIG S. 67

* Synonyme : *Nematus carticornis* Cameron (Konow, 1905, p. 53, n° 38).

Nous avons réuni sous le n° S. 67 la cécidie attribuée au *Pontania bella* André (*Nematus baccarum* Cameron; Konow, 1905, p. 52, n° 7) et la cécidie du *Salix incana* qui semble avoir pour producteur le *Pontania Kriechbaumeri* Konow (Konow, 1905, p. 52, n° 24).

Salix aurita, Caprea, cinerea, glauca, incana, hastata, helvetica, pentandra.

Salix pentandra L.

- Ac. ti.** — S. 14. **Perrisia terminalis** H. Löw 567
Hieronymus, 1890, p. 170, n° 540; Trotter, 1901^f, p. 167. E-C.
- Pl. ti.** — S. 30. **Cryptocampus medullarius** HARTIG 568
Hieronymus, 1890, p. 255-256, n° 763; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 39, ⊕; Nielsen, 1905^b, p. 266-268, fig. 9, ⊕. E-C.
E-N.
- S. 40. **Rhabdophaga salicis** SCHRANK 569
Rostrup, 1896, p. 15, n° 83. D.
- Pl. fe.** — S. 54. **Pontania leucosticta** HARTIG 570
Dalla Torre, 1894, p. 234-235; Trotter, 1901^f, p. 168. E-C, E-O.
- S. 59. **Eriophyide** 571
F. Löw, 1888^c, p. 541, n° 15. N.
- S. 62. **Eriophyes tetanothrix** NAL. 572
Lindroth, 1899, p. 12-14. E-N.

- S.65. **Pontania proxima** LEPEL. 573
 Hieronymus, 1890, p. 256, n° 764 ; Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 353. E-C.
- S.66. **Pontania salicis** CHRIST 574
 Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 349. E-C.
- S.67. **Pontania pedunculi** HARTIG 575
 Frank, 1896, p. 202, n° 4. E-C.

Salix cuspidata SCHULTZ

- Pl. ti. — S.31. [**Pontania collactanea** FÖRSTER] 576
 Jörgensen, 1906^c, p. 349-350, n° 4, fig. 3, ⊕. E-V.
- Pl. fe. — S.65. **Pontania proxima** LEPEL. 577
 Rostrup, 1896, p. 14, n° 80. D.

Salix fragilis L.

- Ac. fl. — S.1. *Wirrsopf*. * **Ériophyide** 578
 Schlechtendal, 1882, p. 31, n° 25c, pl. III, 1-2, ⊕ ; Hieronymus, 1890, p. 90, n° 217. E-C.
 * *Phyllocoptes magnirostris* Nal. et *Epitrimerus salicobius* Nal. (Nalepa, 1890, p. 49, n° 11, p. 63, n° 7).
- S.2. **Aphis amenticola** KALT. 579
 Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 315 ; Kieffer, 1901^b, p. 495. E-C.
- Ac. ti. — S.7. **Ériophyide** 580
 Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 319 ; 1895, p. 13. E-C.
- S.10. **Rhabdophaga heterobia** H. LÖW 581
 Martel, 1891, p. 41, n° 96 ; 1894, p. 11, n° 220. F.
- S.14. **Perrisia terminalis** H. LÖW 582
 F. Löw, 1875, p. 28, pl. II, 2, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1906, fasc. XIV, n° 396, ⊕. E-C, E-O.
- Ac. bg. — S.24. Bourgeon grossi. **Cryptocampus ater** JURINE. 583
 Dalla Torre, 1894, p. 276 ; Kieffer, 1901^b, p. 486. E-C.
- Pl. ti. — S.30. **Cryptocampus medullarius** HARTIG 584
 Frank, 1896, p. 202, n° 6. E-C.
- S.36. **Rhabdophaga saliciperda** DUFOUR 585
 Ratzeburg, 1868 p. 320-327, pl. XLVIII, ⊕ ; Focke, 1890^c, p. 39 ; Rostrup, 1896, p. 15, n° 81. E-C, E-O, D.

- S.37. *Rhabdophaga Pierrei* KIEFF. 586
Cecconi, 1906, p. 42, n° 45. I.
- S.40. *Rhabdophaga salicis* SCHRANK 587
Rostrup, 1896, p. 15, n° 82. D.
- S.43. *Saperda populnea* L. 588
Czech, 1878, p. 433-434. E-C.
- Pl. fe.** — S.46. *Cryptocampus testaceipes* ZADD. 589
Hieronymus, 1890, p. 252, n° 755; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 83, ⊕; Loisele, 1903, p. 6. E-C-F.
- S.51. *Perrisia marginemtorquens* WINN. 590
Bremi, 1847, p. 28. E-C.
- S.53. *Ériophyide* 591
F. Löw, 1874^d, p. 503-504, n° 55; Hieronymus, Pax, etc., 1905, fasc. XIII, n° 369, ⊕. E-C.
- S.54. *Pontania puella* THOMS. 592
Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 342; Rübsaamen, 1901, p. 129, n° 205; Kieffer, 1901^b, p. 487. A.
- S.56. [*Ériophyide*] 593
Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 336. A.
- S.62. * *Eriophyes triradiatus* NAL. 594
Thomas, 1869, p. 332-333, n° 5; Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 347. E-T,
* Avec *Eriophyes tetanothrix* Nal. (Nalepa, 1898, p. 13, n° 8 26-27; 1900, p. 215, pl. V, 5-6). SY.
- S.65. *Pontania proxima* LEPEL. 595
Hieronymus, 1890, p. 253, n° 756; Hieronymus, Pax, etc., 1905, fasc. XIII, n° 368, ⊕; Töpffer, 1906, fasc. I, n° 47, ⊕. E-T.
- S.66. *Pontania salicis* CHRIST 596
Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 349; Kieffer, 1901^b, p. 488-489. E-C.

***Salix fragilis* L. var. *decipiens* KOCH**

- Ac. ti.** — S.8. Cécidie en rosette. [*Cécidomyide*] 597
Tavares, 1905, p. 95. P.
- Pl. fe.** — S.53. Bord du limbe enroulé. *Ériophyide* 598
Tavares, 1900, p. 91, n° 187; 1905, p. 94. P.
- S.65. *Pontania proxima* LEPEL. 599
Tavares, 1900, p. 21, n° 3; 1905, p. 91-92, pl. X, 16, ⊕. P.

Salix viridis FRIES (**S. fragilis** × **alba** WIMM.)

- Ac. ti. — S. 14 **Perrisia terminalis** H. LÖW 600
 Rostrup, 1896, p. 16, n° 97. D.
- S. 15. **Rhabdophaga clavifex** KIEFF. 601
 Rostrup, 1896, p. 16, n° 98. D.
- Pl. ti. — S. 36. **Rhabdophaga saliciperda** DUFOUR 602
 Rostrup, 1896, p. 17, n° 99. D.
- Pl. fe. — S. 46. [**Cryptocampus testaceipes** ZADD.] 603
 Rostrup, 1896, p. 17, n° 100; Kieffer, 1901^b, p. 487. D.
- S. 65. **Pontania proxima** LEPEL. 604
 Rostrup, 1896, p. 17, n° 101. D.

Salix Russelliana SMITH

- Ac. fl. — S. 1. *Wirrzopf*. **Ériophyide** 605
 Thomas, 1877, p. 373, n° 13; F. Löw, 1885, p. 459; Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 316. E-C.
- S. 2. **Aphis amenticola** KALT. 606
 Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 315; Kieffer, 1901^b, p. 495. E-C.
- Ac. ti. — S. 7. **Ériophyide** 607
 Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 319; 1895, p. 13. E-C.
- Pl. fe. — S. 56. **Ériophyide** 608
 Thomas, 1877, p. 373, n° 13; Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 335. E-C.
- S. 62. **Ériophyide** 609
 Thomas, 1877, p. 373, n° 13; Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 346. E-C.

Salix alba L.

- Ac. fl. — S. 1. *Wirrzopf*. * **Eriophyes triradiatus** NAL. 610
 Hieronymus, Pax, etc., fasc. IV, n° 143, ⊕; Appel, 1899, p. 49-52, fig. 7-10, ⊕; Baldrati, 1900, p. 24, n° 33, pl. II, 2, ⊕; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 33, ⊕.
 * Avec *Eriophyes salicis* Nal., *Phyllocoptes parvus* Nal., *Phyllocoptes magnirostris* Nal., *Epitrimerus salicobius* Nal. (Nalepa, 1898, p. 13, nos 25, 27, p. 49, nos 11-12, p. 63, n° 7).

- S. 2. **Aphis amenticola** KALT. 611
Kaltenbach, 1874, p. 586, n° 378; Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 315; Trotter, 1898, p. 33, n° 61 *E-C, I.*
- Ac. ti.** — S. 7. **Eriophyes triradiatus** NAL. 612
Schlechtendal, 1890, p. 33, n° 319; 1895, p. 13. *E-C.*
- S. 8. Cécidie en rosette. . . **Rhabdophaga rosaria** H. LÖW 613
Massalongo, 1893, p. (130-131), n° 93, pl. XXI, 1-2, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n° 340, ⊕. *E-T.*
- S. 14. **Perrisia terminalis** H. LÖW 614
F. Löw, 1877, p. 27; Liebel, 1883, p. 598, n° 259; Kertész, 1902, p. 51. *E-C, I.*
- S. 16. **Cécidomyide** 615
Schlechtendal, 1890, p. 39, n° 326; 1895, p. 14. *E-G.*
- Ac. bg.** — S. 19. [**Rhabdophaga pulvini** KIEFF. ?] 616
Corti, 1903, p. 93, n° 22. *I.*
- Pl. ti.** — S. 28. **Cryptocampus ater** JURINE 617
Nielsen, 1906, p. 44-47. *E-X.*
- S. 30. **Cryptocampus medullarius** HARTIG 618
Frank, 1896, p. 202, n° 6. *E-C, E-X.*
- S. 32. **Rhabdophaga albipennis** WINN. 619
Trotter, 1899, p. 304, n° 40, pl. XVIII, 14-16, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VIII, n° 188, ⊕; Corti, 1903^b, p. 370, n° 169. *E-C, I.*
- S. 33. Bosselette. **Lestes viridis** VAN DER LIND. 620
Pierre, 1902, p. 185; Lemée, 1903^b, p. 32-33. *F.*
- S. 36. **Rhabdophaga saliciperda** DUFOUR 621
Altum, 1882, p. 297-299, fig. 42, ⊕; Schlechtendal, 1895, p. 15; Rübsaamen, 1901, p. 129, n° 188; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 44, ⊕. *E-C.*
- S. 37. **Rhabdophaga Pierrei** KIEFF. 622
Pierre, 1896, p. 105-106. *F.*
- S. 40. **Rhabdophaga salicis** SCHRANK 623
Stefani, 1898^c, p. (33), n° 2. *si.*
- S. 43. **Saperda populnea** L. 624
Czech, 1878, p. 433-434. *E-C.*

Pl. fe. — S. 46.	Cryptocampus testaceipes ZADD.	625
	Schlechtendal, 1853, p. 15; Rübsaamen, 1899, p. 247 n° 55; 1901, p. 129, n° 189.	A.
— S. 51.	[Perrisia marginemtorquens WINN].	626
	Brischke, 1881, p. 175, n° 24; Kieffer, 1901 b, p. 492-493.	A.
— S. 52.	Perrisia Inehbaldiana MIK	627
	Bremi, 1847, p. 28 29, n° 31, pl. II, 33, ⊕; Inehbald et Meade, 1886 b, p. 223-225.	E, C, E-O.
— S. 53. Enroulement serré par en haut . . .	Ériophyide	628
	F. Löw, 1874 d, p. 503-504, n° 55; Cecconi, 1904 b, p. 184, n° 25.	E-T.
— S. 54. Enroulement lâche.	Pontania puella THOMS.	629
	Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 339; Dalla Torre, 1894, p. 250-251; Cecconi, 1901 c, p. 61, n° 32.	A, I.
— S. 56.	Ériophyide	630
	Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 335; Stefani, 1901 b, p. 236-237, n° 36, pl. I, 5, ⊕.	E-C, I.
— S. 57.	Ériophyide	631
	Massalongo, 1891, p. 93, n° 26, pl. III, 20, ⊕.	I.
— S. 62, forme a.	Eriophyes salicis NAL.	632
	Nalepa, 1898, p. 13, n° 25; 1900, p. 213-214, pl. V, 1-2; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VIII, n° 47, ⊕; Rübsaamen, 1895, p. 417, n° 34, pl. XV, 14, ⊕; Focken, 1896, p. 73-75, pl. IV, 7-8, ⊕; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 95, ⊕; Tavares, 1905, p. 93, pl. XIII, 27, 32, ⊕.	E-T, A-M.
— S. 65.	Pontania proxima LEPEL.	633
	Hieronymus, Pax, etc., fasc. IV, n° 142, ⊕; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 96, ⊕.	E-T.
— S. 66	Pontania salicis CHRIST	634
	Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 349; Dalla Torre, 1893 b, p. 16; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 299; Tavares, 1905, p. 91.	E-C, E-O.

Salix babylonica L.

Ac. fl. — S. 1. <i>Wirrzopf</i>	Eriophyes triradiatus NAL.	635
	F. Löw, 1881, p. 6; Hieronymus, 1890, p. 89, n° 212; Trotter, 1903, p. 226, n° 196.	E-T, A-M.
	* Avec <i>Phyllocoptes phytoloides</i> Nal. (Nalepa, 1898, p. 49, n° 13).	
— S. 2.	Aphis amenticola KALT.	636
	Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 315; Kieffer, 1901 b, p. 495.	E-C.
Ac. ti. — S. 7.	[Eriophyes triradiatus NAL.]	637
	Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 319; 1895, p. 13.	A.
— S. 8. Cécidie en rosette. . .	Rhabdophaga rosaria H. Löw.	638
	Schlechtendal, 1890, p. 39, n° 321.	A.

Pl. ti. — S. 29.	Agromyza Schineri GIRAUD	639
	Schlechtendal, 1890, p. 39, n° 328; Kieffer, 1901b, p. 489-490.	<i>E-C.</i>
— S. 33. Bosselettes.	Lestes viridis VAN DER LIND.	640
	Pierre, 1902, p. 185.	<i>F.</i>
Pl. fe. — S. 54.	Pontania	641
	Rübsaamen, 1890, p. 49, n° 179.	<i>A.</i>
— S. 65.	Pontania proxima LEPEL.	642
	Heim, 1893, p. 347-372.	<i>F.</i>
— S. 66.	Pontania salicis CHRIST	643
	Liebel, 1886, p. 567, n° 25; Rübsaamen, 1890, p. 49, n° 171; Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 349.	<i>E-C.</i>

Salix vitellina L.

Ac. fl. — S. 1. <i>Wirzopf</i>	Eriophyide	644
	Baldrati, 1900, p. 26, n° 35; Trotter, 1902, p. 125.	<i>I.E.</i>
Ac. ti. — S. 14.	Perrisia terminalis H. LÖW	645
	Baldrati, 1900, p. 62, n° 153.	<i>I.</i>
Pl. ti — S. 28.	Cryptocampus ater JURINE	646
	Inchbald, 1864, p. 47.	<i>I-B.</i>
— S. 29.	Agromyza Schineri GIRAUD	647
	Szépligéti, 1895, p. 216, n° 40; Kieffer, 1901b, p. 489-490.	<i>A-II.</i>
— S. 33.	Lestes viridis VAN DER LIND.	648
	Pierre, 1902, p. 185.	<i>F.</i>
Pl. fe. — S. 54.	Pontania leucosticta HARTIG	649
	Pontania viminalis HARTIG	650
	Dalla Torre, 1894, p. 234-235, p. 245; Kieffer, 1901b, p. 487.	<i>I-B.</i>
— S. 63.	Pontania vesicator BREM	651
	Brischke, 1881, p. 175, n° 11.	<i>A.</i>
— S. 65.	Pontania proxima LEPEL.	652
	Massalongo, 1893, p. (152), n° 117, pl. XXIV, 2, ⊕; Dalla Torre, 1894, p. 225-226.	<i>E-C, I.</i>

Salix triandra L.

Ac. fl. — S. 1. <i>Wirrzopf</i>	Eriophyide	653
Hieronymus, 1890, p. 88, n° 209; Misciattelli, 1894, p. 222, n° 33.		
— S. 5.	Rhabdophaga heterobia H. Löw	654
Brischke, 1881, p. 175, n° 26; Hieronymus, 1890, p. 161, 162, n° 510; Corti, 1903 ^b , p. 373, n° 181; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 296.		
Ac. ti. — S. 8.	Rhabdophaga rosaria H. Löw	655
Bezzi, 1899, p. 31, n° 110; Corti, 1903 ^b , p. 373, n° 183; Töpffer, 1906, fasc. 1, n° 50, ⊕.		
— S. 10.	Rhabdophaga heterobia H. Löw	656
Corti, 1903 ^b , p. 372, n° 182.		
Ac. bg. — S. 19.	Rhabdophaga pulvini KIEFF.	657
Cecconi, 1900, p. 238, n° 25.		
Pl. ti. — S. 36	Rhabdophaga saliciperda DUFUR	658
Ratzeburg, 1868, p. 321.		
Pl. fe. — S. 46.	Cryptocampus testaceipes ZADD.	659
C. Marchal et Chateau, 1905, p. 298.		
— S. 51.	Cécidomyide	660
Thomas, 1869, p. 341.		
— S. 53.	Ériophyide	661
Misciattelli, 1895, p. 20, n° 12.		
— S. 65.	Pontania proxima LEPEL.	662
Gatta, 1901, p. 387; Kieffer, 1901 ^b , p. 488.		

Salix undulata EURH.

Pl. fe. — S. 65.	Pontania proxima LEPEL.	663
Rostrup, 1896, p. 16, n° 95.		

Salix amygdalina L. (S. discolor KOCH)

Ac. fl. — S. 1. <i>Wirrzopf</i>	Ériophyide	664
Liebel, 1886, p. 568, n° 265; Schlechtendal, 1895, p. 13.		

— S. 2. **Aphis amenticola** KALT. 665
Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 315; Kieffer, 1901^b, p. 495. *E-G.*

— S. 5. **Rhabdophaga heterobia** H. LÖW 666
H. Löw, 1851, p. 374; Hieronymus, 1890, p. 161-162, n° 510; Dalla Torre, 1895, p. 155; *E-C.I.*
Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVIII, n° 435. ⊕.

Ac. ti. — S. 7. **Ériophyide** 667
Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 319; 1895, p. 13. *A.*

— S. 8. Cécidie en rosette. . . **Rhabdophaga rosaria** H. LÖW 668
Kertész, 1902, p. 24. *E-G.*

— S. 10. **Rhabdophaga heterobia** H. LÖW 669
H. Löw, 1851, p. 374-375; Hieronymus, 1890, p. 162, n° 511; Dalla Torre, 1895, p. 155. *E-C.I.*

— S. 14. **Perrisia terminalis** H. LÖW 670
Hieronymus, 1890, p. 162, n° 512; Schlechtendal, 1895, p. 13. *E-G.*

Pl. ti. — S. 28. **Cryptocampus ater** JURINE 671
Nielsen, 1905^b, p. 266-276, n° 5, fig. 10-11, ⊕; 1906, p. 44-47. *E-N.*

— S. 30. **Cryptocampus medullarius** HARTIG 672
Frank, 1896, p. 202, n° 6. *E-G.*
E-N.

Pl. fe. — S. 46. **Cryptocampus testaceipes** ZADD. 673
Dalla Torre, 1893^b, p. 17. *E-G.*

— S. 53. **Eriophyide** 674
Thomas, 1877, p. 373, n° 13; Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 337. *E-G.*

— S. 62. **Ériophyide** 675
Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 346; Kieffer, 1901^b, p. 497. *A.*

— S. 65. **Pontania proxima** LEPEL. 676
Hieronymus, 1850, p. 249, n° 743; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XV, n° 361. ⊕. *E-T.*

— S. 66. **Pontania salicis** CHRIST 677
Liebel, 1886, p. 567, n° 252; Dalla Torre, 1892, p. 152; Cecconi, 1903, p. 28. *E-C.s.*

Salix amygdalina × **purpurea**

Ac. bg. — S. 23. **Cryptocampus saliceti** FALL. 678
Nielsen, 1905, p. 383-384, fig. 3-4, ⊕; 1905^b, p. 257-264, fig. 4-6, ⊕. *E-N.*

Salix purpurea L.

Ac. fl. — S. 1. <i>Wirrzopf</i>	* Eriophyes triradiatus NAL.	679
F.Löw, 1881, p. 6; Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 316; Focke, 1892, p. 159.		<i>E-C, S.Y.</i>
* Avec <i>Phyllocoptes magnirostris</i> Nal., <i>Phylloc. parvus</i> Nal., <i>Phylloc. phyllocoptoides</i> Nal. (Nalepa, 1898, p. 13, n° 27, p. 49, n° 11, 12, 14).		
— S. 2.	Aphis amenticola KALT.	680
Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 315; Kieffer, 1901 ^b , p. 495.		<i>E-C.</i>
— S. 5. Chaton renflé.	Rhabdophaga heterobia H. LÖW]	681
Trotter, 1899, p. 306, n° 46, pl. XVIII, 11; Kieffer, 1900 ^c , pl. XXXIV, 12 a, @.		<i>E-C.</i>
— S. 6. Ovaire renflé.	Cécidomyide	682
Kieffer, 1901 ^b , p. 491.		<i>A.</i>
Ac. ti. — S. 7.	Eriophyes triradiatus NAL.	683
Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 319; 1895, p. 13.		<i>E-C.</i>
— S. 8. Cécidie strobiliforme.	Rhabdophaga rosaria H. LÖW	684
Bremi, 1847, p. 22-23, n° 19, pl. II, 23, @; Kieffer, 1900 ^c , pl. XXXIV, 11, @; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VIII, n° 189, @; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 296.		<i>E-T.</i>
— S. 10.	Rhabdophaga heterobia H. LÖW	685
Liebel, 1886, p. 568, n° 258; 1892, p. 280, n° 227.		<i>A.</i>
— S. 14.	Perrisia terminalis H. LÖW	686
Baldrati, 1900, p. 61, n° 150; Kieffer, 1901 ^b , p. 494.		<i>A, F, I.</i>
— S. 16.	Cécidomyide	687
Giraud, 1861, p. 477-479, pl. XVII, 4, @; Hieronymus, 1850, p. 170-171, n° 542; Schlechtendal, 1890, p. 39, n° 326.		<i>E-C.</i>
Ac. bg. — S. 19.	Rhabdophaga pulvini KIEFF.]	688
Giraud, 1861, p. 477; Trotter, 1899, p. 305-306, n° 44; Kieffer, 1901 ^b , p. 493.		<i>E-C.</i>
— S. 20.	Rhabdophaga insignis KIEFF.	689
Kieffer, 1906, p. 70, n° 1.		<i>I.</i>
Pl. ti. — S. 28.	Cryptocampus ater JURINE	690
Nielsen, 1906, p. 44-47.		<i>E-N.</i>
— S. 29.	Agromyza Schineri GIRAUD	691
Szépligeti, 1895, p. 216, n° 40; Cecconi, 1901 ^f , p. 1040, n° 4.		<i>A-H, S.</i>
— S. 30.	Cryptocampus medullarius HARTIG	692
Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 331; 1895, p. 15; Dalla Torre, 1895, p. 158.		<i>E-C.</i>

- S.33. Bosselettes. **Lestes viridis** VAN DER LIND. 693
Pierre, 1902, p. 185. F.
- S.35. **Grapholitha Servilleana** DUP. 694
Corti, 1901, p. 94, n° 76. I.
- S.36. **Rhabdophaga saliciperda** DUFOUR 695
Giraud, 1861, p. 479-481, n° 4; Kieffer, 1900^c, pl. XXXIV, 9, ⊕. E-C, E-O.
- S.40. **Rhabdophaga salicis** SCHRANK 696
F. L6w, 1874^b, p. 154; Altum, 1882, p. 294-297, fig. 41, ⊕; Hieronymus, 1890, p. 171, n° 543; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 168, ⊕; Kieffer, 1900^c, pl. XXXIV, 10, ⊕; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 297. E-T.
- Pl. fe. — S.45. **Cryptocampus venustus** ZADD. 697
Nielsen, 1905^b, p. 264-265, n° 2, fig. 8, ⊕. E-N.
- S.46. **Cryptocampus testaceipes** ZADD. 698
Rübsaamen, 1901, p. 130, n° 207; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 298. A, F.
- S.49. **Rhabdophaga nervorum** KIEFF. 699
Corti, 1904, p. 125, n° 100. E-C.
- S.53. **Eriophyes truncatus** NAL. 700
Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 86, ⊕; Focken, 1896, p. 96-100, pl. VI, pl. VII, 1-2, 4, ⊕; Nalepa, 1898, p. 13, n° 28; 1900, p. 216-217, pl. V, 9-10; Töpffer, 1906, fasc. I, n° 48, ⊕. E-T.
- S.54. **Pontania viminalis** HARTIG 701
Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 343; Dalla Torre, 1894, p. 254; Kieffer, 1901^b, p. 487. E-O.
- S.56. **Ériophyide** 702
Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 335. E-C.
- S.59. **Ériophyide** 703
Trotter, 1900^c, p. 201, n° 16; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XII, n° 282, ⊕. I.
- S.62. **Ériophyide** 704
Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 346. A, F.
- S.63. **Pontania vesicator** BREMI 705
Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 42, ⊕; Massalongo, 1893, p. 151-152, n° 116, pl. XI, 5-6, ⊕; 1903, p. 41-42, n° 14; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 298; Töpffer, 1906, fasc. I, n° 49, ⊕. E-C, E-I.
- S.64. **Pontania femoralis** CAMERON 706
Brischke et Zaddach, 1876, pl. III, 10, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 41, ⊕; Rudow, 1897, p. 264-265, fig. 9, ⊕; Trotter, 1904, p. 12, n° 24. E-C, I.

SALICACÉES

- S.65. **Pontania proxima** LEPEL. 707
 Cecconi, 1901^c, p. 744, n° 110. I.
- S.66. **Pontania salicis** CHRIST 708
 Hieronymus, 1890, p. 236-237, n° 765; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 40, ⊕; Rubsaamen, 1895, p. 479, n° 117; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VI, n° 139, ⊕. E-T.

Salix purpurea × **incana**

- Ac. fl. — S.1. *Wirrzopf*. **Ériophyide** 709
 Hieronymus, Pax, etc., fasc. III, n° 112, ⊕. I.

Salix purpurea × **grandifolia** WIMM.

- Pl. fe. — S.47. [*Oligotrophus capreæ* WINN. var. *major* KIEFF.] 710
 Dalla Torre, 1892, p. 156. E-C.

Salix purpurea × **viminialis** WIMM. α **rubra** HUDSON

- Pl. fe. — S.56. **Ériophyide** 711
 Hieronymus, 1890, p. 91, n° 225. E-C.

Salix purpurea × **viminialis** WIMM. β **Forbyana** SMITH.

- Pl. fe. — S.63. **Pontania vesicator** BREM 712
 Hieronymus, 1890, p. 258, n° 769; Dalla Torre, 1894, p. 269. E-C.
- S.64. **Pontania femoralis** CAMERON 713
 Hieronymus, 1890, p. 257-258, n° 768 (jardin botanique); Dalla Torre, 1894, p. 231. E-C.

Salix helix L.

- Ac. ti. — S.8. Cécidie en cône. . . . **Rhabdophaga rosaria** H.LÖW 714
 Brischke, 1881, p. 175, n° 7; Kieffer, 1901^b, p. 495. A.
- Pl. ti. — S.36. **Rhabdophaga saliciperda** DUFOUR 715
 Ratzeburg, 1868, p. 391. E-O.

Pl. fe. — S.54.	<i>Pontania viminalis</i> HARTIG	716
	Brischke, 1881, p. 175, n° 19; Dalla Torre, 1894, p. 235	<i>E-O.</i>
— S.63.	<i>Pontania vesicator</i> BREMI	717
	Brischke, 1881, p. 175, n° 11; Dalla Torre, 1894, p. 269.	<i>E-O.</i>
— S.66.	<i>Pontania salicis</i> CHRIST	718
	Brischke, 1881, p. 175, n° 13; Rudow, 1897, p. 266.	<i>A.</i>

Salix rubra HUDSON

Ac. ti. — S.8.	<i>Rhabdophaga rosaria</i> H.LÖW	719
	Kieffer, 1901 ^b , p. 488-489; Penzig, 1904.	<i>I.</i>
Pl. fe. — S.66.	<i>Pontania salicis</i> CHRIST	720
	Kieffer, 1901 ^b , p. 488-489; Penzig, 1904.	<i>I-B, I.</i>

Salix caesia VILL.

Pl. fe. — S.53. Enroulement par en bas.	Ériophyide	721
	Thomas, 1877, p. 373, n° 13; 1885, p. 14, n° 33.	<i>E-C.</i>
— S.66.	<i>Pontania salicis</i> CHRIST	722
	Dalla Torre, 1893 ^b , p. 17; Schlechtendal, 1895, p. 15.	<i>E-C.</i>

Salix daphnoides VILL.

Ac. bg. — S.23.	<i>Cryptocampus saliceti</i> FALL.	723
	Nielsen, 1905, p. 383-384, fig. 1, ⊕; 1905 ^b , p. 257-264, n° 1, fig. 1, ⊕.	<i>E-N.</i>
Pl. ti. — S.35.	<i>Grapholitha Servilleana</i> DUP.	724
	Frank, 1896, p. 252, n° 3; Kieffer, 1901 ^b , p. 485.	<i>A.</i>
Pl. fe. — S.46.	<i>Cryptocampus testaceipes</i> ZADD.	725
	Rübsaamen, 1899, p. 247, n° 59.	<i>R.</i>
— S.54.	[<i>Pontania viminalis</i> HARTIG]	726
	Rübsaamen, 1899, p. 247, n° 60.	<i>R.</i>
— S.58.	<i>Eriophyes effusus</i> CAN.	727
	Leonardi, 1894, p. 235, n° 157; Nalepa, 1898, p. 14, n° 30.	<i>E-C, I.</i>
	HOARD, <i>Zoocécidies</i> .	

— S.61.	<i>Oligotrophus capreae</i> WINN.	728
Cecconi, 1900, p. 238, n° 23.		I.
— S.63.	<i>Pontania vesicator</i> BREMI	729
Rübsaamen, 1901, p. 129, n° 202.		A.
— S.65.	<i>Pontania proxima</i> LEPEL.	730
Rübsaamen, 1899, p. 247, n° 58.		R.
— S.66.	<i>Pontania salicis</i> CHRIST	731
Hieronymus, 1890, p. 252, n° 753; Rübsaamen, 1899, p. 247, n° 61.		E-C, R.

Salix daphnoides × **argenteo-repens** BOLLE

Pl. fe. — S.66.	<i>Pontania salicis</i> CHRIST	732
Hieronymus, 1890, p. 252, n° 754; Dalla Torre, 1894, p. 270-272.		A.

Salix acutifolia L.

Ac. fl. — S.1. Chloranthie.	Ériophyide	733
Rübsaamen, 1895, p. 416, n° 33.		R.
Pl. fe. — S.62.	<i>Eriophyes tetanothrix</i> NAL.	734
Lindroth, 1899, p. 12-14.		E-N.
— S.66.	<i>Pontania salicis</i> CHRIST	735
Rübsaamen, 1895, p. 478, n° 119.		R.

Salix viminalis L.

Ac. fl. — S.1. <i>Wirrsopff</i>	Ériophyide	736
Thomas, 1877, p. 373 (hybride); Hieronymus, 1890, p. 92, n° 288.		E-C.
— S.2.	<i>Aphis amenticola</i> KALT.	737
Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 315; Kieffer, 1901 ^b , p. 495.		E-C.
Ac. ti. — S.7.	Ériophyide	738
Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 319; 1895, p. 13.		E-C.
Ac. bg. — S.17.	<i>Cryptocampus lætus</i> ZADD.	739
Brischke, 1881, p. 175, n° 9; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n° 342, ⊕; Konow, 1905, p. 51, n° 5; Jörgensen, 1906 ^c , p. 348-349, n° 2, fig. 1-2, ⊕.		F, E-C, E N.

- S.23. **Cryptocampus saliceti** FALL. 740
Nielsen, 1905, p. 383-384, fig. 2. ⊕; 1905^b, p. 257-264, fig. 2-3. ⊕. E-N.
- Pl. ti.** — S.28. **Cryptocampus ater** JURINE 741
Inchbald, 1864, p. 47. E-C.
- S.30. **Cryptocampus medullarius** HARTIG 742
Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 331; 1895, p. 15; Dalla Torre, 1894, p. 274-275. E-C.
- S.33. **Lestes viridis** VAN DER LIND. 743
Kieffer, 1901^b, p. 486-487; 1902^c, p. 497; Lemée, 1903^b, p. 32-33. F.
- S.35. **Grapholitha Servilleana** DUP. 744
Brischke, 1882, p. 191, n° 1; Rübsaamen, 1901, p. 138. A.
- S.36. **Rhabdophaga saliciperda** DUFOR 745
Ratzeburg, 1868, p. 321. E-C.
- S.38. **Cryptocampus** 746
Kieffer, 1901^b, p. 487. F.
- S.40. **Rhabdophaga salicis** SCHRANK 747
Hieronymus, 1890, p. 172, n° 548; Kieffer, 1901^b, p. 491. A.
- S.44. **Sesia formicæformis** ESPER 748
Brischke, 1881, p. 175, n° 1. A.
- Pl. fe.** — S.51. **Perrisia marginemtorquens** WINN. 749
Bremi, 1847, p. 27-28, n° 31, pl. II, 32, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. IX n° 270. ⊕; Fockeu, 1896, p. 100-106, pl. VII, 3, 5-6, ⊕; Connold, 1901, pl. LXXXI, ⊕; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n° 17, ⊕. E-T.
- S.53. **Ériophyide** 750
Rostrup, 1896, p. 16, n° 96. D.
- S.54. **Pontania viminalis** HARTIG 751
Pontania leucosticta HARTIG 752
Pontania scotaspis FÖRSTER 753
Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 344; Dalla Torre, 1894, p. 252, 234-235, 274; Jörgensen, 1906^c, p. 349, n° 3. E-T.
- S.55. [**Siphocoryne pastinacæ** L.] 753A
Tavares, 1907^b, p. 127. P.
- S.62, formes *b* et *c.* **Ériophyide** 754
Hieronymus, 1890, p. 92, n° 227; Fockeu, 1896, p. 76-79, pl. IV, 9, ⊕. E-C, F, I.
- S.65. **Pontania proxima** LEPEL. 755
Bignell, 1885, p. 152; Kieffer, 1898^e, p. 99, n° 72. I-B, F*

- S.66. **Pontania salicis** CHRIST 756
 Liebel, 1886, p. 567, n° 252 ; 1892, p. 279, n° 212 ; Kieffer, 1901^b, p. 488-489.
E-C, E-O.I.

Salix ferruginea ANDERS.

- Pl. fe. — S.65. **Pontania proxima** LEPEL. 757
 Kieffer, 1901^b, p. 488.

Salix incana SCHRANK

- Ac. fl. — S.1. *Wirzopf*. **Ériophyide** 758
 Hieronymus, 1890, p. 90, n° 221 ; Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 316. *A.*
- S.2. **Aphis amenticola** KALT. 759
 Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 315 ; Kieffer, 1901^b, p. 495. *E-C.*
- Ac. ti. — S.7. **Ériophyide** 760
 Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 319 ; 1895, p. 13. *A.*
- S.8. **Rhabdophaga rosaria** H.LÖW 761
 Dalla Torre, 1895, p. 157 ; Corti, 1901, p. (90-91), n° 73. *E-C.I.*
- Pl. ti. — S.29. **Agromyza Schineri** GIRAUD 762
 Cecconi, 1901^d, p. 272, n° 34 ; Kieffer, 1901^b, p. 489-490. *I.*
- S.35. **Grapholitha Servilleana** DUP. 763
 Trotter, 1901, p. 376, n° 47 ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XII, n° 280, ⊕. *I.*
- S.40. **Rhabdophaga salicis** SCHRANK 764
 Cecconi, 1902, p. 142, n° 55 ; Corti, 1903^b, p. 372, n° 177. *I.*
- Pl. fe. — S.47. . . . **Oligotrophus capreae** WINN. var. **major** KIEFF. 765
 Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 332 ; Kieffer, 1901^b, p. 492. *E-C.*
- S.48. [**Rhabdophaga salicis** SCHRANK] 766
 F.Löw, 1877, p. 36, n° 8, pl. I, 15, ⊕ ; Schlechtendal, 1895, p. 15. *E-C.*
- S.49. **Rhabdophaga nervorum** KIEFF. 767
 Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 332. *A.*
- S.51. **Perrisia marginemtorquens** WINN. 768
 F.Löw, 1885^c, p. 493 ; Trotter, 1901^d, p. 375-376, n° 46 ; Kertész, 1902, p. 43. *E-C.I.*

— S.53. **Ériophyide** 769
Hieronymus, 1890, p. 90, n° 220; Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 337; Dalla Torre, 1893^b, p. 18; 1895, p. 157; Trotter, 1900^c, p. 201, n° 15. *E-C, I.*

— S.62, forme *b*. **Ériophyide** 770
F. Löw, 1875^b, p. 628; Hieronymus, 1890, p. 90, n° 219; Trotter, 1902, p. 125. *E-C, E, I.*

— S.64. **Pontania femoralis** CAMERON 771
Schlechtendal, 1890, p. 41-42, n° 354; Dalla Torre, 1895, p. 157; Corti, 1903^b, p. 372, n° 179. *E-C, I.*

— S.65. **Pontania proxima** LEPEL. 772
Cecconi, 1901^a, p. 273, n° 36. *I.*

— S.66. **Pontania salicis** CHRIST 773
Hieronymus, 1890, p. 254, n° 759; Massalongo, 1893, p. (150-151), n° 115, pl. XXIV, 3, ⊕. *E-C, I.*

— S.67. **Pontania pedunculi** HARTIG 774
Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 88-88 a, ⊕; Appel, 1891, p. 644; Massalongo, 1893, p. (149-150), n° 114, pl. XI, 3-4, ⊕; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XII, n° 281, ⊕. *E-C, B-M.*

Salix oleifolia SERINGE (*aurita* × *incana* WIMM.)

Pl. fe. — S.61. **Oligotrophus capreae** WINN. 775
Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 348; 1895, p. 15; Kertész, 1902, p. 73-74. *E-C.*

Salix salvitfolia BROT.

Pl. ti. — S.40. **Rhabdophaga salicis** SCHRANK 776
Tavares, 1905, p. 96. *P.*

Pl. fe. — S.62. **Eriophyes salicis** NAL. 777
Tavares, 1905, p. 93. *P.*

— S.66. [**Pontania salicis** CHRIST] 778
Tavares, 1905, p. 91. *P.*

Salix Caprea L.

Ae. fl. — S.1. *Wirzopf*. **Ériophyide** 779
Rübsaamen 1890, p. 47, n° 157, p. 49-50; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 37, ⊕. *E-C, I.*

— S.2. **Aphis amenticola** KALT. 780
Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 315; Kieffer, 1901^b, p. 495. *E-C.*

- S.3. **Dorytomus tæniatus** FABR. 781
Goureau, 1858, p.11 ; Ceccconi, 1902^b, p.359, n° 43 ; Molliard, 1904^b, p.91-95, fig.1-3, ⊕. I,F.
- S.4. **Lépidoptère** 782
Kieffer, 1901^b, p.485. A.
- Ac.ti.** — S.7. **Ériophyide** 783
Schlechtendal, 1890, p.38, n° 319 ; 1895, p.13 ; C.Marchal et Chateau, 1905, p.295. E-C,F.
- S.8. Cécidie en rosette. . **Rhabdophaga rosaria** H.LÖW 784
F. Löw, 1874^b, p.154 ; Hieronymus, 1890, p.167-168, n° 522 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n° 221, ⊕ ; Massalongo, 1895, p.53, n° 36 ; Ceccconi, 1897, p.447. E-T.
- S.10. **Rhabdophaga heterobia** H.LÖW 785
Rübsaamen, 1890, p.48, n° 164 ; Kertész, 1902, p.22-23. A.
- S.11. **Perrisia iteobia** KIEFF. 786
Hieronymus, 1890, p.167, n° 521 ; Martel, 1891, p.42, n° 97 ; Kertész, 1902, p.40-41. E-C,F.
- S.15. **Rhabdophaga clavifex** KIEFF. 787
Martel, 1894, p.11, n° 221 ; C.Marchal et Chateau, 1905, p.296. A,F.
- S.16. **Cécidomyide** 788
Schlechtendal, 1890, p.39, n° 326 ; 1895, p.14. E-C.
- Ac.bg.** — S.19. **Rhabdophaga pulvini** KIEFF. 789
Kertész, 1902, p.24 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p.296. A,F.
- S.24. **Cryptocampus ater** JURINE 790
Dalla Torre, 1894, p.277 ; Schlechtendal, 1895, p.14. E-O.
- S.25. **Rhabdophaga gemmicola** KIEFF. 791
Kieffer, 1901^b, p.493. A.
- S.26. **Rhabdophaga superna** KIEFF. 792
Kieffer, 1897^e, p.24, n° 3. A.
- Pl.ti.** — S.28. **Cryptocampus ater** JURINE 793
Kieffer, 1892^e, p.71-72, n° 544 ; 1901^b, p.486. A.
- S.29. **Agromyza Schineri** GIRAUD 794
Schlechtendal, 1890, p.39, n° 328 ; Kieffer, 1901^b, p.489-490 ; Trotter, 1906, p.120, n° 30. E-C,I.
- S.30. **Cryptocampus medullarius** HARTIG 795
Schlechtendal, 1890, p.40, n° 331 ; 1895, p.15 ; Nielsen, 1905^b, p.268. E-C, E-N.

- S.33. Bosselettes. *Lestes viridis* VAN DER LIND. 796
Kieffer, 1901^b, p. 486-487. *F.*
- S.35. *Grapholitha Servilleana* DUP. 797
Frank, 1896, p. 252, n° 3 ; Sorhagen, 1898, p. 115. *A.*
- S.36. *Rhabdophaga saliciperda* DUFOUR 798
Liebel, 1886, p. 567, n° 225 ; Rübsaamen, 1890, p. 47, n° 162 ; Connold, 1901, pl. XXVI-XXVII, *E-C, E-O.*
⊕ ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 297.
- S.37. *Rhabdophaga Pierrei* KIEFF. 799
Kieffer, 1901^b, p. 490 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 297. *A, F.*
- S.40. *Rhabdophaga salicis* SCHRANK 800
Rübsaamen, 1890, p. 47, n° 161 ; Honard, 1903^c, p. 223-225, fig. 126-128, ⊕. *E-C, E-O.*
- S.41. *Rhabdophaga dubia* KIEFF. 801
Kieffer, 1891^d, p. 208-209, n° 134 ; Kertész, 1902, p. 22. *A.*
- S.43. *Saperda populnea* L. 802
Eggers, 1896, p. 578-579 ; Connold, 1901, p. 74, pl. XXII, ⊕. *E-C, I-B.*
- S.44. *Sesia flaviventris* STAUDGR. 803
Ceccconi, 1902^b, p. 360, n° 44 ; Lueders, 1905, p. 382. *E-C.*
- Pl. fe. — S.45. *Cryptocampus venustus* ZADD. 804
Brischke, 1881, p. 175, n° 22 ; Dalla Torre, 1894, p. 279 ; Rostrup, 1896, p. 12, n° 65. *A, D.*
- S.47. . . . *Oligotrophus capreae* WINN. var. *major* KIEFF. 805
F. Löw, 1877, p. 36, n° 9 ; Liebel, 1886, p. 568, n° 262 ; Lemée, 1902^b, p. 70, n° 18. *E-C, E-O.*
- S.49. *Rhabdophaga nervorum* KIEFF. 806
Kieffer, 1897^e, p. 23, n° 1 ; Kertész, 1902, p. 23. *A.*
- S.51. [*Perrisia marginemtorquens* WINN.] 807
Bremi, 1847, p. 28 ; Corti, 1903^b, p. 371, n° 173. *E-C, I.*
- S.54. Enroulement lâche par en bas. *Pontania* 808
Hieronymus, 1890, p. 251, n° 749 ; Rübsaamen, 1890, p. 259, n° 260 ; Trotter et Ceccconi, 1906, fasc. XV, n° 362, ⊕. *A, I.*
- S.55. *Siphocoryne pastinacæ* L. 809
Schouteden, 1903, p. 186. *B.*
- S.56. *Ériophyide* 810
Misciattelli, 1894, p. 220, n° 24. *I.*

— S.60.	Cécidomyide	811
Rübsaamen, 1889, p.60, n° 4 ; 1890, p.48, n°169.		A.
— S.61.	Oligotrophus capreae WINN.	812
Bremi, 1847, p.67-68, pl.II, 38, ⊕ ; Nik, 1889 ^b , p.306-308, pl.V, 1-9, ⊕ ; Fockeu, 1896, p.79-95, pl.V ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc.I, n°36, ⊕ ; Trotter et Ceconi, 1901, fasc.IV, n°97, ⊕ ; Connold, 1901, pl.XCV, ⊕.		E-T.
— S.62, forme <i>b</i> ; 4 mm. de hauteur.	Eriophyes tetanothrix NAL.	813
Rübsaamen, 1895, p.418, n°35, pl.XV, 18, ⊕ ; Lindroth, 1899, p.12-14 ; Connold, 1901, pl.LXVI, ⊕.		E-T.
— S.65.	Pontania proxima LEPEL.	814
Liebel, 1886, p.566, n° 249 ; Hieronymus, 1890, p.251, n°748 ; Ceconi, 1899, p.162.		E-T.
— S.67.	Pontania pedunculi HARTIG	815
Hieronymus, 1890, p.251, n°747 ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc.IX, n°268, ⊕ ; Martel, 1894, p.12, n°223 ; Connold, 1901, pl.CX, ⊕.		E-T.

Salix Caprea × silesiaca WIMM.

Pl. fe. — S.61.	Oligotrophus capreae WINN.	816
Hieronymus, 1890, p.168, n°525.		A.

Salix grandifolia SERINGE

Ae. ti. — S.8.	Rhabdophaga rosaria H. LÖW	817
Dalla Torre, 1892, p.154 ; Schlechtendal, 1895, p.14.		E-C.
Pl. fe. — S.53.	[Eriophyide]	818
Thomas 1886, p.303 ; Schlechtendal, 1890, p.40, n°337 ; Dalla Torre, 1892, p.154.		E-C.
— S.54.	Pontania	819
Lagerheim, 1903, p.344, n°1.		A.
— S.61.	Oligotrophus capreae WINN.	820
Thomas, 1878, p.705 ; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc.XII, n°341, ⊕.		E-C, I.
— S.62, forme <i>c</i>	Eriophyide	821
Thomas, 1877, p.373, n°13 ; Schlechtendal 1882, p.31, n°25, <i>b</i> .		E-C.
— S.65.	Pontania proxima LEPEL.	822
Lagerheim, 1903, p.344, n°2.		A.

***Salix aurita* L.**

Ac. fl. — S. 1. <i>Wirrzopf</i>	Ériophyide	823
Hieronymus, 1890, p. 89, n° 211; Schlechtendal, 1895, p. 13.	A.	
— S. 2.	Aphis amenticola KALT.	824
Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 315; Kieffer, 1901 ^b , p. 495.	E-C.	
— S. 3.	Curculionide	825
Kieffer, 1901 ^b , p. 484-485.	A.	
Ac. ti. — S. 7.	Ériophyide	826
Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 319; 1895, p. 13.	E-C.	
— S. 8. Cécidie en rosette.	Rhabdophaga rosaria H. LÖW	827
F. Löw, 1874 ^b , p. 154; Hieronymus, 1890, p. 163, n° 514; Kieffer, 1900 ^c , pl. XXXIV, 2, ⊕; Connold, 1901, pl. LXXXV-LXXXVI, ⊕.	E-T.	
— S. 9.	Rhabdophaga rosariella KIEFF.	828
Kieffer, 1897 ^e , p. 23-24, n° 2; 1900 ^c , pl. XXXIV, 4, ⊕.	A.	
— S. 10.	Rhabdophaga heterobia H. LÖW	829
Rübsaamen, 1890, p. 48, n° 164.	A.	
— S. 12.	Eriophyes gemmarum NAL.	830
Kieffer, 1892 ^e , p. 75, n° 545; Nalepa, 1898, p. 14, n° 29.	A.	
— S. 13.	Eriophyes triradiatus NAL.	831
Lindroth, 1899, p. 14.	E-V.	
— S. 15.	Rhabdophaga clavifex KIEFF.	832
Kieffer, 1891 ^b , p. 241, pl. IX, 4, 8, 19, 25, ⊕; Kertész, 1902, p. 21-22.	A.	
Ac. bg. — S. 18.	Cécidomyide	833
Schlechtendal, 1895, p. 14.	A.	
— S. 19.	Rhabdophaga pulvini KIEFF.	834
Kieffer, 1891 ^b , p. 244, fig. 2, pl. IX, 22-24, c, d, ⊕; Kertész, 1902, p. 24.	A.	
— S. 22.	Rhabdophaga	835
Kieffer, 1891 ^b , p. 244, pl. IX, 24, e, ⊕; 1900 ^c , pl. XXXIV, 8, ⊕.	A.	
— S. 23.	Cryptocampus saliceti FALL.	836
Dalla Torre, 1894, p. 278; Kieffer, 1901 ^b , p. 486.	E-O.	
— S. 25.	Rhabdophaga gemmicola KIEFF.	837
Kieffer, 1897 ^e , p. 24, n° 4; 1901 ^b , p. 493; Kertész, 1902, p. 22.	A.	

— S.26.	Rhabdophaga superna KIEFF.	838
Kieffer, 1897 ^e , p.24, n°3; 1898 ^e , p.6; 1901 ^b , p.493.		A.
— S.27.	Cécidomyide	839
Schlechtendal, 1895, p.14.		A.
Pl. ti. — S.28.	Cryptocampus ater JURINE	840
Kieffer, 1892 ^e , p.71-72, n°544; 1901 ^b , p.486.		A.
— S.29.	Agromyza Schineri GIRAUD	841
Kieffer, 1901 ^b , p.489-490.		A.
— S.30.	Cryptocampus medullarius HARTIG	842
Kieffer, 1891, p.237, n°464; Schlechtendal, 1895, p.15.		A.
— S.33. Bosselette.	Lestes viridis VAN DER LIND.	843
Pierre, 1903, p.185; 1904, p.477-484, pl.IV, ⊕.		F.
— S.34.	Rhabdophaga Karschi KIEFF.	844
Kieffer, 1891 ^b , p.251, fig.3, pl.IX, 2, 24, b, ⊕; 1900 ^e , pl.XXXIV, 3, ⊕.		A.
— S.35.	Grapholitha Servilleana DUP.	845
Liebel, 1889, p.304, n°379; 1892, p.279, n°219.		A.
— S.36.	Rhabdophaga saliciperda DUFOUR	846
Liebel, 1886, p.567, n°255; 1892, p.279, n°221; Rübsaamen, 1890, p.47, n°162.		A.
— S.37.	Rhabdophaga Pierrei KIEFF.	847
Kieffer, 1900 ^e , pl.XXXIV, 11, ⊕; C.Marchal et Chateau, 1905, p.297.		F.
— S.40.	Rhabdophaga salicis SCHRANK	848
Liebel, 1886, p.567, n°254; Hieronymus, 1890, p.163-164, n°515; Rübsaamen, 1890, p.47, n°161; Tavares, 1905, p.96; Töpffer, 1906, fasc.I, n°46, ⊕.		E-C. E-O.
— S.41.	Rhabdophaga dubia KIEFF.	849
Kieffer, 1891 ^b , p.255-257, fig.4, pl.X, 5, 24, a, ⊕; 1900 ^e , pl.XXXIV, 6, ⊕; Kertész, 1902, p.22.		A.F.
— S.43.	Saperda populnea L.	850
Kieffer, 1901 ^b , p.485.		A.
— S.44.	Sesia flaviventris STAUDGR.	851
Lueders, 1905, p.382.		E-C.
Pl. fe. — S.45.	Cryptocampus venustus ZADD.	852
Hieronymus, 1890, p.249-250, n°744; Dalla Torre, 1894, p.279.		E-C.

- S.47. . . . **Oligotrophus capreae** WINN. var. **major** KIEFF. 853
Rübsaamen, 1890, p. 48, n° 167; Hieronymus, 1890, p. 165-166, n° 517; Tavares, 1905, p. 92. E-T.
- S.48. **Rhabdophaga salicis** SCHRANK 854
Kieffer, 1901^b, p. 492. F.
- S.49. **Rhabdophaga nervorum** KIEFF. 855
Rübsaamen, 1891^b, p. 405-406, n° 10; Kertész, 1902, p. 23; Tavares, 1905, p. 92. E C, E-O.
- S.51. **Perrisia marginemtorquens** WINN. 856
Rübsaamen, 1889, p. 70, n° 12; 1890, p. 48, n° 70; Corti, 1904, p. 123, n° 92. E-C, E-O.
- S.54. **Pontania leucosticta** HARTIG 857
Brischke, 1881, p. 175, n° 19; Hieronymus, 1890, p. 250, n° 746; Schlechtendal, 1895, p. 15; Trotter, 1899, p. 304, n° 42. A, I.
- [S.59]. **Ériophyide** 858
Trotter, 1900 c, p. 201, n° 14, fig. 5. ⊕; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XII, n° 279, ⊕. I.
- S.61. **Oligotrophus capreae** WINN. 859
Hieronymus, 1890, p. 164-165, n° 516; Kertész, 1902, p. 73-74; Tavares, 1905, p. 93. E-T.
- S.62, forme *a* ou *b*. **Eriophyes tetanothrix** NAL. 860
Rübsaamen, 1895, p. 418, pl. XV, 12, ⊕; Focken, 1896, p. 55-71, pl. IV, 1-6, ⊕; Nalepa, 1898, p. 13, n° 26; 1900, p. 215; Lindroth, 1899, p. 12-14; Tavares, 1905, p. 93, pl. XIII, 28, ⊕. E-T.
- S.65. **Pontania proxima** LEPEL. 861
Liebel, 1886, p. 566, n° 249; Trotter, 1899, p. 304, n° 41. A, I.
- S.66. **Pontania salicis** CHRIST 862
Liebel, 1886, p. 567, n° 253; Rübsaamen, 1890, p. 49, n° 171; Tavares, 1905, p. 91. A, P.
- S.67. **Pontania pedunculi** HARTIG 863
Hieronymus, 1890, p. 250, n° 745; Hieronymus, Pax, etc., 1905, fasc. XIII, n° 367, ⊕; Rostrup, 1896, p. 12, n° 63. E-C, R, D.

Salix aurita × **myrtilloides**

- Pl. fe. — S.62. **Eriophyes tetanothrix** NAL. 864
Lindroth, 1899, p. 12-14. E-N.

Salix aurita × **repens** WIMM.

- Pl. ti. — S.40. **Rhabdophaga salicis** SCHRANK 865
Hieronymus, 1890, p. 167, n° 519. A.

Salix aurita × **silesiaca** WIMM.

- Pl. fe.** — S. 61. **Oligotrophus capreae** WINN. 866
 Hieronymus, 1890, p. 167, n° 520 ; Schlechtendal, 1895, p. 15. A.

Salix silesiaca WILLD.

- Ac. ti.** — S. 8. **Rhabdophaga rosaria** H. LÖW 867
 Hieronymus, 1890, p. 171, n° 545 ; Schlechtendal, 1895, p. 14. E-C.

- Pl. fe.** — S. 61. **Oligotrophus capreae** WINN. 868
 Thomas, 1878, p. 705 ; Hieronymus, 1890, p. 171-172, n° 546. E-C.
 — S. 65. **Pontania proxima** LEPEL. 869
 Hieronymus, 1890, p. 259, n° 775 ; Dalla Torre, 1894, p. 225-226. E-C.

Salix cinerea L.

- Ac. fl.** — S. 2. **Aphis amenticola** KALT. 870
 Kieffer, 1901^b, p. 495. E-C.
 — S. 3. **Dorytomus tæniatus** FABR. 871
 Rostrup, 1896, p. 13, n° 67 ; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 49, ⊕. D, A.

- Ac. ti.** — S. 8. Cécidie en rosette. **Rhabdophaga rosaria** H. LÖW 872
 Hieronymus, 1890, p. 168, n° 527 ; Rübsaamen, 1895, p. 459, n° 82 ; Corti, 1903^b, p. 371, n° 175. E-T.
 — S. 9. **Rhabdophaga rosariella** KIEFF. 873
 Kieffer, 1897^e, p. 23-24, n° 2 ; Loisele, 1903, p. (6). A, F.
 — S. 11. **Perrisia iteobia** KIEFF. 874
 Szépligéti, 1895, p. 216, n° 48 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 297. E-C, F.
 — S. 15. **Rhabdophaga clavifex** KIEFF. 875
 Kieffer, 1891^b, p. 241 ; 1901^b, p. 494 ; Kertész, 1902, p. 21-22. A.

- Ac. bg.** — S. 19. **Rhabdophaga pulvini** KIEFF. 876
 Kieffer, 1891^b, p. 244-246 ; Rostrup, 1896, p. 13, n° 69 ; Tavares, 1905, p. 94. A, D, F.
 — S. 23. **Cryptocampus saliceti** FALL. 877
 Kieffer, 1901^b, p. 486 ; Tavares, 1905, p. 94-95, pl. XIII, 13, ⊕. A, P.

- S. 24. **Cryptocampus ater** JURINE 878
Dalla Torre, 1894, p. 276; Schlechtendal, 1895, p. 15. *E-C.*
- S. 25. **Rhabdophaga gemmicola** KIEFF. 879
Kieffer, 1897^a, p. 24, n° 4; 1901^b, p. 493; Kertész, 1902, p. 22. *A.*
- S. 26. **Rhabdophaga superna** KIEFF. 880
Kieffer, 1897^a, p. 24, n° 3; 1901^b, p. 493. *A.*
- Pl. ti.** — S. 28. **Cryptocampus ater** JURINE 881
Kieffer, 1892^e, p. 71-72, n° 544; 1901^b, p. 486; Tavares, 1905, p. 96. *A, P.*
- S. 29. **Agromyza Schineri** GIRAUD 882
Connold, 1901, p. 76, pl. XXIII, ⊕; Tavares, 1905, p. 96. *E-O.*
- S. 30. **Cryptocampus medullarius** HARTIG 883
Kieffer, 1891, p. 237, n° 464; Rostrup, 1896, p. 13, n° 71; Nielsen, 1905^b, p. 268. *A, D.*
- S. 32. [**Rhabdophaga albipennis** WINN.] 884
Tavares, 1905, p. 96. *P.*
- S. 33. Bosselette. **Lestes viridis** VAN DER LIND. 885
Pierre, 1902, p. 183-184. *F.*
- S. 34. **Rhabdophaga Karschi** KIEFF. 886
Kieffer, 1891^b, p. 251-253; 1901^b, p. 491. *A.*
- S. 35. **Grapholitha Servilleana** DUP. 887
Liebel, 1889, p. 304, n° 379; 1892, p. 279, n° 219. *A.*
- S. 36. **Rhabdophaga saliciperda** DUFOUR 888
Liebel, 1886, p. 567, n° 255; 1892, p. 279, n° 221; Szépligéti, 1895, p. 216, n° 53. *E-C.*
- S. 37. **Rhabdophaga Pierrei** KIEFF. 889
Kieffer, 1901^b, p. 490; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 297; Tavares, 1905, p. 95; 1907^b, p. 128. *A, F, P.*
- S. 40. **Rhabdophaga salicis** SCHRANK 890
Connold, 1901, pl. XXVIII, ⊕; Kertész, 1902, p. 25-26; Tavares, 1905, p. 96, pl. XIII, 8, 19, 24, 26, ⊕. *E-T.*
- S. 41. **Rhabdophaga dubia** KIEFF. 891
Kieffer, 1891^b, p. 255-257; Rostrup, 1896, p. 13, n° 70; Kertész, 1902, p. 22. *A, D.*
- S. 42. **Perrisia** 892
Pierre, 1901, p. 47-48, 1 fig., ⊕. *F.*
- S. 44. **Sesia flaviventris** STAUDGR. 893
Lueders, 1905, p. 382. *E-C.*

Pl. fe. — S.47.	Oligotrophus capreae WINN. var. major KIEFF.	894
	Houard, 1902 ^b , p.47-48, fig. 27-30, ⊕; Tavares, 1905, p.92, pl. XIII, 1, ⊕.	<i>E-C, E-O.</i>
— S.49.	Rhabdophaga nervorum KIEFF.	895
	Rübsaamen, 1899, p.235, n°16; Tavares, 1905, p.92, pl. XIII, 14, 30, ⊕.	<i>A, P.</i>
— [S.50].	[Apion minimum HERBST]	896
	Bargagli, 1883; Kieffer, 1901 ^b , p.485.	
— S.51.	Perrisia marginemtorquens WINN.	897
	Hieronymus, 1890, p.168, n°526; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n°38, ⊕; Rostrup, 1896, p.13, n°73.	<i>E-C, D, I.</i>
— S.53.	Eriophyide	898
	Rostrup, 1896, p.13, n°72.	<i>D.</i>
— S.54.	Pontania viminalis HARTIG	899
	Hieronymus, 1890, p.252, n°752; Dalla Torre, 1894, p.252; Rostrup, 1896, p.14, n°74; Rübsaamen, 1901, p.129, n°201.	<i>D, A, P.</i>
— S.55.	Aphide	900
	Tavares, 1900, p.85, n°155; 1907 ^b , p.127.	<i>P.</i>
— S.61.	Oligotrophus capreae WINN.	901
	Hieronymus, 1890, p.168, n°529; Rostrup, 1896, p.14, n°77; Tavares, 1905, p.93, pl. XIII, 10, ⊕.	<i>D, E-C, E-S.</i>
— S.62.	Eriophyes tetanothrix NAL.	902
	Liebel, 1886, p.568, n°263; Lindroth, 1899, p.12-14.	<i>E-T.</i>
— S.65.	Pontania proxima LEPEL.	903
	Hieronymus, 1890, p.251, n°751; Dalla Torre, 1894, p.225-226; Corti, 1904, p.124, n°97.	<i>E-C, E.</i>
— S.66.	Pontania salicis CHRIST	904
	Liebel, 1886, p.567, n°253; Kieffer, 1901 ^b , p.488-489.	<i>E-C.</i>
— S.67.	Pontania pedunculii HARTIG	905
	Hieronymus, 1890, p.251, n°750; Rübsaamen, 1895, p.479, n°113; Rostrup, 1896, p.14, n°78.	<i>E-T.</i>

Salix cinerea × purpurea WIMM.

Pl. fe. — S.61.	Oligotrophus capreae WINN.	906
	Hieronymus, 1890, p.169, n°530; Schlechtendal, 1895, p.15.	<i>A.</i>

Salix cinerea × viminalis WIMM.

Pl. fe. — S.61.	Oligotrophus capreae WINN.	907
	Hieronymus, 1890, p.169, n°531; Schlechtendal, 1895, p.15.	<i>A.</i>

Salix pedicellata DESF.

- Ac. ti.** — S.8. [Rhabdophaga rosaria H. Löw] 908
Rübsaamen, 1902, p. 321, n° 126. S. Y.

Salix hvida WAHL.

- Pl. fe.** — S.62. Eriophyes tetanothrix NAL. 909
Lindroth, 1899, p. 12-14. E-N.

Salix repens L.

- Ac. ti.** — S.8. Rhabdophaga rosaria H. Löw 910
Hieronymus, 1890, p. 171, n° 544; Rostrup, 1896, p. 15, n° 87; Rübsaamen, 1901, p. 130, n° 208. D, E-C.
— S.10. Rhabdophaga heterobia H. Löw 911
Bergensstamm et Löw, 1876, p. 47, n° 223. E-N, B.
— S.14. [Perrisia terminalis H. Löw] 912
Lagerheim, 1905, p. 16, n° 2, p. 26. E-N.

- Ac. bg.** — S.16'. Cécidomyide 913
Rostrup, 1896, p. 15, n° 88. D.
— S.27. Cécidomyide 914
Rostrup, 1896, p. 15, n° 86. D.

- Pl. ti.** — S.30. Cryptocampus medullarius HARTIG 915
Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 331; 1895, p. 15; Dalla Torre, 1895, p. 158; Nielsen, 1905^b,
p. 266-268, n° 4, fig. 9, ⊕; Lagerheim, 1905, p. 20, n° 1. E-C,
E-N.
— S.31. Pontania collectanea FÖRSTER 916
Dalla Torre, 1894, p. 215. E-C.
— S.35. Grapholitha Servilleana DUP. 917
Rostrup, 1896, p. 15, n° 89; Rübsaamen, 1901, p. 130, n° 209. D, A.
— S.40. [Rhabdophaga salicis SCHRANK] 918
Schlechtendal, 1895, p. 15; Rostrup, 1896, p. 16, n° 91. E-C, D.
— S.40'. Cécidomyide 919
Rostrup, 1896, p. 16, n° 90. D.

- Pl. fe.** — S.51. [Perrisia marginemtorquens WINN.] 920
Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 338; 1895, p. 15. A.

— S. 62. **Ériophyide** 921

Thomas, 1877, p. 374, n° 14; Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 346; Rostrup, 1896, p. 16, n° 93. *D, E-C.*

— S. 66. **Pontania salicis** CHRIST 922

Hieronymus, 1890, p. 258, n° 770; Rübsaamen, 1901, p. 139, n° 17; Lagerheim, 1905, p. 20, n° 2. *E-N, B, I-B.*

Salix repens L. var. rosmarinifolia KOCH
(**S. rosmarinifolia L.**)

Ac. ti. — S. 13. Rosette de feuilles. **Eriophyes tetanothrix** NAL. 923

Eriophyes triradiatus NAL. 924

Lindroth, 1899, p. 12-14. *E-N.*

Pl. fe. — S. 65. [**Pontania proxima** LEPEL.] 923

Hieronymus, 1890, p. 258, n° 771; Schlechtendal, 1895, p. 16. *A.*

Salix nigricans SMITH

Ac. fl. — S. 1. *Wirrzopf*. * **Ériophyide** 926

Thomas, 1877, p. 373, n° 13; Hieronymus, 1890, p. 91, n° 223. *E-C, E-N.*

* *Eriophyes salicis* Nal. et *Eriophyes salicobius* Nal. (Lindroth, 1899 p. 12, 22).

— S. 2. **Aphis amenticola** KALT. 927

Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 315; Kieffer, 1901^b, p. 495. *E -C*

Ac. ti. — S. 7. **Ériophyide** 928

Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 319; 1895, p. 13. *E-C.*

— S. 8. **Rhabdophaga rosaria** H. Löw 929

Hieronymus, 1890, p. 170, n° 539; Schlechtendal, 1895, p. 14. *E-N.*

Pl. fe. — S. 56. **Ériophyide** 930

Thomas, 1885^b, p. 54; Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 335; Dalla Torre, 1892, p. 156. *E-C.*

— S. 61. **Oligotrophus capreae** WINN. 931

Bezzi, 1899, p. 31, n° 106. *I.*

— S. 62. forme c. **Eriophyes tetanothrix** NAL. 932

Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 346; Lindroth, 1899, p. 12-14. *E-C, E-N.*

— S. 64. **Pontania femoralis** CAMERON 933

Kieffer, 1901^b, p. 488. *I-B.*

- S.65. *Pontania proxima* LEPEL. 934
Schlechtendal, 1890, p.41, n° 353. E-C.
— S.66. [*Pontania salicis* CHRIST] 935
Hieronymus, 1890, p.255, n° 762 ; Dalla Torre, 1895, p.157. E-C, I.

Salix nigricans* × *Caprea

- Ac. ti. — S.13. Rosette de feuilles . . . *Epitrimerus salicobius* NAL. 936
Lindroth, 1899, p.22. E-N.
Pl. fe. — S.62. *Eriophyes tetanothrix* NAL. 937
Lindroth, 1899, p.12-14. E-N.

***Salix nigricans* × sp.**

- Pl. fe. — S.66. [*Pontania salicis* CHRIST] 938
Trotter, 1899, p.305, n° 43. I.

***Salix latifolia* SÉRINGE**

- Pl. fe. — S.61. *Oligotrophus capreae* WINN. 939
Misciattelli, 1895 c, p.116, n° 17 ; Kieffer, 1901 b, p.492. I.

***Salix puberula* DÖLL.**

- Pl. fe. — S.66. *Pontania salicis* CHRIST 940
Kieffer, 1901 b, p.488-489. I-B.

***Salix phylicifolia* L.**

- Ac. ti. — S.13. Rosette de feuilles. . . *Eriophyes tetanothrix* NAL. 941
Eriophyes triradiatus NAL. 942
Lindroth, 1899 p.12-14. E-N.
Pl. fe. — S.64. *Pontania femoralis* CAMERON 943
Kieffer, 1901 b, p.488. I-B.
— S.66. *Pontania salicis* CHRIST 944
Schlechtendal, 1890, p.41, n° 349 ; Kieffer, 1901 b, p.488-489. E-C.
HOARD, *Zoocécidies*.

Salix laurina SMITH

- Pl. fe. — S.63. **Pontania vesicator** BREMI 945
 Dalla Torre, 1894, p. 269; Kieffer, 1901^b, p. 488. I-B.
 — S.64. **Pontania femoralis** CAMERON 946
 Dalla Torre, 1894, p. 231. I-B.

Salix bicolor EHRLH.

- Ac. fl. — S.1. *Wirzopf*. **Ériophyide** 947
 Hieronymus, 1890, p. 89, n° 213; Schlechtendal, 1895, p. 13. A.
 Ac. ti. — S.7. **Ériophyide** 948
 Schlechtendal, 1895, p. 13. A.

Salix Schraderiana WILLD.

- Pl. fe. — S.47. [**Oligotrophus capreæ** WINN. var. **major** KIEFF.] 949
 Rostrup, 1896, p. 16, n° 94. D.

Salix arbuscula L.

- Pl. ti. — S.40. **Rhabdophaga salicis** SCHRANK 950
 F. Löw, 1885^c, p. 492-493; Dalla Torre, 1892, p. 152; Kertész, 1902, p. 25-26. E-C.
 Pl. fe. — S.53. Enroulement par en haut. **Ériophyide** 951
 Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 337; Dalla Torre, 1892, p. 152. E-C.
 — S.62. **Ériophyide** 952
 Thomas, 1877, p. 373, n° 13; Dalla Torre, 1892, p. 152; Massalongo, 1906^b, p. 155, n° 67. E-C, I.
 — S.63. **Pontania vesicator** BREMI 953
 Trotter, 1903^b, p. 19, n° 54. I.
 — S.64. **Pontania femoralis** CAMERON 954
 Kieffer, 1901^b, p. 488. I-B.
 — S.65. **Pontania proxima** LEPEL. 955
 Dalla Torre, 1893^b, p. 17; Schlechtendal, 1895, p. 16. E-C.
 — S.66. **Pontania salicis** CHRIST 956
 Dalla Torre, 1892, p. 152; 1893^b, p. 17; 1895, p. 156; Schlechtendal, 1895, p. 15. E-C.

Salix glabra SCOP.

Pl. fe. — S.46.	Cryptocampus testaceipes ZADD.	957
	Dalla Torre, 1892, p. 154; Schlechtendal, 1895, p. 15.	<i>E-C.</i>
— S.53.	Èriophyide	958
	Thomas, 1877, p. 373, n° 13; 1885, p. 13, n° 26; Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 337; Dalla Torre, 1892, p. 153; 1893 ^b , p. 18.	<i>E-C.</i>
— S.56.	Èriophyide	959
	Thomas, 1877, p. 373, n° 13; 1885, p. 15, n° 34; Dalla Torre, 1892, p. 153.	<i>E-C.</i>
— S.64.	Pontania femoralis CAMERON	960
	Dalla Torre, 1892, p. 154; Schlechtendal, 1895, p. 16.	<i>E-C.</i>
— S.66.	Pontania salicis CHRIST	961
	Dalla Torre, 1892, p. 154; 1893 ^b , p. 18; 1895, p. 156; Schlechtendal, 1895, p. 15.	<i>E-C.</i>

Salix Mellichhoferi SAUT.

Pl. fe. — S.53. Enroulement par en haut.	Èriophyide	962
	Kieffer, 1901 ^b , p. 497.	<i>E-C.</i>

Salix hastata L.

Ac. ti. — S.8.	Rhabdophaga rosaria H. LÖW	963
	Hieronymus, 1890, p. 169, n° 534; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 87, ⊕.	<i>E-C.</i>
— S.14.	Perrisia terminalis H. LÖW	964
	F. Löw, 1885 ^c , p. 494; Dalla Torre, 1892, p. 154.	<i>E-C.</i>

Pl. ti. — S.40.	Rhabdophaga salicis SCHRANK	965
	F. Löw, 1888 ^c , p. 545, n° 28; Hieronymus, 1890, p. 169, n° 535; Dalla Torre, 1892, p. 154.	<i>N, E-C.</i>

Pl. fe. — S.53.	Èriophyide	966
	Thomas, 1885, p. 13, n° 27; 1886, p. 305; Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 337; Dalla Torre, 1892, p. 154.	<i>E-C.</i>
— S.62.	Èriophyide	967
	F. Löw, 1888 ^c , p. 541, n° 13; Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 346.	<i>N, E-C.</i>
— S.66.	Pontania salicis CHRIST	968
	F. Löw, 1888 ^c , p. 547, n° 33, a; Hieronymus, 1890, p. 253, n° 757; Dalla Torre, 1895, p. 156.	<i>N, E-C, I.</i>

- S.67. *Pontania pedunculi* HARTIG 969
 F. Löw, 1888^c, p. 547, n° 33, *b*. N.

***Salix hastata* × *nigricans* WIMM.**

- Pl. fe. — S.53. *Ériophyide* 970
 Thomas, 1886, p. 303; Dalla Torre, 1892, p. 154; Schlechtendal, 1895, p. 15. E-C.

***Salix hastata* × *silesiaca* WIMM.**

- Pl. fe. — S.61. *Oligotrophus capreae* WINN. 971
 Hieronymus, 1890, p. 169, n° 536; Schlechtendal, 1895, p. 15. A-H.

***Salix lanata* L.**

- Pl. fe. — S.62. *Eriophyes tetanothrix* NAL. 972
 Lindroth, 1899, p. 12-14. E-N.

***Salix depressa* L.**

- Ac. ti. — S.8; petite rosette. [*Rhabdophaga rosaria* H. LÖW] 973
 Rübsaamen, 1895, p. 459, n° 84. R.

- Pl. fe. — S.66. *Pontania salicis* CHRIST 974
 Rübsaamen, 1895, p. 479, n° 114. R.

***Salix lapponum* L.**

- Ac. ti. — S.16. *Cécidomyide* 975
 Schlechtendal, 1890, p. 39, n° 326; 1895, p. 14. E-C.

- Pl. fe. — S.51. [*Perrisia marginemtorquens* WINN.] 976
 Thomas, 1878, p. 705; Hieronymus, 1890, p. 169-170, n° 537. E-C.

- S.53. *Ériophyide* 977
 Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 337. E-C.

- S.62. *Eriophyes tetanothrix* NAL. 978
 Lindroth, 1899, p. 12-14. E-N.

- S.63. *Pontania vesicator* BREMI 979
 Trotter, 1903^b, p. 19, n° 55. I.

- S.64. **Pontania femoralis** CAMERON 980
Hieronymus, 1890, p. 254, n° 760 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 167, ⊕. I.
- S.65. **Pontania proxima** LEPEL. 981
Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 353 ; Corti, 1902, p. 259, n° 176. E-C, I.
- S.66. **Pontania salicis** CHRIST 982
Corti, 1902, p. 258-259, n° 175. I.

Salix helvetica VILL.

- Pl. ti.** — S.40. [**Rhabdophaga salicis** SCHRANK] 983
E. Löw, 1888^b, p. 238 ; Dalla Torre, 1892, p. 155. E-C.
- S.41. **Rhabdophaga dubia** KIEFF. 984
Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. IX, n° 269, ⊕. E-C.
- Pl. fe.** — S.53. **Ériophyide** 985
Dalla Torre, 1892, p. 155 ; Schlechtendal, 1895, p. 15. E-C.
- S.62. **Ériophyide** 986
Dalla Torre, 1895, p. 156. E-C.
- S.65. **Pontania proxima** LEPEL. 987
Dalla Torre, 1892, p. 155 ; Schlechtendal, 1895, p. 16. E-C.
- S.66. **Pontania salicis** CHRIST 988
Dalla Torre, 1895, p. 156. E-C.
- S.67. **Pontania pedunculi** HARTIG 989
Misciattelli, 1895, p. 85, n° 7. I.

Salix glauca L.

- Ac. ti.** — S.13. **Eriophyes triradiatus** NAL. 990
Lindroth, 1899, p. 14. E-N.
- Pl. fe.** — S.54. **Pontania** 991
Rübsaamen, 1895, p. 479, n° 116. R.
- S.62. **Eriophyes tetanothrix** NAL. 992
Lindroth, 1899, p. 12-14. E-N.
- S.67. **Pontania pedunculi** HARTIG 993
Rübsaamen, 1895, p. 479, n° 115. R.

Salix Myrsinites L.

- Pl. ti.** — S.40. [Rhabdophaga salicis SCHRANK] 994
 F.Löw, 1877, p. 25, pl. 1, 7, ♂; Hieronymus, 1890, p. 170, n° 538; Kertész, 1902, p. 25-26. *E-C, I.*
- Pl. fe.** — S.53. Enroulement par en haut. **Ériophyide** 995
 Dalla Torre, 1895, p. 157. *E-C.*
- S.62, forme *c.* **Eriophyes tetanothrix** NAL. 996
 Hieronymus, 1890, p. 90-91, n° 222; Lindroth, 1899, p. 12-14. *E-C, E-X.*
- S.65. Cécidie arrondie, de 6 mm. de diamètre. [Pontania proxima LEPEL.] 997
 Hieronymus, 1890, p. 254-255, n° 761; Schlechtendal, 1895, p. 16. *E-C*
- S.66. **Pontania salicis** CHRIST 998
 Trotter, 1901^d, p. 376, n° 49. *I.*

Salix Myrsinites L. var. Jacquiniiana Host

- Pl. fe.** — S.53. **Ériophyide** 999
 Thomas, 1885, p. 13-14, n° 28; Dalla Torre, 1892, p. 156; Kieffer, 1901^b, p. 497. *E-C.*
- S.62. **Ériophyide** 1000
 Thomas, 1877, p. 373, n° 13; 1885, p. 16, n° 37. *E-C.*

Salix retusa L. (S. Kitabeliana Willd.)

- Pl. ti.** — S.40. **Rhabdophaga salicis** SCHRANK 1001
 Dalla Torre, 1895, p. 159. *E-C.*
- Pl. fe.** — S.53. **Ériophyide** 1002
 Thomas, 1885, p. 14, n° 30; 1886, p. 363; Dalla Torre, 1892, p. 157; 1895, p. 158-159. *E-C.*
- S.62. **Ériophyide** 1003
 Thomas, 1885, p. 15, n° 35; Schlechtendal, 1890, p. 41, n° 346; Dalla Torre, 1893^b, p. 19. *E-C.*
- S.63. **Pontania vesicator** BREMI 1004
 Kieffer, 1901^b, p. 488. *E-C.*
- S.64. **Pontania femoralis** CAMERON 1005
 Hieronymus, 1890, p. 259, n° 774; Dalla Torre, 1894, p. 231; 1895, p. 159. *E-C.*

- S.65. [**Pontania proxima** LEPEL.] 1006
 Hieronymus, 1890, p. 259, n°773; Schlechtenda', 1890, p. 41, n°353; Appel, 1891, p. 644; Dalla
 Torre, 1895, p. 159. *E-C.*

Salix serpyllifolia SCOP.

- Pl. fe.** — S.53. **Ériophyide** 1007
 Thomas, 1877, p. 373, n°13; 1885, p. 14, n°31; Dalla Torre, 1892, p. 157. *E-C.*
 — S.62. **Eriophyes tetanothrix** NAL. 1008
 Dalla Torre, 1892, p. 157; Nalepa, 1895, p. 213; 1900, p. 215. *E-C.*

Salix alpigena KERNER (**retusa** × **hastata**)

- Pl. fe.** — S.53. Enroulement du limbe. **Eriophyide** 1009
 Thomas, 1877, p. 373, n°13; 1885, p. 14, n°29. *E-C.*

Salix herbacea L.

- Ac. ti.** — S.12. [**Eriophyes gemmarum** NAL.] 1010
 Kieffer, 1901^b, p. 496. *E-C.*
Pl. fe. — S.53. **Ériophyide** 1011
 Thomas, 1885, p. 14, n°32; 1886, p. 363; Dalla Torre, 1892, p. 155; Corti, 1902, p. 257-258, n°173. *E-C, I.*
 — S.62, forme *c.* **Eriophyes tetanothrix** NAL. 1012
 Dalla Torre, 1892, p. 155; Lindroth, 1899, p. 12-14; Corti, 1902, p. 258, n°174. *E-N, E-C, I.*
 — S.65. **Pontania proxima** LEPEL. 1013
 F. L. 6 v., 1888^c, p. 547, n°34; Hieronymus, 1890, p. 253, n°758; Schlechtendal, 1890, p. 41, n°353;
 1895, p. 16. *E-T.*

Salix rotundifolia TRAUTV.

- Pl. fe.** — S.62. **Eriophyes tetanothrix** NAL. 1014
 Lindroth, 1899, p. 12-14. *E-N.*

Salix reticulata L.

- Ac. fl.** — S.6. Ovaire gonflé. **Cécidomyide** 1015
 Schlechtendal, 1890, p. 38, n°318; Appel, 1891, p. 644; Dalla Torre, 1895, p. 158. *E-C.*

Pl. fe. — S.61.	Oligotrophus capreæ WINN.	1016
Cecconi, 1901 ^c , p. 737, n° 44.		<i>I.</i>
— S.62, forme <i>a</i> ou <i>b</i>	Ériophyide	1017
Thomas, 1877, p. 373, n° 13; 1885, p. 16-17, n° 39; 1886, p. 303; Hieronymus, 1890, p. 91, n° 226; Dalla Torre, 1892, p. 156-157; 1893 ^b , p. 19; 1895, p. 158.		<i>E-C.</i>
— S.65. Cécidie sphérique, de 5 mm. de diamètre.	[Pontania proxima LEPEL.]	1018
Hieronymus, 1890, p. 258-259, n° 772; Schlechtendal, 1895, p. 16; Massalongo, 1906 ^b , p. 156, n° 68, fig. 3. ⊕.		<i>E-G.</i>
— S.66.	[Pontania salicis CHRIST]	1019
Dalla Torre, 1892, p. 157; 1893 ^b , p. 19; 1895, p. 158; Corti, 1902, p. 260-261, n° 178.		<i>E-C, I.</i>

Salix myrtilloides L.

Pl. fe. — S.53. Bord du limbe enroulé.	Epitrimerus salicobius NAL.	1020
Lindroth, 1899, p. 12-14, 22.		<i>E-N.</i>

Salix nigra WAHL.

Ac. fl. — S.1. <i>Wirrzopf</i>	Ériophyide	1021
Thomas, 1877, p. 343, 373; Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 316; 1895, p. 13.		<i>E-C.</i>
— S.2.	Aphis amenticola KALT.	1022
Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 315; Kieffer, 1901 ^b , p. 495.		<i>E-C.</i>
Ac. ti. — S.7.	Ériophyide	1023
Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 319; 1895, p. 13.		<i>E-C.</i>
Pl. ti. — S.36.	Rhabdophaga saliciperda DUFOUR	1024
Kieffer, 1901 ^b , p. 490 (note).		
— S.40.	Rhabdophaga salicis SCHRANK	1025
Kieffer, 1895, p. 175, n° 1; 1900 ^c , pl. XLIV, 8 ⊕.		<i>A.</i>
Pl. fe. — S.49.	Rhabdophaga nervorum KIEFF.	1026
Kieffer, 1895, p. 175, n° 2; Schlechtendal, 1895, p. 15.		<i>A.</i>
— S.53.	Ériophyide	1027
Schlechtendal, 1890, p. 40, n° 337.		<i>A.</i>

Salix elegantissima KOCH

- Ac. fl.** — S. 1. *Wirrzopf*. **Ériophyide** 1028
 Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 316; 1895, p. 13. *E.-C.*
- S. 2. **Aphis amenticola** KALT. 1029
 Schlechtendal, 1890 p. 38, n° 315; Kieffer, 1901^b, p. 495. *E.-C.*
- Ac. ti.** — S. 7. **Ériophyide** 1030
 Schlechtendal, 1890, p. 38, n° 319; 1895, p. 13. *E.-C.*

Salix lanceolata

- Pl. fe.** — S. 46. **Cryptocampus testaceipes** ZADD. 1031
 Nielsen, 1905^b, p. 265-266, n° 3. *E.-N.*

Salix canariensis CH. SMITH

- Pl. ti.** — S. 40. **Rhabdophaga salicis** SCHRANK 1032
 Tavares, 1905, p. 96. *P.*
- Pl. fe.** — S. 62. [**Eriophyes tetanothrix** NAL.] 1033
 Rübsaamen, 1902^d, p. 64, n°s 21-22; Tavares, 1903^b, p. 185-186, n° 25. *ca. m.*

Salix Medemii BOISSIER

- Pl. fe.** — S. 62, forme *d.* **Ériophyide** 1034
 Rübsaamen, 1902^c, p. 320-321, n° 124, pl. XV, 38, ⊕. *A.-M.*

Salix sp.

- Ac. bg.** — S. 21. **Rhabdophaga perforans** KIEFF. 1035
 Kieffer, 1906, p. 71, n° 2. *F.*
- Pl. ti.** — S. 39. **Rhabdophaga Nielsenii** KIEFF. 1036
 Boas, 1898, p. 362; Kieffer et Nielsen, 1906, p. 1-4. *E.-N.*



FAMILLE DES BÉTULACÉES

Alnus 1117-1146, Betula 1067-1116, Carpinus 1037-1050, Corylus 1052-1066, Ostrya 1051.

Les cécidies des Bouleaux, des Charmes et des Aulnes présentent entre elles beaucoup de ressemblances, tandis que celles des Noisetiers s'en éloignent par leur forme bien spéciale (sauf une galle de bourgeon et une cécidie foliaire pustuleuse).

Le fruit du Bouleau seul réagit à l'action d'un Diptère, l'*Oligotrophus betulae*. L'inflorescence mâle n'est déformée que chez le Noisetier par un autre diptère, le *Stictodiplosis corylina*, mais cette cécidie du chaton n'atteint jamais l'ampleur de la mycocécidie de l'*Exoascus alutorquus* chez les Aulnes.

D'autres Diptères, *Contarinia betulicola* et *Perrisia alni*, attaquent l'extrémité des jeunes pousses des Bouleaux et des Aulnes qu'ils transforment en cécidies caulinaires constituées par deux feuilles appliquées l'une contre l'autre ; aucune galle semblable n'a encore été rencontrée dans les autres genres, *Carpinus* et *Corylus*, de la même famille.

Les bourgeons sont renflés par des Acariens chez le Bouleau (*Eriophyes rudis*), le Noisetier (*Eriophyes avellanæ*), le Charme (*Eriophyes* sp.) et l'*Ostrya*, qui se rapproche ainsi du Charme.

Très mal connues encore, et exigeant de nouvelles recherches, sont les cécidies caulinaires. C'est ainsi que, chez les Bouleaux et chez les Aulnes, des renflements situés dans la région terminale des rameaux ont été attribués autrefois au *Teras ferruginea* (Syst. Verz.) et que de minimes boursofflures situées près de l'insertion des feuilles sont considérées comme produites par l'*Epiblema tetraquetra*.

Les cécidies des feuilles sont nombreuses et de forme bien caractéristique :

a. Renflement de la nervure médiane, avec chambre larvaire interne, chez presque tous les Bouleaux (*Massalongia rubra*) et les Charmes (*Perrisia carpini*) ;

b. Pustules du limbe dans la plupart des genres de cette famille ; les cécidozoaires sont des diptères non encore obtenus par éclosion, sauf *Contarinia betulina* ;

c. Amas pileux, avec saillie à la face opposée, situés dans l'angle des nervures et engendrés par des Acariens : *Eriophyes rudis* var. *longisetosa* et *Eriophyes lionotus* pour les Bouleaux, *Eriophyes tenellus* pour le Charme, *Eriophyes Nalepai* pour l'Aulne ;

d. Gallés céphalonéiformes dues à d'autres Acariens : *Eriophyes laevis* de l'Aulne et *Eriophyes betulæ*, avec *Eriophyes lionotus*, du Bouleau ;

e. Taches érinéennes, à poils renflés en agaric ou non, produites par des Ériophyides et connues sous les anciens noms d'*Erineum roseum*, *Erineum betulinum*, *Erineum alneum* chez les Bouleaux (*Eriophyes rudis* et variétés) et chez les Aulnes (*Eriophyes brevitarvus*) ;

f. Signalons aussi qu'un autre Acarien, l'*Eriophyes macrotrichus* pro-

duit, chez le Charme, une cécidie très curieuse au point de vue mécanique : sous son action, les nervures secondaires s'allongent considérablement ; mais, arrêtées dans leur elongation par le bord rigide et non déformé du limbe, elles se contournent en une sinusoïde assez régulière ;

g. Grandes boursoufflures observées sur les feuilles des Bouleaux ; elles sont dues à des Hémiptères appartenant aux genres *Chytophorus*, *Callipterus* et *Symylobius* ; les cécidies de l'*Hamamelistes betulinus* sont bien connues grâce aux travaux de Horváth qui correspondent à ceux de Pergande pour le Nouveau-Monde.

~~~~~

### Carpinus Betulus L.

- Ac.bg.** — Bourgeon gonflé, sphérique ou ovoïde, au moins de la grosseur d'un pois, couvert d'une pilosité anormale peu distincte. **Ériophyide** 1037  
 Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 286. I.
- Pl.ra.** — [Nodosités. . . . . **Heterodera radicolica** GREEFF] 1038  
 Trotter, 1905, p. 52-53. I.
- Pl.fe.** { Feuilles brunies . . . . . A.  
 { La forme et la taille des nervures ne sont pas modifiées . . . . . B.  
 { Les nervures prennent part à la formation de la galle . . . . . C.
- A.** — Feuilles brunies. . . . **Phyllocoptes comatus-betuli** NAL. 1039  
 Nalepa, 1898, p. 47, n° 4, b ; Schlechtendal, 1903, p. 124-125. E-C.
- B.** — A la face supérieure, pli vert, jaune ou rouge, faisant saillie entre deux nervures latérales (fig. 205) ; il lui correspond à la face inférieure un sillon qui ne s'ouvre qu'à maturité (fig. 206) et contient de nombreuses larves blanches. M.T.  
**Contarinia carpini** KIEFF. 1040  
 F. Löw, 1877, p. 32-33, n° 1, pl. I, 11, ⊕ ; Massalongo, 1893, p. (233-234), n° 180 ; Trotter, 1903, E-C.  
 p. 16, n° 14 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 246. F.I.M.
- Galle du parenchyme. Larve jaunâtre. . . **Cécidomyide** 1041  
 Rübsaamen, 1895, p. 263, n° 2 ; Massalongo, 1904, p. 115, n° 23. A.I.
- A la face supérieure, à l'aisselle des nervures latérales, boursoufflure à laquelle correspond, à la face inférieure, une dépres-

sion renfermant des poils anormaux. *Erineum pulchellum* Schm.

\* **Eriophyes tenellus** Schm. 1042

F. Löw, 1885, p. 461-462; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. III, n° 55, ♂; Trotter, 1903, p. 17, n° 16; Hieronymus, Pax, etc., 1907, fasc. XV, n° 402, ♂.

E-G, F,  
I, SE.

\* En compagnie de *Phyllocoptes compressus* Nal. (Nalepa, 1898, p. 9, n° 12, p. 46, n° 3).

— Érinéum le plus souvent hypophylle situé dans des dépressions allongées et étroites comprises entre les nervures secondaires et accompagnées d'un léger soulèvement sur la face supérieure; poils unicellulaires, cylindriques, à extrémité arrondie.

**Ériophyide** 1043

Trotter, 1903, p. 16-17, n° 15; 1904, p. 72-73, n° 6.

I, SE,  
A-M.

C. — Les deux moitiés du limbe se replient par en haut autour de la nervure médiane formant charnière et considérablement renflée. Larves blanches. M. T.

**Cécidomyide** 1044

Rubsaamen, 1889, p. 60, n° 1; 1890, p. 33, n° 34, pl. II, 3, ♂.

E-G.



*Carpinus Betulus*

*Contaritia carpini* (n°1040)

Fig. 205 (a). — D'ap. nat.

Fig. 206 (b). — D'ap. nat.




*Carpinus Betulus*

*Perrisia carpini* (n°1045)

Fig. 207 (a). — D'ap. nat.

Fig. 208 (b). — D'ap. nat.



*Carpinus Betulus*

*Eriophyes macrotrichus* (n°1046)

Fig. 209 (a). — D'ap. nat.

Fig. 210 (b). — D'ap. nat.

— Entre deux nervures latérales dont la base est renflée, la nervure médiane présente un renflement (fig. 207) ayant dans sa partie inférieure deux séries de cavités (fig. 208) contenant chacune une larve. M. T.

**Perrisia carpini** F. Löw 1045

F. Löw, 1874<sup>b</sup>, p. 157, n°3, pl. II, 5, ⊕; Massalongo, 1893, p. (79-80), n°41, pl. X, 5, ⊕; Trotter *E. G. S. E.*, et Cecconi, 1901, fasc. III, n°56, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1906, fasc. XIV, n°38<sup>a</sup>, ⊕. *I. F. A. M.*

— Plis sinusoïdaux allant du bord du limbe à la nervure médiane (fig. 209), faisant saillie sur la face inférieure (fig. 210) et crispant les nervures latérales. *Legnon confusum* BREMI, *Cris-taria carpini* VALLOT. **Eriophyes macrotrichus** NAL. 1046

Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n°9, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. I, n°4, ⊕.

*E. T.*

\* En compagnie de *Phyllocoptes carpini* Nal. (Nalepa, 1898, p. 9, n°11, p. 46, n°2).

*A. M.*

### **Carpius duinensis** Scop.

Pl. fe. — Sur les feuilles, petites nodosités jaune blanchâtre faisant saillie sur les deux faces et présentant une ouverture arrondie à la face inférieure.

**Eriophyide** 1047

Rubsaamen, 1895, p. 405-406, n°13, pl. XV, 24, ⊕.

*R.*

— Feuilles arrêtées dans leur croissance et un peu repliées par en haut.

**Aphide** 1048

Rubsaamen, 1895, p. 425-426, n°47; Schouteden, 1903, p. 171.

*R.*

### **Carpius orientalis** MILLER

Pl. fe. — Plis sinusoïdaux. Voir n° 1046. **Eriophyes macrotrichus** NAL. 1049

Trotter, 1905 b, p. 98, n°4; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIII, n°311, ⊕.

*I.*

### **Carpius Heeri** ETTINGSH. (fossile)

Pl. fe. — Macules irrégulièrement arrondies, de 1-3,5 mm. de diamètre.

*Phyllerites palae-carpini* ETTINGSH.

**Eriophyidites** 1050

Ettingshausen, 1888, p. 264, pl. I, 3, ⊕; Meschinelli, 1892, p. 807, n°11; 1898, p. 106, pl. XXX, 5-5a, ⊕; Trotter, 1903<sup>a</sup>, p. 17.

*A. H.*

### **Ostrya carpinifolia** Scop.

Ac. bg. — Bourgeons renflés restant fermés. Plusieurs larves, M. T.

**Cécidomyide** 1051

Trotter, 1899, p. 285, n°7, pl. XVIII, 10; 1901<sup>d</sup>, p. 366-367, n°21; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVII, n°415, ⊕.

*I.*

**Corylus Avellana L. (et var. laciniata)**

**Ac.inf.** — Chaton renflé, plus ou moins piriforme, à écailles agrandies et lisses (fig. 211). Larves grégaires blanches. M. T. II.

**Stictodiplosis corylina F.Löw 1052**

F.Löw, 1878<sup>b</sup>, p. 396-397, pl. IV, 5, ⊕; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. IX, n° 223, ⊕. E-T.

— Même déformation, mais les écailles ont une surface plus ou moins rugueuse. **Ériophyde 1053**


Rübsaamen, 1890, p. 34, n° 39; Schlechtendal, 1895, p. 10. A, E-C.

-- Chaton prolifère. . . . . **Ériophyde 1054**

Dalla Torre, 1892, p. 117, b; 1895, p. 140, b; Schlechtendal, 1895, p. 10. E-C.



*Corylus Avellana*  
*Stictodiplosis corylina* (n°1052)  
Fig. 211. — D'ap. nat.



*Corylus Avellana*  
*Eriophyes avellanæ* (n°1056)  
Fig. 212 (a) — D'ap. nat.  
Fig. 213 (b). — D'ap. nat.

**Ac.ti.** — Entre-nœuds terminaux d'une pousse très raccourcis; feuilles petites, enroulées, plissées et frisées, couvertes de poils anormaux. **Eriophyes vermiformis NAL. 1055**

Martel, 1893, p. 8-9, n° 156; Nalepa, 1898, p. 10, n° 14. E-C, F, si.

**Ac.bg.** — Bourgeon déformé, hypertrophié, presque sphérique, pouvant atteindre 10 mm. de diamètre (fig. 212) et composé d'écailles épaissies dont les plus internes sont couvertes d'émergences semblables à de petites verrues (fig. 213).

\* **Eriophyes avellanæ NAL. 1056**



Vallot, 1834, p. 153; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. III, n° 59, ⊕; Connold, 1901, pl. XLVII, ⊕; Grevillins et Niessen, 1906, fasc. I, n° 3, ⊕.

\* Avec *Eriophyes vermiformis* Nal. et *Anthocoptes loricatus* Nal. (Nalepa, 1898, p. 9-10, n° 13, p. 10, n° 14, p. 59, n° 1).

— Bourgeon grossi devenu globuleux et contenant une chenille dans une grande cavité centrale. **Lépidoptère** 1037

Cecconi, 1902<sup>b</sup>, p. 345-346, n° 9; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 298, 559. *I.*

**Pl. ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radicola** GREEFF 1038

Trotter et Cecconi, 1904, fasc. IX, n° 224, ⊕; Trotter, 1904<sup>e</sup>, p. 37-67, 7 fig., ⊕. *I.*

**Pl. fe.** — Cécidie consistant en un épaissement de la nervure, visible sur les deux faces du limbe, qui rappelle la galle de l'*Oligotrophus Lemeei* sur les feuilles d'Orme. Cavité larvaire unique à parois ligneuses; surface de la cécidie couverte de poils glanduleux. M.T. **Cécidomyide** 1039

Trotter, 1903, p. 18-19, n° 23, pl. I, 1, ⊕. *A-M.*

— A la face inférieure du limbe, excavations circulaires, entourées d'une zone un peu décolorée, mesurant 3-5 mm. de diamètre; la partie déformée est légèrement épaissie. Une larve hyaline, brillante. M.T. **Oligotrophus coryli** KIEFF. 1060

Rübsaamen, 1891<sup>b</sup>, p. 404, n° 4; Massalongo, 1903, p. 37-38, n° 3. *A, I.*

— Dans le parenchyme foliaire, petites cécidies de forme circulaire. **Cécidomyide** 1061

Kieffer, 1897<sup>e</sup>, p. 19, n° 2; Lemée, 1902, p. (41), n° 174. *A, F.*

— Limbe plissé. . . . . **Diplosine** 1062

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 298; Loisele, 1903, p. 13. *E-C, F.*

— Limbe brun. . . . . \* **Phyllocoptes comatus** NAL. 1063

Nalepa, 1892, p. 19; 1898, p. 47, n° 4 a; Schlechtendal, 1895, p. 3 n° 3.

\* Avec *Oxypleurites depressus* Nal. (Nalepa, 1898, p. 67, n° 3).

**Corylus tubulosa** WILLD. (**C. purpurea** HORT.)

**Ac. inf.** — Chaton renflé. Voir n° 1052. . **Stictodiplosis corylina** F. LÖW 1064

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 297. *A.*

**Ac. bg.** — Bourgeons hypertrophiés, à écailles pubescentes et verruqueuses. **[Eriophyes avellanæ NAL.]** 1065

Kieffer, 1892<sup>e</sup>, p. 120, n° 40; Baroni, 1895, p. 177-178. *A, I.*


**Pl. fe.** — Excavations circulaires à la face inférieure du limbe. Voir n° 1060. **Oligotrophus coryli** KIEFF. 1066  
 Kieffer, 1897<sup>c</sup>, p. 19, n° 1; 1901<sup>b</sup>, p. 298. A



**Betula verrucosa** EHRL. (**B. alba** L.)

**Ac. fr.** — Fruit renflé, oviforme (fig. 214-217). Une larve rouge. M.C.H. **Oligotrophus betulæ** WINN. 1067  
 F.Löw, 1878<sup>b</sup>, p. 399-401, n° 1, pl. IV, 4, ⊕; Liebel, 1889, p. 300, n° 345; Kertész, 1902, p. 72-73. E-T.


**Ac. fl.** — Chaton grossi. . . . . **Cécidomyide** 1068  
 Binnie, 1877, p. 182; Connold, 1901, pl. CXX, ⊕. E-O.



**Betula verrucosa**  
*Oligotrophus betulæ* (n° 1067)  
 Fig. 214, 215 (a, b). — Im. F.Löw  
 Fig. 216, 217 (c, d). — Im. F.Löw



**Betula verrucosa**  
*Eriophyes rudis* (n° 1072)  
 Fig. 218. — D'ap. nat.



**Betula verrucosa**  
*Massalongia rubra* (n° 1075)  
 Fig. 219 (a). — D'ap. nat.  
 Fig. 220 (b). — D'ap. nat.

**Ac. ti.** — Feuilles terminales présentant un plissement vers le haut le long de la nervure médiane, épaissies sur ce pli et sur la base des nervures latérales, contournées souvent en cuiller; feuilles colorées en rouge. Larves blanches. M.T. **Contarinia betulicola** KIEFF. 1069

Hieronymus, 1890, p. 125, n° 390; Martel, 1893, p. 5-6, n° 145; Kertész, 1902, p. 92; Trotter, 1906, p. 112-113, n° 5; Hieronymus, Pax, etc., 1906, fasc. XIV, n° 380, ⊕. E-C, F.I.

— Renflement de la partie terminale d'un rameau.

**Lépidoptère 1070**

Rübsaamen, 1889, p. 63, n° 3 ; 1890, p. 33, n° 29.

*E-C, E-O.*

**Ac.bg. — Bourgeons gonflés. . . . . Cécidomyide 1071**

Hieronymus, 1890, p. 65, n° 58 ; Lemée, 1902, p. (33), n° 78 ; Trotter, 1906, p. 113, n° 7.

*E-C, E-O.*

— Bourgeons grossis, pouvant atteindre 10 mm. de diamètre, avec écailles mal imbriquées (fig. 218) dont la pointe est plus ou moins recourbée en dehors. Souvent les bourgeons sont plus petits (6 mm. au plus), ovoïdes et à écailles si étroitement imbriquées que l'on aperçoit seulement les plus externes. Le rameau, toujours épaissi au dessous de la cécidie, est le plus souvent arrêté dans son développement ; s'il continue à croître, ses entre-nœuds demeurent courts dans la plupart des cas.

**Eriophyes rudis CAN. 1072**

Thomas, 1876, p. 257-259, n° 1, pl. IX, 1-8, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 159, ⊕ ; Kieffer, 1892<sup>c</sup>, p. 118, n° 26, fig. 1, ⊕ ; Martel, 1893, p. 6, n° 147, pl. IV, 8, ⊕ ; Nalepa, 1898, p. 8, n° 9a ; Connold, 1901, pl. LXIII, ⊕

*E-T.*

— Petits bourgeons réunis en grand nombre et constituant une masse irrégulière, légèrement velue.

**Eriophyide 1073**

Trotter, 1901<sup>f</sup>, p. 165-167, t. fig. ⊕.

*S.*

**Pl.ti. —** Sur le rameau et au-dessous d'un nœud, renflement ovoïde ou arrondi. Trou de sortie à l'aisselle de la feuille. Chenille blanc sale.

**Epiblema tetraquetra HAWORTH 1074**

Schlechtendal, 1895, p. 9 ; Rübsaamen, 1901, p. 114, n° 34.

*E-C.*

**Pl.fe.** { Déformation sans pilosité anormale. . . . . A.  
Déformation apparente avec pilosité anormale. . . . . B.  
Pilosité anormale sans déformation . . . . . C.

**A. —** Sur la nervure médiane ou sur les nervures latérales, renflement fusiforme, allongé, de couleur verte ou violette (fig. 219-220), contenant des larves grégaïres, d'abord blanches, plus tard d'un rouge brillant, se métamorphosant sous la feuille desséchée, hors de la cécidie.

**Massalongia rubra KIEFF. 1075**

Rübsaamen, 1889, p. 62-63, n° 1, Lemée, 1902, p. (33-34), n° 79 ; Trotter, 1906, p. 113, n° 6.

*E-C, F.I.*

— Sur le limbe, pustules arrondies de 3-4 mm. de diamètre (fig. 221), peu saillantes sur les deux faces (fig. 222), jaunâtres

HOVARD, *Zoocécidies.*

et à bord teinté de rouge. Une seule larve blanche, puis jaune soufre. M.T.

**Contarinia betulina** KIEFF. 1076

Hieronymus, 1890, p. 125, n° 391; Martel, 1893, p. 5, n° 144; Lagerheim, 1905, p. 13. E-C, E-O.

— A la face supérieure de la feuille, bosselures plus ou moins saillantes, de forme irrégulière, pouvant atteindre 10 mm. et plus. Pucerons ailés noirs, avec ailes à plat.


**Hamamelistes betulinus** HORVATH 1077

Kieffer, 1894, p. 295-296; Horvath, 1901, p. 165-168; Schouteden, 1903, p. 170. E-C.

— Feuilles plissées, à bords plus ou moins repliés par en bas. Pucerons ailés avec ailes formant toit et alors d'un jaune brunâtre, ou sans ailes et alors noirs avec abdomen annelé de jaune.


**Chætophorus annulatus** KOCH 1078

Schlechtendal, 1890, p. 13, n° 112; Schouteden, 1903, p. 171. E-C.




*Betula verrucosa*  
*Contarinia betulina* (n°1076)

Fig. 221 (a). — D'ap.nat.  
Fig. 222 (b). — D'ap.nat.



*Betula verrucosa*  
*Eriophyes betula* (n°1080)

Fig. 223 (a). — D'ap.nat.  
Fig. 224 (b). — D'ap.nat.



*Betula verrucosa* et *B. pubescens*  
*Eriophyes rudis* (n°1085)  
*Eriophyes lionotus* (n°1095)

Fig. 225 (a). — D'ap.nat.  
Fig. 226 (b). — D'ap.nat.

— Même déformation. Pucerons sans ailes, jaunes avec des taches noires et une bande transversale rouge minium.

**Callipterus tricolor** KOCH 1079

Schlechtendal, 1890, p. 13, n° 113; Schouteden, 1903, p. 171. E-C.

B. — Sur le limbe, petites cécidies vertes ou rouges, plus tard brunes, généralement nombreuses (fig. 223), très saillantes à

la face inférieure où elles ont une forme à peu près cylindrique et peu apparentes à la face supérieure (fig. 224; cette figure doit être renversée) où la saillie subconique n'a que 0,3-0,6 mm. de hauteur; à la face supérieure ouverture avec petit bouquet de poils courts et dressés; la cavité est glabre. *Cephaloneon betulinum* BREML.

\* *Eriophyes betulæ* NAL. 1080

*Eriophyes lionotus* NAL. 1081

Thomas, 1876, p. 266-269, n° 10, pl. X, 12-15, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 8, ⊕; Lindroth, 1899, p. 10; Lagerheim, 1905, p. 6, n° 2.

E-T.

\* Commensal: *Epitrimerus acromius* Nal. (Nalepa, 1898, p. 9, n° 10, p. 63, n° 4).

— Sur le pétiole, ou sur les nervures des feuilles abondamment pourvues de la cécidie précédente, petites galles en corne courbée, glabres, de 2 mm. de long, ou encore cécidies en forme de verrue de 0,5-1 mm. de haut. A la pointe, ouverture dont les cellules limitantes ont des prolongements filiformes gris argenté. La cavité est tapissée de poils isolés, courts, pointus et unicellulaires.

[*Eriophyes betulæ* NAL.] 1082

Hieronymus, 1890, p. 64-65, n° 57; Schlechtendal, 1890, p. 13, n° 111.

E-C.

— Sur le limbe, à l'aisselle des nervures, cécidies en forme de bourse, de 1-3 mm. de haut sur 2 mm. de large, garnies de poils blanchâtres à la face inférieure.

*Eriophyes rudis* CAX. var. *longisetosa* NAL. 1083

Hieronymus, 1890, p. 64, n° 56; Nalepa, 1898, p. 8, n° 9 b.

E-C.

C. — A la face supérieure de la feuille, petites taches irrégulières allongées d'un feutrage d'aspect grumelleux et de couleur rouge-carmin au printemps, rouge-sang en automne. Poils très courts en agaric. *Erineum roseum* SCHULTZ.

*Eriophyes rudis* CAX. var. *longisetosa* NAL. 1084

Fée, 1834, p. 116, n° 48, pl. VI, 5, ⊕; F. Löw, 1885, p. 460-461.

E-T.

— A la face inférieure de la feuille (fig. 225), et plus rarement à la face supérieure ou sur les deux faces, taches blanchâtres ou rougeâtres, d'aspect grumelleux, formées par un feutrage de poils en agaric, plus longs que dans la cécidie précédente. *Erineum betulinum* SCHUM.

*Eriophyes rudis* CAX. 1085

Fée, 1834, p. 122, n° 64 pl. VI, 2, ⊕; Hieronymus, 1890, p. 64, n° 55; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 7, ⊕; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n° 7, ⊕.

E-T.

**Betula pubescens** EHRH.

- Ac.fr.** — Fruit gonflé. Une larve rouge. M.C.  
*Oligotrophus betulæ* WINN. 1086  
 Kertész, 1902, p. 72-73 ; Kieffer, 1898<sup>c</sup>, p. 22 ; 1901<sup>b</sup>, p. 271. E-C.
- Ac.ti.** — Les feuilles terminales d'un rameau, épaissies à la base, ont leurs bords incurvés vers le haut et prennent la forme d'une cuiller à concavité tournée vers le rameau ; leurs nervures hypertrophiées sont teintées de rouge et le limbe est recouvert de poils anormaux formant feutrage. Larves blanches M.T.  
*Contarinia betulicola* KIEFF. 1087  
 Martel, 1893, p. 5-6, n° 145 ; Kieffer, 1898<sup>c</sup>, p. 32 ; 1901<sup>b</sup>, p. 271. E-C, F.  
 — Rameau renflé à son extrémité. . . . . **Lépidoptère** 1088  
 Rubsamen, 1889, p. 63, n° 3 ; 1890, p. 33, n° 29. E-C.
- Ac.bg.** — Bourgeon grossi et déformé. Voir n° 1072.  
*Eriophyes rudis* CAN. 1089  
 Hieronymus, 1890, p. 64, n° 54 ; Nalepa, 1898, p. 8, n° 9 a ; Rubsamen, 1901, p. 113, n° 28. E-C, E-N.
- Pl.ti.** — Sur un rameau, renflement arrondi ou ovoïde, au-dessous du point d'insertion d'un pétiole ; trou de sortie de l'animal à l'aisselle de la feuille.  
*Epiblema tetraquetra* HAWORTH 1090  
 Schlechtendal, 1895, p. 8 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 270. E-C.
- Pl.fe.** { Déformation sans pilosité anormale . . . . . A  
 { Déformation avec pilosité anormale . . . . . B.  
 { Pilosité anormale sans déformation . . . . . C.
- A.** — Renflement vert ou rouge sur la nervure médiane. Voir n° 1075.  
*Massalongia rubra* KIEFF. 1091  
 Liebel, 1886, p. 537, n° 42 ; Rubsamen, 1901, p. 86, p. 93, n° 42, p. 113, n° 31, fig. 10, ⊕. E-C, E-O.  
 — Pustules arrondies du parenchyme. Voir n° 1076.  
*Contarinia betulina* KIEFF. 1092  
 Kieffer, 1889, p. 153-155 ; Hieronymus, 1890, p. 124-125, n° 389 ; Kertész, 1902, p. 92. E-C, E-N.  
 — Feuilles crispées. Pucerons ailés, bruns ou verts, avec ailes en toit.  
*Symydobius oblongus* HEYDEN 1093  
 Kieffer, 1891<sup>f</sup>, p. 21 ; 1901<sup>b</sup>, p. 271 ; Schouteden, 1903, p. 170. E-C.

— A la face supérieure du limbe, bosselure de forme irrégulière. Pucerons ailés noirs avec ailes à plat.

**Hamamelistes betulina** HORVÁTH 1094

Liebel, 1889, p. 300-301, n° 348 ; Horváth, 1896, p. 6-7 ; Kieffer, 1896<sup>c</sup>, p. 228-229.

E-C.

B. — A la face inférieure, le plus souvent à l'aisselle des nervures, dans une dépression à laquelle correspond une saillie à la face supérieure, amas de poils cylindriques, contournés (fig. 226). *Phyllerium tortuosum* GREVILLE. **Eriophyes lionotus** NAL. 1095

Greville, 1874, pl. LXXXIV, 1-4, ⊕ ; Liebel, 1886, p. 537, n° 45 ; F. Löw, 1888<sup>c</sup>, p. 538, n° 4 ; Nalepa, 1898, p. 9, n° 10.

E-T.

— Sur le limbe en général, plus rarement à l'aisselle des nervures, écidie vert clair en forme de bourse saillante à la face supérieure, avec poils plus ou moins nombreux à la face supérieure et poils simples, raides, blanc jaunâtre à la face inférieure.

**Ériophyide** 1096

Thomas, 1893<sup>b</sup>, p. 7 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 272.

E-C.

— A l'aisselle des nervures, saillie de forme irrégulière à laquelle correspond, à la face inférieure, une dépression avec poils bruns cylindriques, formant feutrage. La face supérieure est glabre ou présente quelques poils courts.

**Eriophyes rudis** CAN. var. **longisetosa** NAL. 1097

Liebel, 1886, p. 537, n° 47 ; Rübbsaamen, 1890, p. 32, n° 23 ; 1901, p. 11 3, n° 29.

E-C.

C. — *Erineum roseum* SCHULTZ, épiphyllé, à poils courts. Voir n° 1084. **Eriophyes rudis** CAN. var. **longisetosa** NAL. 1098

F. Löw, 1885, p. 455, 460-461 ; Hieronymus, 1890, p. 63-64, n° 52.

E-T.

— *Erineum betulinum* SCHUM., le plus souvent hypophylle, à poils longs. Voir n° 1085. **Eriophyes rudis** CAN. 1099

F. Löw, 1885, p. 460-461 ; Hieronymus, 1890, p. 63, n° 51 ; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n° 58, ⊕.

E-T.

### **Betula intermedia** BECHST.

Pl. fe. — Nervure médiane renflée. Voir n° 1075.

**Massalongia rubra** KIEFF. 1100

Dalla Torre, 1893<sup>b</sup>, p. 7.

E-C.

**Betula nana L.**

- Ac.bg.** — Bourgeon gonflé. Voir n°1072. . . . **Eriophyes rudis CAN.** 1101  
Lindroth, 1899, p. 9. E-N.
- Pl.fe.** — *Erineum roseum* SCHULTZ. Voir n°1084.  
[**Eriophyes rudis CAN. var. longisetosa NAL.**] 1102
- *Erineum betulinum* SCHUM. Voir n°1085.  
[**Eriophyes rudis CAN.**] 1103  
F. Löw, 1885, p. 460-461 ; 1888<sup>c</sup>, p. 539, note 2 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 272-273. E-C.
- Érinéum. . . . . \***Eriophyes fennicus LINDROTH** 1104  
Lindroth, 1899, p. 11-12, 22. — \*Avec *Epitrimerus acromius* Nal. E-N.

**Betula humilis SCHRANK**

- Pl.fe.** — Érinéum rouge sang formé de poils courts. *Erineum roseum* SCHULTZ. Voir n°1084.  
[**Eriophyes rudis CAN. var. longisetosa NAL.**] 1105  
Schultz, 1806, p. 506, n° 1481. E-C.
- A la face supérieure généralement et le plus souvent le long des nervures latérales, érinéum d'aspect granuleux, jaune blanchâtre, formant feutrage et constitué par des poils en massue. **Ériophyide** 1106  
Hieronymus, 1890, p. 63, n° 50 ; Schlechtendal, 1895, p. 8. E-C.

**Betula odorata REHB.**

- Ac.fr.** — Fruit gonflé. Voir n°1067. . . . **Oligotrophus betulæ WINN:** 1107  
Rostrup, 1896, p. 18, n° 109. E-N.
- Ac.bg.** — Bourgeon gonflé. Voir n°1072. . . . **Eriophyes rudis CAN.** 1108  
Rostrup, 1896, p. 18, n° 110 ; Lindroth, 1899, p. 9-10. E-N.
- Pl.fe.** — Limbe bosselé. Voir n°1077.  
**Hamamelistes betulinus HORVATH** 1109  
Lagerheim, 1905, p. 21. E-N.



- Cécidie céphalouéiforme. . . . . **Eriophyes rudis** CAN. 1110  
**Eriophyes lionotus** NAL. 1111  
 Lindroth, 1899, p. 10-11. E-N.
- Cécidie céphalouéiforme axillaire. Voir n° 1083.  
**Eriophyes rudis** CAN. var. **longisetosa** NAL. 1112  
 Rostrup, 1896, p. 18, n° 111. E-N.
- *Erineum roseum* SCHULTZ. Voir n° 1084.  
**Eriophyes rudis** CAN. var. **longisetosa** NAL. 1113  
 Rostrup, 1896, p. 18, n° 112 ; Lagerheim, 1905, p. 6, n° 2. E-N.
- Production érinéenne. . . . . **Eriophyes rudis** CAN. 1114  
 Lindroth, 1899, p. 9-10 ; Lagerheim, 1905, p. 6, n° 1. E-N.

### **Betula pendula** ROTH

- Ac. fr.** — Fruit gonflé. . . . . **Oligotrophus betulæ** WINN. 1115  
 Kieffer, 1901b, p. 270-271. E-C.
- Pl. ti.** — Minime bosselette. . . . . **Lestes viridis** VAN DER LIND. 1116  
 Pierre, 1902, p. 185. F.



### **Alnus viridis** DC.

- Pl. fe.** — [*Erineum arillare* FÉE]. Voir n° 1132.  
**Eriophyes Nalepai** FOCKEU] 1117  
 Fée, 1834, p. 101, n° 13, pl. I 5, ⊕ ; Thomas, 1869, p. 337. E C, I.
- Pubescence jaunâtre située à l'aisselle des nervures secondaires, mais sans élévation correspondante sur la face opposée ; poils simples, effilés. **Eriophyide** 1118  
 Trotter, 1903c, p. 30, B. R.
- [*Cephaloneon pustulatum* BREMI]. Voir n° 1128.  
**Eriophyes lævis** NAL. 1119  
 Nalepa, 1898, p. 7-8, n° 7. E-C.
- A la face supérieure des feuilles, ou plus rarement à la face inférieure, amas de poils d'une belle teinte rouge (fig. 227-228), cylindriques, à extrémité mousse (fig. 229). *Phyllerium purpureum* DC. **Eriophyes brevitarsus** FOCKEU] 1120  
 Nalepa, 1898, p. 8, n° 8. Trotter et Ceconi, 1902, fasc. VII, n° 155, ⊕ ; Trotter, 1903c, p. 30 A. E-T.

**Alnus cordifolia** TEN. (**A. cordata** LOIS.)Pl.fe. — (*Erineum alneum* PERS.]. Voir n° 1133.**Eriophyes brevitarsus** FOCKEU 1121

Thomas, 1877, p. 354, n° 1; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. IX, n° 211, ⊕.

I.

**Alnus glutinosa** GLERTN.

Ac.ti. — Rameau renflé dans la partie terminale. . . Lépidoptère 1122

Schlechtendal, 1890, p. 11, n° 84.

E-G.

Pl.ti. — Léger renflement situé sur un rameau à la base d'un  
pétiole. **Epiblema tetraquetra** HAWORTH 1123

Rübsaamen, 1890, p. 31, n° 15; 1901, p. 110, n° 14.

E-G.

— Dans l'écorce, parties déprimées avec épaissement local  
périphérique. **Chionaspis alni** SIGN. 1124

Schlechtendal, 1895, p. 8.

E-G.

— Minime bosselette. . . . . **Lestes viridis** VAN DER LIND. 1125

Pierre, 1902, p. 184; Lemée, 1902, p. (30), n° 52; 1903, p. 32-33.

F.

— Légère bosselette. . . . . **Tettigonia viridis** L. 1126

Pierre, 1906, p. (6), fig. 7, 15, ⊕.

F.

|        |   |                                                                                                   |    |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pl.fe. | { | Déformation très apparente ne laissant apercevoir à l'extérieur aucune pilosité anormale. . . . . | A. |
|        |   | Pilosité anormale accompagnée d'une déformation plus ou moins apparente. . . . .                  | B. |
|        |   | Pilosité anormale sans trace de déformation. . . . .                                              | C. |
|        |   |                                                                                                   |    |

A. — Feuilles plissées, crispées par en haut, épaissies et n'ayant que le tiers de la taille normale; les nervures sont épaissies surtout dans leur partie basilaire (fig. 230-231). Larves grégaires blanches, puis rouges. M.T. Après la migration des larves la cécidie se dessèche et le reste de la feuille reprend sa croissance arrêtée jusque-là.

**Perrisia alni** F.Löw 1127

F.Löw, 1877, p. 2-4; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n° 202, ⊕; Kertész, 1902, p. 32.

E-T.


— A la face supérieure de la feuille, petites excroissances rouges, de la grosseur d'un grain de chènevis, subsphériques, étranglées à la base (fig. 232); ces galles s'ouvrent à la face inférieure par un ostiole situé sur une minime saillie entou-

rée d'une gouttière circulaire (fig.233); il faut ouvrir la galle pour constater l'existence de poils anormaux cylindriques qui forment une sorte de bourre remplissant la cavité. *Cephaloneon pustulatum* BREML.

**Eriophyes lævis** NAL. 1128

Rübsaamen, 1895, p.402, n°6, pl.XV, 23, ⊕; Fockeu, 1896, p.121-127, pl. IX, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n°5, ⊕; Massalongo, 1901, p.87, l. pl. I, 1, ⊕; Connold, 1901, pl. LIV, ⊕; Tavares, 1907 b, pl. III, 22, ⊕.

E-T.




*Alnus viridis*

*Eriophyide* (n°1120)

Fig.227 (a). — D'ap.nat.

Fig.228 (b). — D'ap.nat.

Fig.229 (c). — D'ap.nat.




*Alnus glutinosa*

*Perrisia alni* (n°1127)

Fig.230 (a). — D'ap.nat.

Fig.231 (b). — D'ap.nat.



*Alnus glutinosa*

*Eriophyes lævis* (n°1128)

Fig.232 (a). — D'ap.nat.

Fig.233 (b). — D'ap.nat.

— Sur le limbe, boursouffure peu saillante, mais étendue, à contours mal définis, avec décoloration et plus tard brunissement.

**Oxypleurites heptacanthus** NAL. 1129

**Oxypleurites Trouessarti** NAL. 1130

Leonardi, 1894, p.325, n°16-17; Schlechtendal, 1895, p.8; Nalepa, 1898, p.66-67, n°1-2.

E-G.

— Boursouffure décolorée. . . . **Epitrimerus trinotus** NAL. 1131

Nalepa, 1898 p 62, n°2.

E-G.


B. — A l'aisselle des nervures, saillies très apparentes, de forme hémisphérique, visibles à la face supérieure (fig.234); il leur correspond, à la face inférieure (fig.235) une dépression assez marquée, largement ouverte, et dans laquelle on peut observer des poils blanchâtres ou d'un jaune-brun clair (fig.236). Les

poils de la cavité sont de deux sortes : les uns cylindriques, à pointe mousse, pluricellulaires, sont des poils normaux un peu modifiés, à paroi épaisse, tordus et enchevêtrés ; les autres, plus courts et plus trapus, sont unicellulaires. — Le plus souvent la galle se reproduit à l'aisselle de chacune des nervures secondaires et il peut se faire alors que la feuille s'incurve vers la face inférieure en rapprochant ses bords, de façon à prendre une forme en cuiller. *Erineum axillare* FÉE.

### *Eriophyes Nalepai* FOCKE 1132

Martel, 1893, p. 3, n° 139, pl. IV, 11, ⊕; Focken, 1896, p. 115-121, pl. VIII, 4-8, ⊕; Massalongo, 1901, p. 87-88, II, pl. L2, ⊕; Connold, 1901, pl. XLVIII, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. V, n° 102, ⊕; Tavares, 1905, p. 2, pl. X, 13, ⊕; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n° 6, ⊕.

E-T.




*Alnus glutinosa*

*Eriophyes Nalepai* (n° 1132)

Fig. 234 (a). — D'ap. nat.

Fig. 235 (b). — D'ap. nat.

Fig. 236 (c). — D'ap. nat.



*Alnus glutinosa*

*Eriophyes brevitarsus* (n° 1133)

Fig. 237 (a). — D'ap. nat.

Fig. 238 (b). — D'ap. nat.

Fig. 239 (c). — D'ap. nat.

— A la face inférieure ou très rarement à la face supérieure, amas, d'abord blancs puis brunâtres, de poils unicellulaires dont l'extrémité, fortement renflée, s'étale et présente des prolongements mamelonnés de forme très variable ; saillie légère à la face supérieure (fig. 237-239). *Erineum alnum* PERS.

### \* *Eriophyes brevitarsus* FOCKE 1133

Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 52, ⊕; Focken, 1896, p. 111-115, pl. VIII, 2-3, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. V, n° 101, ⊕; Tavares, 1905, p. 2, pl. X, 10, ⊕.

E-T.

\* Avec *Epitrimerus longitarsus* Nal. (Nalepa, 1898, p. 8, n° 8, p. 62, n° 3; Lindroth, 1899, p. 22).

— Sur le dessous des feuilles, taches éparses formées par des amas de poils allongés, cylindriques, blanchâtres ; une saillie correspondante se remarque à la face supérieure. **Ériophyide** 1134  
 Liebel, 1886, p. 535, n° 27 ; Kieffer, 1892<sup>c</sup>, p. 102, n° 18 ; Trotter, 1903<sup>b</sup>, p. 8, n° 2. A. I.

C. — A la face inférieure, des poils bruns peu différents des poils normaux forment des rangés anormales le long des nervures. **Ériophyide** 1135  
 Liebel, 1886, p. 535, n° 29 ; Lemée, 1902, p. (30), n° 4<sup>e</sup> ; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 339. A. P.

### **Alnus incana** DC.

Pl. fe. — [*Erineum arillare* FÉE]. Voir n° 1132. **[Eriophyes Nalepai FOCKEU]** 1136

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 250 ; Cecconi, 1906, p. 39, n° 2. A. I.

— Limbes crispés. Voir n° 1127. **Perrisia alni** F. LÖW 1137

Bremi, 1847, p. 29, n° 33, pl. II, 34, ⊕. F. Löw, 1877, p. 4 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. IX, n° 252. E-C, I.  
 ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIII, n° 306, ⊕.

— *Cephaloneon pustulatum* BREMI. Voir n° 1128. **Eriophyes lævis** NAL. 1138

Thomas, 1869, p. 333-334, n° 6 a ; Hieronymus, 1890, p. 60, n° 33 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 53, ⊕ ; Lindroth, 1899, p. 7-8 ; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. III, n° 51, ⊕. E-T.

— A la face inférieure, ou rarement à la face supérieure de la feuille, amas de poils cylindriques, d'abord gris jaunâtre, plus tard brunâtres, irrégulièrement enroulés et à extrémité mousse. *Phyllerium aluigenum* KUNZE.

**Eriophyes brevitarsus** FOCKEU 1139

Fée, 1834, p. 108-109, n° 30, pl. II, 4, ⊕ ; F. Löw, 1874, p. 7, n° 12 ; Nalepa, 1898, p. 8, n° 8 ; Lindroth, 1899, p. 8-9 ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. IX, n° 253, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIII n° 307, ⊕. E-T.

— A la face inférieure des feuilles, amas de poils différent à peine des poils normaux ; l'emplacement de ces amas est marqué à la face supérieure par une saillie légère. **Ériophyide** 1140  
 Kieffer, 1894, p. 295, n° 2 ; 1901<sup>b</sup>, p. 251 ; Schlechtendal, 1895, p. 8. E-C.

### **Alnus pubescens** TAUSCH (*glutinosa* × *incana* WIRTGEN)

Pl. fe. — Feuille plissée et crispée. Voir n° 1127. **Perrisia alni** F. LÖW 1141

Thomas, 1877, p. 354, n° 1 ; Kertész, 1902, p. 3<sup>e</sup>. E-C.

- [*Cephaloneon pustulatum* BREMI]. Voir n° 1128.  
 [Eriophyes lævis NAL.] 1142  
 Schlechtendal, 1890, p. 12, n° 95 ; Lindroth, 1899, p. 7-8. *E-C, E-N*.
- [*Erineum axillare* FÉE]. Voir n° 1132.  
 Eriophyes Nalepai FOCKEU 1143  
 Schlechtendal, 1890, p. 12, n° 96 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 250. *E-C*.
- [*Erineum alneum* PERS.]. Voir n° 1133.  
 Eriophyes brevitarsus FOCKEU 1144  
 Thomas, 1877, p. 354, n° 1 ; Fockeu, 1894<sup>b</sup>, p. 437 ; Lindroth, 1899, p. 8-9. *E-N, E-C, F*.

**Alnus similis** GÖPP. (fossile)

- Pl. fe. — Taches pileuses. . . . . Eriophyidites 1145  
 Meschinelli, 1892, p. 808, n° 14 ; 1898, p. 107, pl. XXX, 6, ⊕ ; Trotter, 1903<sup>c</sup>, p. 16. *E-C*.

**Alnus gracilis** UNGER (fossile)

- Pl. fe. — Macules arrondies ou elliptiques, de 0,5-1,5 mm. de diamètre. *Phyllerites priscus* ETTINGSII. Eriophyidites 1146  
 Meschinelli, 1892, p. 808, n° 15 ; 1898, p. 107, pl. XXVIII, 16, ⊕ ; Trotter, 1903<sup>c</sup>, p. 16. *E-C*.

FAMILLE DES FAGACÉES

Castanea 1167, Fagus 1147-1166, Quercus 1168-2036

I. FAGUS. — Les galles du Hêtre ne présentent aucun point de ressemblance avec celles des Chênes ; elles offrent cependant quelque similitude de forme avec des cécidies signalées dans plusieurs genres de la famille précédente : bourgeon hypertrophié, pustule du limbe, plis du limbe parallèles aux nervures secondaires (cécidie de l'*Oligotrophus fagicolus*, semblable à celle du *Contarinia carpini*). Dans ce dernier cas, on peut considérer comme un facteur important pour la genèse de ces galles le fait que les nervures secondaires des feuilles du Hêtre et du Charme sont rectilignes et sensiblement parallèles.

Nous avons attiré l'attention sur les cécidies décrites en Asie-Mineure par Rübсаamen (1895), par Trotter (1903) et par nous (1902<sup>c</sup>) ; ces galles (voir n°s 1152, 1153, 1157) rappellent d'assez près celles du *Mikiola fagi*

et de *Oligotrophus annulipes* qu'on rencontre si communément dans les pays d'Europe.

Signalons enfin que les hémiptéroécidies des tiges sont encore mal connues et qu'il reste à préciser le rôle joué par le *Pterochlorus exsicicator* et l'*Adelges fagi* au début de la formation de ces nodosités.

II. QUERCUS. — Les galles des Chênes sont parmi les plus anciennement connues, parmi les plus belles et aussi parmi les plus abondantes (plus de huit cents pour l'Europe ; à lui seul le Chêne Rouvre en présente près de deux cents). Elles sont engendrées presque toutes par des Cynipides et leur histoire se trouve si intimement liée à celle de ces curieux Hyménoptères que nous nous contenterons de renvoyer les Cécidologues, pour les généralités relatives aux galles et aux cécidozoaires des Chênes, aux travaux importants de Hartig, de Giraud, de Schenck, de Mayr, de Wachtl, etc., qui presque tous datent du milieu du siècle dernier. On pourra consulter aussi avec profit, comme nous l'avons fait nous-même, le magistral mémoire de Mayr (1870-1871), relatif aux galles des Chênes du centre de l'Europe, puis le Catalogue de Dalla Torre (1893), les deux volumes du Traité des Cynipides de Kieffer (parus de 1897 à 1905 dans le Species des Hyménoptères d'André), enfin la famille des Cynipidae de Dalla Torre et Kieffer (1902) dans le Genera Insectorum de Wystman. De belles illustrations en couleurs existent dans le célèbre Mémoire d'Adler (1881) et dans le Recueil des dessins de Giraud publié par Darboux et Houard (1907).

Jusque vers la fin du siècle dernier, l'étude des galles des Chênes avait été limitée au centre de l'Europe et aux régions septentrionale et occidentale ; les *Quercus pedunculata*, *sessiliflora*, *pubescens* et *Cerris* s'étaient montrés particulièrement riches en cécidies. Mais depuis une dizaine d'années l'activité des Cécidologues s'est surtout portée sur les Chênes de la région méditerranéenne et sur ceux de l'Asie-Mineure : Chicote, Kieffer, Trotter et surtout Tavares ont signalé de nouvelles galles sur *Quercus Toza* et *Quercus lusitanica* croissant dans la péninsule ibérique ; Rübssamen et Trotter ont décrit les nombreuses cécidies de la péninsule des Balkans et de l'Asie Mineure, pendant que P. Marchal observait celles d'Algérie, sur le Chêne Zéen.

Nous avons rapporté, dans ce Catalogue, les résultats principaux que contiennent les mémoires des Cécidologues modernes, sans oublier les indications relatives aux galles recueillies sur les Chênes exotiques plantés dans les parcs ou les jardins botaniques (Cecconi en Italie et surtout Rolfe à Kew). Nous avons tenu compte aussi d'observations faites sur des Chênes de la région méditerranéenne conservés en herbier, pensant, avec P. Marchal (1897, p. 13) qu'« étant donné le grand intérêt qui s'attache à la biologie des Cynipides vivant sur les Chênes, on ne saurait réunir trop de données pour établir l'histoire de leurs adaptations sous des climats divers ».

### **Fagus silvatica** L.

(y compris les variétés *heterophylla*, *asplenifolia*, *sanguinea*, *purpurea*, *ferruginea*, *colorata*, etc.).

Ac.bg. — Bourgeons demeurant fermés, atteignant 30 mm. de long

sur 12 mm. de large; leurs feuilles sont couvertes de longs poils d'un blanc d'argent. Ces bourgeons se dessèchent en été, mais certains peuvent cependant développer un rameau épais et court, plus ou moins contourné, couvert de poils anormaux gris ou blanchâtres; les feuilles, mal développées, faiblement et irrégulièrement plissées le long des nervures latérales, ou encore crispées, sont très rapprochées les unes des autres.

Ériophyide 1147

Liebel, 1886, p. 543, n° 88; Kieffer, 1892<sup>c</sup>, p. 121, n° 46, fig. 3, ⊕.

A.


**Pl.ti.** — Sur les rameaux, épaississement en forme de lentille reconvert au début par l'écorce qui finit par éclater; il se forme ainsi des sortes de chancres pouvant atteindre 20 mm. de diamètre.

Adelges fagi HARTIG 1148

R. Hartig, 1880<sup>b</sup>, p. 156, pl. IX; Schlechtendal, 1890, p. 14, n° 124; Liebel, 1892, p. 8, n° 67. E-C.

*Fagus silvalica*  
*Mikiola fagi* (n° 1151)

Fig. 240 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 241 (b). — D'ap. nat.



*Fagus silvalica*  
*Mikiola* (n° 1152)  
*Oligotrophus* (n° 1157)

Fig. 243, 243 (a, b). — Im. Trotter  
Fig. 244, 245 (c, d). — Im. Trotter



*Fagus silvalica*  
*Oligotrophus annulipes* (n° 1153)

Fig. 246 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 247 (b). — D'ap. nat.

— A la face inférieure des jeunes rameaux ou sur le tronc des arbres jeunes, épaississement pouvant atteindre plusieurs décimètres de longueur sur 20-30 mm. de largeur et faisant une saillie de 2-3 mm.; l'écorce finit par se fendre suivant la longueur de la cécidie. Puceron de grande taille, brun, non lanugineux.

Pterochlorus exsicicator ALTM 1149

R. Hartig, 1880, p. 151, pl. VIII; Liebel, 1892, p. 8, n° 66; Schenkling, 1896, p. 251, 271, fig. 19, ⊕. E-C.



— Minimes bosselettes. . . . . **Lestes viridis** VAN DER LIND. 1150

Pierre, 1902, p. 185.

F.

|                |   |                                                                           |                                             |    |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| <b>Pl. fe.</b> | { | Cécidie faisant fortement saillie à la face supérieure. . . . .           | A.                                          |    |
|                |   | Cécidie en forme de pustule, visible sur les deux faces du limbe. . . . . | B.                                          |    |
|                |   | Cécidie d'une autre forme {                                               | Plis du limbe. . . . .                      | C. |
|                |   |                                                                           | Enroulement marginal. . . . .               | D. |
|                |   |                                                                           | Limbe crispé ou replié par en haut. . . . . | E. |
|                |   | Touffe de poils. . . . .                                                  | F.                                          |    |

A. — Cécidie de consistance ligneuse, de forme ovoïde mais terminée en pointe, atteignant 8-10 mm. de hauteur sur 5 mm. de diamètre, insérée sur une nervure (fig. 240); les parois très épaisses (fig. 241), vertes au début dans toute leur épaisseur, se teintent plus tard de rouge sur leur face externe seulement. A la face inférieure, la cécidie apparaît sous la forme d'une petite saillie portant en son centre un ostiole très étroit fermé par des papilles. Cette galle uniloculaire se détache à maturité en laissant sur la feuille, après sa chute, la partie inférieure contenant l'ouverture. Une larve blanche. M.T.

**Mikiola fagi** HARTIG 1151

Licopoli, 1877, p. 12, pl. I, 11, ⊕; André, 1889, p. 153-154, 3 fig., ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 13, ⊕; Martel, 1891, p. 20, n° 31, pl. III, 11, ⊕; Massalongo, 1893, p. (89-91), n° 53, pl. XII, 4, ⊕; Büsngen, 1895, p. 9-18, 6 fig., ⊕; Focke, 1896, p. 27-45, pl. III, ⊕; Appel, 1899, p. (44-49), pl. fig. 3-6, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. I, n° 7, ⊕.

E-T.

— Cécidie insérée sur une nervure latérale ou plus souvent sur la nervure médiane, semblable à la précédente, mais dépourvue de pointe et, quelquefois, sphérique (fig. 242-243); la face interne des parois est d'une teinte rouge variant du carmin au pourpre, tandis que la face externe est le plus souvent vert pâle. Une seule larve blanchâtre. M.T.

**Mikiola** 1152

Rübsaamen, 1895, p. 440, n° 65, pl. XIII, 4, ⊕; Trotter, 1903, p. 24, n° 36, pl. I, 6-7, ⊕.

R, A-M.

— Cécidie de 2,5 mm. de hauteur sur 1-2 mm. de diamètre, de forme subcylindrique (fig. 246), terminée en pointe mousse; les parois très minces et fragiles sont couvertes de poils blancs ou bruns (fig. 247). Cette cécidie, insérée entre deux nervures, est uniloculaire; elle se détache à maturité en laissant sur la feuille une empreinte circulaire dont les bords sont un peu épaissis et dont le centre est marqué par une petite saillie laissant entre les bords et elle une gouttière annulaire. Une larve. M.T.

**Oligotrophus annulipes** HARTIG 1153

Focken, 1896, p. 8-26, pl. I-II, ⊕; Appel, 1899, p. (46) pl. fig. 2, ⊕; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. X, n° 238, ⊕; 1906, fasc. XIII, n° 318, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 12, ⊕.

E-T.

— Cécidie semblable à la précédente, mais entièrement glabre; extrémité supérieure conique. [*Oligotrophus annulipes* HARTIG]

1154

Bremi, 1847, p. 13, n° 2, pl. I, 13, ⊕; Trotter, 1903, p. 30, A.


E-C, R.

— Cécidie se présentant à la face supérieure du limbe (fig. 248) sous la forme de gracieuses touffes de longs poils, rayonnants, soyeux, de teinte ferrugineuse, insérés sur une petite galle uniloculaire (fig. 250-251); celle-ci est enveloppée par un large rebord du limbe. Sur la face opposée (fig. 249), la cécidie n'est décelée que par un petit disque arrondi d'1 mm. de diamètre environ. Les cécidies sont toujours groupées au voisinage immédiat de la nervure médiane de la feuille. *Oligotrophus*

1155

Houard, 1902, c. p. 50-52, fig. 1-4, ⊕; Trotter, 1903, p. 22-23, n° 34, pl. I, 4, pl. II, 18, ⊕; 1903, p. 30, B; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. X, n° 239, ⊕.

R, A-M.



*Fagus silvatica* : *Oligotrophus* (n° 1155)

Fig. 248 (a). — D'ap. nat.

Fig. 250 (c). — D'ap. nat.

Fig. 249 (b). — D'ap. nat.

Fig. 251 (d). — D'ap. nat.

Fig. 252 (e). — État jeune de la galle de *Oligotrophus annulipes* (n° 1153).

B. — Pustule arrondie formée par un épaissement du parenchyme.

Cécidomyide 1156

F. Löw, 1888<sup>b</sup>, p. 241; Schlechtendal, 1890, p. 15, n° 134; Lemée, 1902, p. (46), n° 232.

D, E-C.

F, I.

— Cécidie faisant à peu près également saillie des deux côtés du limbe (fig.244) ; elle est subhémisphérique à la face supérieure, blanche ou rosée, d'un diamètre de 1,5-2,5 mm., arrondie à la face inférieure, verdâtre et munie d'un petit mucron. A l'état adulte, la région supérieure de la cécidie se détache sous la forme d'un corps cylindroconique creux (fig.245), semblable à celui de la galle du Tilleul.

**Oligotrophus** 1157

Rübsaamen, 1895, p.440, n°65, pl.XIII, 5, ⊕ ; Trotter, 1903, p.23-24, n°35, pl.I, 5, ⊕.

R.A.M.

C. — Entre deux nervures latérales, pli du limbe partant de la nervure médiane et atteignant généralement le bord, très hypertrophié et teinté de jaune ou de rouge ; ce pli fait saillie à la face inférieure, s'ouvre par une fente à la face supérieure et renferme 2 à 3 larves rougeâtres. M.T.

**Oligotrophus fagicolus** KIEFF. 1158

F.Löw, 1874<sup>b</sup>, p.156, n°1 ; 1877, p.33 ; Massalongo, 1893, p.(93-95), n°55, pl.X, 7-8, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc.V, n°110, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc.II, n°66, ⊕.

D, E, C,  
F, I.

— Feuille demeurant petite et présentant des plis au fond desquels se trouvent les nervures latérales hypertrophiées ; le limbe est épaissi, couvert de poils anormaux et parfois teinté de rougeâtre. Quand, par exception, les feuilles attaquées atteignent la taille normale, elles sont plus ou moins crispées, couvertes de bosselures et velues. [ **Eriophyes stenaspis** NAL. ]

1159

Thomas, 1876, p.278-280, pl.XI, 27-28, ⊕ ; Martel, 1893, p.11, n°162.

E.T.

D. — Enroulement marginal par en haut ou par en bas, serré et occupant une faible partie du bord ; érinéum à l'intérieur de la partie enroulée. *Legnon circumscriptum* BREML.

**Eriophyes stenaspis** NAL. 1160

Nalepa, 1898, p.10, n°15 ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc.X, n°237, ⊕.

E.T.

E. — Feuilles crispées le long des nervures latérales et recourbées. Puceron fortement lanugineux.

**Phyllaphis fagi** L. 1161

Schlechtendal, 1890, p.14, n°126 ; Schouteden, 1903, p.174, n°1.

E.T.

— Feuille repliée sur la face supérieure de telle sorte que les deux moitiés du limbe soient accolées ; nervures médiane et latérales hypertrophiées. L'ensemble rappelle la cécidie du *Perrisia alni* décrite au n°1127.

**Cécidomyide** 1162

Trotter, 1903, p.24-25, n°37.

A.M.

F. — A l'aisselle des nervures et à la face inférieure, amas de poils anormaux comblant une dépression à laquelle correspond sur la face supérieure une saillie décolorée.

\* **Monochetus sulcatus** NAL. 1163

Connold, 1901, pl. LXXII, ⊕; Lemée, 1902, p. 46, n° 236; Cecconi, 1904<sup>b</sup>, p. 179-180, n° 6. *E.-C. F. J.*  
 \* Avec *Phyllocoptes gracilipes* Nal. (Nalepa, 1898, p. 44-45, n° 1, p. 47, n° 5).

— A la face inférieure, amas de poils courts, en massue, formant des taches plus ou moins étendues, d'abord blanches, plus tard rosées, enfin brunes. *Erineum fagineum* PERS.

**Eriophyes nervisequus** CAN. var. **maculifer** TROTTER 1164

Greville, 1827, pl. CCL, 1, ⊕; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. X, n° 236, ⊕. *E.-T.*

— A la face supérieure, poils courts en massue, d'abord blancs, puis rosés, ensuite bruns, disposés en rangées le long des nervures. *Erineum nervisequum* KUNZE. **Eriophyes nervisequus** CAN. 1165

Hieronymus, 1890, p. 70-71, n° 95; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 11, ⊕; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. X, n° 235, ⊕; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n° 56, ⊕. *E.-C. F. J.*

**Fagus pliocenica** SAPORTA (fossile)

Pl. fe. — Cécidie ovoïde. Voir n° 1151. . . . [Mikiola fagi HARTIG] 1166

Marty, 1894, p. 173, 1 fig., ⊕; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, p. 182; Trotter, 1903<sup>e</sup>, p. 14. *F.*



**Castanea vulgaris** LAMK.

Pl. fe. — Pustule arrondie, de 1 mm. de diamètre environ, peu saillante sur les deux faces de la feuille, d'un vert beaucoup plus clair que le limbe. [Cécidomyide] 1167

C. Zimmermann, 1907, p. 104-105, n° 7. *I.-B.*

[**Castanea vesca** GLERTX.]

Pl. ra. — Nodosités. . . . . **Heterodera radicolica** GREEFF 1167A

Trotter, 1905, p. 52-53. *I.*



**Quercus**

## SECTION LEPIDOBALANUS.

**Quercus Robur L.****Q. pedunculata** EHRL., **Q. sessiliflora** SMITH, **Q. pubescens** WILD.

Ac. fr. voir p. 211

Ac. fl. ♂ voir p. 216

Ac. ti. voir p. 220

Ac. bg. voir p. 222


Pl. ra. voir p. 246

Pl. ti. voir p. 246

Pl. fe. voir p. 250

|   |         |   |                                                               |                                                                                     |    |
|---|---------|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| { | Ac. fr. | { | Cécidie affectant l'amande du gland et non la cupule. . . . . | A.                                                                                  |    |
|   |         |   | {                                                             | Galle munie de prolongements cylindriques ou ramifiés, disposés sans ordre. . . . . | B. |
|   |         |   |                                                               | Galle munie de prolongements disposés sous forme de couronnes. . . . .              | C. |
|   |         |   |                                                               | Galle munie de prolongements en forme de carènes ou de crêtes. . . . .              | D. |
|   |         |   |                                                               | Galle globuleuse, sans prolongements, peu velue ou cotonneuse. . . . .              | E. |

A. — Le gland demeure un peu plus petit qu'à l'état normal et fixé à la cupule ; sa membrane, légèrement boursoufflée, recou-

**Quercus Robur**Fig. 253 (a) : *Andricus Panteli* var. *fructuum* (n°1174). . . . . Im. TROTTERFig. 254 (b) : *Andricus superfetationis* (n°1183). . . . . D'ap. nat.Fig. 255 (c) : *Andricus Seckendorfi* (n°1173). . . . . Im. KIEFF.Fig. 256 (d) : *Callirhytis glandium* (n°1168). . . . . D'ap. nat.Fig. 257 (e) : *Cynipide* (n°1168). . . . . Im. KIEFF.

vre de petites cécidies arrondies (fig. 256). — Parfois le gland est arrêté dans son développement et fait à peine saillie hors de la cupule (fig. 257). *Q. ped., sess., pub.*

[**Callirhytis glandium** GIRAUD] 1168

Mayr, 1872, p. 699 ; Schlechtendal, 1890, p. 21, n° 153 ; 1895, p. 11, b ; Kieffer, 1897<sup>b</sup> et 1899<sup>b</sup>, p. 128, 383-386, pl. XIV, 8, ⊕ ; R. du Buysson, 1900, p. 357 ; Pigeot, 1904, p. 23. E.-C. F.

B. — Cécidie de 30-40 mm. de diamètre, apparaissant en mai sous la forme d'un disque rouge et épais, dont le bord émet quelques prolongements coniques, et dont la surface supérieure produit une multitude de prolongements filiformes, amincis au bout, plus ou moins courbés ; plus tard, ces filaments se ramifient et s'enchevêtrent de façon à cacher complètement le disque, dont les bords se sont petit à petit rabattus de façon à embrasser la cupule. C'est au centre du disque que se trouve la galle interne, ovoïde, complètement libre à maturité. Cynipide février II. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.* **Cynips caput-medusæ** HARTIG 1169

Mayr, 1871, p. 30, n° 89, pl. VII, 89, ⊕ ; Massalongo, 1863, p. (203-205), n° 153, pl. XXVIII, 4, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII-VIII, n°s 216, 245, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VI, n° 132, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 194-195, n° 17, pl. XI, 3, ⊕. *E-C, F, I, P-B.*

— Cécidie ressemblant à la précédente, mais les appendices sont courts, élargis, fusionnés à la base et portent un nombre très restreint de prolongements filiformes. *Q. sess.*

**Cynips caput-medusæ** HARTIG] 1170

Trotter, 1901<sup>d</sup>, p. 371-372, n° 37, pl. XV, 6, ⊕. *I.*

— Cécidie arrondie, de 60 mm. de diamètre et 22 mm. de hauteur, couverte d'appendices longs de 15-25 mm., cylindriques à la base et terminés en pointe. Cynipide I. *Q. sess.* **Cynipide** 1171

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 459 ; Cecconi, 1904, p. 87. *I.*

— Cécidie arrondie, pouvant atteindre la grosseur d'une noix, de couleur jaune pâle ; elle porte de très nombreux prolongements de 4 à 8 mm. de long suivant les cécidies, mais tous de même taille et de même forme sur une galle donnée ; ces prolongements sont formés d'une partie basilaire longue et grêle, tantôt droite, tantôt légèrement arquée, supportant un renflement terminal coloré en rouge et gluant. Cynipide mars-avril II. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.* **Andricus lucidus** HARTIG 1172

Schlechtendal, 1890, p. 22, n° 198. *E-G.*

— Cécidie arrondie, verte ou rouge à l'état jeune, brune à maturité ; elle a 10-25 mm. de diamètre et porte à sa surface de nombreux petits prolongements de 2-4 mm. de long (fig. 255), cylindriques, légèrement renflés un peu au-dessous de l'extrémité, verts à la base, rouges et gluants dans leur partie ter-

minale ; ces prolongements sont toujours irrégulièrement contournés. Cynipide novembre II. *Q. sess.*

**Andricus Seckendorfi** WACHTL 1173

Dalla Torre, 1893, p. 98 ; Cecconi, 1901<sup>e</sup>, p. 741, n° 89 ; Trotter, 1903, p. 51-52, n° 138. *E.-G. I. A.-M.*


— Cécidie pluriloculaire de 10-15 mm. de diamètre, munie de nombreux appendices contournés (fig. 253). Insecte mars II *Q. ped.*

**Andricus Panteli** KIEFF. var. **fructuum** TROTTER 1174

Trotter, 1899, p. 294-296, n° 25, pl. XVIII, 5, ⊕ ; Stefani, 1901, p. 453, n° 36. *I.*

— [Voir n° 1808. *Q. ped.*]. **Neuroterus glandiformis** GIRAUD 1175

Misciattelli, 1895<sup>b</sup>, p. 92, n° 43 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 455. *I.*



*Quercus Robur*

*Cynips Kiefferi* (n° 1176)

Fig. 258 (a). — Im. KIEFF.

Fig. 259 (b). — Im. KIEFF.

*Quercus Robur*

*Cynips Mayri* (n° 1177)

Fig. 260 (a). — D'ap. nat.

Fig. 261 (b). — D'ap. nat.

- C. — Grosse cécidie, haute de 20-25 mm., large de 30-35 mm., coiffant un gland complètement atrophié ; elle se compose d'une partie basale hémisphérique fixée au gland par sa partie convexe et se rattachant par sa partie plane au grand cercle de base d'un tronc de cône qui forme la partie supérieure et qui est limité d'autre part par une surface légèrement concave (fig. 258-259). La grande base du tronc de cône, qui déborde sur la partie inférieure hémisphérique, présente sur tout son

pourtour des appendices rabattus sur la portion basilaire de la cécidie. La galle tout entière est d'un brun clair brillant et faiblement glutineuse. *Q. pub.*

**Cynips Kiefferi** CABRERA 1176

Cabrera y Diaz, 1897, p. 25 ; Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 547-549, pl. XXII, 7, ⊕.

*E. si.*

— Galle en casque de lancier (fig. 260-261), composée d'une partie basilaire hémisphérique surmontée d'un disque plat, à bords recourbés par en bas, qui s'y rattache par un pédicule ; le bord inférieur de la partie basilaire se divise en lobes rameux entourant la cupule. La cécidie, de consistance ligneuse, d'un brun-marron très brillant, est fortement gluante à l'état frais. Cynipide octobre-novembre I, printemps II. *Q. ped., sess., pub.*

**Cynips Mayri** KIEFF. 1177

Solla, 1892, p. 321, A, pl. VI, 1-5, ⊕ ; Houard, 1902<sup>b</sup>, p. 45-46, n° 44.

*E-S.I.F.*

— Cécidie semblant se développer aux dépens d'un fruit et rappelant un peu par sa forme générale la galle du *C. Mayri* dont elle possède la base élargie et la région conique ; mais la région terminale de la cécidie est creuse et bordée de prolongements irréguliers qui se remarquent du reste sur presque toutes les parties de la galle et permettent de rapprocher également cette bizarre production de la cécidie du *Cynips caput-medusae*. *Q. sess.*

**Cynipide** 1178

Trotter, 1904, p. 10-11, n° 17, 1 fig., ⊕.

*I.*

— Cécidie munie de trois couronnes d'appendices. Voir n° 1652. *Q. ped.*

**Cynips Panteli** TAVARES 1179

Tavares, 1905, p. 84-85.

*P.*

D. — Cécidie haute de 15-20 mm., ayant une forme tronconique et fixée à la cupule par la grande base qui peut atteindre 25 mm. de diamètre (fig. 262). De consistance ligneuse, de la couleur de la cupule, cette galle présente 5-8 carènes, souvent interrompues par des dépressions, orientées suivant des génératrices et aboutissant, au sommet, sur le bord d'une ouverture circulaire qui donne accès dans une antichambre (fig. 263) ; au-dessous est une seconde cavité, entièrement close, contenant la galle interne. Cynipide février-mars II. *Q. ped., sess., pub.*

**Cynips calicis** BURGD. 1180

Beijerinck, 1897, p. 387-444, pl. XVI-XVIII, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 33, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VIII, n° 240-241, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 195-196, n° 18, pl. XV, 3, ⊕.

*E-T.*



— Cécidie rappelant celle du *Cynips calicis*, mais de couleur jaunâtre et plus visqueuse; les carènes sont assez irrégulières.

*Q. ped.*

Cynipide 1181

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 458; Tavares, 1902<sup>b</sup>, p. 88-89, n° 28.


E-G, E.

— Cécidie rappelant celle du *Cynips calicis*, mais les carènes, très irrégulières, ressemblent à des crêtes sinueuses ou à des filaments fusionnés. [*Q. ped.*].

Cynipide 1182

Trotter, 1901<sup>d</sup>, p. 372, pl. XV, 7. ⊕.

L.



*Quercus Robur*

*Cynips calicis* (n° 1180)

Fig. 262 (a). — D'ap. nat.

Fig. 263 (b). — D'ap. nat.



*Quercus Robur*

*Andricus Theophrastus* (n° 1184)

Fig. 264 (a). — D'ap. nat.

Fig. 265 (b). — D'ap. nat.

- E. — Au bord de la cupule, petites cécidies arrondies (5-6,3 mm. de hauteur sur 4,5-5 mm. de large), d'un rouge carminé, couvertes de poils gris soyeux qui paraissent rayonner autour d'un petit tubercule apical, jaunâtre et glabre (fig. 254). Souvent la cécidie est verte et affecte la forme d'un petit citron. Cynipide printemps III. *Q. ped.*, *pub.*, *sess.*

*Andricus superfetationis* PASZL. 1183

Giraud, 1859, p. 372-373, n° 4; Paszylavszky, 1884<sup>c</sup>, p. 147-151; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VI, n° 131, ⊕; Tavares, 1905, p. 84; Darboux et Honard, 1907, p. 196-197, n° 19, pl. XIV, 2-3, ⊕.

E-G,

L, P.

— Masse sphérique dure, atténuée aux deux pôles, de 6-8 mm.

de diamètre, uniloculaire, à surface d'un beau vert, revêtue d'abondants poils blanc jaunâtre ou fauve, longs de 6-10 mm. L'ensemble affecte la forme d'une grosse pelote cotonneuse et mesure de 20 à 30 mm. de diamètre (fig.264-265). Cynipide mars III. *Q. pub.*, [*sess.*]. **Andricus Theophrasteus** TROTTER 1184

Trotter, 1903, p. 205-208, n°159, pl. II, 15, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VIII, n°183, ⊕.

*E-S, s, A-M.*

|         |   |                                                                                    |   |                                                                                                        |                                                |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ac.fl.♂ | } | Cécidie<br>sans pilosité<br>ou avec<br>des poils<br>plus courts<br>que la<br>galle | } | Cécidie couverte d'un duvet cotonneux formé par des poils plus longs que la galle . . . . . A.         |                                                |
|         |   |                                                                                    |   | Cécidie couverte sur toute son étendue d'une pubescence formée de nombreux poils dressés. . . . . B.   | Cécidie velue au sommet seulement . . . . . C. |
|         |   | Cécidie<br>glabre<br>ou portant<br>au plus<br>quelques<br>poils courts             | } | Cécidie formée aux dépens d'une étamine dont les anthères sont encore visibles sur le côté. . . . . D. | Cécidie à surface lisse et glabre. . . . . E.  |
|         |   |                                                                                    |   | Cécidie présentant des côtes ou des prolongements. . . . . F.                                          |                                                |

A. — Cécidie ovoïde, de 2 mm. de haut (fig.283), formée aux dépens d'une étamine, d'abord verte, puis brune, portant au sommet un bouquet de poils blancs serrés, longs de 6-8 mm. Le plus souvent toutes les étamines d'un chaton sont attaquées et, comme l'axe du chaton ne se développe pas, il se forme un amas cotonneux sphérique entouré par les écailles du bourgeon. Cynipide juin I. *Q. sess.*, [*ped.*]. **Andricus cirratus** ADLER 1185

Lichtenstein-Adler, 1881, p. 42-43, n°11 a, pl. XI, 11 a, ⊕; Paszlavszky, 1884, p. 74, n°3. *E-C, E-O.*

— Cécidie ovoïde, brune, de 2 mm. de haut (fig.284), fixée à l'axe d'un chaton qui ne s'est pas allongé, couverte de poils mesurant 6-8 mm. de long. Sur tous les chatons contenus dans un bourgeon, les cécidies sont groupées en amas; le bourgeon se trouve alors transformé en une masse arrondie ou ovoïde qui peut atteindre la grosseur d'une noix et disparaît sous un revêtement cotonneux de poils blancs ou jaunâtres (fig.285-286). *Q. ped.*, *sess.*, *pub.* **Andricus ramuli** L. 1186

Mayr, 1871, p. 22, n°81, pl. VI, 81, ⊕; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 47, n°13 7, pl. XI, 13 a, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n°215, ⊕; Jörgensen, 1906, p. 104, n°31, pl. II, 29, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 197-198, n°20, pl. XIII, 1, ⊕. *E-T.*

— Cécidie semblable à la précédente. Cynipide ayant trois bandes longitudinales brunes sur le mesonotum. *Q. ped.*

**Andricus ramuli** L. var. **trifasciata** KIEFF. 1187

Tavares, 1900, p. 28, n° 28; 1905, p. 82-83.

*P, E.*

B. — Cécidie ovoïde formée au dépens du filet d'une étamine (fig. 275-276) et sur le côté de laquelle les anthères forment deux bourrelets longitudinaux; haute de 2 mm., large de 1 mm., elle est d'abord verte, plus tard brune et couverte de poils courts, jaunâtres. Cynipide mai I. *Q. sess., pub.*

**Andricus amenti** GIRAUD 1188

Giraud, 1859, p. 360-361, n° 8; Mayr, 1871, p. 23, n° 82, pl. VII, 82, ⊕; Kieffer, 1899<sup>b</sup>, p. 411-413, pl. XVI, 7, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 198-199, pl. XII, 4-5, ⊕.

*E-C,  
E-O.*

— Cécidie piriforme, haute de 2 mm., insérée sur l'axe du chaton entre deux étamines (fig. 281); d'abord verte, puis brune, elle est couverte de poils blancs dressés (fig. 282). Cynipide juin I. *Q. ped., sess.*

**Andricus pilosus** ADLER 1189

Lichtenstein-Adler, 1881, p. 40-41, n° 10 a, pl. X, 10 a, ⊕; Mayr, 1882, p. 19; Jörgensen, 1906, p. 105, n° 32, pl. II, 30, ⊕.

*E-C  
(exc. E).*

C. — Le chaton ne se développe pas; son axe, un peu épaissi, reste court et porte au sommet une à trois cécidies ovoïdes de 2-2,5 mm. de long (fig. 279), teintées de brun rougeâtre, glabres à la base, mais couvertes dans leur partie supérieure de poils assez longs (fig. 280). Cynipide mai I. *Q. pub.*

**Andricus occultus** TSCHKE 1190

Tschek, 1871, p. 797-798; Mayr, 1871, p. 24, n° 83, pl. VII, 83, ⊕.

*E-C.*

— Cécidie ovoïde, terminée par une pointe bien nette (fig. 277); d'abord verte, puis jaune, elle n'a guère que 1,5 mm. de haut et présente au sommet un bouquet de poils courts qui peut faire défaut (fig. 278). Cynipide juin I. *Q. sess.*

**Andricus nudus** ADLER 1191

Lichtenstein-Adler, 1881, p. 44-45, n° 12 a, pl. XI, 12 a, ⊕; Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 442-443, pl. XVI, 4, ⊕.

*E-C, F.*

— Cécidie ovoïde, jaune, haute de 2-2,75 mm., terminée par une pointe brunâtre qui porte un bouquet de poils courts. Cynipide mai I. *Q. sess.*

**Andricus** 1192

Schlechtendal, 1890, p. 21, n° 192; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 455.

*E-C.*

— Cécidie ovoïde, haute de 2-2,75 mm., large de 1 mm., terminée par une pointe qui porte une touffe de poils atteignant le quart de la longueur de la galle; les deux moitiés de l'anthère sont encore visibles sous forme de deux bossettes ovales et brunes. Cynipide juin I. *Q. ped.* **Andricus Kiefferi** PIGEOT

1193

Pigeot, 1899, p. 80; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 453.

E.

D. — Cécidie formée d'une partie inférieure sphérique, de 1-1,5 mm. de diamètre, surmontée d'un appendice conique (fig. 271), portant deux gros bourrelets qui représentent les deux moitiés de l'anthère et se rejoignent presque au sommet (fig. 272). Cécidie caduque, entièrement glabre. Cynipide août I-II. *Q. ped., sess., pub.* **Neuroterus Schlechtendali** MAYR

1194

Mayr, 1871, p. 28, n° 87, pl. VII, 87, ⊕; Dalla Torre, 1893, p. 46-47.

E-C, E-O.



*Quercus Robur*

- |                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fig. 266 (a) : <i>Andricus Mayri</i> (n°1198) . . . . .                 | Im. KIEFF.          |
| Fig. 267 (b) : <i>Neuroterus baecarum</i> (n°1196) . . . . .            | D'ap. nat.          |
| Fig. 268 (c) : <i>Andricus seminationis</i> (n° 1200) . . . . .         | D'ap. nat.          |
| Fig. 269, 270 (d) : <i>Andricus quadrilineatus</i> (n°1201) . . . . .   | Im. MAYR            |
| Fig. 271, 272 (e) : <i>Neuroterus Schlechtendali</i> (n°1194) . . . . . | Im. MAYR            |
| Fig. 273, 274 (f) : <i>Andricus xanthopsis</i> (n°1195) . . . . .       | Im. SCHL. et KIEFF. |

— Cécidie jaunâtre, haute de 2 mm., de forme subcylindrique, se terminant par une pointe conique un peu plus sombre, sur laquelle on remarque deux bourrelets qui représentent les deux moitiés de l'anthère (fig. 273-274); elle est complètement glabre dans sa partie supérieure et porte seulement à la base quelques poils blancs et courts. L'axe du chaton est un peu renflé au voisinage du point d'insertion de la galle. Cynipide mai-juin I. *Q. ped., sess.* **Andricus xanthopsis** SCHL

1195

Schlechtendal, 1883, p. 1-2, n°1, fig. 1, ⊕; 1884, p. 99-104, n°1. Pigeot, 1904, p. 24.

A.F.

E. — Petite cécidie ovoïde de 1,5 mm. de haut. Voir n°1191.

— Cécidie sphérique, de 4,5 mm. de diamètre (fig. 267), juteuse,

ressemblant à un grain de raisin. Cynipide mai-juin I. *Q. ped.*,  
*sess.*, *pub.*

**Neuroterus baccarum** L. 1196

Prillieux, 1876, p. 119-126, pl. XVI, 6-11, pl. XVII, ⊕ : Licopoli, 1877, pl. II, 10, ⊕ : Tavares, *E-T*,  
 1905, pl. VII, 21, ⊕ : Darboux et Houard, 1907, p. 199-200, n° 22, pl. XVI, 6-7, ⊕.

— Le chaton ne se développe pas, demeure court, s'épaissit,  
 n'arrive pas à maturité et forme une cécidie verdâtre qui tombe  
 à l'époque où les chatons normaux sont complètement déve-  
 loppés et mûrs. Larves blanchâtres. *Q. pub.*

**Contarinia** 1197

Trotter, 1900, p. 201, n° 18, pl. IX, 9.

*I.*



**Quercus Robur**

- Fig. 275, 276 (g) : *Andricus amenti* (n° 1188) . . . D'ap. nat. et im. MAYR.
- Fig. 277, 278 (h) : *Andricus nudus* (n° 1191) . . . D'ap. nat.
- Fig. 279, 280 (i) : *Andricus occultus* (n° 1190) . . . Im. MAYR
- Fig. 281, 282 (k) : *Andricus pilosus* (n° 1189) . . . Im. ADLER
- Fig. 283 (l) : *Andricus cirratus* (n° 1185) . . . Im. ADLER
- Fig. 284 (m) : *Andricus rumuli* (n° 1186) . . . Im. MAYR

F. — Cécidie pluriloculaire arrondie, de 5-10 mm. de diamètre,  
 portant un grand nombre de prolongements dressés (fig. 266),  
 dont le diamètre décroît de la base jusqu'au sommet qui se  
 termine en pointe obtuse, rouge et gluante ; ces appendices,  
 longs de 3-5 mm., présentent ordinairement plusieurs arêtes  
 longitudinales A l'état frais, la galle est jaune verdâtre et  
 gluante. Cynipide printemps II-III. *Q. ped.*

**Andricus Mayri** WACHTL 1198

Dalla Torre, 1893, p. 91 ; Darboux et Houard, 1907, p. 201, n° 24, pl. XVII, 3, ⊕.

*E-G.*

— Galle peu commune, semblable à la précédente, mais plus  
 grosse (10-20 mm.) et à appendices plus longs (5-15 mm.) ; par  
 sa base, elle embrasse étroitement le chaton. Voir n° 1224.

**Andricus Panteli** KIEFF. 1199

— Cécidie uniloculaire, fusiforme, de 3 à 6 mm. de longueur  
 (fig. 268), insérée sur l'axe du chaton par un court pédicule qui  
 peut faire défaut ; elle est verte et présente des côtes longitu-

dinales plus ou moins marquées, teintes de vert ou de rouge; son extrémité est marquée d'une verrue autour de laquelle s'observe une couronne de poils plus serrés que sur le reste de la surface. Le pédoncule du chaton est fortement renflé au point d'insertion de la galle. Cynipide printemps II-III. *Q. ped.*, *sess.* **Andricus seminationis** ADLER 1200

Lichtenstein-Adler, 1881, p. 67-68, pl. XI, 20, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 200-201, n° 3, pl. XI, 1, ⊕. *E-G.*  
*E-O.*

— Cécidie uniloculaire, ovoïde, de 3 mm. de haut sur 2 mm. de large (fig. 269), entièrement glabre, brune, à surface marquée de bourrelets longitudinaux irréguliers, contournés (fig. 270), terminée par une verrue peu distincte. *Q. ped.*, *sess.*

**Andricus quadrilineatus** HARTIG 1201

Mayr, 1871, p. 25, n° 84, pl. VII, 84, ⊕; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 69-71, n° 22, pl. XI, 22, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 316, ⊕; Jörgensen, 1906, p. 105, n° 33, pl. II, 43, ⊕. *E-T.*

— Cécidie semblable à la précédente.

**Andricus flavicornis** SCHENCK 1202

Schenck, 1863, p. 197, 202, 233, n° 26; Dalla Torre, 1893, p. 94. *A.*

— Cécidie uniloculaire, haute de 5,2 mm., large de 3,5 mm., munie de bourrelets longitudinaux espacés irrégulièrement, peu proéminents; la surface de la galle est verruqueuse entre les côtes. *Q. ped.* ou *sess.* **Andricus [verrucosus]** SCHENCK 1203

Schenck, 1863, p. 234, n° 29; Dalla Torre, 1893, p. 95. *A.*

Cécidie douteuse :

— [Voir n° 1812. *Q. ped.* . . . **Andricus grossulariæ** GIRAUD] 1204

Misciattelli, 1895<sup>b</sup>, p. 92, n° 42; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 451. *I.*

**Ac. ti.** — Les entre-nœuds terminaux d'un rameau demeurent courts et s'épaississent, donnant ainsi origine à un renflement terminal en massue (12 mm. sur 7 mm.) qui porte des feuilles plus rapprochées que celles d'une pousse normale (fig. 287); dans la cavité qui occupe l'axe de ce renflement, on trouve une galle interne ovoïde, solidement fixée au fond (fig. 288). La cécidie peut donner naissance à des rameaux latéraux après la sortie de l'insecte. Cynipide juin I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Andricus inflator** HARTIG 1205

Lichtenstein-Adler, 1881, p. 34-36, n° 8a, pl. X, 8a, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, *E-T.*


n°213, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 82, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 63-64, pl. XI, 18, 20, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 202, n° 25, pl. XVII, 1-2, ⊕.

— Cécidie beaucoup plus petite que la précédente (5 mm. sur 4 mm.), mais ayant la même forme. Voir n° 1659. *Q. pub. ped.*


**Andricus pseudo-inflator TAVARES 1206**

Trotter, 1898, p. 20, n° 21 ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VIII, n° 181, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 64. *F.I.P.*

— Les entre-nœuds terminaux demeurent courts et les feuil-



**Quercus Robur**  
*Andricus ramuli* (n° 1186)  
Fig. 285 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 286 (b). — D'ap. nat.



**Quercus Robur**  
*Andricus inflator* (n° 1205)  
Fig. 287 (a). — Im. ADLER  
Fig. 288 (b). — Im. ADLER

les, ainsi réunies en bouquets plus ou moins lâches, sont crispées le long des nervures épaissies. Larves grégaires, blanchâtres, sauteuses. M.T. *Q. ped., sess.* **Contarinia quercina RÜBS.** 1207

Rübsaamen, 1890, p. 21-24, pl. III, 29 ; Lemée, 1903, p. (78), n° 545 ; Trotter, 1904, p. 10, n° 16. *D, E-C, F.I.*

Cécidies douteuses :

— [Voir n° 1820. *Q. ped., sess.* . . . **Andricus cydoniæ GIRAUD,** 1208  
Misciattelli, 1895<sup>b</sup>, p. 91, n° 35 ; Lemée, 1903, p. (74), n° 152. *I.F.*

— [Voir n° 1819. *Q. ped.* . . . **Andricus multiplicatus GIRAUD,** 1209  
Misciattelli, 1895<sup>b</sup>, p. 91, n° 34 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 408-409. *I.*

|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                    |                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                |    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ac. bg.                          | Cécidie conservant l'aspect d'un bourgeon, dont la taille reste normale ou acquiert de grandes dimensions : écailles persistantes, déformées et hypertrophiées si le bourgeon est très grossi (Voir fig. 289, 292)..... |                                                                                                            |                                                                                    |                            |                                                                                   | A.                                                                                                                                                               |                                                                                |    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         | Cécidie profondément enfoncée dans le bourgeon d'où sa partie supérieure émerge seule (fig. 293, 295)..... |                                                                                    |                            |                                                                                   | B.                                                                                                                                                               |                                                                                |    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | présentant des poils longs plus ou moins nombreux (fig. 297, 298).....             |                            |                                                                                   | C.                                                                                                                                                               |                                                                                |    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         | des prolongements                                                                                          |                                                                                    | glabres surtout la surface | diversement con-                                                                  | D.                                                                                                                                                               |                                                                                |    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | tournés (fig. 300, 301).....                                                       |                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                |    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         | Cécidie ayant une forme qui ne rappelle pas celle d'un gros bourgeon : les écailles sont caduques.         | Cécidie émergeant entièrement du bourgeon et portant :                             | des prolongements          | glabres au sommet ou à la base seulement                                          | dressés, droits ou à peine courbés (fig. 303, 305).....                                                                                                          | E.                                                                             |    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                    |                            |                                                                                   | Cécidie s'évasant à partir du point d'insertion, en forme de cône ou de cloche et portant des prolongements sur le pourtour de la base (fig. 307, 309, 311)..... | F.                                                                             |    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         | Cécidie d'une autre forme (fig. 313, 315, 320).....                                                        | Cécidie en cône ou en cloche avec aspérités sur le pourtour de la base. Voir F.    | des aspérités nombreuses   | cécidie sphérique à aspérités régulièrement distribuées (fig. 324, 325, 327)..... | H.                                                                                                                                                               |                                                                                |    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                    |                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                  | cécidie sphérique à aspérités distribuées sans ordre (fig. 331, 333, 335)..... | K. |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                    |                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                |    |
| un seul mamelon ou surface lisse | petite cécidie couverte de longs poils, au moins jusqu'à la sortie de l'insecte (fig. 345, 347, 351, 352, 354).....                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                    |                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                  | M.                                                                             |    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | cécidie glabre ou avec poils très courts (Voir la suite du tableau à la page 223). |                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                |    |



Suite du tableau de la page précédente :

|                                                      |   |                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cécidie<br>glabre ou<br>avec poils<br>très<br>courts | } | grosse cécidie sphérique sans aucun mamelon (fig.356,<br>358,360).....                                           | N. |
|                                                      |   | grosse cécidie non sphérique, ressemblant à une urne,<br>une coupe ou une mitre (fig.364, 365, 367, 369, 373)... | O. |
|                                                      |   | petite cécidie sphérique pourvue d'un mamelon (fig.377,<br>378,379).....                                         | P. |
|                                                      |   | petite cécidie fusiforme avec pédoncule plus ou moins<br>long (fig.381,383).....                                 | Q. |
|                                                      |   | petite cécidie subcylindrique, conique ou ellipsoïdale,<br>(fig. 384,385,386).....                               | R. |
|                                                      |   | Forme de la galle non décrite.....                                                                               | S. |

A. — Cécidie ovoïde, de 2 mm. de hauteur, complètement enfoncée dans le bourgeon qui ne diffère pas d'un bourgeon normal, mais présente seulement sur le côté un petit trou d'éclosion. Cynipide printemps II. *Q. sess., pub.* \* **Cynipide** 1210

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 416-417.

A, I-B.

\* *Neuroterus defectus* Hartig ou *N. politus* Hartig ou *Andricus punctatus* Bignell.

— Bourgeon dépassant peu la taille normale et restant fermé.

Larves rouges. M.T. *Q. ped., sess.*

**Arnoldia** 1211

Kieffer, 1897<sup>e</sup>, p. 23 ; 1901<sup>b</sup>, p. 461.

A.

— Bourgeon dépassant peu la taille normale, légèrement entr'ouvert. Larves rouges. M.T. *Q. pub.*

**Arnoldia** 1212

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 461 ; Lemée, 1903, p. (76), n° 527.

F, I.

— Bourgeon plus précoce que les autres, courbé en crosse à l'extrémité et laissant voir de petites feuilles vertes imparfaitement dégagées. *Q. ped.*

**Meconema varium** FABR. 1213

Pierre, 1905, p. 167-170.

F.

— Cécidie en artichaut ou en cône de houblon, formée par des écailles très agrandies et imbriquées (fig. 289) ; les écailles centrales laissent entre elles une cavité (fig. 290) au fond de laquelle se trouve une galle interne ovoïde (fig. 291). Cynipide printemps III-IV. *Q. ped., sess., pub.*

**Andricus fecundator** HARTIG 1214

Ratzeburg, 1884, p. 53-59, pl. V, 11, ⊕ ; Lacaze-Duthiers, 1853, p. 349-350, pl. XIX, 12-15, ⊕ ; Licopoli, 1877, p. 5-6, pl. I, 13, ⊕ ; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 37-39, n° 10, pl. X, 10, ⊕ ; Martel, 1891, p. 34, n° 71, pl. IV, 3, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. III, n° 109, ⊕ ; Massalongo,

E-T.

1893, p. (166-168), n° 129, pl. XXXVIII, 4, ⊕; Küstenmacher, 1894, p. 120-121, pl. X, 39-40, ⊕; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 81, ⊕; Weisse, 1902, p. 615-621, n° 3, pl. XII, 7-8, pl. XIII, A, 9, pl. XIII, B, 15, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 202-203, n° 26, pl. XV, 5, ⊕.

— Cécidie ovoïde, formée par la soudure en une masse unique des écailles internes agrandies (fig. 292), et portant à sa surface de petites écailles à peine déformées. Cynipide avrilmai I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.* **Neuroterus apralinus** GIRAUD 1215

Giraud, 1859, p. 363-364; Mayr, 1870, p. 32, n° 42, pl. IV, 42, ⊕; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 65-66, n° 19 a, pl. XI, 19 a, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 203-204, n° 27, pl. XVIII, 2, ⊕. *E-T*  
(*ecc.N*),  
*A-M.m.*

B. — Cécidie en forme de petit citron (fig. 293-294), de 3-4 mm. de longueur, insérée sur un petit pédoncule caché, ainsi que la partie basilaire de la galle, par les écailles du bourgeon; à la partie supérieure se voit une pointe apicale, souvent entourée à sa base d'une légère gouttière annulaire. La galle, d'abord verte, devient plus tard rougeâtre, la gouttière conservant toujours une couleur plus claire; elle se détache à maturité, en octobre. Cynipide printemps III. *Q. ped.*, *sess.*

**Andricus collaris** HARTIG 1216

Ratzeburg, 1844, p. 53-59, pl. V, 5, ⊕; Mayr, 1870, p. 25, n° 32, pl. IV, 32, ⊕; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 35-36, n° 9, pl. X, 9, ⊕; Dalla Torre, 1893, p. 83; Jørgensen, 1906, p. 96, n° 14. *E-T*

— Cécidie complètement ou à moitié enfoncée dans le bourgeon; elle est ovoïde, jaunâtre, et de 1,5-2 mm. de hauteur; paroi mince. Cynipide printemps II. *Q. sess.*, *pub.* **Cynipide** 1217

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 114, note 1; Trotter, 1899, p. 301-302, n° 34. *E-C.I.*

— Cécidie verte, ovoïdale, longue de 2 mm., large de 1,5 mm., glabre, à paroi mince, dépassant le bourgeon d'un tiers seulement ou enfoncée en entier dans le bourgeon; galle caduque. Cynipide août I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Andricus gemmicola** KIEFF. 1218

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 418-419; 1905, p. 565-566; Pigeot, 1904, p. 17. *F.*

— Cécidie haute de 3,5-5 mm., de forme ovoïde, terminée en pointe (fig. 295), insérée par une large base; elle est glabre, lisse, verdâtre, avec une teinte rouge sur la partie supérieure, qui émerge seule du bourgeon. Sous une mince enveloppe charnue on trouve une galle interne ligneuse, couverte de petites côtes longitudinales (fig. 296). A maturité, en octobre ou novembre, la cécidie se détache et la couche externe des-


séchée laisse à nu la galle interne. Cynipide printemps III.

*Q. ped., sess., pub.*

**Andricus autumnalis** HARTIG 1219

Mayr, 1870, p. 24, n° 31, pl. IV, 31, ⊕; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 46-47, n° 13, pl. XI, 13, ⊕; D. E.-C., Jørgensen, 1906, p. 95, n° 12, pl. II, 11, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 205, n° 28, pl. XI, 4-5, ⊕. E.-O.

C. — A la base des troncs (et le plus souvent cachée sous la mousse, les feuilles sèches ou une mince couche de terre), cécidie à parois minces (fig. 299), pouvant atteindre 4-5 mm. de diamètre; elle présente sur toute sa surface de nombreux



*Quercus Robur*

*Andricus fecundator* (n° 1214)

Fig. 289 (a). — D'ap. nat.

Fig. 290 (b). — D'ap. nat.

Fig. 291 (c). — D'ap. nat.



a




b



c



d



a

b

*Quercus Robur*

Fig. d'après MAYR, KIEFF., ADLER, TROTTER

Fig. 292 (a) : *Neuroterus aprilinus* (n° 1215).

Fig. 293, 294 (b) : *Andricus collaris* (n° 1216).

Fig. 295, 296 (c) : *Andricus autumnalis* (n° 1219).

Fig. 297 (d) : *Andricus hystrix* (n° 1221).

*Quercus Robur*

*Andricus serotinus* (n° 1220)

Fig. 298 (a). — D'ap. nat.

Fig. 299 (b). — D'ap. nat.

filaments épais à la base, s'amincissant ensuite, terminés en pointe mousse, longs de 4-10 mm. et portant des poils d'un gris argenté longs de 1 mm. (fig. 298). La galle est blond cendré ou gris rosé quand elle est à l'abri de la lumière, d'un rouge plus ou moins violacé dans le cas contraire. Cynipide septembre II. *Q. sess., pub.*

**Andricus serotinus** GIRAUD 1220

Giraud, 1859, p. 348-349, n° 10. Mayr, 1870, p. 13, n° 13, pl. II, 13, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 205-206, n° 29, pl. XI, 6-8, ⊕.

A.-H.

— Cécidies sphériques, généralement groupées par 2-4, jaunâtres, de 3,5 mm. de diamètre, portant de nombreux pro-

HOUARD, *Zoocécidies*.


longements longs de 3-4 mm. (fig.297), parcourus par 3-4 crêtes longitudinales et terminés par 1 à 12 soies blanchâtres. Cynipide automne I. *Q. ped., pub.* **Andricus hystrix** TROTTER 1221

Trotter, 1899, p. 297-398, n° 29, pl. XVIII, 7, 13. ⊕; 1901<sup>d</sup>, p. 370, n° 33; Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 496-498, pl. XXV, 5. ⊕; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 85, ⊕; Cecconi, 1904<sup>b</sup>, p. 183, n° 20. I.

D. — Cécidie pluriloculaire, de 10-25 mm. de diamètre, de la couleur de l'écorce, jamais gluante et présentant des appendices contournés de 5-10 mm. de long (fig.300). Cynipide novembre I, février II. *Q. ped., sess., pub.*

**Cynips coriaria** HAIMH. 1222

Mayr, 1870, p. 19, n° 22, pl. III, 22. ⊕; Massalongo, 1893, p. (180-181), n° 138, pl. XXX, 1. ⊕; E-C, Darboux et Houard, 1907, p. 207-208, n° 31, pl. XXVII, 6. ⊕. E-S, A-M.



*Quercus Robur*  
*Cynips coriaria* (n° 1222)  
Fig. 300. — D'ap. nat.



*Quercus Robur*  
*Andricus Panteli* (n° 1224)  
Fig. 301 (a). — Im. TAVARES  
Fig. 302 (b). — Im. KIEFF.

— Cécidie semblable, mais plus petite. Voir n°1687. *Q. ped.*

**Cynips coriaria** HAIMH. var. *lusitanica* KIEFF. 1223

Tavares, 1902<sup>b</sup>, p. 88, n° 23; 1905, p. 68. E-C, P.

— Cécidie pluriloculaire de 10-20 mm. de diamètre, vert jaunâtre, gluante à l'état frais; les appendices mesurent 5-15 mm. de long; ils sont larges à la base, velus, striés longitudinalement (fig.301-302). Cynipide décembre I, mars II. *Q. ped., sess., pub.* **Andricus Panteli** KIEFF. 1224

Kieffer, 1896<sup>b</sup>, p. 370; Trotter, 1899, p. 295; 1903, p. 51, n° 137; Stefani, 1901, p. 453, n° 35; Tavares, 1905, p. 68, pl. VI, 3, ⊕.

E-S,  
A-M.

- E. — Cécidie couverte sur toute sa surface de prolongements pyramidaux et offrant l'aspect d'une mâcle (fig 303). La figure 304 montre sa structure : autour d'une galle sphérique de 5-6 mm. de diamètre s'irradient des prolongements composés d'un pédicule mince, long de 3-4 mm., supportant une partie terminale, longue de 10 mm., s'évasant d'abord pour se terminer en pointe ; les différents prolongements s'accolent par leur partie évasée. Cynipide mars II. *Q. ped., sess., pub.*

**Cynips Hartigi** HARTIG 1225

Mayr, 1870, p. 12, n° 10, pl. II, 10, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VIII, n° 246, ⊕; Stefani, 1898<sup>c</sup>, p. (24), n° 41; Darboux et Houard, 1907, p. 206-207, n° 30, pl. XXVII, 1-2, ⊕.

A-H, I.



a



a



b



b

*Quercus Robur*

*Cynips Hartigi* (n° 1225)  
Fig. 303 (a). — Im. KIEFF.  
Fig. 304 (b). — Im. KIEFF.

*Quercus Robur*

*Andricus lucidus* (n° 1226) et var. *erinacea* (n° 1227).  
Fig. 305 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 306 (b). — Im. KIEFF.

- Cécidie pluriloculaire, arrondie, de la grosseur d'une cerise à celle d'une noix, couverte de prolongements très nombreux, dressés, longs de 4-8 mm. (fig 305) et composés chacun d'un long filament portant, à son extrémité, un petit renflement teinté de rouge et couvert d'une substance gluante. Cynipide mars avril II. *Q. ped., sess., pub.*

**Andricus lucidus** HARTIG 1226

Mayr, 1870, p. 23, n° 27, pl. III, 27, ⊕; Licopoli, 1877, p. 7-8, pl. I, 16, ⊕; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 86, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 317, ⊕; Trotter, 1903, p. 50-51, n° 135; Darboux et Houard, 1907, p. 208, n° 32, pl. XIV, 4-5, pl. XXVIII, 10, ⊕.

E-G,  
E-S,  
A-M.

— Cécidie semblable à la précédente, mais les appendices ne mesurent que 2-4 mm. de longueur (fig.306) ; leur renflement terminal est à peine indiqué et ils sont en outre striés longitudinalement. La galle a 8-10 mm. de diamètre. *Q. ped.*


**Andricus lucidus** HARTIG var **erinacea** TROTTER 1227

Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p.476, pl.XXV, 8, ♂ ; Trotter, 1901<sup>d</sup>, p.370-371, n°34 ; Cecconi, 1902<sup>b</sup>, p.356, n°34. /.

— Cécidie semblable à celle d'*Andricus Mayri* (n°1198), mais formée aux dépens d'un bourgeon. *Q. ped.* Cynipide 1228

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p.118, note 1. /.

F. — Cécidie jaunâtre, teintée de rose par endroits ; la partie distale se termine par une base parfois presque plane, mais le plus souvent un peu bombée, avec dépression centrale. Du bord de cette surface partent plusieurs prolongements cornus disposés en couronne (fig.308) et dont la base est quelquefois cerclée d'une dépression annulaire ; la surface de la galle est



*Quercus Robur*  
*Cynips coronaria* (n°1229)

Fig. 307 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 308 (b). — D'ap. nat.

*Quercus Robur*  
*Cynips polycera* (n°1230)

Fig. 309 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 310 (b). — D'ap. nat.

*Quercus Robur*  
*Cy. polycera* var. *subterranea* (n°1232)  
*Cy. polycera* var. *nov.* (n°1232).

Fig. 311 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 312 (b). — Im. MAYR.

gluante, celle des appendices ne l'est pas. A l'intérieur est une coque ovoïde. La hauteur de la cécidie est de 10-12 mm. environ, sa largeur de 12-15 mm. — Parfois les prolongements forment deux couronnes, mais ceux de la couronne interne

ne mesurent alors que 2-3 mm. de long (fig. 307). *Q. ped., sess., pub.*

**Cynips coronaria** STEFANI 1229

Giraud, 1859, p. 342-344, n° 4; Mayr, 1870, p. 18, n° 21, pl. III, 21 b, ⊕; Stefani, 1898, p. 160-163; Trotter, 1903, p. 202, n° 150; Darboux et Houard, 1907, p. 210-211, n° 34, pl. XXVII, 5, ⊕.

*E-C, I, G.*

— Galle en cloche ou en cône, de 12-15 mm. de hauteur, de 12-15 mm. de diamètre; la base est ornée d'un mamelon central et limitée par un bord tranchant (fig. 309) qui porte d'ordinaire 3-4 prolongements en forme de corne aplatie et recourbée. Cette cécidie est, à l'état frais, d'une couleur vert clair, parfois mélangé de rougeâtre et d'une consistance médiocre; en se desséchant elle devient brune et plus dure. Elle présente une galle interne ovoïde marquée de stries (fig. 310). Cynipide octobre-novembre I ou printemps II. *Q. ped., sess., pub.*

**Cynips polycera** GIRAUD 1230

Giraud, 1859, p. 340-341, n° 2; Mayr, 1870, p. 20, n° 23, pl. III, 23, ⊕; Licopoli, 1877, p. 9, pl. I, 6, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 211-212, n° 35, pl. XIV, 6, pl. XX, 4-6, ⊕.

*E-C, I.*

— Cécidie semblable à la précédente, mais sa base est de forme elliptique (au lieu d'être circulaire), sa partie proximale presque cylindrique et enfin la galle interne n'est pas striée. *Q. pub.* **Cynips polycera** GIRAUD var. **transversa** KIEFF.

1231

Kieffer, 1900 b, p. 528-529, pl. XXV, 9, ⊕; 1901 b, p. 421, 431.

*si.*

— A la base du tronc, le plus souvent dissimulée sous la terre ou les feuilles mortes, cécidie semblable à celle de *C. polycera* (voir n° 1230), mais à cône plus court et sans véritables appendices (fig. 311); elle est d'un vert jaunâtre, rosé ou rougeâtre, parfois teinté de violacé. La cavité centrale est délimitée par une paroi dont la consistance est à peine plus grande que celle du tissu qui l'entoure. Cynipide novembre I. *Q. ped., sess., pub.*

\* **Cynips polycera** GIRAUD var. **subterranea** GIRAUD 1232

Giraud, 1859, p. 341, n° 3; Mayr, 1870, p. 21, n° 23, pl. III, 23 a, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 212-213, n° 36, pl. XIV, 1, ⊕.

*E-C, I.*

\* Une forme de cette galle (fig. 312), figurée par Mayr (1870, pl. III, 23 a, ⊕) et reproduite par Kieffer (1900 b, p. 524, note 1, pl. XII, 5, ⊕), possède des bords tranchants et une surface libre presque plane.

— Cécidie ne se différenciant pas de la galle précédemment décrite. *Q. pub.*

**Cynips trinacriæ** STEFANI 1233

Stefani, 1906 b, p. 127-128, n° 1; Mayr, 1907, p. 6-7.

*si.*

— Cécidie semblable à la précédente, mais isolée, portée par un petit pédicelle, à surface supérieure légèrement convexe, munie en son centre d'un minime bouton ; les prolongements marginaux sont nombreux et courts ; la teinte générale de la galle est vert d'eau.

**Cynipide** 1234

Darboux et Houard, 1907, p. 213-214, n° 37, pl. XIV, 9-10, ⊕.

A-H.

G. — Cécidie en forme de corne souvent bifurquée (fig. 313) ; elle est formée d'une partie basilaire longue de 7-8 mm., large de 5-6 mm. qui contient la chambre larvaire (fig. 314) et porte à son extrémité distale un prolongement qui peut atteindre 50 mm. de long et qui est tantôt simple, tantôt bifurqué, mais toujours marqué d'un sillon qui le parcourt dans toute sa longueur. *Q. ped., sess., pub.*

**Cynips aries** MAYR 1235


Giraud, 1859, p. 371, n° 1 ; Mayr, 1870, p. 33, n° 43, pl. IV, 43, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VIII, n° 180, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 215-216, n° 38, pl. XXVII, 8, ⊕.

E-C, I, SE.




*Quercus Robur*  
*Cynips aries* (n° 1235)

Fig. 313 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 314 (b). — D'ap. nat.



*Quercus Robur*  
*Cynips galeata* (n° 1236)

Fig. 315. — D'ap. nat.



*Quercus Robur*  
*Cynipide* (n° 1237)  
*Cynips Korlevici* (n° 1238)

Fig. 316, 317 (a, b). — Im. TROTTER  
Fig. 318, 319 (c, d). — Im. KIEFF.

— Cécidie se décomposant nettement en une partie basilaire ovoïde, longue de 4-5 mm., haute de 2-3 mm., de teinte rousse, à peu près glabre ou avec poils blanchâtres épais et assez longs, et



en une partie terminale, de diamètre un peu plus grand (fig.315), subhémisphérique, couronnée par plusieurs petits prolongements ; galle interne dans la partie basilaire. Cynipide été II. *Q. ped., sess., pub.* **Cynips galeata** MAYR 1236

Mayr, 1870, p.22, n°26, pl. III, 26, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. II, n° 36, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p.216, n° 39, pl. XXVIII, 3, ⊕.

*E-C, I, P-B.*

— Cécidie ligneuse, subcylindrique, longue de 8-10 mm., large de 5-6 mm., ayant la forme d'une petite corolle gamopétale, à bords divisés et renversés en dehors (fig.316), enveloppant une cavité assez profonde. Cette petite corolle est séparée par un sillon transversal du corps gallaire proprement dit, subsphérique, qui contient une ample cavité larvaire (fig.317).

*Q. pub.* **Cynipide** 1237

Trotter, 1903, p.202-203, n° 153, pl. I, 14 bis, ⊕.

*BU.*

— Cécidie composée de deux parties, comme les précédentes. La partie distale est haute de 7-8 mm., large de 5-6 mm., brunâtre, presque ligneuse, largement ouverte en gobelet (fig.318) et séparée par un étroit sillon circulaire de la partie proximale qui embrasse le rameau, mais qui n'y est fixée que par un point. La galle est velue dans la région basilaire. Galle interne arrondie, à paroi mince, située près du fond de la cavité du gobelet (fig.319). *Q. pub.* **Cynips Korlevici** KIEFF. 1238

Kieffer, 1902<sup>e</sup>, p.496 : 1905, p.578-579, pl. X, 6-7, ⊕ ; Mantero, 1906, p.461, n° 41.

*A-II, I.*

— Cécidie présentant la forme indiquée par la figure 320, mais dont la base se prolonge en plusieurs appendices trapus appliqués sur le rameau ; sa surface, brune, présente quelques poils courts et des stries formant une réticulation plus ou moins distincte. La galle interne, ligneuse, est blanche et noyée dans un tissu spongieux brun (fig.321). Cynipide mars I.

*Q. ped., sess., pub.* **Cynips conifica** HARTIG 1239

Mayr, 1870, p.13, n° 12, pl. II, 12, ⊕ ; Trotter, 1903, p.201, n° 148 ; Darboux et Houard, 1907, p.216-217, n° 40, pl. XXVIII, 9, ⊕.

*E-C, P-B, F, I.*

— Cécidie haute de 5-15 mm., semblable à la précédente (fig.322-323), mais à sommet enfoncé, à surface brun roussâtre, couverte de poils blancs et de nervures anastomosées. Cynipide mars III. *Q. pub.*

**Cynips conifica** HARTIG var. *longispina* KIEFF. 1240


Trotter, 1898, p.21, n° 23 ; 1901<sup>d</sup>, p.374, n° 41, pl. XVI, 10, ⊕ ; Mantero, 1906, p.455, n° 24.

*I.*

H. — Cécidie arrondie, d'un brun marron luisant, de 20-35 mm. de diamètre, présentant une nodosité apicale peu marquée, autour de laquelle sont disposées régulièrement, de façon à former une couronne, d'autres nodosités plus accentuées pouvant quelquefois acquérir jusqu'à 5-6 mm. de long. Au centre de cette cécidie se trouve une galle interne ellipsoïdale dont le grand axe est dans le plan équatorial de la galle externe. Cynipide février-mars H. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Cynips quercus-tozæ** Bosc 1241

Massalongo, 1893, p. (175-177), n° 135, pl. XXIX, 3, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 40, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VIII, n° 242, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 225-226, n° 51, pl. XXVII, 11-12, ⊕. E-T,  
A-M.



**Quercus Robur**

*Cynips conifica* (n° 1239)

Fig. 320 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 321 (b). — D'ap. nat.

**Quercus Robur**

*Cynips conifica* var. *longispina* (n° 1240)  
*Cynips truncicola* (n° 1243)

Fig. 322, 323 (a, b). — Im. TROTTER  
Fig. 324 (c). — D'ap. nat.

**Quercus Robur**

*Cynips caliciformis* (n° 1244)

Fig. 325 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 326 (b). — D'ap. nat.

— Cécidie arrondie, uniloculaire, de 20-30 mm. de diamètre, un peu spongieuse, à surface couverte de grands mamelons pyramidaux surbaissés, contigus, sillonnés longitudinalement. Le sommet de ces mamelons est bleuté avant la maturité,

tandis que la base est rouge et la région médiane jaunâtre.

Cynipide printemps II. *Q. sess.* **Cynips mediterranea** TROTTER 1242

Cecconi, 1901<sup>e</sup>, p. 742, n° 99.

I.

— Cécidie arrondie, de 6-7 mm. de diamètre, de la couleur de l'écorce et ligneuse; sa couche corticale, un peu pubescente, est divisée par des fissures étroites en compartiments assez réguliers au centre de chacun desquels se voit un petit tubercule (fig. 324). Cynipide mars II ou III. *Q. ped., sess., pub.*

**Cynips truncicola** GIRAUD 1243

Giraud, 1859, p. 345-346, n° 6; Mayr, 1870, p. 12, n° 11, pl. II, 11, ⊕; Licopoli, 1877, p. 9, pl. I, 8, ⊕; Massalongo, 1893, p. (185-186), n° 141, pl. XXX, 6, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 226, n° 52, pl. XXVIII, 4, ⊕.

E-C,

P-B,

I.E.

— Cécidie arrondie, de 5-10 mm. de diamètre, ligneuse; sa couche corticale, revêtue d'une pubescence courte, lisse, comme feutrée, d'un gris roussâtre, est divisée en facettes présentant chacune un petit mamelon lisse et nu (fig. 325). Au centre se trouve une galle interne à parois épaisses (fig. 326), autour de laquelle sont disposées des fibres rayonnantes. Cynipide août I. *Q. ped., sess., pub.* **Cynips caliciformis** GIRAUD 1244

Giraud, 1859, p. 339, n° 1; Mayr, 1870, p. 21, n° 24, pl. III, 24, ⊕; Massalongo, 1893, p. (178-179), n° 136, pl. XXIX, 4-5, ⊕; Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 560-562, pl. XXIV, 2, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 226-227, n° 53, pl. XXVIII, 1-2, ⊕.

E-C, I,

P-B.

— Petite cécidie de 4 mm. de diamètre en moyenne (fig. 327); sa surface est parsemée de petites élévations courtes, cylindriques ou un peu coniques. La couche externe, durcissant à maturité, enveloppe une galle interne ligneuse, à côtes rayonnant à partir du sommet (fig. 328). Galle tombant en octobre. Cynipide juillet-août III. *Q. ped., sess., pub.*

**Andricus Kirchsbergi** WACHTEL 1245

Giraud, 1859, p. 372, n° 3; Mayr, 1870, p. 33, n° 44, pl. IV, 44, ⊕; Trotter, 1901<sup>d</sup>, p. 372-373, n° 38, pl. XVI, 8, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 209-210, n° 33, pl. XVI, 10-11, ⊕.

E-C,

E-S.

— Cécidie ressemblant à la précédente par sa forme et sa taille (diamètre de 3-6 mm.); elle en diffère par les 10-15 petites crêtes longitudinales dentelées qui ornent sa surface (fig. 329-330).

*Q. pub.*

**Andricus** 1246

Trotter, 1901<sup>d</sup>, p. 373, n° 39, pl. XVI, 9, ⊕.

I.


K. — Cécidie brune, arrondie, de taille très variable (13-35 mm. de diamètre), hérissée sur toute sa surface d'aspérités parfois ter-

minées en pointe, disposées sans ordre et plus ou moins reliées par des carènes longitudinales (fig.331). Cette galle, qui tombe à maturité, présente une grande cavité centale (fig.332) dans laquelle se trouve une petite galle interne ovoïde. Cynipide printemps II. *Q. ped.*

**Cynips hungarica** HARTIG 1247

Mayr, 1870, p. 15, n° 16, pl. II, 16, ⊕ ; Paszlavszky, 1884 b, p. 225 ; Trotter, 1903, p. 203, n° 154 ; Darboux et Houard, 1907, p. 227, n° 54, pl. XXVII, 10, ⊕.

A-H,  
SE.




**Quercus Robur**

*Andricus Kirchsbergi* (n° 1245)

*Andricus* (n° 1246)

Fig. 327, 328 (a, b). — Im. GIRAUD

Fig. 329, 330 (c, d). — Im. TROTTER



**Quercus Robur**

*Cynips hungarica* (n° 1247)

Fig. 331 (a). — Im. KIEFF.

Fig. 332 (b). — Im. KIEFF.

— Cécidie sphérique, jaune brunâtre, de 12-23 mm de diamètre, parsemée de petites nodosités (fig.333) ; son parenchyme brun jaunâtre se laisse facilement couper au couteau. La galle sort sur le côté d'un bourgeon qui demeure intact (fig.334). Cynipide août-septembre I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Cynips Kollari** HARTIG 1248

Licopoli, 1877, p. 5, pl. I, 1, ⊕ ; Beijerinck, 1882, p. 132-155, pl. IV, 67-74, pl. V, 75-88, ⊕ ; Mas-salongo, 1893, p. (182-183), n° 139, pl. XXX, 2 5, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 37, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 228, n° 55, pl. XV, 1, ⊕.


E-T,  
A-M.

— Cécidie d'un jaune brunâtre, de 10-12 mm. de diamètre, à surface couverte ou non de rides irrégulières et présentant en outre des nodosités plus ou moins saillantes, distribuées sans

aucun ordre (fig. 335-337). Au centre se voit une cavité arrondie, creusée au milieu du parenchyme dur (fig. 336). La galle sort d'un bourgeon qui disparaît entièrement. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Cynips tinctoria** OLIV. var. **nostra** STEFANI 1249

Stefani, 1898, p. 160, n° 3; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 39, ⊕; Trotter, 1903, p. 208-209, n° 161. E-G,  
E-S, A-M.



**Quercus Robur**  
*Cynips Kollari* (n° 1248)  
Fig. 333 (a). — Im. GIRAUD  
Fig. 334 (b). — D'ap. nat.

**Quercus Robur**  
*Cynips tinctoria* var. *nostra* (n° 1249)  
Fig. 335 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 336 (b). — D'ap. nat.  
Fig. 337 (c). — D'ap. nat.

— Cécidie piriforme, verdâtre, plus tard terreuse, à surface couverte de petits tubercules. *Q. pub.*

**Cynipide** 1250

Calabrese-Milani, 1902, p. 63-64, n° 24, pl. I, 6 b, pl. III, 2, ⊕.

*I.*

- L. — Cécidie présentant 3, 4, rarement 2, 5, 6, mamelons coniques, généralement terminés en pointe aiguë et longs de 3-6 mm. (fig. 338-339); entre ces mamelons, c'est-à-dire à la partie apicale de la cécidie, se voit une petite nodosité en forme de verrue (fig. 340) entourée d'une pubescence annulaire. L'épiderme est gris brunâtre, fendillé, finement velu et non luisant; le rameau n'est pas renflé et il n'y a pas de galle interne (fig. 341). Cynipide mai II. *Q. pub.*, *sess.*, [*ped.*].

**Cynips amblycera** GIRAUD 1251

Giraud, 1859, p. 347, n° 8; Mayr, 1870, p. 21, n° 25, pl. III, 25, ⊕; Trotter et Cecconi 1901, fasc. IV, n° 89, ⊕; Darboux et Honard, 1907, p. 217, n° 41, pl. XVII, 10-12, ⊕.


A-H,  
BU, I.

— Cécidie identique à la précédente, haute et épaisse de 7-8 mm., mais les mamelons sont plus courts, plus gros, largement arrondis et terminés par une petite verrue (fig. 342). L'épiderme est de la couleur de l'écorce, glabre, déchiré au voisinage de la base de chaque mamelon; le rameau n'est pas déformé et il y a une galle interne. Cynipide printemps II. *Q. pub.*

**Cynips ambigua** TROTTER 1252

Trotter, 1898, p. 21-22, n° 4; 1899, p. 301, n° 31, pl. XVIII, 8, ⊕.

I.



*Quercus Robur*

*Cynips amblycera* (n°1251)

Fig. 338, 339 (a, b). — D'ap. nat.  
Fig. 340, 341 (c, d). — D'ap. nat.

*Quercus Robur*

*Cynips ambigua* (n°1252)  
*Cynips corruptrix* (n°1253)

Fig. 342 (a). — Im. TROTTER  
Fig. 343, 344 (b, c). — Im. TROTTER

*Quercus Robur*

*Andricus callidoma* (n°1254)

Fig. 345 (a). — Im. GIRAUD  
Fig. 346 (b). — Im. GIRAUD

— Cécidie formée d'une partie basilaire à peu près cylindrique, surmontée de 1 à 5 (le plus souvent 2-3) mamelons arrondis ou coniques, longs de 2 à 4 mm. (fig. 343-344): entre ces mamelons se trouve une petite verrue latérale et glabre. L'épiderme plus ou moins fendillé est brun-rouge sur les mamelons; le rameau est renflé et il y a une galle interne subligneuse. Cynipide juin II. *Q. ped.*

**Cynips corruptrix** SCHL. 1253

Schlechtendal, 1870, p. 339, n° 3; Trotter, 1903, p. 301, n° 151.

E-C, I, SE, A-M.

M. — Cécidie fusiforme portée à l'extrémité d'un pédoncule plus long qu'elle ; sa surface, d'un vert-grisâtre au début, plus tard brune, est marquée de côtes plus ou moins saillantes et porte des poils raides dirigés vers le bas (fig.345-346), qui existent aussi sur le pédoncule. Cynipide printemps III. *Q. ped., pub.*

**Andricus callidoma** GIRAUD 1254

Giraud, 1859, p.348, n°9 ; Mayr, 1870, p.25, n°33, pl.IV, 33, ⊕ ; R. du Buysson, 1900, p.357 ; Darboux et Houard, 1907, p.229-230, n°57, pl.XVII, 8-9, ⊕. *E-G, L.F.*

— Cécidie fusiforme, de 10 mm. de long (fig.347), de couleur brune, garnie d'un feutrage de même teinte ; ses parois sont ligneuses et peu épaisses. La galle devient glabre après la sortie de l'insecte (septembre I). *Q. ped., sess., pub.*

**Andricus solitarius** FONSÉC. 1255

Ratzeburg, 1884, p.53-59, pl.V, 6-7, ⊕ ; Mayr, 1870, p.24, n°29, pl.III, 29, ⊕ ; Massalongo, 1893, p.(171-172), n°132, pl.XXVII, 5, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p.230, n°58, pl.XVI, 5, ⊕. *E-T.*

— Cécidie verte ou brun rougeâtre, ressemblant à un petit gland, pouvant atteindre 6 mm. de longueur (fig.348) ; elle présente un renflement en bourrelet (simulant une cupule) au-dessous d'une partie terminale subcylindrique (figurant l'amande du gland). L'ensemble est couvert d'une épaisse pilosité d'un blanc de neige (fig.349). Cynipide printemps II-III. *Q. ped., sess., pub.*

**Andricus glandulæ** SCHENCK 1256

Mayr, 1870, p.26, n°34, pl.IV, 34, ⊕ ; Kieffer, 1900 b, p.452-454, pl.XVIII, 7, ⊕ ; Tavares, 1905, p.72, pl.VII, 13-14, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p.231-232, n°59, pl.XVII, 13-14, ⊕. *E-G, E-O, I, P.*

— Cécidie pileuse, semblable à la précédente, n'en différant que par le pédoncule assez long, parfaitement cylindrique, et par la couronne très régulière de grosses gibbosités arrondies qui entoure la région équatoriale de la galle (fig.350).

**Andricus glandulæ** SCHENCK var. 1257

Mayr, 1870, p.26, n°34, pl.IV, 34, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p.231-232, n°59, pl.XVII, 4-5, ⊕. *E-G.*

— Cécidie de 2,5 mm. de long (fig.351), arrondie au sommet, verte ou teintée de rouge, couverte de quelques poils assez longs et souvent colorés en rouge. Cynipide mai I. *Q. pub.*

**Dryophanta floseuli** GIRAUD 1258


Giraud, 1868, p.54, 4° ; Mayr, 1870, p.32, n°41, pl.IV, 41, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p.218, n°42, pl.XVIII, 5, ⊕. *E-G, F.J.*

— Cécidie de 2,5 mm. de long (fig.352), d'abord rouge, plus

tard violette, arrondie au sommet qui peut présenter une légère dépression ; les poils sont très courts et donnent à la surface un aspect velouté (fig.353). Cynipide mai-juin I. *Q. ped.*, *sess.*

**Dryophanta Taschenbergi** SCHL. 1239

Lichtenstein-Adler, 1881, p.50-51, n° 14 a, pl. XI, 14 a, ⊕ ; Beijerinck, 1882, p.98-101, pl. III, 35-41, ⊕ ; Pigeot, 1904, p.15 ; Jörgensen, 1906, p.94, n° 8. E-N,  
E-C, F.



*Quercus Robur*

- Fig. 347 (a) : *Andricus solitarius* (n°1255) . . . . . D'ap. nat.  
 Fig. 348, 349 (b) : *Andricus glandulae* (n°1256) . . . . . D'ap. nat.  
 Fig. 350 (c) : *Andricus glandulae* var. (n°1257) . . . . . Im. GIRAUD  
 Fig. 351 (d) : *Dryophanta floscoli* (n°1258) . . . . . Im. MAYR  
 Fig. 352, 353 (e) : *Dryophanta Taschenbergi* (n°1259) . . . . . Im. ADLER  
 Fig. 354, 355 (f) : *Dryophanta similis* (n°1261) . . . . . Im. ADLER

— Cécidie présentant beaucoup d'analogie avec la précédente : haute de 4 mm , large de 2 mm , arrondie à l'extrémité, brunâtre à maturité, glabre ou très finement velue. En général plusieurs cécidies sont groupées et étroitement serrées. *Q. ped.*

**Biorrhiza Cecconiana** KIEFF. 1260

Cecconi, 1902, p.636 ; Kieffer, 1905, p.582-583. I.

— Cécidie de 2 mm. de long (fig.354). à sommet en pointe mousse, d'un gris verdâtre ; les poils sont blancs et assez longs (fig.355). Cynipide mai I. *Q. ped.*, *sess.*

**Dryophanta similis** ADLER 1261

Lichtenstein-Adler, 1881, p.52-53, n°15 a, pl. XI, 15 a, ⊕ ; Liebel, 1886, p.562, n° 219. A.A-H.

N. — Cécidie arrondie ou ovoïde (fig.356) ne présentant aucune aspérité, mais parfois marquée de dépressions ; sa teinte est mêlée de jaunâtre et de rougeâtre et sa taille varie de celle d'une noix à celle d'une petite pomme. La section (fig.357) montre plusieurs cavités ovoïdes dont le grand axe est parallèle au rameau à l'extrémité duquel est insérée la galle. Cynipide juin-juillet I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Biorrhiza pallida** OLIV. 1262



Mayr, 1870, p. 28, n° 37, pl. IV, 37, ⊕ ; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 58-61, n° 17 a, pl. XI, 17 a, ⊕ ; Beijerinck, 1882, p. 58-78, pl. I, 12-16, pl. II, 17-23, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. III, n° 110, ⊕ ; Trotter et Ceconi, 1906, fasc. XV, n° 353, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 218-219, n° 43, pl. XIX, 4, ⊕ ; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n° 73, ⊕. E-T,  
A-M.

— Cécidie sphérique, jaune brunâtre, de 12-23 mm. de diamètre, à parenchyme mou, mais entièrement lisse. Voir n° 1248.


**Cynips Kollari** HARTIG 1263

— Cécidie semblable à la précédente, mais n'ayant que 10 mm. environ de diamètre. Voir n° 1675. [*Q. ped.*].

**Cynips Kollari** HARTIG. var. *minor* KIEFF. 1264

Tavares, 1905, p. 68.

P.



**Quercus Robur**  
*Biorrhiza pallida* (n° 1262)  
Fig. 356 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 357 (b). — D'ap. nat.

**Quercus Robur**  
*Cynips lignicola* (n° 1265)  
Fig. 358 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 359 (b). — D'ap. nat.

**Quercus Robur**  
*Cynips conglomérata* (n° 1266)  
Fig. 360 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 361 (b). — D'ap. nat.

— Cécidie arrondie, de 8-10 mm. de diamètre en général (fig. 358), de couleur brun-rouille ; l'épiderme présente des déchirures plus ou moins étendues. A l'intérieur on trouve, toujours au voisinage du point d'insertion, une galle interne blanc jaunâtre (fig. 359) noyée dans un parenchyme brun-rouille. Cynipide mai-juin II. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Cynips lignicola** HARTIG 1265

Mayr, 1870, p. 16, n° 19, pl. II, 19, ⊕ ; Hieronymus, 1890, p. 214-215, n° 649 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n° 217-217 a, ⊕ ; Trotter et Ceconi, 1901, fasc. IV, n° 83, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 219-220, n° 44, pl. XV, 4, ⊕ ; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 47, ⊕. E-T,  
A-M.

— Cécidies arrondies, de 6-10 mm. de diamètre (fig.360), de teinte d'abord verte, plus tard brun jaunâtre, généralement réunies en grappes sur les bourgeons terminaux et latéraux des jeunes branches. Chaque cécidie présente dans la plupart des cas un petit mamelon saillant, au-dessous duquel se trouve la galle interne (fig.361). Cynipide novembre I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Cynips conglomerata** GIRAUD 1266

Giraud, 1859, p. 344-345, n° 5; Mayr, 1870, p. 16, n° 20, pl. II, 20, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 318, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 220-221, n° 45, pl. XV, 2, ⊕.

*E. C.*  
*I. F.*

— Cécidie ligneuse, dure, compacte, uniloculaire, globuleuse, d'un diamètre de 15-20 mm. Voir n°1677. *Q. ped.*

**Cynips tinctoria** OLIV. 1267

Trotter, 1903, p. 208, n°160; Darboux et Houard, 1907, p. 228-229, n° 56, pl. XI, 2, ⊕.

*A. H.*  
*T. A. M.*

— [Cécidie très dure, sphérique, de 10 mm. environ de diamètre, à galle larvaire centrale. Voir n°1833. *Q. sess.*

**Synophrus politus** HARTIG] 1268

Cecconi, 1897, p. 442.

*I.*

O. — Cécidie gluante, de teinte vert pâle ou d'un rouge plus ou moins vif au début, plus tard brune, du volume d'une cerise et présentant la forme indiquée par les figures 362 et 364. La section médiane (fig.363) montre une galle interne ovoïde dont le grand axe est perpendiculaire à celui de la cécidie. Cynipide mars II. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Cynips glutinosa** GIRAUD 1269

Giraud, 1859, p. 342-344, n° 4; Mayr, 1870, p. 18, n° 21, pl. III, 21, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 221-222, n° 46, pl. XX, 3, ⊕.

*A. H.*  
*E. S.*

— Cécidie assez semblable à la précédente, solitaire, légèrement conique à la partie supérieure, haute de 8-10 mm., large d'autant, à surface brun jaunâtre, glabre et lisse (fig.365); paroi épaisse de 1-2 mm. (fig.366); galle interne ovoïdale (3,5 mm. sur 2 mm.). Cynipide printemps II. *Q. Robur.*

**Cynips tergestensis** KIEFF. 1270

Græffe, 1905, p. 370-372, fig. 1, ⊕.

*A. H.*


— Cécidie en forme de cône allongé, haut de 12 à 18 mm., large de 15 à 18 mm., embrassant par sa base le rameau et quelques pétioles de feuilles (fig.367); sa surface est revêtue d'un feutrage dense fauve et caduque; enfin, la partie supérieure du cône

est un peu élargie et creusée en une cuvette avec ombilic central. Cavité larvaire unique et grande située dans la région basilaire (fig.368) Cynipide mars-avril II. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Cynips tomentosa** TROTTER 1271

Trotter, 1903, p. 209-210, n° 162, pl. I, 12, pl. II, 19, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XI, n° 270, ⊕.

*P-B,*  
*A-M,*



*Quercus Robur*

*Cynips glutinosa* (n°1369)  
Fig. 362, 363 (a, b). — D'ap. nat.  
Fig. 364 (c). — Im. GIRAUD

*Quercus Robur*

*Cynips tergestensis* (n°1270)  
Fig. 365 (a). — Im. GR.EFFE  
Fig. 366 (b). — Im. GR.EFFE

*Quercus Robur*

*Cynips tomentosa* (n°1271)  
Fig. 367 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 368 (b). — D'ap. nat.

— Galle de couleur jaune pâle, brillante, en forme de coupe (fig.369), fixée à l'extrémité d'un pédoncule dont la longueur et le diamètre varient respectivement de 5 à 8 mm. et de 1,5 à 3 mm. La coupe a un diamètre de 15-22 mm. et ses bords sont légèrement recourbés en dehors, parfois fimbriés ; au point où elle se rattache au pédoncule, on trouve une galle interne ovoïde (fig.370), dont le grand axe est perpendiculaire au pédoncule. Cynipide fin automne I. *Q. sess.*, *pub.*

**Cynips Stefaniai** KIEFF. 1272

Licopoli, 1877, p. 10, pl. I, 15, ⊕ ; Massalongo, 1893, p. (186-188), n° 142, pl. XXIX, 6, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 38, ⊕.

*L.*

— Galle ligneuse, en forme de coupe, à bord déformé, plus ou moins lacinié ou denté, irrégulièrement replié, de 3 mm. de

hauteur à peine et d'un diamètre de 4-6 mm. ; la partie basilaire est subcylindrique et la partie supérieure plane porte en son centre un petit cône entouré de très petits tubercules ; l'ensemble est brun et revêtu d'une courte pilosité cendrée. Cécidie biloculaire, avec grande chambre larvaire. Plusieurs de ces galles sont en général agglomérées à l'extrémité des jeunes pousses. *Q. Robur*.

Cynipide 1273

Stefani, 1898<sup>c</sup>, p. (19-20), n° 27.


si.

— Cécidie constituée comme celle du *Cynips Stefaniai*, mais la partie supérieure au lieu d'être étalée en un disque concave est rétrécie, presque toujours lobée (fig. 371) ; l'ensemble forme une coupe profonde et étroite. *Q. ped.*

Cynipide 1274

Trotter, 1903, p. 211-212, n° 165, pl. II, 17, ⊕ ; Kieffer, 1905, pl. XXI, 3-4, ⊕.

A-M.



Quercus Robur

*Cynips Stefaniai* (n° 1272)

Cynipide (n° 1274)

Fig. 369, 370 (a, b). — Im. KIEFF.

Fig. 371 (c). — Im. TROTTER

Quercus Robur

*Cynips mitrata* (n° 1275)

Fig. 372 (a). — D'ap. nat.

Fig. 373, 374 (b, c). — Im. GIRAUD

Fig. 375, 376 (d, e). — Im. MAYR et KIEFF.

— Cécidie formée de deux parties superposées (fig. 372-376), séparées par un étranglement ; la partie inférieure, large de 10 mm., embrasse le rameau, tandis que la portion supérieure, de diamètre beaucoup moins considérable, forme une rosette à bords arrondis, un peu ondulés et dont le centre est creusé

d'une petite fossette. Cynipide février-mars II. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Cynips mitrata** MAYR 1275

Giraud, 1859, p. 344; Mayr, 1870, p. 18, n° 21, pl. III, 21 c, d, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, *E-C, I*, fasc. II, n° 34; Darboux et Houard, 1907, p. 222-223, n° 47, pl. XVI, 8-9, ⊕. *A-M.*

— Cécidie conique. Voir n° 1239 et fig. 320.

**Cynips conifica** HARTIG 1276

P. — Cécidie verte, glabre, de 3 à 4,5 mm. de diamètre, pourvue au sommet d'une petite proéminence et entourée à la base par les écailles du bourgeon (fig. 377); sous la couche épidermique charnue, assez mince, se trouve une galle interne ligneuse à surface striée finement, en réseau. En octobre la cécidie tombe à terre et la galle interne est mise à nu. Cynipide printemps II-IV. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Andricus globuli** HARTIG 1277

Lichtenstein-Adler, 1881, p. 32-34, n° 8, pl. X, 8, ⊕; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 84, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1906, fasc. XIV, n° 395, ⊕; Jörgensen, 1906, p. 95, n° 11, pl. II, 10, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 223, n° 48, pl. XVII, 7, ⊕. *E-T.*



*Quercus Robur*

*Quercus Robur*

*Quercus Robur*

*Andricus globuli* (n° 1277)  
*Trigonaspis meguptera* (n° 1280)

*Andricus Clementinæ* (n° 1279)

*Andricus Giraudi* (n° 1282)

Fig. 377 (a). — D'ap. nat.

Fig. 379 (a). — Im. KIEFF.

Fig. 381 (a). — D'ap. nat.

Fig. 378 (b). — Im. ADLER.

Fig. 380 (b). — Im. KIEFF.

Fig. 382 (b). — D'ap. nat.

— Cécidie rappelant beaucoup la précédente par sa forme et par ses dimensions, mais striée longitudinalement. Voir n° 1668. *Q. ped.*

**Andricus Bocagei** TAVARES 1278

Tavares, 1902, p. 107-108, n° 255.

P.

— Cécidie de 4-5 mm. de diamètre, insérée sur un très court pédoncule et portant au sommet un petit mamelon (fig.379-380) ; sa surface, un peu ridée, jaune brunâtre, présente quelques poils courts et blanchâtres. La galle interne, parfaitement arrondie, est libre au centre d'une cavité creusée dans le tissu spongieux. Cynipide février-mars II ou octobre-novembre II. *Q. sess.*, [*ped.*].

**Andricus Clementinæ** GIRAUD 1279

Giraud, 1859, p.349-350, n° 11 ; Mayr, 1870, p.26, n° 35, pl.IV, 35, ⊕.

A-H, [I-B, J].

— Cécidie sphérique, de 5 à 7 mm. de diamètre, présentant une petite pointe apicale (fig.378) ; sa surface glabre et brillante est d'un beau rouge ; ses parois sont épaisses et juteuses. Il n'y a pas de galle interne et la cécidie se dessèche après la sortie de l'insecte qui a lieu fin mai ou début juin ; la ♀ agame sortie de la galle pique les feuilles et donne naissance aux galles réniformes du *Trigonaspis renum*. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Trigonaspis megaptera** PANZER 1280

Mayr, 1870, p.14, n°14, pl.II, 14, ⊕ ; Lichtenstein-Adler, 1881, p.62-64, n° 18 a, pl.XI, 18 a, ⊕ ; Beijerinck, 1882, p.122-131, pl.IV, 59-66, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p.2°3-224, n° 49, pl.XIX, 5, ⊕.

E-T.

— Cécidie identique à la précédente. Insecte ne pouvant être distingué du précédent, mais produisant sur les feuilles la galle arrondie du *Trigonaspis synaspis*. *Q. Robur*.

**Trigonaspis megapteropsis** WRIESE 1281

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.578 ; Dalla Torre et Kieffer, 1902, p.56, n° 4 a.

H.

Q. — Cécidie toujours portée sur un long pédoncule (fig.381) ; elle est fusiforme, un peu plus grosse qu'un grain d'orge, de teinte verte, et sa surface présente 5-6 côtes longitudinales (fig.382), le plus souvent teintées de rouge vif et convergeant au sommet effilé en pointe mousse. La cécidie mûre tombe à terre en juillet-août. Cynipide printemps II-III. *Q. ped.*, *sess.*

**Andricus Giraudi** WACHTL 1282

Lichtenstein-Adler, 1881, p.41-42, n° 11, pl.XI, 11, ⊕ ; Houard, 1902<sup>b</sup>, p.45, n° 41 ; Tavares, 1905, p.71, pl.IV, 16, ⊕.

E-T  
(exc.E).

— Cécidie subsessile (fig.383) n'apparaissant qu'en septembre et semblable pour le reste à la précédente. Cynipide printemps III. *Q. ped.*, *sess.*

**Andricus Malpighii** ADLER 1283

Lichtenstein-Adler, 1881, p.44, n° 12, pl.XI, 12, ⊕ ; Houard, 1902<sup>b</sup>, p.45, n° 42.


E-C, E-O, J.

R. — Cécidie allongée, subcylindrique, portant une petite pointe vers son sommet arrondi (fig.384) ; elle est glabre, entièrement lisse, verte avec des bandes blanchâtres ; elle tombe en mai. Cynipide printemps II-III ou [novembre I]. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Andricus albopunctatus** SCHL. 1284

Mayr, 1871, p. 33, n° 94, pl. VII, 94, ⊕ ; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 71-72, n° 23, pl. XI, 23, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 224-225, n° 50, pl. XVIII, 3-4, ⊕.

E-G,  
E-O, I.



*Quercus Robur*

Fig. 383 (a) : *Andricus Malpighii* (n° 1283) . . . . . Im. ADLER  
 Fig. 384 (b) : *Andricus albopunctatus* (n° 1284) . . . . . D'ap. nat.  
 Fig. 385 (c) : *Andricus Lambertoni* (n° 1286) . . . . . Im. KIEFF.  
 Fig. 386-389 (d-g) : *Andricus Trotteri* (n° 1287) . . . . . Im. TROTTER

— Cécidie ovoïdale allongée, presque cylindrique, longue de 6-8 mm., large de 3 mm., ligneuse, glabre, avec la moitié supérieure striée longitudinalement ; un petit ombilic bien saillant termine la galle ; cavité larvaire spacieuse et paroi mince. Cynipide printemps II. *Q. ped.*

**Andricus Tavaresii** KIEFF. 1285

Tavares, 1905, p. 72-73.

P.

— Cécidie ligneuse, conique (fig.385), large de 4 mm. et haute de 5-6 mm., en tenant compte de l'appendice creux subcylindrique qui la surmonte ; elle est brune, glabre et striée longitudinalement depuis sa base jusqu'au sommet de l'appendice. Cynipide printemps III. *Q. ped.*, *sess.*

**Andricus Lambertoni** KIEFF. 1286

Kieffer, 1897<sup>a</sup>, p. 23, n° 1 ; 1900<sup>b</sup>, p. 455-456, pl. XVIII, 8, ⊕ ; Pigeot, 1904, p. 17.

A, F.

— Cécidie ellipsoïdale, à parois minces et subligneuses (fig.389), de 3 mm. de longueur sur 2-2,5 mm. de hauteur (fig.386), ayant l'apparence d'un petit œuf posé sur un coussinet (fig.387-388) ; la surface mate, faiblement rugueuse,

est de couleur sombre avec bandes transversales sinueuses, irrégulières, blanches ou grises. Cynipide décembre I. *Q. pub.*

**Andricus Trotteri** KIEFF. 1287

Trotter, 1899, p. 298-300, n° 30, pl. XVIII, 2-3, ⊕ : Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 87, ⊕. I.

S. — Forme de la galle non connue. . **Andricus Girardi** TAVARES 1288

Tavares, 1902, p. 108-109, n° 255 bis : 1905, p. 70. P.

Pl. ra. — Sur les racines les plus grosses comme sur les radicelles, et à une profondeur au-dessous de la surface du sol qui peut atteindre un mètre, cécidies d'abord jaune brunâtre, rouges ou blanchâtres par endroits, à surface verruqueuse (fig. 390), à substance charnue, devenant plus tard brun-noir et prenant après la sortie de l'insecte seulement une consistance ligneuse. Parfois ces galles sont plus ou moins sphériques, uni ou pluriloculaires (fig. 391), de la grosseur d'un pois à celle d'une cerise ; mais, le plus souvent, elles forment des agglomérations qui atteignent et dépassent la grosseur d'une noix et dans lesquelles les cécidies sont tantôt simplement juxtaposées, tantôt entièrement soudées en une masse unique. Cynipide novembre II-mars III. *Q. ped., sess., pub.* **Biorrhiza aptera** BOSQ 1289

Mayr, 1870, p. 6, n° 2, pl. I, 2, ⊕ ; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 56-58, n° 17, pl. XI, 17, pl. XII, 8, ⊕ ; Beijerinck, 1882, p. 62-64 ; Darboux et Honard, 1907, p. 235, n° 64, pl. XXVII, 3-4, ⊕ ; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n° 72, ⊕. E-T.

— Sur les racines et au voisinage de la surface du sol, nodosité pluriloculaire, d'abord blanche ou rosée, pouvant atteindre le volume d'un coing, de forme arrondie et de consistance charnue ; plus tard (après le printemps de la 2<sup>e</sup> année) la galle devient brun sombre et son parenchyme se lignifie. Cynipide printemps III. *Q. ped., sess., pub.* **Andricus radicis** FABR. 1290

Mayr, 1870, p. 6, n° 1, pl. I, 1, ⊕ ; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 22-24, n° 5, pl. X, 5, ⊕ ; Hieronymus, 1890, p. 210, n° 643 a ; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n° 19, ⊕. E-T.

Pl. ti. { Sur le tronc..... A.  
 { Sur les rameaux de l'année..... B.

A. — Cécidies situées sur la partie du tronc enfoncée en terre et semblables à celle décrite au n° 1290.

— Dans les crevasses de l'écorce, à la base du tronc le plus souvent, cécidies alignées et pressées l'une contre l'autre




(fig. 393), d'abord surmontées d'un opercule conique, rouge et charnu, qui tombe à la maturité (fig. 394), après quoi la galle se présente sous la forme d'un cône qui peut atteindre 10 mm: de haut; elle est enfoncée par sa pointe dans l'écorce de telle façon que sa base, qui a 3,5-4 mm. de diamètre, fait à peine saillie; cette base présente d'ailleurs une série de petites dépressions punctiformes (fig. 392) disposées à sa périphérie sur un cercle qui entoure une saillie arrondie de 2,5-3 mm. de diamètre et sous laquelle se trouve la cavité larvaire; trou de sortie apical. Cynipide avril-mai I. *Q. ped., sess., pub.*

**Andricus corticis** HARTIG 1291

E-T.

Mayr, 1870 p. 7, n° 3, pl. I, 3, ⊕; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 30-31, n° 7, pl. X, 7, ⊕; Tavares, 1905, p. 61-62, pl. IV, 3, pl. XII, 17, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 232, n° 60, pl. XIX, 6, ⊕.




*Quercus Robur*

*Biorrhiza aptera* (n° 1289)

Fig. 390 (a). — Im. KIEFF

Fig. 391 (b). — Im. KIEFF



*Quercus Robur*

*Andricus corticis* (n° 1291)

Fig. 392 (a). — D'ap. nat.

Fig. 393 (b). — D'ap. nat.

Fig. 394 (c). — Im. KIEFF.

— A la base des jeunes chênes ou à la face inférieure des branches qui touchent le sol, cécidies apparaissant d'abord comme de petites excroissances rouges, alignées dans une fente longitudinale de l'écorce (fig. 395, en haut), prenant plus tard la forme d'un cône obtus, rouge et charnu; à maturité il se détache un opercule qui est devenu brun par la dessiccation et l'on voit alors une petite excroissance arrondie (fig. 395), haute de 2-3 mm., de 3,5-5,5 mm. de diamètre, de couleur brun

clair et ne présentant des stries longitudinales que dans sa partie inférieure. Cynipide mars-avril III. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Andricus rhizomæ** HARTIG 1292

Mayr, 1870, p. 8, n° 4, pl. I, 4, ⊕; Trotter, 1903<sup>b</sup>, p. 17, n° 46; Darboux et Houard, 1907, p. 232-233, n° 61, pl. XXVIII, 7, ⊕. *E.T.*

— Cécidie passant au début par les mêmes stades que la précédente (fig. 397); mais après la chute de l'opercule on voit apparaître une cécidie conique, dure (fig. 396), haute de 5-6 mm., ayant 4-5 mm. de diamètre et présentant des stries longitudinales allant de la base au sommet. Cynipide mars III. *Q. ped.*, *sess.*

**Andricus Sieboldi** HARTIG 1293

Lichtenstein-Adler, 1881, p. 27-28, n° 6, pl. X, 6, ⊕; Houard, 1903<sup>c</sup>, p. 262-270, fig. 188-198, ⊕; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n° 21, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 233-234, n° 62, pl. XXVIII, 8, ⊕. *E.T.*



*Quercus Robur*

*Andricus rhizomæ* (n°1292)  
Fig. 395. — D'ap. nat.



*Quercus Robur*

*Andricus Sieboldi* (n°1293)  
Fig. 396 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 397 (b). — Im. ADLER



*Quercus Robur*

*Andricus trilineatus* (n°1294)  
Fig. 398 (a). — Im. ADLER  
Fig. 399 (b). — Im. ADLER  
Fig. 400 (c). — D'ap. nat.

B. — Sur l'écorce d'un rameau, petite bosselure longue de 1,5-2 mm. (fig. 398) et due à la présence, dans la couche ligneuse ou sous l'écorce, d'une petite cécidie ovoïde, blanche, uniloculaire, longue de 1,3 mm. (fig. 400); généralement de semblables cécidies sont groupées en grand nombre sur un rameau qui présente alors un renflement allongé et irrégulier

ou qui peut être complètement déformé (fig.399). Cynipide août-septembre I ou II. *Q. ped., sess., pub.*

**Andricus trilineatus** HARTIG 1294

Mayr, 1870, p. 11, n° 9, pl. I, 9, ⊕ ; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 24-27, n° 5 a, pl. X, 5 a, ⊕ ; Hieronymus, 1890, p. 210, n° 643 ; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n° 20, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 234-235, n° 63, pl. XXVIII, 5, ⊕. *E-T.*

— Cécidie semblable à la précédente. *Q. ped.*

**Andricus trilineatus** HARTIG var. **beirensis** TAVARES 1295

Tavares, 1902, p. 105-106, n° 253 ; 1905, p. 64-65. *P.*

— Minime bossette. *Q. ped.* . . . **Lestes viridis** VAN DER LIND. 1296

Pierre, 1902, p. 185. *F.*

— Très petite cécidie ovoïde de 2 mm. de long, d'abord verte puis brune, à parois très minces, entièrement lisse et glabre.

Cynipide juillet-août I. *Q. ped., sess.* **Andricus gemmatus** ADLER 1297

Lichtenstein-Adler, 1881, p. 31-32, n° 7 a, pl. X, 7 a, ⊕ ; Pigeot, 1904, p. 14-15 ; Stefani, 1906, p. 165. *A, F, si.*

— Sur un rameau, à l'endroit où étaient fixées les écailles d'un bourgeon, cécidie blanche, longue de 2-3 mm., large de 1,5 mm., et de forme ellipsoïdale. Cynipide mai I. *Q. ped., sess.*

**Andricus furunculus** BELMERINGK 1298

Kieffer, 1899<sup>b</sup>, p. 395, pl. XXII, 3, ⊕ ; Tavares, 1902, p. 106, n° 253 bis ; Pigeot, 1904, p. 15 ; 1904<sup>b</sup>, p. 37-38. *H, F, P.*

— Sur l'écorce, petite dépression entourée d'un bourrelet circulaire. *Q. ped., sess., pub.* **Asterodiaspis quercicola** BOUCHÉ 1299

Bouché 1851, p. 112, n° 5 ; Signoret, 1870, p. 279-280, pl. VIII, 2, ⊕. *D, E-G, E-O.*

— Au voisinage de l'extrémité du rameau, épaissement plus ou moins incurvé, deux ou trois fois aussi gros que le rameau normal. Chenille dans la moelle ; trou de sortie à la base. *Q. ped., sess., pub.*

[**Pelatea festivana** HÜBNER et **Stenolechia gemmella** L.] 1300

Cecconi, 1900, p. 235-237, n° 19 ; Rübsaamen, 1901, p. 126, n° 162, fig. 15-16, ⊕. *E-T*  
(*cec. N.*)

Cécidies douteuses :

— [Cécidie fusiforme, de 2 mm de long, émergeant d'une fente de l'écorce d'un jeune rameau. Voir n° 1844. *Q. ped., sess.*

**Neuroterus saltans** GIRAUD 1301

Tavares, 1900, p. 52, n° 78 ; Lemée, 1903, p. (76), n° 530. *F, I, P.*

— [Grosse cécidie embrassant le rameau. Voir n° 1843. *Q. sess.*

**Aphelonyx cerricola** GIRAUD] 1302

Gerconi, 1897, p. 443. Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 407.

I.

— [Nodosité ligneuse. *Q. Robur.*

**Pamene splendidulana** GUENÉE] 1303

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 401.

|                                                     |                                                                                          |    |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pl. fe.                                             | Galle fermée                                                                             | {  | Galle ouverte située sur le bord du limbe. . . . .                  | A.                                                                                                                                                   |                                                              |
|                                                     |                                                                                          |    | Galle ouverte située à la surface du limbe. . . . .                 | B.                                                                                                                                                   |                                                              |
|                                                     |                                                                                          |    | Rentlement irrégulier du pétiole ou de la nervure médiane . . . . . | C.                                                                                                                                                   |                                                              |
|                                                     |                                                                                          |    | Cécidie visible seulement sur l'une des faces. {                    | Cécidie sphérique. . . . .                                                                                                                           | D.                                                           |
|                                                     |                                                                                          |    |                                                                     | Cécidie ovoïde ou en sphéroïde aplati aux pôles. . . . .                                                                                             | E.                                                           |
|                                                     |                                                                                          |    |                                                                     | Cécidie lenticulaire à face sup. plane. . . . .                                                                                                      | F.                                                           |
|                                                     |                                                                                          |    |                                                                     | Cécidie lenticulaire à face sup. conique ou déprimée . . . . .                                                                                       | G.                                                           |
|                                                     |                                                                                          |    |                                                                     | Cécidie en forme d'urne, de corne ou de rein . . . . .                                                                                               | H.                                                           |
|                                                     |                                                                                          |    | Cécidie couverte de longs poils . . . . .                           | K.                                                                                                                                                   |                                                              |
|                                                     |                                                                                          |    | Cécidie uniloculaire visible sur les deux faces. {                  | Cécidie formée aux dépens de la partie terminale d'une nervure latérale, dont la croissance est arrêtée, et placée au fond d'une incisure du bord, { | et conerescente avec le bord dans toute sa longueur. . . . . |
| rattachée à ce bord par un point seulement. . . . . | M.                                                                                       |    |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                              |
| également saillante sur les deux faces. . . . .     | N.                                                                                       |    |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                              |
| Cécidie formée aux dépens du parenchyme foliaire, { | fortement saillante à la face inférieure et à peine saillante sur l'autre face . . . . . | O. |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                              |

A. — Bord de la feuille rabattu sur l'une ou l'autre face, avec légère hypertrophie de la nervure médiane et taches blanches ou jaunes sur le limbe. *Q. ped., sess., pub.*

**Phylloxera coccinea** HEYDEN 1304

**Phylloxera quercus** FONSEC. 1305

Balbani, 1884, p. 6-79, pl. I-IV; Schouteden, 1903, p. 185, n° 3; 1903<sup>b</sup>, p. 98, n° 4.

E-C, E-O.

— Un des lobes marginaux se rabat vers la face inférieure (fig. 402) sur laquelle ses bords s'appliquent ; la partie rabattue est épaissie, décolorée, avec des taches jaunes ou rouges (fig. 401). *Q. ped.*, *sess.*, *pub.* **Macrodiplosis dryobia** F. Löw 1306

F. Löw, 1877, p. 14-16, pl. I, 5, ⊕ ; Massalongo, 1893, p. (126-127), n° 88, pl. XVIII, 4, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n° 214, ⊕ ; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. XXXVIII, 11, ⊕ ; Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 126, pl. II, 12, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVIII, n° 433, ⊕.

E-T,  
A-M.


— Bord du limbe rabattu par en bas sur une longueur d'un centimètre environ et en forme de croissant de lune. *Q. ped.*

**Cécidomyide** 1306A

Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 126-127, pl. II, 14-15, ⊕.

P.

— Entre deux lobes voisins, au fond de l'une des découpures du bord (fig. 403), celui-ci présente un enroulement étroit par en



*Quercus Robur*

*Macrodiplosis dryobia* (n° 1306)

Fig. 401 (a). — D'ap. nat.

Fig. 402 (b). — D'ap. nat.

*Quercus Robur*

*Macrodiplosis volvens* (n° 1307)

Fig. 403 (a). — D'ap. nat.

Fig. 404 (b). — D'ap. nat.

*Quercus Robur*

*Phylloxera acanthohermes* (n° 1311)

Fig. 405 (a). — D'ap. nat.

Fig. 406 (b). — D'ap. nat.

Fig. 407 (c). — D'ap. nat.

haut (fig. 404). Une à trois larves jaune orangé pâle. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.* **Macrodiplosis volvens** KIEFF. 1307

F. Löw, 1877, p. 36-37, n° 10, pl. I, 16, ⊕ ; Massalongo, 1893, p. (245), n° 196, pl. XXXIX, 5, ⊕ ; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. XXXVIII, 12, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XV, n° 357, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1907, fasc. XV, n° 417, ⊕ ; Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 126, pl. II, 11, ⊕.

E-T,  
A-M.

— Bord du limbe étroitement enroulé par en bas, ondulé et hypertrophié. *Q. ped.* **Ériophyide ou Aphide** 1307A

Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 126.

P.

— Bord du limbe ondulé, froissé et rabattu sur la face inférieure. *Q. pub.* **Epitrimerus cristatus** NAL. 1308

Nalepa, 1897<sup>b</sup>, p. 237; 1898, p. 63, n° 5.

A-H.

— Limbe courbé en arrière en forme de cuiller, à bords rapprochés plus ou moins enroulés. Puceron jaune. *Q. ped.*

**Aphis suberis** TAVARES] 1309

Tavares, 1900, p. 83-84, n° 149; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 469; Schouteden, 1903, p. 185.

P.

B. — A la face supérieure de la feuille, tache arrondie de 2-3 mm. de diamètre, vert jaunâtre, plus sombre au centre et souvent aussi présentant une zone marginale plus sombre; à la face inférieure il lui correspond une fossette où vit la larve. Après la migration de celle-ci, les taches deviennent brun jaunâtre et présentent souvent une perforation centrale. M.T. *Q. ped.*, *pub.*

**Cécidomyide** 1310

Rübsaamen, 1891<sup>b</sup>, p. 405, n° 8; Martel, 1894, p. 8-9, n° 209; Massalongo, 1903, p. 41, n° 11.

A, F, I.

— A la face supérieure, petite saillie peu marquée et décolorée (fig. 405); à la face inférieure, dépression circulaire de 2-3 mm. de diamètre (fig. 406-407). *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Phylloxera acanthohermes** LICHT. 1311

Rübsaamen, 1901, p. 126, n° 159; Schouteden, 1903, p. 185; Hieronymus, Pax, etc., 1907, fasc. XV, n° 420, ⊕.

E-C, F.

— A la face supérieure, saillie à peine sensible; à la face opposée, dépression arrondie de 1 mm. de diamètre. *Q. ped.*, *sess.*

**Trioza remota** FÖRSTER 1312

F. Löw, 1888, p. 93, n° 89; Focken, 1894<sup>b</sup>, p. 436; Lemée, 1903, p. (79), n° 549.

E-C, E-O.

— A la face inférieure, taches formées par un feutrage de poils anormaux dont les uns, très longs et très contournés, sont hyalins, tandis que les autres, plus courts et cylindriques, sont à peine arqués; ces derniers sont quelquefois renflés en massue à leur extrémité. *Erineum quercinum* PERS. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Eriophyes quercinus** CAN. 1313

Gorda, 1840, p. 3, n° 7, pl. I, 7, ⊕; Trotter, 1900<sup>c</sup>, p. 198-201; Trotter et Ceceoni, 1906, fasc. XV, n° 355-356, ⊕.

E-C,  
F, I.

— Tache décolorée et de forme irrégulière *Q. ped.*, *pub.*

**Epitrimerus Massalongoianus** NAL. 1314

Nalepa, 1898, p. 63, n° 6; Lemée, 1903, p. (79), n° 550.

E-C, I, F.

- Pli irrégulier du limbe situé le long d'une nervure secondaire et faisant saillie sur la face inférieure ; nervure épaissie et un peu courbée. *Q. sess.* **Cécidomyide** 1315  
*Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 463.* *E.*
- C. — Renflement atteignant un diamètre à peu près triple de celui de l'organe (pétiole ou nervure) sur lequel il se trouve (fig. 427) ; sa longueur varie de 5 à 8 mm. et sa couleur est jaunâtre. Chenille blanche, parsemée de poils bruns, à tête noire. M. T. ou, plus rarement, M. C. *Q. ped., sess., pub.*  
**Heliozela stanneella** FISCH. v. R. 1316  
*Schlechtendal, 1890, p. 31, n° 251 ; Trotter, 1899, p. 302, n° 36 ; Lemée, 1903, p. 173, n° 505.* *A, F, I.*
- Renflement irrégulier, multiloculaire. Voir n° 1294.  
**Andricus trilineatus** HARTIG 1317
- Renflement identique (fig. 428). *Q. ped., sess., pub.*  
**Andricus testaceipes** HARTIG 1318  
*Lichtenstein-Adler, 1881, p. 28-29, n° 6 a, pl. X, 6 a, ⊕ ; Hieronymus, 1890, p. 208-209, n° 642, p. 229, n° 672 ; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n° 22, ⊕ ; Jørgensen, 1906, p. 103-104, n° 29, pl. II, 28, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 235-236, n° 65, pl. XII, 6, ⊕.* *E-T.*
- Nodosité ellipsoïdale, longue de 2,5 mm. et large de 1-1,5 mm., de la couleur de l'organe sur lequel elle est produite. Trou de sortie à la base. Cynipide août I. *Q. ped., sess.*  
**Andricus testaceipes** HARTIG var. **nodifex** KIEFF. 1319  
*Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 436-437, pl. XXV, 7, ⊕ ; Lemée, 1903, p. (76), n° 528 ; Loiseleur, 1903, p. (5) ; Pigeot, 1904, p. 18-19.* *A, F.*
- D. — Grosse galle, de 10-20 mm. de diamètre en général (fig. 408), pouvant exceptionnellement atteindre 30 mm. de diamètre, d'abord charnue ; sa surface luisante est verte ou jaune, veinée de rouge, lisse ou le plus souvent garnie de petits tubercules ; après la sortie de l'insecte elle se dessèche et diminue beaucoup de volume en se déformant ; pas de galle interne (fig. 409). Cynipide septembre-décembre I ou II. *Q. ped., sess., pub.*  
**Dryophanta folii** L. 1320  
*Lichtenstein-Adler, 1881, p. 48-50, n° 14, pl. XI, 14 pl. XII, 5, ⊕ ; Fockeu, 1889<sup>b</sup>, p. 83-91, fig. 17-18, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 320, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 90, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 236-237, n° 66, pl. XXI, 3 4, ⊕.* *E-T, A-M.*
- Galle charnue comme la précédente, mais beaucoup plus petite, n'ayant que 5-7 mm. de diamètre (fig. 447) ; elle est tou-

jours lisse. D'abord verte, elle prend à maturité en juin, au moment où elle va se détacher, une teinte rouge et est semée de points jaunâtres ; elle présente une galle interne, à parois minces, située en son centre (fig. 448). Cynipide juin-juillet I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Trigonaspis synaspis** HARTIG 1321

Mayr, 1871, p. 1, n° 47, pl. V, 47, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XI, n° 271, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 38, n° 68, pl. XXI, 2, ⊕.


E-T  
(*exc. E.*).

— Cécidie de 8-10 mm. de diamètre, rouge, ceinturée d'une série de larges bandes jaunâtres (fig. 410) souvent parsemées de




*Quercus Robur*

*Dryophanta folii* (n° 1300)  
Fig. 408 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 409 (b). — D'ap. nat.



*Quercus Robur*

*Dryophanta longiventris* (n° 1302)  
Fig. 410 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 411 (b). — D'ap. nat.



*Quercus Robur*

*Dryophanta divisa* (n° 1308)  
Fig. 412 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 413 (b). — D'ap. nat.

granulations leur donnant un aspect rugueux ; cavité interne allongée (fig. 411). Cynipide novembre-décembre I. *Q. ped.*, *sess.*

**Dryophanta longiventris** HARTIG 1322

Mayr, 1871, p. 2, n° 50, pl. V, 50, ⊕ ; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 51-52, n° 15, pl. XI, 15, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VI, n° 129, ⊕ ; Jorgensen, 1906, p. 98, n° 18, pl. II, 17, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 238-239, n° 69, pl. XXI, 8, ⊕.

E-T.

— Cécidie de 8-10 mm. de diamètre, de teinte brun clair, présentant quelques verrues aplaties, très petites. Cynipide novembre-décembre I. *Q. pub.*, *sess.*

**Dryophanta pubescentis** MAYR 1323

Mayr, 1871, p. 2, n° 49, pl. V, 49, ⊕ ; Cecconi, 1897, p. 443 ; Darboux et Houard, 1907, p. 237, n° 67, pl. XXI, 1, ⊕.

E-T  
(*exc. N.*).



— Cécidie sphérique, de la grosseur d'un grain de chènevis, lisse, non luisante, à surface jaunâtre parsemée de taches rondes d'un brun noirâtre. *Q. pub.* **Andricus Giardinus** STEFANI 1324

Stefani, 1898b, p. 249, n° 1 ; 1898c, p. (27), n° 50 ; Kieller, 1899b, p. 390-391, pl. XXV, 6, ⊕. *si.*

— Cécidie sphérique, de deux mm. de diamètre, à surface rugueuse, glabre, jaunâtre ; chambre larvaire unique. *Q. pub.*

**Cynipide** 1325

Calabrese-Milani, 1902, p. 78-79, n° 41, pl. III, 1 b, ⊕. *l.*

E. — Cécidie dure, ovoïde, de 2-3 mm. de long ; son grand axe est parallèle à la nervure médiane (plus rarement à une nervure latérale), sur laquelle elle s'insère : elle est comprise entre deux petites valves (fig. 430) qui sont des expansions lamelleuses de la nervure et dont le plan est parallèle à son grand axe ; galle d'abord verte, plus tard jaune avec des taches rouges. Cynipide octobre I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Andricus ostreus** GIRAUD 1326

Giraud, 1859, p. 350, n° 1 ; Mayr, 1871, p. 13, n° 67, pl. VI, 67, ⊕ ; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 64-65, n° 19, pl. XI, 19, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 239-240, n° 70, pl. XXII, 7, ⊕. *E-T*  
*A-M, m.*

— Cécidie ovoïde, mesurant 4 mm. de longueur, d'abord blanc jaunâtre, plus tard brun jaunâtre, à surface lisse ou souvent parsemée de très petits tubercules (fig. 451), à parois peu épaissies (fig. 452). Cynipide octobre-novembre I. *Q. ped.*, *sess.*

**Dryophanta agama** HARTIG 1327

Mayr, 1871, p. 3, n° 52, pl. V, 52, ⊕ ; Hieronymus, 1890, p. 215, n° 650. *E-T (ecc. N), A-M.*

— Cécidie en forme de sphéroïde présentant un aplatissement marqué aux deux pôles (fig. 412), brillante, généralement lisse, parfois pourvue de petites verrues, jaunâtre ou brunâtre, souvent veinée de rouge, assez dure, atteignant 7 mm. de diamètre et 5 mm. de hauteur ; cavité unique (fig. 413). Cynipide octobre-novembre I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.* **Dryophanta divisa** HARTIG 1328

Mayr, 1871, p. 3, n° 51, pl. V, 51, ⊕ ; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 53-54, n° 16, pl. XI, 16, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. 1, n° 30-30 a, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 79, pl. V, 9-10, ⊕ ; Jørgensen, 1906, p. 99, n° 19, pl. II, 42, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 241, n° 72, pl. XX, 7, ⊕. *E-T.*

— Cécidie de même forme que la précédente, haute de 4-5 mm., à peine plus large ; elle présente au pôle supérieur une légère dépression, dont le centre est occupé par une très petite ver-

ruë (fig. 457-458) ; elle est faiblement luisante et de couleur jaune. Au-dessus de la cavité larvaire se trouve une seconde chambre, vide (fig. 449-450). Cynipide octobre-novembre I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Dryophanta disticha** HARTIG 1329

Mayr, 1871, p. 4, n° 53, pl. V, 53, ⊕ ; Houard, 1902<sup>b</sup>, p. 45, n° 38, fig. 18-19, ⊕ ; TAVARES, 1905, p. 79, pl. V, 11, ⊕ ; Jørgensen, 1906, p. 99, n° 20, pl. II, 18, ⊕.

*E-T.*

— Cécidie subsphérique, de 3-4,5 mm. de diamètre, à surface ornée de nombreux mamelons très apparents et insérée sur la nervure au moyen de deux bourrelets.

**Cynipide** 1330

Darbois et Houard, 1907, p. 241-242, n° 73, pl. XXII, 4-6, ⊕.

*A-II.*

F. — Les deux faces de la cécidie sont blanches et munies de poils étoilés bruns, disposés en cercles concentriques ; le diamètre de la galle est de 3 mm. *Q. ped.* ou *sess.*

**Neuroterus** 1331

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 125, n° 208.

*F.*

— Cécidie de 3-5 mm. de diamètre (fig. 414) ; sa face inférieure, plane ou quelquefois un peu concave, blanchâtre ou brunâtre, est appliquée sur le limbe ; sa face supérieure possède en son centre (fig. 415) un tubercule bien net ; elle est souvent rouge sombre ou veinée de rouge. La galle est parfois complètement glabre à maturité ou ne montre que quelques poils étoilés, courts, brunâtres, situés à la face supérieure. Cynipide mars II. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Neuroterus læviusculus** SCHENCK 1332

Lichtenstein-Adler, 1881, p. 14-15, n° 2, pl. X, 2, ⊕ ; Focke, 1889<sup>b</sup>, p. 72-76, fig. 12-13, ⊕ ; Hieronymus, 1890, p. 220-221, n° 654 a, p. 229, n° 666 ; Darbois et Houard, 1907, p. 242-243, n° 74, pl. XX, 11-12, ⊕.

*E-T,*  
*A-Br.*

— Cécidie semblable à la précédente, mais le bord est relevé et à moitié rabattu sur la face supérieure (fig. 416) de façon à simuler un chapeau tricorne. *Q. ped.*, *sess.*

**Neuroterus læviusculus** SCHENCK var. **reflexa** KIEFF. 1333

Schlechtendal, 1885, p. 21, pl. II, 3, ⊕ ; Kieffer, 1901, p. 648, pl. XIX, 7, ⊕ ; Houard, 1902<sup>b</sup>, p. 45, n° 39.

*A, F, J.*

— Cécidie plane, peu velue ; diamètre 5 mm. *Q. ped.*

**Neuroterus** [**læviusculus** SCHENCK var. **lusitanica** TAVARES] 1334

TAVARES, 1905, p. 81, pl. V, 12, ⊕.

*P.*

— Cécidie plane, mais pourvue à la face supérieure de poils abondants, serrés ; diamètre 4 mm. *Q. ped.*

**Neuroterus** 1335

TAVARES, 1905, p. 81, pl. V, 8, ⊕.

*P.*

G. — Cécidie de 4-5 mm. de diamètre ; sa face inférieure, presque plane, glabre et blanchâtre, est étroitement appliquée sur la face inférieure du limbe à laquelle elle est reliée par un pédicule court et mince (fig. 417) ; la face supérieure de la galle est conique, blanc jaunâtre ou rarement rougeâtre et abondamment pourvue de poils étoilés bruns (fig. 418). Cynipide mars II. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.* **Neuroterus lenticularis** OLIV. 1336

Lichtenstein-Adler, 1881, p. 7-12, n° 1, pl. X, 1, ⊕ ; Focken, 1889 b, p. 65-72, fig. 8-11, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 31, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XV, n° 354 ; Darboux et Houard, 1907, p. 243-244, n° 75, pl. XX, 8-10, ⊕.

E-T.  
A-M.



*Quercus Robur*

*Neuroterus leviusculus* (n° 1332)

*N. leviusc.* var. *reflexa* (n° 1333)

Fig. 414, 415 (a, c). — D'ap. nat.

Fig. 416 (b). — D'ap. nat.



*Quercus Robur*

*Neuroterus lenticularis* (n° 1336)

Fig. 417 (a). — D'ap. nat.

Fig. 418 (b). — D'ap. nat.



*Quercus Robur*

*Neuroterus fumipennis* (n° 1338)

Fig. 419 (a). — D'ap. nat.

Fig. 420 (b). — D'ap. nat.

— Cécidie semblable, de 6 mm. de diamètre, à surface couverte de poils rares, rougeâtres. Cynipide février II. *Q. ped.*

**Neuroterus lenticularis** OLIV. var. **hystrio** TAVARES 1337

TAVARES, 1902, p. 113, n° 263 ; 1905, p. 81-82, pl. V, 21, ⊕.

P.

— Cécidie de 2-3 mm. de diamètre (fig. 419) et n'ayant guère que 0,6 mm. de hauteur ; sa face inférieure, plane ou faiblement convexe, présente en son centre un pédicule qui la rattache à la face inférieure du limbe ; sa face supérieure, jaunâtre, présente en son centre une saillie conique assez accusée. Le bord de la cécidie n'est pas appliqué sur la feuille et ses deux

faces sont garnies de poils courts, bruns, assez rares (fig. 420).  
Cynipide avril-mai H. *Q. ped.*, *sess.*

**Neuroterus fumipennis** HARTIG 1338

Lichtenstein-Adler, 1881, p. 18-19, n° 4, pl. X, 4, ⊕; Focken, 1889<sup>b</sup>, p. 76-82, fig. 14-16, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 35, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1907, fasc. XV, n° 418, ⊕.

*E-T.*  
*A-M.*

— Cécidie discoïdale (de 3,5 mm. de diamètre), rappelant la précédente. *Q. ped.*

**Neuroterus fumipennis** HARTIG var. 1339

Trotter, 1897, p. 160, n° 21.

*I.*

— Cécidie de 2-3 mm. de diamètre (fig. 421), ressemblant à un petit bouton soyeux (fig. 422); ses bords arrondis ont environ 1 mm. d'épaisseur et sa face supérieure présente une dépression centrale bien marquée (fig. 423). La galle est brunâtre ou veinée de rouge et couverte de poils filiformes, à éclat soyeux, appliqués, rayonnant à partir des bords de la dépression centrale. Cynipide mars H. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Neuroterus numismatis** OLIV. 1340

Lichtenstein-Adler, 1881, p. 16-17, n° 3, pl. X 3, ⊕; Focken, 1889<sup>b</sup>, p. 47-65, fig. 1-7, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 32, ⊕; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 91, ⊕; Tavares, 1905, p. 79, pl. V, 19, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 244-245, n° 76, pl. XVI, 2-4, ⊕.

*E-T.*  
*A-M.*

H. — A la face inférieure, cécidie en forme d'urne (fig. 431), d'un vert tendre parfois uniforme, mais le plus souvent mêlé de rouge vif, rattachée à une nervure par un pédicule très court et très mince (fig. 459); la galle est une masse subcylindrique ou ovoïde couronnée par un petit rebord évasé en collerette et terminée par une petite pointe (fig. 460). Cynipide H. *Q. pub.*, [*sess.*, *ped.*].

**Andricus urnæformis** MAYR 1341

Mayr, 1871, p. 5, n° 55, pl. V, 55, ⊕; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 88, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 245-246, n° 77, pl. XXII, 1-3, ⊕.

*E-G.*  
*E-S.*, *A-M.*

— A la face inférieure, fixée à une nervure par un pédoncule court et mince, cécidie en forme de corne, haute de 8-20 mm., légèrement étranglée en son milieu (fig. 424). *Q. pub.*, [*ped.*].

**Dryophanta cornifex** HARTIG 1342

Mayr, 1871, p. 4, n° 54, pl. V, 54, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 41, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1907, fasc. XV, n° 419, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 246, n° 78, pl. XVI, 1, ⊕.

*E-G.*  
*I.F.*

— A la face inférieure, et rattachée à une nervure par un pédicule court et mince, cécidie en forme de rein (fig. 425), longue de 3 mm. en moyenne, d'abord vert pâle ou jaunâtre, puis

rouge vif au moins sur une partie de sa surface (fig. 426). Cyni-  
pide printemps III. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Trigonaspis renum** GIRAUD 1343

Giraud, 1859, p. 362-363, n°1; Mayr, 1871, p. 1, n° 46, pl. V, 46, ⊕; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 61-62, n° 18, pl. XI, 18, ⊕; Focken, 1889<sup>b</sup>, p. 95-100, fig. 20-21, ⊕; Jørgensen, 1906, p. 97-98, n° 16, pl. II, 15, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 246-248, n° 79, pl. XX, 1-2, ⊕.

E-T.



*Quercus Robur*

*Neuroterus numismatis* (n°1340)

Fig. 421 (a). — D'ap. nat.

Fig. 422 (b). — D'ap. nat.

Fig. 423 (c). — D'ap. nat.



*Quercus Robur*

*Dryophanta cornifera* (n°1342)

Fig. 424. — D'ap. nat.



*Quercus Robur*

*Trigonaspis renum* (n°1343)

Fig. 425 (a). — D'ap. nat.

Fig. 426 (b). — D'ap. nat.

K. — A la face inférieure du limbe, fixée à la nervure médiane, grosse masse cylindrique spongieuse (fig. 453-454), couverte de filaments gris, longs de 20-25 mm.; à l'intérieur se trouve une galle interne ellipsoïdale mesurant 4 mm. sur 2,5 mm., à paroi mince et fragile. Moitiés du limbe repliées par en haut. *Q. ped.*

**Andricus Targionii** KIEFF. 1344

Cecconi, 1904, p. 86; Kieffer, 1905, p. 552-554, pl. X, 10-11, ⊕. — Cette cécidie, connue de Chine, semble avoir été signalée par erreur en Italie (Renseignement oral de M. Trotter).

— Cécidie de 4-5 mm. de diamètre, couverte de poils soyeux. *Q. ped.*, *pub.*

**[Neuroterus lanuginosus** GIRAUD 1345


Misciattelli, 1895<sup>b</sup>, p. 91, n° 39; Cecconi, 1902<sup>b</sup>, p. 356, n° 32; Tavares, 1902<sup>b</sup>, p. 91, n° 41. A-H.L.

L. — Cécidie ovoïde, blanc-jaunâtre, de 2 mm. de long (fig. 433), à parois lisses et très minces; la feuille est souvent tordue et

l'incisure du bord du limbe atteint parfois la nervure médiane (fig.432). Cynipide mai I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Neuroterus albipes** SCHENCK 1346

Mayr, 1871, p. 16, n° 72, pl. VI, 72, ⊕ ; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 15-16, n° 2 a, pl. X, 2 a, ⊕ ; Tavares, 1907<sup>b</sup>, pl. II, 16, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 248, n° 80, pl. XIV, 11, ⊕. E-T.



**Quercus Robur**

- Fig. 427 (a) : *Heliozela stanneella* (n°1316) . . . . . D'ap. nat.
- Fig. 428, 429 (b, b') : *Andricus testaceipes* (n°1318) . . . . . Im. MAYR
- Fig. 430 (c) : *Andricus ostreus* (n°1326) . . . . . D'ap. nat.
- Fig. 431 (d) : *Andricus urnaeformis* (n°1341) . . . . . D'ap. nat.
- Fig. 432 (e) : *Neuroterus albipes* (n°1346) . . . . . D'ap. nat.

— Cécidie piriforme ou fusiforme, de 3-3,5 mm. de haut sur 2-2,5 mm. de large (fig.434), verte, avec des côtes longitudinales plus ou moins nettes, teintées de rouge ou de verdâtre. Cynipide printemps II. *Q. ped.*, *sess.*

**Andricus marginalis** ADLER 1347

Mayr, 1871, p. 18, n° 76, pl. VI, 76, ⊕ ; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 68-69, n° 21, pl. XI, 21, ⊕. E-G, E-O.



**Quercus Robur**

- Fig. 433 (f) : *Neuroterus albipes* (n°1346) . . . . . Im. ADLER
- Fig. 434 (g) : *Andricus marginalis* (n°1347) . . . . . Im. KIEFF.
- Fig. 435 (h) : *Andricus seminationis* (n°1348) . . . . . Im. KIEFF.
- Fig. 436 (i) : *Dryophanta verrucosa* (n°1349) . . . . . Im. ADLER

M. — Cécidie fusiforme, de la grosseur d'un grain d'orge, verte, avec des côtes longitudinales teintées de rouge ou de vert (fig.435) et en général très accusées; la surface porte quel-

ques poils courts, épars. Une verrue qui marque le sommet de la galle est entourée d'une couronne de poils plus serrés. Cynipide printemps II-III. *Q. ped.*, *sess.*

**Andricus seminationis** ADLER 1348

Giraud, 1859, p. 373, n° 5; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 67-68, n° 20, pl. XI, 20, ⊕; Hieronymus, 1890, p. 208, n° 641.


*E-G.*  
*E-O.*

— Cécidie cylindrique, tronconique ou ellipsoïdale, pouvant atteindre 4 mm. de long (fig. 436), d'un jaune verdâtre parfois veiné de rouge; sa surface est toute couverte de petits poils vésiculeux, qui lui donnent une apparence finement granulée (fig. 455-456). Cynipide mai I. *Q. ped.*, *sess.*

**Dryophanta verrucosa** SCHL. 1349

Mayr, 1871, p. 16, n° 73, pl. VI, 73, ⊕; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 54-55, n° 16 a, pl. XI, 16 a, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 349, n° 81, pl. XIV, 7-8, ⊕.

*D, E-G.*  
*E-O, L.*



*Quercus Robur*

*Andricus curvator* (n° 1351)

Fig. 437 (a). — D'ap. nat.

Fig. 438 (b). — D'ap. nat.



*Quercus Robur*

*Neuroterus baccarum* (n° 1355)

Fig. 439 (a). — D'ap. nat.

Fig. 440 (b). — D'ap. nat.



*Quercus Robur*

*Neuroterus tricolor* (n° 1356)

Fig. 441 (a). — D'ap. nat.

Fig. 442 (b). — D'ap. nat.

— Cécidie semblable à la précédente, ayant la même surface finement granulée, mais sans que cet aspect soit dû ici à la présence de poils vésiculeux, la surface étant entièrement glabre. *Q. ped.*

**Dryophanta Schlechtendali** KIEFF. 1350

Schlechtendal, 1890, p. 34 (note).


*A.*

N. — Cécidie ayant la forme, la taille et la couleur d'un pois (fig. 437), glabre sur le dessus, à peine pubescente sur le dessous, munie d'une grande cavité qui contient une galle interne (fig. 438); le limbe est ordinairement déformé et courbé. Cynipide mai-juin I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.* **Andricus curvator** HARTIG 1351

Mayr, 1871, p. 6, n° 56, pl. V, 56, ⊕; Prillieux, 1876, p. 126-136, pl. XVIII, ⊕; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 36-37, n° 9a, pl. X, 9a, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VIII, n° 179, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 249-250, n° 82, pl. XII, 7, pl. XIII, 4-5, ⊕.

E-T

A-M.



Quercus Robur

- Fig. 443(a) : *Andricus sufflator* (n° 1352). . . . . D'ap. nat.  
 Fig. 444, 446 (b) : *Neuroterus vesicator* (n° 1353). . . . . D'ap. nat. et d'ap. ADLER  
 Fig. 447, 448 (c) : *Trigonaspis synaspis* (n° 1321). . . . . D'ap. nat.  
 Fig. 449, 450 (d) : *Dryophanta disticha* (n° 1329). . . . . Im. KIEFF.  
 Fig. 451, 452 (e) : *Dryophanta ajama* (n° 1327). . . . . D'ap. nat.

— Cécidie en forme de pustule à contour arrondi (fig. 443), de 3 mm. de diamètre; son épaisseur est triple de celle de la feuille. D'abord verte, puis brune, à la face supérieure, elle est jaunâtre, puis brune, à la face inférieure où elle est un peu plus convexe et présente latéralement une petite verrue. Une galle interne arrondie. Cynipide juin I. *Q. sess.*, *pub.*

**Andricus sufflator** MAYR 1352

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 122, n° 195; 1899<sup>b</sup>, p. 400-402, pl. XI, 7, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VIII, n° 182, ⊕; Trotter, 1903, p. 52, n° 139.

E-G, F,  
I, P-B.

— Cécidie différant de la précédente par l'existence à la face supérieure de stries disposées radialement et d'une petite verrue (fig. 444-445); la saillie est, en outre, un peu moins accusée à la face inférieure qu'à la face supérieure. Pas de galle interne (fig. 446). Cynipide juin I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Neuroterus vesicator** SCHL. 1353

Prillieux, 1876, p. 114-119, pl. XVI, 16, ⊕; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 17-18, n° 3a pl. X, 3a, ⊕; Jørgensen, 1906, p. 103, n° 28, pl. II, 27, ⊕; Tavares, 1907<sup>b</sup>, pl. II, 13, ⊕.

E-T,  
A-M.

— Pustule circulaire, de 2-3 mm. de diamètre, à peine sail-



lante sur l'une et l'autre face ; à maturité, elle présente à la face inférieure un trou de sortie circulaire. *Q. ped.*, *sess.*

**Cécidomyide 1354**

Schlechtendal, 1890, p. 35, n° 277 ; Rübsaamen, 1891, p. 385.


*A. F.*

— Pustules ellipsoïdales (4 mm. sur 2 mm.), alignées au bord du limbe, à grand axe parallèle à ce bord ; surface glabre et verte. *M. T. Q. ped.*

**Cécidomyide 1354A**

Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 124-126, fig. 2, ⊕.

*P.*



*Quercus Robur*

*Andricus Targionii* (n°1344)

[Galle de Chine ?]

Fig. 453 (a). — Im. KILFF.

Fig. 454 (b). — Schéma.

*Quercus Robur*

*Dryophanta verrucosa* (n°1345)

Fig. 455 (a). — Im. GIRAUD

Fig. 456 (b). — Im. GIRAUD

*Quercus Robur*

*Dryophanta disticha* (n°1329)

*Andricus urniformis* (n°1341)

Fig. 457, 458 (b, c). — D'ap. nat.

Fig. 459, 460 (d, e). — Im. GIRAUD et MAYR

O. — Cécidie rappelant un grain de raisin blanc par sa forme, sa taille et sa couleur (fig. 439) ; assez rarement elle est veinée de rouge. A la face supérieure, elle fait à peine saillie sous la forme d'un disque arrondi, au centre duquel se voit une petite cicatrice ; c'est sur la face inférieure du limbe (fig. 440) que se trouve située la plus grande partie de la cécidie qui, à maturité, se dessèche et se déforme en se ratatinant beaucoup. Cynipide juin I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.*

**Neuroterus baccarum L. 1355**

Mayr, 1871, p. 15, n° 70, pl. VI, 70, ⊕ ; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 13-14, n° 1 a, pl. X, 1 a, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VIII, n° 243, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VI, n° 133, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 199-200, n° 22, pl. XVI, 6-7, ⊕.

*E. T.*  
*A. M.*

— Cécidie semblable à la précédente, mais deux à trois fois plus petite, n'atteignant guère que 4-5 mm. de diamètre (fig. 441); en outre, on trouve çà et là à sa surface des poils fins, dressés (fig. 442), longs de 1-2 mm., qui disparaissent à maturité. Cynipide juillet I. *Q. ped.*, *sess.*, *pub.* **Neuroterus tricolor** HARTIG 1356  
Mayr, 1871, p. 15, n° 71, pl. VI, 71, ⊕; Lichtenstein-Adler, 1881, p. 19-20, n° 4 a, pl. X, 4 a, ⊕. E-T.

## Cécidies douteuses :

— [Voir n° 1857. *Q. ped.* . . . **Neuroterus saltans** GIRAUD] 1357  
Misciattelli, 1895 b, p. 93, n° 40. I.

— [Voir n° 1864. *Q. ped.*, *sess.* . . . **Chilaspis nitida** GIRAUD] 1358  
Lemée, 1903, p. (78), n° 541. F.

— [Voir n° 1882. *Q. ped.* . . . **Dryomyia circinnans** GIRAUD] 1359  
Cecconi, 1902 c, p. 621. I.

— Cécidie circulaire, aplatie, de 1-1,5 mm. de diamètre, fixée à une fine nervure de la face inférieure du limbe par un court pédicule; surface couverte de longs poils roux très denses. *Q. pub.* **Cynipide** 1360  
Cecconi, 1902 c, p. 638; Kieffer, 1901 b, p. 471-472. I.

Variétés du **Quercus pedunculata** EHRH. :**Quercus pedunculata** var. **fastigiata** LAMK.**(Q. pyramidalis** GMELIN)

Ac. bg. — Voir n° 1277. . . . . [Andricus globuli HARTIG] 1361  
Lacaze, 1853, p. 310-312; Kieffer, 1897 b, p. 86. F.

— Voir n° 1248. . . . . [Cynips Kollari HARTIG] 1362  
Lacaze, 1853, p. 291-299; Rolfe, 1881, p. 55; Kieffer, 1897 b, p. 86. F, I-B.

— Voir n° 1262. . . . . [Biorrhiza pallida OLIV.] 1363  
Baldrati, 1900, p. 69, n° 174. I.

— Voir n° 1214. . . . . [Andricus fecundator HARTIG] 1364  
Rolfe, 1881, p. 55. I-B.

— Voir n° 1254. . . . . [Andricus callidoma GIRAUD] 1365  
Rolfe, 1881, p. 55. I-B.

|        |   |                                                                                       |                                          |         |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Pl.fe. | { | Cécidie lenticulaire.....                                                             | A.                                       |         |
|        |   | Cécidie d'une autre forme.....                                                        | B.                                       |         |
| A.     | — | Voir n°1336. . . . .                                                                  | [ <i>Neuroterus lenticularis</i> OLIV.]  | 1366    |
|        |   | Rolfe, 1881, p.55 ; Kieffer, 1897 <sup>b</sup> , p.86 ; Baldrati, 1900, p.69, n° 176. |                                          | I-B, A. |
|        | — | Voir n°1340. . . . .                                                                  | [ <i>Neuroterus numismatis</i> OLIV.]    | 1367    |
|        |   | Lacaze, 1853, p.313-314 ; Kieffer, 1897 <sup>b</sup> , p.87.                          |                                          | F.      |
|        | — | Voir n°1338. . . . .                                                                  | [ <i>Neuroterus fumipennis</i> HARTIG]   | 1368    |
|        |   | Kieffer, 1897 <sup>b</sup> , p.87 ; Baldrati, 1900, p.69, n° 175.                     |                                          | I.      |
|        | — | Voir n°1332. . . . .                                                                  | [ <i>Neuroterus læviusculus</i> SCHENCK] | 1369    |
|        |   | Kieffer, 1897 <sup>b</sup> , p.86.                                                    |                                          | A.      |
| B.     | — | Voir n°1341. . . . .                                                                  | [ <i>Andricus urnæformis</i> MAYR]       | 1370    |
|        |   | Lacaze, 1853, p.312-313 ; Kieffer, 1897 <sup>b</sup> , p.86-87.                       |                                          | F.      |
|        | — | Voir n°1326. . . . .                                                                  | [ <i>Andricus ostreus</i> GIRAUD]        | 1371    |
|        |   | Lacaze, 1853, p.321-323 ; Kieffer, 1897 <sup>b</sup> , p.87.                          |                                          | F.      |
|        | — | Voir n°1320. . . . .                                                                  | [ <i>Dryophanta folii</i> L.]            | 1372    |
|        |   | Lacaze, 1853, p.306-307 ; Kieffer, 1897 <sup>b</sup> , p.87.                          |                                          | F.      |
|        | — | Voir n°1351. . . . .                                                                  | <i>Andricus curvator</i> HARTIG          | 1373    |
|        |   | Kieffer, 1901 <sup>b</sup> , p.436.                                                   |                                          | I.      |
|        | — | Voir n°1355. . . . .                                                                  | [ <i>Neuroterus baccarum</i> L.]         | 1374    |
|        |   | Rolfe, 1881, p.55.                                                                    |                                          | I-B.    |

**Quercus pedunculata** var. **laciniata** LODD.

|        |   |                      |                                         |      |
|--------|---|----------------------|-----------------------------------------|------|
| Ac.bg. | — | Voir n°1248. . . . . | [ <i>Cynips Kollari</i> HARTIG]         | 1375 |
|        |   | Rolfe, 1881, p.55.   |                                         | I-B. |
| Pl.fe. | — | Voir n°1340. . . . . | [ <i>Neuroterus numismatis</i> OLIV.]   | 1376 |
|        |   | Rolfe, 1881, p.55.   |                                         | I-B. |
|        | — | Voir n°1336. . . . . | [ <i>Neuroterus lenticularis</i> OLIV.] | 1377 |
|        |   | Rolfe, 1881, p.55.   |                                         | -B.  |
|        | — | Voir n°1355. . . . . | [ <i>Neuroterus baccarum</i> L.]        | 1378 |
|        |   | Rolfe, 1881, p.55.   |                                         | I-B. |

**Quercus pedunculata** var. **concordia** HORT.

- Pl.fe. — Voir n°1336. . . . . [Neuroterus lenticularis OLIV.] 1379  
 Rolfe, 1881, p. 55. I-B.

**Quercus pedunculata** var. **granbyana** HORT.

- Pl.fe. — Voir n°1336. . . . . [Neuroterus lenticularis OLIV.] 1380  
 Rolfe, 1883, p. 31. I-B.

**Quercus pedunculata** var. **pendula** LOUD.

- Pl.fe. — Voir n°1355. . . . . [Neuroterus baccarum L.] 1381  
 Rolfe, 1881, p. 55. I-B.

**Quercus pedunculata** var. **purpurea** LOUD.

- Ac.bg. — Voir n°1262. . . . . [Biorrhiza pallida OLIV.] 1382  
 Rolfe, 1881, p. 55. I-B.

- Pl.fe. — Voir n°1336. . . . . [Neuroterus lenticularis OLIV.] 1383  
 Rolfe, 1883, p. 31. I-B.

- Voir n°1355. . . . . [Neuroterus baccarum L.] 1384  
 Rolfe, 1881, p. 55. I-B.

**Quercus pedunculata** var. **heterophylla** LOUD.

- Ac.bg. — Voir n°1248 et n°1263. . . . . [Cynips Kollari HARTIG] 1385  
 Rolfe, 1881, p. 55. I-B.

- Pl.fe. — Voir n°1336. . . . . [Neuroterus lenticularis OLIV.] 1386  
 Rolfe, 1881, p. 55. I-B.

- Voir n°1340. . . . . [Neuroterus numismatis OLIV.] 1387  
 Rolfe, 1881, p. 55. I-B.

- Voir n°1355. . . . . [Neuroterus baccarum L.] 1388  
 Rolfe, 1881, p. 55. I-B.

**Quercus pedunculata** var. **filicifolia** HORT.

- Ac.bg.** — Voir n°1248. . . . . **Cynips Kollari** HARTIG] 1389  
 Rolfe, 1881, p.55. *I-B.*
- Pl.fe.** — Voir n°1336. . . . . [**Neuroterus lenticularis** OLIV.] 1390  
 Rolfe, 1881, p.55. *I-B.*
- Voir n°1340. . . . . [**Neuroterus numismatis** OLIV.] 1391  
 Rolfe, 1881, p.55. *I-B.*
- Voir n°1355. . . . . [**Neuroterus baccarum** L.] 1392  
 Rolfe, 1881, p.55. *I-B.*

**Quercus pedunculata** var. **variegata** ENDL.

- Ac.bg.** — Voir n°1244. . . . . **Cynips caliciformis** GIRAUD 1393  
 Stefani, 1897, p.95-97; 1906, p.182. *si.*
- Voir n°1248. . . . . **Cynips Kollari** HARTIG 1394  
 Stefani, 1897, p.95; 1906, p.182 *si.*
- Voir n°1249. . . . . **Cynips tinctoria** OLIV. var. **nostra** STEFANI 1394A  
 Stefani, 1906, p.182. *si.*

**Quercus pedunculata argenteo** × **variegata**

- Ac.bg.** — Voir n°1248. . . . . **Cynips Kollari** GIRAUD 1395  
 Reijnvaan et Lecuwen, 1906, p.81-82, 1 fig., ⊕. *H.*

Variétés du **Quercus sessiliflora** SMITH :**Quercus sessiliflora** var. **aurea** DC. (**Q. aurea** WIERZBICKI)

- Pl.fe.** — Voir n°1336 . . . . . [**Neuroterus lenticularis** OLIV.] 1396  
 Hieronymus, 1890, p.200, n° 624; Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p.318, n°114. *A-H.A-M.*
- Voir n°1332. . . . . [**Neuroterus læviusculus** SCHENCK] 1397  
 Hieronymus, 1890, p.200, n°623; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p.75. *A-H*

**Quercus sessiliflora** var. **Virgiliana** DC.  
(**Q. Virgiliana** TEN.)

- Pl.fe. — A la face inférieure de la feuille, cécidie sphérique de 10-20 mm. de diamètre. Voir n°1320. **Dryophanta folii** L. 1398  
Karsch, 1880, p. 368, n° 40. I.  
— Voir n°1326. . . . . [**Andricus ostreus** GIRAUD] 1399  
Hieronymus, 1890, p. 235, n° 690; Kieffer, 1897 b, p. 135, n° 244. A-H.  
— Voir n°1332. . . . . **Neuroterus læviusculus** SCHENCK 1400  
Hieronymus, 1890, p. 235, n° 691; Kieffer, 1897 b, p. 135, n° 245. A-H.



Variétés du **Quercus pubescens** WILLD. :

**Quercus pubescens** var. **crispata** STEV.

- Pl.fe. — Voir n°1336. . . . . **Neuroterus lenticularis** OLIV. 1401  
Rübsaamen, 1902, p. 16, n° 22. P-B.  
— Galle du parenchyme. Voir n°1354. . . . . **Cécidomyide** 1402  
Rübsaamen, 1902, p. 16, n° 23. P-B.

**Quercus leptobalanos** GUSSONE

- Ac.fr. — Voir n°1177. . . . . **Cynips Mayri** KIEFF. 1403  
Mattei, 1903, 13 p., 1 pl. color. I.



**Quercus congesta** PRESL.

- Pl.fe. — Voir n°1336. . . . . **Neuroterus lenticularis** OLIV. 1404  
Rübsaamen, 1902, p. 16, n° 15. A-H.

**Quercus Haas** KOTSCHY (**Q. ped.** var. **Haas** DC.)

- Ac.bg. — Voir n°1248. . . . . [**Cynips Kollari** HARTIG] 1405  
Rolfe, 1881, p. 54. I-B.

**Pl.fe.** — Voir n°1355. . . . . [Neuroterus baccarum L.] 1406  
 Rolfe, 1881, p. 54. I-B.

**Quercus Haas** KOTSCHY var. **atrichoclados** BORBAS ET BORNAL.

**Pl.fe.** — Voir n°1336. . . . . Neuroterus lenticularis OLIV. 1407  
 Rübssaamen, 1902, p. 16, n° 16; 1902<sup>c</sup>, p. 309, n° 86. P-B, A-M.

**Quercus Dalechampi** TEN. (**Q. sessiliflora** var. **Tenorei** DC.)

**Ac.bg.** — Cécidie cylindrique irrégulière, terminée par un disque arrondi à bord lobé et recourbé vers la base; cette cécidie, qui atteint 30 mm. de haut, a un diamètre de 20 mm. dans sa partie inférieure et de 25 mm. au niveau du disque; en vieillissant, la galle devient brune, brillante, comme laquée.  
 [Cynips polycera GIRAUD] 1408  
 Hieronymus, 1890, p. 202, n° 630; Kiefler, 1897<sup>b</sup>, p. 86, n° 76. I.

**Pl.fe.** — Cécidie lenticulaire avec excavation centrale. Voir n°1340.  
 Neuroterus numismatis OLIV. 1409  
 Rolfe, 1881, p. 55; Hieronymus, 1890, p. 203, n° 632. I-B, si.

— Cécidie lenticulaire à bords relevés. Voir n°1332.  
 Neuroterus læviusculus SCHENCK 1410  
 Hieronymus, 1890, p. 202-203, n° 631. si.

— Cécidie lenticulaire. Voir n°1336.  
 Neuroterus lenticularis OLIV. 1411  
 Rolfe, 1881, p. 55. I-B.

— Cécidie globuleuse. Voir n°1355. . Neuroterus baccarum L. 1412  
 Rolfe, 1881, p. 55. I-B.

**Quercus budenziana** BORBAS

**Ac.fr.** — Voir n°1169. . . . . Cynips caput-medusæ HARTIG 1413  
 Borbás, 1890, p. 27. A-H.

— Voir n°1180. . . . . Cynips calicis BURGS. 1414  
 Borbás, 1890, p. 27. A-H.

|                                 |                                       |      |
|---------------------------------|---------------------------------------|------|
| Ac. bg. — Voir n° 1222. . . . . | <i>Cynips coriaria</i> HAIML.         | 1415 |
| Borbás, 1890, p. 27.            |                                       | A-H. |
| Pl. fe. — Voir n° 1336. . . . . | <i>Neuroterus lenticularis</i> OLIV.  | 1416 |
| Borbás, 1890, p. 27.            |                                       | A-H. |
| — Voir n° 1332. . . . .         | <i>Neuroterus læviusculus</i> SCHENCK | 1417 |
| Borbás, 1890, p. 27.            |                                       | A-H. |
| — Voir n° 1351. . . . .         | <i>Andricus curvator</i> HARTIG       | 1418 |
| Borbás, 1890, p. 27.            |                                       | A-H. |
| — Voir n° 1326. . . . .         | <i>Andricus ostreus</i> GIRAUD        | 1419 |
| Borbás, 1890, p. 27.            |                                       | A-H. |

***Quercus conferta* KIT. (Q. Farnetto TEN., hungarica HUBENY)**

|                                                                                                                 |                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Ac. fr. — Cécidie chevelue. Voir n° 1169.                                                                       | <i>Cynips caput-medusæ</i> HARTIG | 1420            |
| Paszlavszyk, 1884 <sup>b</sup> , p. 225 ; 1885, p. 107 ; Rübssaamen, 1902, p. 16, n° 4 ; Cecconi, 1902, p. 629. |                                   | A-H,<br>P-B, I. |
| — Cécidie en forme de shapska. Voir n° 1177.                                                                    | <i>Cynips Mayri</i> KIEFF.        | 1421            |
| Cecconi, 1901 <sup>c</sup> , p. 739, n° 71 ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIV, n° 349, ⊕.                    |                                   | I.              |
| Ac. fl. — Cécidie munie de prolongements simples, coniques, à sommet rouge et gluant. Voir n° 1198.             | <i>Andricus Mayri</i> WACHTL      | 1422            |
| Paszlavszyk, 1885, p. 107.                                                                                      |                                   | A-H.            |

- Ac. bg. { Cécidie affectant la forme d'un bourgeon ou d'un fuseau . . . . . A.  
 Cécidie sphérique à surface lisse ou parsemée d'aspérités irrégulières. B.  
 Cécidie présentant des nodosités arrondies ou des mamelons obtus. . . . . C.  
 Cécidie présentant des prolongements plus ou moins longs. . . . . D.

A. — Cécidie longue de 6 mm. et large de 5 mm., constituée aux dépens d'un bourgeon axillaire dont les écailles soudées forment une enveloppe mince entourant une galle à paroi peu épaisse, striée ; cavité larvaire unique, ample, d'un diamètre de 4 mm. **Cynipide** 1423

Cecconi, 1902 c, p. 630 ; 1904, p. 84. I.



- Voir n° 1255. . . . . **Andricus solitarius** FONSÉ. 1424  
 Cecconi, 1902 c, p. 629. I.
- B.** — Voir n° 1262. . . . . **Biorrhiza pallida** OLIV. 1425  
 Cecconi, 1902 c, p. 629. I.
- Voir n° 1265. . . . . **Cynips lignicola** HARTIG 1426  
 Cecconi, 1901 e, p. 739, n° 70 ; Kieffer, 1901 b, p. 422. I.
- Voir n° 1248. . . . . **Cynips Kollari** HARTIG 1427  
 Cecconi, 1902 c, p. 629. I.
- Cécidie de 58 mm. sur 44 mm. ; taches blanches. Voir n° 1770.  
**Cynips insana** MAYR 1428  
 Mayr, 1901, p. 65-68 ; Kieffer, 1905, p. 572-573. T.
- C.** — Voir n° 1241. . . . . **Cynips quercus-tozæ** BOSQ 1429  
 Paszlavszky, 1884 b, p. 225 ; 1885, p. 107. A-H.
- Voir n° 1239. . . . . **Cynips conifica** HARTIG 1430  
 Cecconi, 1901 e, p. 739, n° 68 ; 1902 c, p. 629. I.
- D.** — Voir n° 1226. . . . . **Andricus lucidus** HARTIG 1431  
 Cecconi, 1902 c, p. 628 ; Kieffer, 1901 b, p. 427. I.
- Voir n° 1230. . . . . **Cynips polycera** GIRAUD 1432  
 Cecconi, 1902 c, p. 630. I.
- Voir n° 1224. . . . . **Andricus Panteli** KIEFF. 1433  
 Cecconi, 1902 c, p. 629 ; Kieffer, 1901 b, p. 449. I.
- Voir n° 1229. . . . . **Cynips coronaria** STEFANI 1434  
 Cecconi, 1901 e, p. 739, n° 69 ; Kieffer, 1901 b, p. 429. I.
- Voir n° 1225. . . . . **Cynips Hartigi** HARTIG 1435  
 Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VII, n° 175, ⊕ ; Cecconi, 1902 c, p. 630. I.
- Pl.ti.** — Voir n° 1294. . . . . **Andricus trilineatus** HARTIG 1436  
 Cecconi, 1902 c, p. 629. I.
- Pl.fe.** { Cécidie lenticulaire. . . . . A.  
 { Cécidie affectant une autre forme. . . . . B.
- A.** — Voir n° 1336. . . . . **Neuroterus lenticularis** OLIV. 1437  
 Rolfe, 1883, p. 30 ; Kieffer, 1897 b, p. 85. I-B.

|                                                                                                                            |                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| — Voir n° 1338. . . . .                                                                                                    | <b>Neuroterus fumipennis</b> HARTIG | 1438 |
| Cecconi, 1901 <sup>e</sup> , p. 740, n° 72; Kieffer, 1901 <sup>b</sup> , p. 443. <span style="float: right;">I.</span>     |                                     |      |
| — Voir n° 1340. . . . .                                                                                                    | <b>Neuroterus numismatis</b> OLIV.  | 1439 |
| Rübsaamen, 1902, p. 16, n° 13. <span style="float: right;">P-B.</span>                                                     |                                     |      |
| B. — Voir n° 1352. . . . .                                                                                                 | <b>Andricus sufflator</b> MAYR      | 1440 |
| Cecconi, 1902 <sup>e</sup> , p. 629. <span style="float: right;">I.</span>                                                 |                                     |      |
| — Voir n° 1323. . . . .                                                                                                    | <b>Dryophanta pubescentis</b> MAYR  | 1441 |
| Paszlajszky, 1884 <sup>b</sup> , p. 227; 1885, p. 107. <span style="float: right;">A-H.</span>                             |                                     |      |
| — Voir n° 1326. . . . .                                                                                                    | <b>Andricus ostreus</b> GIRAUD      | 1442 |
| Cecconi, 1901 <sup>e</sup> , p. 739, n° 67; Kieffer, 1901 <sup>b</sup> , p. 432-433. <span style="float: right;">I.</span> |                                     |      |
| — Érinéum . . . . .                                                                                                        | <b>Eriophyes suberinus</b> NAL.     | 1443 |
| Cecconi, 1902 <sup>e</sup> , p. 611. <span style="float: right;">I.</span>                                                 |                                     |      |

**Quercus Toza** BOSQ

(**Q. Tauzin** PERS., **pubescens** BROT. NON WILLD.)

**Ac.fr.** — Cécidie dure, brune, pluriloculaire, formée aux dépens de l'amande du gland. Voir n° 1168.

[**Callirhytis glandium** (GIRAUD)] 1444

Chicote, 1886; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 135. E.

— Cécidie munie de prolongements ramifiés. Voir n° 1169.

**Cynips caput-medusæ** HARTIG 1445

Chicote, 1886; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 135. E.

— Cécidie volumineuse (20 mm. de hauteur sur 20-25 mm. de large à la base et 11-13 mm. dans la région supérieure) en forme de cône tronqué dont la base est ornée de deux couronnes de prolongements simples, épais, plus ou moins contournés (fig. 461); au milieu des prolongements plus courts qui occupent le sommet du cône, s'ouvre une grande cavité au voisinage de laquelle se trouve la chambre larvaire (fig. 462).

Cynipide janvier-février II. **Cynips Panteli** TAVARES 1446

Tavares, 1900, p. 42-44, n° 60, pl. II, 1-2, ⊕; 1905, p. 84-85, pl. VI, 2, ⊕. P.

**Ac.fl.** — Grosse cécidie sphérique cotonneuse. Voir n° 1187.

**Andricus ramuli** L. var. **trifasciata** KIEFF. 1447

Kieffer, 1899<sup>b</sup>, p. 409; Tavares, 1900, p. 28, n° 28; 1905, p. 82-83. P.


- Cécidie piriforme, haute de 2 mm., couverte de poils fins.  
 Voir n° 1189. **Andricus pilosus** ADLER 1448  
 Tavares, 1902, p. 103, n° 249 bis ; 1905, p. 83-84, pl. IV, 24-24 a, pl. XI, 13, ⊕. P.
- Cécidie ovoïde, velue seulement dans sa moitié supérieure.  
 Voir n° 1190. **Andricus occultus** TSCHERK 1449  
 Tavares, 1902, p. 103, n° 249 ; 1905, p. 83, pl. XI, 21, 27, ⊕. P.
- Cécidie formée aux dépens d'une étamine dont les anthères  
 sont encore visibles. **Neuroterus Schlechtendali** MAYR 1450  
 Tavares, 1902, p. 114, n° 265 bis ; 1905, p. 83, pl. VII, 15, ⊕. P.
- [Cécidie ovoïde, de 1,5 mm. de haut, velue seulement à la  
 pointe. **Andricus nudus** ADLER] 1451  
 Tavares, 1905, p. 84. P.
- Ac.ti.** — Renflement de l'extrémité d'une pousse (5 mm. sur 4).  
**Andricus pseudo-inflator** TAVARES 1452  
 Kieffer, 1905, p. 560. E.O.
- Ac.bg.** { Cécidie en forme de bourgeon plus ou moins grossi... A.  
 { Cécidie émergeant très peu du bourgeon... B.  
 { Cécidie munie de prolongements... C.  
 { Cécidie sans prolongements, de forme arrondie ou ovoïde... D.  
 { Cécidie sans prolongements et d'une autre forme... E.
- A.** — Cécidie rappelant un fruit de houblon, avec, au centre,  
 une petite galle interne ligneuse. **Andricus fecundator** HARTIG 1453  
 Hieronymus, 1890, p. 234, n° 686 ; Trotter, 1901, p. 160, n° 78 ; Tavares, 1905, p. 69, pl. XII, 4, ⊕. F, E, P.
- Cécidie beaucoup plus étroite que la précédente, fusiforme,  
 longue de 12-15 mm. et large de 5-6 mm. ; galle interne brune,  
 striée longitudinalement, à sommet tronqué et muni d'une  
 petite verrue conique rougeâtre. **Cynipide** 1454  
 Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 132-133, n° 233 ; 1901<sup>b</sup>, p. 413, note 1. F.
- Cécidie ovoïde à écailles hypertrophiées complètement sou-  
 dées. Voir n° 1215. **Neuroterus aprilinus** GIRAUD 1455  
 Tavares, 1902, p. 114, n° 264 ; 1905, p. 69, pl. IV, 22, ⊕. P.
- B.** — Cécidie de 3-4 mm. de longueur, émergeant très peu du  
 bourgeon. Voir n° 1216. **Andricus collaris** HARTIG 1456  
 Tavares, 1903, p. 172-173, n° 42 ; 1905, p. 71-72, pl. II, 15, ⊕. P.

— Cécidie glandiforme (8 mm. sur 3), glabre, verte (fig. 465-466), striée seulement dans sa moitié supérieure, et terminée par un petit mamelon apical (à l'état jeune la galle est presque sphérique) ; parois ligneuses délimitant une grande cavité larvaire. [*Cynipide* printemps II].


**Andricus Tavaresi** KIEFF. 1457

Tavares, 1905, p. 72-73 pl. II, 19, pl. IV, 25, ⊕ ; Kieffer, 1905, p. 567-568, pl. XXI, 6, ⊕.

P.



a




b


*Quercus Toza*

*Cynips Panteli* (n° 1446)

Fig. 461 (a). — Im. TAVARES  
Fig. 462 (b). — Schéma.



a




b

*Quercus Toza*


*Cynips quercus-tozae* (n° 1463)

Fig. 463 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 464 (b). — D'ap. nat.



a

b



c

d

*Quercus Toza*

*Andricus Tavaresi* (n° 1457)  
*Trigonospis bruneicornis* (n° 1501)  
Fig. 465, 466 (a, b). — Im. TAVARES  
Fig. 467, 468 (c, d). — Im. TAVARES

C. — Prolongements contournés, irréguliers, disposés sans ordre.

Cécidie non gluante. Voir n° 1222.

[**Cynips coriaria** HAIMH.] 1458

Chicote, 1886 ; Kieffer, 1897 b, p. 135.

E.

— Cécidie semblable. Voir n° 1687.

**Cynips coriaria** HAIMH. var. *lusitanica* KIEFF. 1459

Tavares, 1905, p. 68, pl. VI, 1, ⊕.

P.

— Prolongements larges, courts et rayonnant assez régulièrement ; cécidie à surface gluante.

**Andricus Panteli** KIEFF. 1460

Tavares, 1900, p. 33, n° 44 ; 1905, p. 68.

P.

— Prolongements trapus, affectant la forme de pyramides. Voir n° 1225.

[**Cynips Hartigi** HARTIG] 1461

Chicote, 1886 ; Kieffer, 1897 b, p. 135 ; 1901 b, p. 411-412.

E.

- Prolongements très nombreux et minces. Voir n° 1226.  
**Andricus lucidus** HARTIG 1462  
 Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 49; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 427. I.
- D. — Cécidie sphérique, brun marron, avec une couronne de nodosités (fig. 463-464). Cynipide février-mars II.  
**Cynips quercus-tozæ** BOSCH 1463  
 Bosch, 1792, p. 154-157, pl. XXXII, 3, ⊕; Tavares, 1905, p. 67. E.S.
- Cécidie sphérique, brun clair, lisse ou avec des aspérités disposées sans ordre.  
**Cynips Kollari** HARTIG 1464  
 Rolfe, 1881, p. 55; Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 49; Tavares, 1905, p. 67-68, pl. VI, 4, ⊕. I-B, F, E, P, I.
- Cécidie arrondie, à surface déchirée. Voir n° 1265.  
**Cynips lignicola** HARTIG 1465  
 Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 49. I.
- Grosse cécidie arrondie, charnue, blanche ou rouge, pluriloculaire.  
**Biorrhiza pallida** OLIV. 1466  
 Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 135; Tavares, 1900, p. 46, n° 63; 1905, p. 67, pl. VI, 8, ⊕. E, P.
- Petite cécidie arrondie et charnue, uniloculaire.  
**Trigonaspis megaptera** PANZER 1467  
 Tavares, 1905, p. 66, pl. VIII, 17, ⊕. P.
- Cécidie ovoïdale ou conique (dimensions : 4-5,5 mm. sur 2,5-3 mm.), verte, couverte de poils argentés, striée en long, à paroi molle, charnue, à cavité larvaire unique et ample.  
**[Dryophanta flosculi** GIRAUD] 1468  
 Tavares, 1903, p. 173, n° 4; 1905, p. 66, pl. IV, 23, ⊕; 1907<sup>b</sup>, p. 123-124, fig. 1, ⊕. P.
- Cécidie ovoïdale, mesurant 2,3 mm. sur 1,8 mm., à parois minces, enfermée dans un bourgeon dont les écailles diffèrent peu des écailles normales.  
**Cynipide** 1469  
 Tavares, 1903, p. 173, n° 43; 1905, p. 70. P.
- E. — Cécidie fusiforme pédicellée. Voir n° 1255.  
**Andricus solitarius** FONSC. 1470  
 Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 134-135; Tavares, 1900, p. 33, n° 44; 1902, p. 182; 1905, p. 70-71, pl. IX, 15, ⊕. E, P.
- Cécidie fusiforme sessile. Voir n° 1283.  
**Andricus Malpighii** ADLER 1471  
 Tavares, 1900, p. 30, n° 35; 1901, p. 71, pl. IV, 13, ⊕. P.

— Cécidie ayant la forme d'un petit gland. Voir n° 1256.

**Andricus glandulæ** SCHENCK 1472

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 133, n° 235 ; 1901<sup>b</sup>, p. 419.

F.

— Cécidie subarrondie, à surface gluante. Voir n° 1269.

[**Cynips glutinosa** GIRAUD] 1473

Chicote, 1886 ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 135 ; 1901<sup>b</sup>, p. 423.

E.

**Pl.ra.** — Cécidies agglomérées. Voir n° 1289. . **Biorrhiza aptera** BOSCH 1474

Tavares, 1900, p. 47, n° 64 ; 1905, p. 60 ; 1907<sup>b</sup>, pl. III, 16, ⊕.

P.

— Cécidie pluriloculaire, irrégulièrement arrondie. Voir n° 1290.

**Andricus radialis** FABR. 1475

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 134 ; Tavares, 1900, p. 34, n° 47 ; 1905, p. 60-61, pl. VI, 7, ⊕.

E, P.

**Pl.ti.** { Sur le tronc..... A.  
 { Sur les rameaux de l'année..... B.

A. — Cécidie identique à la précédente. . **Andricus radialis** FABR. 1476

Tavares, 1905, p. 61.

P.

— Cécidie en forme de cône allongé, non strié longitudinalement. Voir n° 1291.

**Andricus corticis** HARTIG 1477

Tavares, 1905, p. 61-62.

P.

— Cécidie semblable à la précédente, dont elle ne diffère que par une sorte de cylindre cannelé intérieurement qui surmonte la cavité larvaire. Cynipide printemps II.

**Andricus Krajnovici** TAVARES 1478

Tavares, 1905, p. 62.

P.

— Cécidie en forme de cône surbaissé, ligneux, strié dans sa partie inférieure seulement. Voir n° 1292.

**Andricus rhizomæ** HARTIG 1479

Tavares, 1900, p. 35, n° 48 ; 1905, p. 62.

P.

— Cécidie en forme de cône surbaissé, ligneux, présentant des stries qui partent du sommet. Voir n° 1293.

**Andricus Sieboldi** HARTIG 1480

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 134 ; Tavares, 1900, p. 34, n° 46 ; 1905, p. 62.

E, P.

B. — Petite dépression entourée d'un léger bourrelet circulaire.

[**Asterodiaspis quercicola** BOUCHÉ] 1481

Tavares, 1905, p. 64 (*Acanthohermes quercus* Kollar).

P.

— Renflement fusiforme ou cylindrique, parfois un peu conique pouvant atteindre 40 mm. de long. Une chenille dans la grande cavité larvaire. **Lépidoptère** 1482

Tavares, 1905, p. 63, pl. VIII, 19, pl. IX, 24, ⊕.

P.

— Cécidie unilatérale amenant la courbure des rameaux et contenant une petite galle interne dans une grande cavité.

**Andricus curvator** HARTIG 1483

Tavares, 1905, p. 63.

P.

— Renflement irrégulier des rameaux produit par de petites cécidies arrondies, de 1 à 3 mm. de diamètre.

**Andricus trilineatus** HARTIG 1484

Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 438-440 ; 1901<sup>b</sup>, p. 407 ; Tavares, 1905, p. 65.

P.

— Cécidies arrondies, très nombreuses dans l'axe d'un jeune rameau ; leur présence n'est décelée que par le trou de sortie du Cynipide (avril-juin I).

**Andricus trilineatus** HARTIG var. **beirensis** TAVARES 1485

Tavares, 1902, p. 105-106, n° 253 ; 1905, p. 64-65, pl. IV, 28, ⊕.

P.

— Cécidie ellipsoïdale (2 mm. sur 1,5 mm.), uniloculaire. Voir n° 1298.

**Andricus furunculus** BEJERINCK 1486

Tavares, 1902, p. 106, n° 253 bis ; 1905, p. 64, pl. II, 20, pl. XIII, 21, ⊕.

P.

|         |   |                                                                         |    |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Pl. fe. | { | Cécidie lenticulaire.....                                               | A. |
|         |   | Cécidie insérée sur la face inférieure de la nervure médiane.....       | B. |
|         |   | Cécidie sphérique.....                                                  | C. |
|         |   | Cécidie en forme de rein, de fuseau, de pustule ou de sphéroïde aplati. | D. |
|         |   | Cécidie affectant le bord du limbe.....                                 | E. |
|         |   | Renflement irrégulier du pétiole ou de la nervure médiane.....          | F. |

A. — Voir n° 1336. . . . . **Neuroterus lenticularis** OLIV. 1487

Rolfe, 1881, p. 55 ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 134, n° 242, p. 135.

I-B, E.

— Voir n° 1337. **Neuroterus lenticularis** OLIV. var. **histrion** KIEFF 1488

Tavares, 1902, p. 113, n° 263 ; 1905, p. 81, pl. V, 3, ⊕.

P.

— Voir n° 1340. . . . . **Neuroterus numismatis** OLIV. 1489

Hieronymus, 1890, p. 235, n° 689 ; Trotter, 1901, p. 160, n° 179 ; Tavares, 1905, p. 79.

F, E, P.

— Cécidie brunâtre, de 4 mm. de diamètre, présentant sur ses deux faces des poils étalés blancs ; elle est fixée sur le limbe par un court pédicelle qui s'insère au centre de sa face

inférieure, sur une partie convexe : un point jaune au centre de la face supérieure. **Cynipide** 1490

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 134, n° 611 : 1901<sup>b</sup>, p. 440-441. *F.*

— Cécidie semblable à celle décrite au n° 1717, mais un peu plus velue.

**Neuroterus læviusculus** SCHENCK var. **lusitanica** TAVARES 1491

Hieronymus, 1890, p. 234-235, n° 688; TAVARES, 1905, p. 80. *F., E., P.*

— Voir n° 1338. **Neuroterus fumipennis** HARTIG 1492

TAVARES, 1900, p. 51-52, n° 75; 1905, p. 80, pl. V, 1, ⊕. *F., P.*

B — Cécidie munie de deux valves Voir n° 1326.

**Andricus ostreus** GIRAUD 1493

Hieronymus, 1890, p. 234, n° 687; TAVARES, 1905, p. 77. *E., P.*

— Voir n° 1857. **Neuroterus saltans** GIRAUD 1494

Chicote, 1886; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 135. *E.*

C. — Cécidie faisant également saillie sur les deux faces du limbe. Voir n° 1351. **Andricus curvator** HARTIG 1495

TAVARES, 1900, p. 31, n° 36; 1905, p. 74-75, pl. IX, 23 ⊕. *P.*

— Cécidie faisant inégalement saillie sur les deux faces du limbe. Voir n° 1355. **Neuroterus baccarum** L. 1496

Rolfe, 1881, p. 51; TAVARES, 1905, p. 75, pl. V, 6, ⊕. *E.-O.*

— Cécidie ayant 8-10 mm. de diamètre, lisse. Voir n° 1323. **Dryophanta pubescentis** MAYR 1497

Chicote 1886; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 135; 1901, p. 633, noter. p. 635; 1901<sup>b</sup>, p. 44; TAVARES, 1902, p. 115, n° 298; 1905, p. 78, pl. V, 4, pl. IX, 11 ⊕. *E., P.*

— Voir n° 1320. **[Dryophanta folii L.]** 1498

Houard, 1905<sup>b</sup>, p. 143. *F.*

— Cécidie mesurant 4-5 mm. de diamètre, à surface hérissée de poils fins. Voir n° 1356. **Neuroterus tricolor** HARTIG 1499

TAVARES, 1905, p. 75, pl. VII, 17-18, pl. XI, 11 ⊕. *P.*

D. — Cécidie réniforme. Voir n° 1343. **[Trigonaspis renum GIRAUD]** 1500

Chicote 1886; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 135; 1901<sup>b</sup>, p. 440. *E.*

— Petite cécidie fusiforme, longue de 4 mm., épaisse de 1.5 mm., presque ligneuse, blanche, fixée par une mince pédi-



celle sur le côté des nervures (fig. 467), parallèlement à celles-ci ; la surface supérieure est couverte de longs poils (fig. 468), l'inférieure presque glabre ; cavité larvaire ellipsoïdale limitée par une paroi mince. Cynipide printemps II.

**Trigonaspis brunicornis** TAVARES 1501

Tavares, 1900, p. 37-38, n° 51, pl. I, 3, ⊕ ; 1902, p. 109-110, n° 256 ; 1905, p. 77-78, pl. V, 3, ⊕ ; Kieffer, 1905, p. 580-581, pl. IX, 1, ⊕. P.

— Cécidie en forme de pustule (diamètre 2-3 mm.), également saillante sur les deux faces du limbe. Voir n° 1353.

**Neuroterus vesicator** SCHL. 1502

Tavares, 1900, p. 51, n° 74 ; 1905, p. 74, pl. V, 16, ⊕. P.

— Cécidie semblable à la précédente, mais plus petite (diamètre 1,5 mm.), avec une cavité interne dans laquelle vit une larve qui sort par un orifice de la face supérieure. M.T.

**Cécidomyide** 1503

Tavares, 1905, p. 74, pl. IX, 19, ⊕. P.

— Cécidie en forme de sphéroïde aplati. Voir n° 1328.

[**Dryophanta divisa** HARTIG] 1504

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 133-134, n° 239 ; 1901<sup>b</sup>, p. 447. F.

E. — Bord du limbe rabattu. . . **Phylloxera coccinea** HEYDEN 1505

Tavares, 1902<sup>d</sup>, p. 182 ; 1905, p. 74. P.

— Bord du limbe rabattu. . . **Macrodiplosis volvens** KIEFF. 1505A

Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 126. P.

— Petite cécidie ovoïde, de 2 mm. de longueur, fixée au bord du limbe et en arrêtant la croissance. Voir n° 1346.

**Neuroterus albipes** SCHENCK 1506

Tavares, 1905, p. 76-77, pl. IX, 12, 16, ⊕. P.

F. — Renflement irrégulier. Voir nos 1317, 1318.

**Andricus trilineatus** HARTIG 1507

[**Andricus testaceipes** HARTIG] 1508

Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 440, 441 ; 1901<sup>b</sup>, p. 432 ; Tavares, 1905, p. 73. P.

— Renflement. Voir n° 1316. [**Heliozela stanneella** FISCH. v. R.] 1509

Tavares, 1905, p. 73, pl. IX, 14, ⊕. P.

**Quercus Ilex L.**(y compris les formes *genuina* et *serrata*)

- Ac. fr.** — Entre la cupule et le gland, cécidie ligneuse, multiloculaire, formée aux dépens de la membrane du gland dont la surface est bosselée ou parfois fendillée.
- Callirhytis glandium** GIRAUD 1510
- Tavares, 1905, p. 59. P.
- Sur le gland, généralement mal développé, cécidie brun marron, gluante, en forme de casque de lancier. Voir n° 1177.
- Cynips Mayri** KIEFF. 1511
- Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 92, note 2. E-S.
- Sur le gland atrophié, cécidie brunâtre non gluante, formée de deux parties, l'une inférieure en calotte sphérique, l'autre supérieure tronconique, le cercle de base de la calotte étant en contact avec la grande base du tronc de cône : le pourtour de cette dernière est d'ailleurs orné de petits appendices.
- Cynips Kiefferi** CABRERA 1512
- Cabrera, 1897, p. 25 ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 92, note 2. E.
- Petites cécidies ovoïdales formées aux dépens de la paroi latérale ou de la base de la cupule (fig. 469). La présence des cécidies ne se traduit au dehors que par une courbure plus ou moins accentuée du gland (fig. 470) dont la pointe peut venir toucher le bord de la cupule. Cynipide décembre I ou printemps II.
- Plagiotrochus Burnayi** TAVARES 1513
- Tavares, 1902, p. 110-111, n° 257 ; 1905, p. 59, pl. VI, 12, pl. XIV, 14-15, ⊕. P.
- Bord de la cupule déformé, un peu épaissi et velu.
- Eriophyes ilicis** CAN. var. *rudis* NAL. 1514
- Müllner, 1902, p. 14-15 ; Nalepa, 1902, p. 223. E-C.
- Ac. fl.** — Inflorescence profondément déformée (fig. 471) et revêtue d'un érinéum brun rougeâtre ; étamines allongées, parfois irrégulièrement bosselées (fig. 472), de 5-6 mm. de long sur 2 mm. de diamètre, couvertes d'un feutrage épais formé de poils étoilés dont les rayons assez épais, cylindriques, terminés en pointe mousse, sont droits ou contournés.
- Eriophyes ilicis** CAN. var. *Licopolii* STEFANI 1515

Licopoli, 1877, p. 22-23, pl. III, 3-4, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 315, ⊕; E-S.  
 Stefani, 1901<sup>b</sup>, p. 234-235, n° 31, pl. II, 4, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VI, n° 128, ⊕;  
 Tavares, 1905, p. 58, pl. III, 15, ⊕.

— Axe du chaton fortement épaissi et transformé en une masse fusiforme (18 mm. sur 12 mm.), charnue, verte, glabre, qui présente à sa surface des rudiments de fleurs au centre de petites dépressions. Cynipide mai I.

**Plagiotrochus fusifex** MAYR var. **ilicina** TAVARES 1516

Tavares, 1900, p. 47, n° 65; 1902, p. 112, n° 259; 1905, p. 56-57, pl. III, 9, ⊕. P.



*Quercus illex*

*Quercus illex*

*Quercus illex*

*Plagiotrochus Burnayi* (n°1513)

*Er. ilicis* var. *Licopolii* (n°1515)

*Andricus singulus* (n°1517).

Fig. 469 (a). — Im. TAVARES

Fig. 471 (c). — D'ap. nat.

Fig. 473 (a). — D'ap. nat.

Fig. 470 (b). — Im. TAVARES

Fig. 472 (d). — Im. LICOPOLI

Fig. 474 (b). — D'ap. nat.

**Ac.ti.** — Sur une pousse, renflement irrégulier, ligneux, de la grosseur d'un pois (fig.473), à paroi épaisse (fig.474), à cavité allongée, portant quelques feuilles et quelques bourgeons.

[**Andricus singulus** MAYR] 1517

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 88, n° 79; 1901<sup>b</sup>, p. 408. E-S.F.

- Ac.bg.** { Galle en artichaut, en chou-fleur ou formée par une agglomération de bourgeons..... A.  
 { Galle fusiforme (10-15 mm. de long) ou ovoïde (2 mm.)..... B.  
 { Galle irrégulièrement arrondie, multiloculaire..... C.  
 { Galle sphérique, uniloculaire, à parois épaisses... D

A. — Les écailles du bourgeon, très agrandies, sont imbriquées

de façon à former une cécidie ovoïde (fig. 475), pluriloculaire, rappelant un fruit de houblon ou mieux la galle produite par l'*Andricus fecundator*. Larves d'un blanc jaunâtre. M. T. Éclouaison mai II.

**Contarinia cocciferæ** TAVARES 1518

TAVARES, 1900, p. 72-74, n° 125; 1905, p. 55, pl. III, 12, ⊕; 1906, p. 79-80; CECIONI, 1902, p. 141, n° 42; HOUARD, 1902, p. 94, n° 30.

P. F. I.

— Excroissance colorée ayant l'aspect d'un chou-fleur et pouvant atteindre 50-60 mm. de diamètre.

**Eriophyes suberinus** NAL.] 1519

KIEFFER, 1901<sup>b</sup>, p. 470.

E.

— Cécidie constituée par une agglomération de bourgeons légèrement grossis et très velus.

**Eriophyide** 1520

KIEFFER, 1901<sup>b</sup>, p. 470.

P.

B. — Cécidie fusiforme, pédiculée, uniloculaire, de 10 mm. de long. Voir n° 1255.

**Andricus solitarius** FONSC. 1521

KIEFFER, 1900<sup>b</sup>, p. 490; 1901<sup>b</sup>, p. 415-416.

E-S.

— Cécidie ovoïde, de teinte verdâtre, présentant deux côtes longitudinales qui convergent au sommet, lequel paraît ainsi mucroné. Cynipide printemps II.

**Andricus Mayeti** KIEFF. 1522

KIEFFER, 1899<sup>b</sup>, p. 398; 1901<sup>b</sup>, p. 417.

F.

C. — Cécidie blanche ou rosée, glabre, charnue, de la grosseur d'une cerise à celle d'une noix.

**Biorrhiza pallida** OLIV.] 1523

KIEFFER, 1897<sup>b</sup>, p. 88-89; 1901<sup>b</sup>, p. 414.

E.

— Cécidie semblable à la précédente, mais couverte d'une épaisse pilosité et n'atteignant que la taille d'une noisette.

**Cynipide** 1524

KIEFFER, 1897<sup>b</sup>, p. 89, note 1; 1901<sup>b</sup>, p. 414.

si.

D. — Cécidie de 10 mm. de diamètre, à paroi ligneuse et dure, de la couleur de l'écorce.

**Synophrus politus** HARTIG 1525

CECIONI, 1902, p. 144, n° 91; STEFANI, 1906, p. 163.

I.

— Cécidie de 12-20 mm. de diamètre, brun clair, lisse ou avec nodosités disposées sans ordre.

**Cynips Kollari** HARTIG 1526

KIEFFER, 1897<sup>b</sup>, p. 89; 1901<sup>b</sup>, p. 421-422.

E-S.

— Cécidie de 15-30 mm. de diamètre, brun-marron, présen-

tant à sa partie supérieure des aspérités disposées en couronne,

**Cynips quercus-tozæ** Bosc 1527

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 89; 1901<sup>b</sup>, p. 424.

*E.S.*

**Pl.ra.** — Cécidie dont la forme n'a pas été indiquée. . . **Cynipide** 1528

Solla, 1892, p. 321; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 87, n° 77; 1901<sup>b</sup>, p. 402.

*I.*

**Pl.ti.** — Renflement fusiforme, rarement globuleux, dur, ligneux, contenant plusieurs cellules larvaires situées dans la couche ligneuse. Cynipide mars-avril II, rarement automne I.

**Plagiotrochus Kiefferianus** TAVARES 1529

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 87-88, n° 78; Trotter, 1901<sup>d</sup>, p. 369, n° 30; Cecconi, 1902, p. 144, n° 90; Tavares, 1905, p. 53, pl. III, 11, pl. XI, 15, ♂.

*F.I.,  
E.P.*



*Quercus ilex*

*Contarinia coccifera* (n°1518)

Fig. 475. — D'ap. nat.



*Quercus ilex*

*Contarinia ilicis* (n°1561)

*Contarinia luteola* (n°1532)

Fig. 476, 477 (a, b). — D'ap. nat.

Fig. 478 (c). — D'ap. nat.



*Quercus ilex*

*Eriophyes ilicis* (n°1544)

Fig. 479 (a). — D'ap. nat.

Fig. 480 (b). — D'ap. nat.

Fig. 481 (c). — D'ap. nat.

— Cécidie ligneuse, de la grosseur d'un pois, fixée sur l'écorce, de forme conique, à surface ornée de mucrons courts et robustes irrégulièrement distribués, et terminée par une pointe longue et épaisse.

**Andrieus** 1530

Stefani, 1898<sup>c</sup>, p. (28), n° 54.

*si.*

— Cécidie ligneuse, uniloculaire, pouvant atteindre la grosseur

d'une noix, de forme irrégulièrement arrondie, embrassant le rameau dont l'écorce est éclatée ; une galle interne.

[**Aphelonyx cerricola** GIRAUD] 1531

Cecconi, 1897, p. 444; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 405.

I.

— Dans le parenchyme cortical des jeunes rameaux (fig. 478), renflement unilatéral, en forme de cône surbaissé (2 mm. de hauteur en moyenne, sur 2 mm. de diamètre à la base), avec ouverture apicale conduisant dans la cavité larvaire. M.C. Dip-tère mars-avril II.

**Contarinia luteola** TAVARES 1532

Massalongo, 1893, p. (124-125), n° 85, pl. XXXVIII, 1-2, ⊕; Tavares, 1905, p. 54, pl. III, 7 c, ⊕. F, I, P.

— Sur l'écorce d'un tronc, âgé de 10-20 ans, bosselette à peine visible, longue de 6 mm., large de 4-5 mm., de la couleur de l'écorce qu'elle ne déchire pas ; à chaque bosselette correspond une galle interne, uniloculaire, ligneuse, ellipsoïdale, longue de 4 mm., large de 2,5 mm., orientée parallèlement aux génératrices du tronc. Souvent plusieurs cécidies sont réunies ou même soudées. Cynipide février-mai II.

**Fioriella Marianii** KIEFFER. 1533

Kieffer, 1902 c, p. 495-496; 1902 d, p. 639; 1905, p. 547-549, pl. X, 5, ⊕.

I.

— Renflement à peine perceptible d'un rameau semblable à celui produit par *Andricus trilineatus*. Voir n° 1294.

**Cynipide** 1534

Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 440; 1901<sup>b</sup>, p. 405.

F, E.

- Pl. fe. { Cécidie du pétiole ou de la nervure médiane. . . . . A.  
 Cécidie n'affectant que le bord du limbe. . . . . B.  
 Cécidie visible seulement sur l'une des faces du limbe. . . . . C.  
 Cécidie faisant également { Saillie bien marquée (cécidie arrondie). D.  
 saillie sur les 2 faces. . . } Saillie légère (cécidie pustuleuse). . . . E.  
 Cécidie faisant des saillies très inégales sur les 2 faces. . . . . F.

A. — Sur le pétiole, renflement vert ou couleur de paille, cylindro-conique avec ouverture apicale, pubescent jusque vers le milieu de la hauteur; la base est entourée d'une zone circulaire de 2-3 mm. de diamètre. **Contarinia luteola** TAVARES 1535

Massalongo, 1893, p. (124-125), n° 85, pl. XXXVIII, 1-2, ⊕; Cecconi, 1902, p. 141, n° 41; Tavares, 1905, p. 53, pl. III, 7, ⊕. F, I, P.

— Cécidie fusiforme de 2-3 mm. de long, enfoncée dans une

- fente de la nervure médiane ou du pétiole, à la face inférieure.  
 [Neuroterus saltans GIRAUD] 1536  
 Kieffer, 1897 b, p. 91, n° 89; 1901 b, p. 433. E.
- Cécidie ovoïde de 2 mm. de long, fixée à la nervure médiane, qui forme deux expansions lamelleuses enveloppant la galle et persistant après sa chute. [Andricus ostreus GIRAUD] 1537  
 Kieffer, 1897 b, p. 91, n° 87; 1901 b, p. 432-433. E.
- Sur le pétiole, renflement allongé, multiloculaire, à surface bosselée, semblable à ceux d'*Andricus testaceipes* et d'*Andricus trilineatus*. Voir n°s 1317, 1318. Cynipide 1538  
 Kieffer, 1901 b, p. 432. F, E.
- B. — Hypertrophie et décoloration du bord du limbe avec reploie-  
 ment. Phylloxera coccinea HEYDEN 1539  
 Phylloxera quercus FONSC. 1540  
 Stefani, 1901, p. 445, n° 9; Cecconi, 1902 b, p. 352, n° 23. I.
- C. — Cécidie lenticulaire de 3-5 mm. de diamètre, couverte de  
 poils blancs soyeux. [Neuroterus lanuginosus GIRAUD] 1541  
 Cecconi, 1902, p. 144, n° 88. I.
- Cécidie sphérique, de 8-10 mm. de diamètre. Voir n° 1323.  
 Dryophanta pubescentis MAYR 1542  
 Kieffer, 1901 b, p. 446. B-M.
- Cécidie munie de 2 cavités. Voir n° 1329.  
 Dryophanta disticha HARTIG 1543  
 Kieffer, 1901, p. 640.
- A la face inférieure ou souvent aussi à la face supérieure, taches couleur rouille, de quelques mm. de diamètre (fig. 479 à 481), formées par un feutrage de poils étoilés de forme très variable, mais dont les rayons sont en général renflés dans leur partie moyenne. *Phyllerium dryinum* SCHL.; *Erineum ilicinum* DC. Eriophyes ilicis CAN. 1544  
 Nalepa, 1900, p. 210, pl. IV, 3-4; Rübсаamen, 1900 b, p. 215, n° 21, fig. 15, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 32, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VIII, n° 239, ⊕; Tavares, 1905, p. 52, pl. III, 4, ⊕. E-S, B-M.
- Taches sombres dues à la présence de nombreux poils courts, fortement renflés à l'extrémité. *Erineum sparsum* MASS. Eriophyide 1545  
 Massalongo, 1891, p. 101, n° 43. I.

— A la face inférieure, dans une dépression, érinéum formé de poils étoilés à rayons très longs et cylindriques ou bien courts et atténués graduellement de la base à la pointe. *Eri-  
neum suberinum* FÉE.

**Ériophyide** 1546

Rübsaamen, 1900<sup>b</sup>, p. 215-216, n° 22, fig. 16, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 52-53.

*B-M.*

— Simple soulèvement du limbe. . . . . **[Tenthredinide]**

1547

Ceconi, 1904, p. 84-85.

*I.*

— Petit soulèvement conique, de 1 mm. de diamètre, à la face supérieure du limbe; larve fixée sur le dessous de la feuille.

**Psylla ilicina** STEFANI 1548

Stefani, 1901, p. 446-447, n° 13; 1906, p. 163; Trotter, 1901<sup>d</sup>, p. 370, n° 32; Trotter et Ceconi, 1907 fasc. XVIII, n° 429, ⊕.

*I.*

D. — Cécidie rouge vif, de la grosseur d'un pois, uniloculaire, juteuse, un peu velue (fig. 482-483). Voir n° 1989.

**\* Dryocosmus australis** MAYR 1549


Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 90, n° 82; Trotter et Ceconi, 1901, fasc. IV, n° 80, ⊕; Trotter, 1902, p. 123; Houard, 1902<sup>c</sup>, p. 94, n° 29; Tavares, 1905, p. 49, pl. III, 3, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1907, fasc. XV, n° 416, ⊕.

*F, I, E,  
P, c.*

\* D'après Tavares (1905, p. 54, pl. XI, 19, ⊕), une cécidie semblable peut se produire aux dépens d'un bourgeon, à l'extrémité d'un rameau.



*Quercus Hex*  
*Dryocosmus australis* (n° 1549)  
Fig. 482 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 483 (b). — D'ap. nat.



*Quercus Hex*  
*Plagiotrochus ilicis* (n° 1551)  
Fig. 484. — D'ap. nat.

— Cécidie ovoïde blanchâtre et pubescente, déformant la



feuille, dont le limbe est incisé jusqu'à la galle ; quelquefois le limbe est découpé jusqu'à la nervure médiane.

**Neuroterus albipes** SCHENCK 1550

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 91-92, n° 90 ; 1901<sup>b</sup>, p. 434.

E.

— Cécidie ovoïde, pluriloculaire, avec nombreuses galles internes, englobant presque complètement le limbe (fig. 484) qui n'apparaît plus de chaque côté que sous la forme de minces denticules ; la cécidie est rouge, à peine pubescente, et à contours nettement délimités. Cynipide avril-mai I.

**Plagiotrochus ilicis** FABR. 1551

Focke, 1895, p. 497-498, 1<sup>o</sup>, pl. XIV, 3, ⊕ ; Kieffer, 1901, p. 604-606 ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVIII, n° 431, ⊕.

B-M.

**Plagiotrochus ilicis** FABR. var. **Emeryi** MAYR 1552

Hieronymus, 1890, p. 203-204, n° 635 ; Kieffer, 1901, p. 606.

E, I, b, P.

**Plagiotrochus ilicis** FABR. var. **Kiefferi** MARCHAL 1553

P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 19-20 ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 49, n° 84 ; 1901, p. 607.

AL.

**Plagiotrochus ilicis** FABR. var. **nigra** KIEFF. 1554

Kieffer, 1901, p. 606 ; Tavares, 1905, p. 49-50, pl. III, 14, ⊕.

F, P.

**Plagiotrochus ilicis** FABR. var. **Lichtensteini** KIEFF. 1555

Lichtenstein, 1877, p. 102 ; Kieffer, 1901, p. 607.

F, b.

**Plagiotrochus ilicis** FABR. var. **abdominalis** KIEFF. 1556

Kieffer, 1901, p. 606.

b.

E. — Pustule à contour ovulaire, de 1,5 mm. de long sur 1 mm. de large, brune sur le dessus, vert pâle sur le dessous (fig. 485-486) ; trou de sortie près du bord. **Andricus pseudococcus** KIEFF. 1557

Massalongo et Ross, 1898, p. 405, pl. XXVII, 11-12, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 52, pl. III, 6, ⊕. P, I, [S],

— Pustule circulaire de 1 mm. d'épaisseur sur 2-2,5 mm. de diamètre, de même couleur que la feuille, se desséchant et devenant brune après la sortie de l'insecte, qui a lieu par un orifice percé latéralement. Cynipide mai I ou mars II.

**Andricus coriaceus** MAYR 1558

**Andricus coriaceus** MAYR var. **barrensis** TAVARES 1558A

Mayr, 1882, p. 20 ; Hieronymus, 1890, p. 203, n° 634 ; Tavares, 1905, p. 52, pl. III, 2, ⊕ ; Stefani, 1906, p. 163 ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVIII, n° 430, ⊕.

E-S.

— Pustule circulaire, de la couleur de la feuille, présentant

sur chacune des faces une petite nodosité centrale ; diamètre 3,5 mm. M.T.

Cécidomyide 1559

Stefani, 1898<sup>c</sup>, p.(13).n°5 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.465.

si.


- F. — A la face inférieure, excroissance de forme ovoïde (fig.488), de 3-3,5 mm de longueur sur 2 mm. de largeur et 2,5 mm. de haut ; la cavité unique (fig.490) s'ouvre à la face opposée par une fente longitudinale (fig.487) dont les deux bords sont étroitement rapprochés sur toute leur longueur, sauf à l'une des extrémités, où ils laissent entre eux une ouverture circulaire. Cécidies parfois fort nombreuses sur les feuilles (fig.489), qui peuvent être alors déformées. Larve solitaire. M.C. Adulte printemps I.

Dryomyia Lichtensteini F.Löw 1560

Massalongo, 1893, p.(243-244).n°193, pl XXXIX, 3-4, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1900, fasc.II, n°31, ⊕ ; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl.XXXVIII, 6, ⊕ ; Houard, 1901<sup>d</sup>, p.706, n°51 ; Tavares, 1905, p.51, pl.III, 1, ⊕.

B-M,

AL.



Quercus ilex

*Andricus pseudococcus* (n°1557)

Fig.485 (a). — Im.Mass.

Fig.486 (b). — Im.Mass.



Quercus ilex

*Dryomyia Lichtensteini* (n°1560)

Fig.487,488 (a,b). — D'ap.nat.

Fig.489,490 (c,d). — D'ap.nat.

- A la face inférieure, saillie conique de 1,7-2 mm. de haut sur 1-1,3 mm. de diamètre à la base, présentant à la pointe une ouverture avec bord frangé (fig.476-477) ; à la face supérieure, tache brunâtre circulaire. Larve jaunâtre. M.T. Adulte avril II.

Contarinia ilicis KIEFF. 1561

F.Löw, 1878<sup>b</sup>, p.398-399, n°5, pl.IV, 6, ⊕ ; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl.XXXVIII, 7, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc.VIII, n°176, ⊕ ; Tavares, 1905, p.51, pl.III, 5, ⊕.

F.I.P.

- Cécidie conique, haute de 1 mm., large de 1 mm. à la base, située près des nervures, à la face supérieure du limbe, et entourée par du tissu hypertrophié ; sur la face inférieure se remarque une plage jaunâtre avec un gros tubercule au centre ; petite ouverture circulaire à l'extrémité du cône. Larve solitaire quittant la galle en mars II. **Contarinia** 1562
- Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 467 ; Stefani, 1906, p. 163. si.
- Cécidie cylindrique, saillante à la face supérieure du limbe (plus rarement sur le dessous), un peu velue dans la région basilaire, verte ou couleur de paille, de 0,5-0,6 mm. de hauteur, entourée à la base par une zone circulaire de 2-3 mm. de diamètre ; pas de déformation à la face opposée. Trou d'éclosion à l'extrémité de la partie cylindrique de la galle. M.C. Adulte mars-avril II. **Contarinia luteola** TAVARES 1563
- Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 466-467 ; Tavares, 1905, p. 50, pl. III, 7<sup>b</sup>, ⊕. p.
- Cécidie faisant fortement saillie à la face supérieure du limbe ; elle est brillante et couverte de poils simples, droits, roses, assez longs. Cynipide en mai. **Andricus Buyssoni** KIEFF. 1564
- Kieffer, 1901, pl. XXV, 11, ⊕ ; 1901<sup>b</sup>, p. 438 ; 1902, p. 3-4 ; 1905, p. 556-557. TU.
- Cécidie constituée par un large disque velu, de 5 mm. de diamètre, saillant à la face inférieure du limbe. Voir n° 1882. **Dryomyia circinnans** GIRAUD 1565
- Cecconi, 1902, p. 141, n° 45. I.
- Galle sphérique couverte de longs poils dressés et apparaissant, à la face supérieure, sous la forme d'une saillie discoïdale et, à la face inférieure, comme une baie de 3-4 mm. de diamètre. **Neuroterus tricolor** HARTIG] 1566
- Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 90, n° 83 ; 1901<sup>b</sup>, p. 437. F.E.
- Petite galle pustuleuse, uniloculaire, faisant saillie à la face supérieure du limbe sous la forme d'une éminence discoïde de 2,5 mm. de diamètre, à petit mucron central et apparaissant à la face inférieure, sous la forme d'une légère éminence duveteuse déprimée en son centre. **Cécidomyide** 1567
- Focken, 1895, p. 500-501, 3° ; 1897, p. 113-114. SY.

**Quercus Hex** L. var. **grammuntia** MARTIN-DONOS ET TIMB.-LAGR.  
(**Q. grammuntia** L.)

Pl.fe. — Voir n°1555.

**Plagiotrochus ilicis** FABR. var. **Lichtensteini** KIEFF. 1568

Dalla Torre, 1893, p.58; Kieffer, 1901, p.607.

B-M.

**Quercus Hex** L. var. **ballota** DC. (**Q. ballota** DESF.)

Pl.fe. — Cécidie en forme de poche. Voir n°1560.

**Dryomyia Lichtensteini** F.LÖW 1569

F.Löw, 1878<sup>b</sup>, p.392-393, pl.IV, 2.⊕; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.468.

F.I.

— Érinéum sans déformation du limbe. Voir n°1544.

[**Eriophyes ilicis** CAN.] 1570

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.471.

B-M.

**Quercus Hex** L. var. **avellanaeformis** COUTINHO  
(**Q. avellanaeformis** COLM ET BOUTEL)

Ac.bg. — Cécidie sphérique. Voir n°1248. . . [**Cynips Kollari** HARTIG] 1571

Hieronymus, 1890, p.200, n°625; Stefani, 1898<sup>c</sup>, p.(14-15), n°10.

E,si.

Pl.fe. — Petites cécidies uniloculaires, brillantes, velues ou presque glabres, sphériques, atteignant 3-5 mm. de diamètre, attachées par une large base sur une nervure latérale à la face inférieure de la feuille en faisant saillie à la face supérieure sous la forme d'un disque plat, brillant, glabre, de 2.5-3 mm. de diamètre.

**Cynipide** 1572

Hieronymus, 1890, p.200-201, n°626; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p.76.

E.

— Cécidie conique. Voir n°1561. . . **Contarinia ilicis** KIEFF. 1573

Tavares, 1900, p.71-72, n°123; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.467.

P.

**Quercus Hex** L. var. **calycina** POIR.

Pl.fe. — Érinéum, sans déformation du limbe. . . Ériophyide 1574

Rübsaamen, 1902, p.16, n°19.

P-B.

**Quercus Turneri** WILLD. (*Q. pedunculata* × *Hex*)

- Ac.bg.** — Voir n°1214. . . . . **Andricus fecundator** HARTIG 1575  
 Rolfe, 1881, p.57; Trail et Rolfe, 1906. *I-B.*
- Voir n°1216. . . . . **Andricus collaris** HARTIG 1576  
 Rolfe et Trail, 1906. *I-B.*
- Voir n°1248. . . . . **Cynips Kollari** HARTIG 1577  
 Rolfe, 1881, p.56; 1883, p.33; Trail et Rolfe, 1906. *I-B.*
- Pl.fe.** — Voir n°1322. . . . . **Dryophanta longiventris** HARTIG 1578  
 Rolfe, 1881, p.56; 1883, p.31; Trail et Rolfe, 1906. *I-B.*
- Voir n°1328. . . . . **Dryophanta divisa** HARTIG 1579  
 Rolfe, 1881, p.57; Trail et Rolfe, 1906. *I-B.*
- Voir n°1340. . . . . **Neuroterus numismatis** OLIV. 1580  
 Rolfe, 1881, p.56; Trail et Rolfe, 1906. *I-B.*
- Voir n°1351. . . . . **Andricus curvator** HARTIG 1581  
 Rolfe, 1881, p.57; Trail et Rolfe, 1906. *I-B.*
- Voir n°1355. . . . . **Neuroterus baccarum** L. 1582  
 Rolfe, 1881, p.56; Trail et Rolfe, 1906. *I-B.*

**Quercus Suber** L.(y compris les variétés *genuina* et *brevisquama*)

- Ac.fr.** — Cécidie ligneuse, pluriloculaire, brune, formée aux dépens de la membrane du gland, qui est bosselé et parfois même crevassé à la surface. Cynipide I-IV.
- Callirhytis glandium** GIRAUD 1583
- Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p.92; Stefani, 1898<sup>a</sup>, p.(30), n°61; Tavares, 1905, p.59, pl.VI, 11, ⊕; Cecconi, 1906, p.43, n°61. *F.P.J.*
- Galle en casque de lancier. Voir n°1177. **Cynips Mayri** KIEFF. 1584  
 Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p.537; 1901<sup>b</sup>, p.457. *E.*
- Cécidie en forme de tronc de cône, comme celle du *Cynips Panteli* (voir n°1446), mais en différant par l'absence d'appendices dans la région supérieure et par une seule couronne d'appendices à la base. **Cynipide** 1585  
 Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.460. *P.*

— Cécidie constituée aux dépens du gland qui est atrophié et de la cupule hypertrophiée dont la surface est couverte d'écaillés vertes et rouges, allongées. Voir n° 1808.

**Neuroterus glandiformis** GIRAUD 1586

Seurat, 1900, p. 7, 3<sup>e</sup>; Tavares, 1905, p. 59, pl. IV, 8, ⊕.

P, TU.

**Ac. fl.** { Grosse cécidie cotonneuse ou en forme d'urne. . . . . A.  
 { Petite cécidie ovoïde, de 2,5 mm. de longueur au maximum. . . . . B.  
 { Axe du chaton déformé. . . . . C.

A. — Cécidie oviforme ou piriforme, de 6-8 mm. de long sur 3-5 mm. de diamètre, d'un brun-roux un peu brillant à l'état sec, parfois un peu rugueuse, glabre, contenant une chambre larvaire sphérique surmontée d'une cavité cylindrique débouchant au dehors. Cynipide juin I. **Andricus grossulariæ** GIRAUD 1587

P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 17, n° 2; Stefani, 1897, p. 97-98; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 93, ⊕; Tavares, 1905, p. 57-58, pl. III, 10, pl. XI, 24, ⊕.

I, P,  
AL, TU.

— Fleur transformée en une sorte d'urne. Voir n° 1811.

**Andricus æstivalis** GIRAUD 1588

Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 743, n° 106; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 450.

I.

B. — Cécidie ovoïdale, de 1,5-2 mm. de longueur, terminée en pointe à la partie supérieure, glabre, uniloculaire, résultant de la transformation de l'anthère d'une étamine. Cynipide mai I. **Andricus Beijerincki** TROTTER 1589

Tavares, 1905, p. 58, pl. IX, 17-18, ⊕.

P.

— Cécidies ovoïdes, longues de 1,5-2,3 mm., larges de 1,2-1,5 mm., munies de 4 arêtes longitudinales convergeant vers le sommet; elles résultent de la transformation des étamines et se trouvent réunies au nombre de 10-20 dans un bourgeon floral. Cynipide juin I. **Andricus burgundus** GIRAUD 1590

Tavares, 1902, p. 103-104, n° 251; 1905, p. 58, pl. III, 16, ⊕.

P.

— Bourgeon à fleurs grossi, entr'ouvert, contenant de 5 à 10 petites galles, glabres, ovoïdes, brillantes, de teinte roux clair, hautes d'environ 2 mm., formées aux dépens d'une étamine.

**Andricus luteicornis** KIEFF. 1591

Stefani, 1894, p. 21; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 92, n° 91; 1901<sup>b</sup>, p. 453; 1905, p. 559.

P, si.

— Cécidie formée aux dépens d'une anthère hypertrophiée ; elle est longue de 2-2,5 mm., épaisse de 1,5 mm., brune, mate, obtuse aux deux extrémités et munie sur le côté d'un sillon longitudinal.

**Cynipide** 1592

Tavares, 1900, p. 104, n° 229 ; 1905, p. 58.


*P.*

C. — Axe du chaton renflé en une série de petites masses ovoïdales de faibles dimensions (1,6-1,8 mm. sur 0,7 mm.), ordinairement courbées, couvertes de poils argentés (fig. 491) ; cavités larvaires limitées par des parois minces. Cynipide fin juin I.

**Plagiotrochus amenti** TAVARES 1593


Tavares, 1902, p. 111-112, n° 258 ; 1905, p. 57, pl. III, 18, ⊕ ; Kieffer, 1905, p. 585-586, pl. XXI, 5, ⊕.

*P.*



*Quercus Suber*

Fig. 491 (a) : *Plagiotrochus amenti* (n° 1593). . . Im. KIEFF.  
 Fig. 492, 493 (b, c) : *Cynipide* (n° 1597). . . Im. KIEFF.  
 Fig. 494, 495 (d, e) : *Andricus Mayeti* (n° 1608). . . Im. KIEFF.



*Quercus Suber*

*Synophrus Olivieri* (n° 1601)  
 Fig. 496 (a). — Im. KIEFF.  
 Fig. 497 (b). — Im. KIEFF.

— Chaton renflé, composé d'agglomérations d'excroissances velues simulant de petits choux-fleurs.

**Ériophyide** 1594

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 470.

*si.*

**Ac.ti.** — Renflement terminal de la grosseur d'une noisette, à l'in-

térieur duquel se trouvent des coques ovoïdes. Voir n°1819.

[*Andricus multiplicatus* GIRAUD] 1593

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 88, note 2 ; 1901<sup>b</sup>, p. 408-409. si.

— Renflement terminal ovoïde, dur, ligneux, de la grosseur d'une noisette, pouvant porter quelques feuilles. Voir n°1820.

[*Andricus cydoniæ* GIRAUD] 1596

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 88, note 2 ; 1901<sup>b</sup>, p. 409 ; Stefani, 1906, p. 182. si.

— Cécidie terminale, sphérique ou ovoïde, de 7 mm. de diamètre (fig. 492-493). A l'état jeune, elle est verte, présente des poils étoilés et est portée sur un pédicule entouré par les écailles du bourgeon. A maturité, son périoderme devient gris et rugueux et peut se desquamer par plaques polyédriques ; les écailles du bourgeon tombent et le pédicule s'épaissit jusqu'à acquérir le même diamètre que la cécidie, qui paraît alors sessile ; sur ce pédicule, des bourgeons normaux peuvent plus tard apparaître.

**Cynipide** 1597

Hieronymus, 1890, p. 232-233, n° 683 ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 88, n° 79, pl. XXIV 7, ⊕. F, si.

- |         |   |                                                             |    |
|---------|---|-------------------------------------------------------------|----|
| Ac. bg. | { | Cécidie formée par un amas de feuilles ou de bourgeons..... | A. |
|         |   | Cécidie arrondie, multiloculaire.....                       | B. |
|         |   | Cécidie arrondie, uniloculaire.....                         | C. |
|         |   | Cécidie ovoïde ou fusiforme.....                            | D. |

A. — Cécidie en artichaut semblable à celle de l'*Andricus fecundator*. Voir n° 1518. **Contarinia cocciferæ** TAVARES 1598

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 88, pl. XXI, 20, ⊕ ; 1901<sup>b</sup>, p. 461 ; Tavares, 1905, p. 55. F, P.

— Bourgeons hypertrophiés réunis en grand nombre et formant par leur ensemble une grosse cécidie irrégulière verdâtre ou rougeâtre, semblable à un chou-fleur.

**Eriophyes suberinus** NAL. 1599

Nalepa, 1899, p. 218 ; Stefani, 1901<sup>b</sup>, p. 235, n° 32, pl. II, 5, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 55, pl. XII, 18, ⊕. P, si.

B. — Cécidie juteuse, blanche ou rosée, pouvant atteindre la grosseur d'une noix. Voir n° 1262. **Biorrhiza pallida** OLIV. 1600

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 88-89 ; 1901<sup>b</sup>, p. 414. E.

— Cécidie irrégulièrement arrondie, ligneuse et très dure, de 15-30 mm. de diamètre (fig. 496) et de la couleur de l'écorce du rameau : la surface est glabre et couverte de petites aspé-



- rités; enfin, les cavités larvaires disséminées sans ordre mesurent 2,5 mm. de diamètre (fig.497).
- Synophrus Olivieri** KIEFF. 1601
- Kieffer, 1899<sup>b</sup>, p.375-377, pl.XXV, 3, ⊕; 1901<sup>b</sup>, p.433. AL.
- C. — Cécidie sphérique, de 10 mm. de diamètre (fig.498), de la couleur de l'écorce, à parois ligneuses, très dures (fig.499).  
Cynipide mars-juillet II. **Synophrus politus** HARTIG 1602
- P.Marchal, 1897<sup>b</sup>, p.16-17, n° 1; Stefani, 1897, p.97; Tavares, 1905, p.55, pl.XI, 1, ⊕. I, P, AF-N.
- Cécidie brun clair, lisse ou présentant des nodosités disposées sans ordre, sphérique, de 12-20 mm. de diamètre, à parois très épaisses. **Cynips Kollari** HARTIG 1603
- Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p.89; 1901<sup>b</sup>, p.421-422. E-S.
- Cécidie d'un brun-marron brillant, de 15-30 mm. de diamètre, présentant dans sa partie supérieure une couronne de nodosités. Cynipide février-mars II. **Cynips quercus-tozæ** BOSC 1604
- Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p.89; 1901<sup>b</sup>, p.424. E-S.
- D. — Cécidie uniloculaire, fusiforme, ligneuse, de 10-15 mm. de long, brune et couverte de poils bruns ou, plus rarement, glabre. **Andricus solitarius** FONSC. 1605
- Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p.89, note 2; 1901<sup>b</sup>, p.415-416. si.
- Le bourgeon entr'ouvert laisse apercevoir 5 à 10 cécidies, de 1,5 mm. de haut sur 1,2 mm. de large, de forme conique, à sommet légèrement recourbé sur le côté; leur surface est glabre et leur paroi très mince; trou de sortie près du sommet sur le côté concave. Cynipide mars-avril. **Andricus luteicornis** KIEFF. 1606
- Andricus luteicornis** KIEFF. var. *nigra* TAVARES 1607
- Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p.89-90, n° 81; 1899<sup>b</sup>, p.419-420, pl. XXIV, 9, ⊕; Tavares, 1902, p.104-105; 1905, p.56, pl. II, 17, pl. III, 17, ⊕. P, si.
- A la place d'un bourgeon, dont il ne reste que quelques écailles, cécidie ovoïde, de teinte verdâtre, haute de 2 mm., et présentant latéralement deux côtes qui se rejoignent au mucron du sommet (fig.494-495). Cynipide printemps II. **Andricus Mayeti** KIEFF. 1608
- Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p.89, n° 80, pl. XXI, 22, ⊕; 1899<sup>b</sup>, p.397-398. F.

Pl.ti. — Renflement peu visible. Voir n°1294.

[**Andricus trilineatus** HARTIG.] 1609

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.405; Stefani, 1906, p.181.

si.

— Bossette sur l'écorce du tronc; loge larvaire enfoncée dans les tissus. Voir n°1533.

\* **Fioriella Marianii** KIEFF. 1610

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.403, note 1; 1902, p.1-2.

I.

\* Dans une publication plus récente (1905, p.548), Kieffer rapporte cette cécidie au *Quercus Ilex*; il y a peut-être lieu de la supprimer ici.

— Renflement uniloculaire, unilatéral, de la grosseur d'un pois.

**Cynipide** 1611

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.405.

F.

— Renflement unilatéral à l'extrémité d'un rameau; cavité larvaire ample.

**Lépidoptère** 1612

Trotter, 1901<sup>d</sup>, p.375, n°44.

I.

— Petite cécidie ligneuse, en forme de vésicule allongée.

**Lépidoptère** 1613

Stefani, 1906, p.182.

si.

— Jeune rameau épaissi et courbé près de l'extrémité, présentant dans la concavité un renflement long de 6-7 mm. et une galle interne ovoïdale (3 mm. sur 1,5), ligneuse. Insecte mai-juin I.

**Andricus fidelensis** TAVARES 1614

Tavares, 1902, p.106-107, n°254; 1905, p.54, pl.III, 13, ⊕.

P.

— Sur un rameau qu'elle embrasse par sa partie basilaire, cécidie uniloculaire de forme irrégulièrement arrondie, développée dans la couche ligneuse et faisant éclater l'écorce. Voir n°1843.

**Aphelonyx cerricola** GIRAUD 1615

Stefani, 1898<sup>c</sup>, p.(29), n°58; 1906, p.181; Cecconi, 1906, p.43, n°66.

I.

— Renflement fusiforme, allongé, à surface lisse, contenant de nombreuses cellules ovoïdes alignées dans la couche médullaire.

[**Dryocosmus Fonscolombe** KIEFF.] 1616

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.405.

F.

Pl. fe. { Cécidie déformant la nervure médiane ou le pétiole... A.  
 { Cécidie visible sur l'une des faces du limbe seulement... B.  
 { Cécidie visible sur les deux faces du limbe } ne faisant saillie que sur l'une des faces... C.  
 { } faisant également saillie sur les 2 faces... D.  
 { } faisant inégalement saillie sur les 2 faces... E.

A. — Renflement fusiforme ou arrondi, à surface plus ou moins bosselée.

[**Andricus trilineatus** HARTIG] 1617

[*Andricus testaceipes* HARTIG] 1618Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 440, 441; 1901<sup>b</sup>, p. 432; TAVARES, 1905, p. 51-52.

F.E.P.

— Cécidie ovoïde, enfoncée dans une fente de la nervure médiane ou du pétiole. Voir n° 1857.

[*Neuroterus saltans* GIRAUD] 1619P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 17, n° 3; TAVARES, 1905, p. 52, 53, pl. III, 7, ⊕.

I.P., AL.

— Cécidie ovoïde, insérée sur la nervure et munie de 2 expansions lamelleuses. Voir n° 1326.

[*Andricus ostreus* GIRAUD] 1620Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 91, n° 87; 1901<sup>b</sup>, p. 91, n° 87.

E-S.

— Renflement de la nervure médiane. . . . . *Arnoldia* 1621

Trotter, 1901<sup>d</sup>, p. 375, n° 43.

I.

— Renflement de la base du pétiole. . . . . *Lépidoptère* 1621A

Cecconi, 1904, p. 87.

I.

— Cécidie en forme de petit tube conique. Voir n° 1535.

[*Contarinia luteola* TAVARES] 1622Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 460.

I.

B. — Cécidie lenticulaire, de 4-5 mm. de diamètre, couverte de poils soyeux, nombreux et longs; le centre de la galle présente une petite dépression.

*Neuroterus lanuginosus* GIRAUD 1623Stefani, 1898<sup>c</sup>, p. (16), n° 14; Cecconi, 1901, p. 141, n° 21; 1906, p. 43, n° 67.

I, s, si.

— Cécidie lenticulaire, présentant une dépression centrale bien marquée et des bords arrondis en bourrelet, semblable par suite à celle de *Neurot. numismatis* (voir n° 1340), mais n'ayant que 1,5 mm. de diamètre; en outre, la pilosité est blanchâtre au lieu d'être brunâtre et la chambre larvaire est plus grande.

[*Neuroterus numismatis* OLIV.] 1624

Hieronymus, 1890, p. 234, n° 685.

si.

— Cécidie globuleuse allongée (2-2,5 mm. sur 1-1,5), uniloculaire, de couleur rose mate, fixée latéralement sur une nervure secondaire à la face inférieure du limbe; sa surface est couverte de très fins tubercules cylindriques. Cette cécidie présente quelque analogie avec celle décrite au n° 1866.

*Neuroterus* 1625Trotter, 1903<sup>b</sup>, p. 17, n° 47.

I.

— Cécidie subsphérique, munie de deux cavités. Voir n°1329.

**Dryophanta disticha** HARTIG 1626

Kieffer, 1901, p. 640.

— Érinéum formé de deux sortes de poils, les uns grêles, longs et contournés, les autres beaucoup plus gros, cylindriques ou fortement renflés en massue à l'extrémité ; aucune élevure ne se remarque à la surface du limbe. [*Erineum ilicinum* DC.].

[**Eriophyes ilicis** CAN.] 1627

Rübsaamen, 1900<sup>b</sup>, p. 231, fig. 19. ⊕ ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 471.

*E-S, P-B.*

— Limbe en forme de cuiller, arqué vers la face inférieure. Puceron jaune.

**Callipterus quercus** KALT. 1628

Tavares, 1900, p. 83, n° 149, pl. I, 8. ⊕ ; 1905, p. 53, pl. VII, 12. ⊕ ; Cecconi, 1903, p. 27, n° 10.

*P, S.*

C. — Cécidie ovoïdale (3-3,5 mm. sur 2-2,5), dure, pubescente, avec fente étroite en forme de boutonnière. Voir n°1560.

**Dryomyia Lichtensteini** F. LÖW 1629

Kieffer, 1898<sup>c</sup>, p. 17 ; 1901<sup>b</sup>, p. 468.

*E-S.*

— Cécidie semblable à la précédente, mais glabre et comprimée latéralement. Voir n°1997.

**Dryomyia cocciferæ** MARCHAL 1630

Trotter, 1901, p. 160, n° 76 ; Tavares, 1905, p. 51, pl. III, 8. ⊕.

*P.*

— A la face supérieure, saillie hémisphérique de 2-4 mm. de diamètre (fig. 500-501) ; la dépression correspondante sur l'autre face contient des poils longs, cylindriques, assez épais, à parois minces (fig. 502). *Erineum suberinum* FÉE. **Eriophyide**

1631

Hieronymus, 1890, p. 85, n° 192 ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XI, n° 273. ⊕ ; Tavares, 1905, p. 52-53.

*I, P.*

D. — Petite cécidie circulaire, de 2-2,5 mm. de diamètre, faisant très légèrement saillie sur les deux faces du limbe, avec un petit mucron sur le dessus. Voir n°1558.

**Andricus coriaceus** MAYR 1632

Cecconi, 1902, p. 145, n° 119 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 439.

*I.*

— Pustule à contour ovale, longue de 1,5 mm. et large de 1 mm., brune sur le dessous, vert pâle sur le dessus.

**Andricus pseudococcus** KIEFF. 1633

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 90, n° 83 *bis*, note 2 ; 1901<sup>b</sup>, p. 439 ; 1902, p. 2-3 ; 1905, p. 554. — Consulter aussi Trotter, 1903, p. 46, note 1.

*si.*

— Pustule circulaire, avec opercule se détachant à la maturité.  
Voir n°1886.

[*Arnoldia Szepligetii* KIEFF.] 1634

Cecconi, 1901<sup>e</sup>, p. 736, n°40 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 464-465.

L.

— Pustule circulaire, de 3.5 mm. de diamètre, non décolorée,  
avec de petites verrues au milieu des deux faces.

Cécidomyide 1635

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 465.


st.

— Cécidie ovoïdale, uniloculaire, fixée au bord du limbe, qui  
peut être profondément incisé. Voir n°1871.

*Andricus Schroëckingeri* WAGHTL 1636

Troller, 1903<sup>b</sup>, p. 17-18, n°48.

L.



*Quercus Suber*

*Synophrus politus* (n°1602)

Fig. 498 (a). — D'ap. nat.

Fig. 499 (b). — D'ap. nat.

*Quercus Suber*

*Ériophyde* (n°1631)

Fig. 500 (a). — D'ap. nat.

Fig. 501 (b). — D'ap. nat.

Fig. 502 (c). — D'ap. nat.

*Quercus Suber*

*Arnoldia cerris* (n°1644)

Fig. 503 (a). — D'ap. nat.

Fig. 504 (b,c). — D'ap. nat.

— Cécidie uniloculaire, ovoïdale (2 mm. sur 1 mm.), à grand  
axe parallèle au plan du limbe, glabre, à paroi mince, brune  
sur le dessus et jaune sur le dessous, située près du bord.

Cynipide 1637

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 437-438 ; Cecconi, 1903, p. 27, n°11.

s.

— Petite cécidie de 2 mm. de long, affectant la forme d'un

baril ou d'un cylindre arrondi aux deux extrémités, encastrée dans l'épaisseur du limbe et en relation avec une nervure secondaire ; la face supérieure est couleur vert-de-gris et glabre, l'autre est velue.

**Andricus** 1638

Stefani, 1906<sup>b</sup>, p. 130.

si.

— Cécidie subsphérique, uniloculaire, de la grosseur d'un pois, juteuse, souvent teintée de rouge vif, un peu velue. Voir n° 1989.

**Dryocosmus australis** MAYR 1639

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 90, n° 82 ; 1901<sup>b</sup>, p. 436.

E-S.

— Cécidie multiloculaire, charnue, verte ou d'un rouge pâle, pouvant occuper tout le limbe dont il ne subsiste que les dents. Voir n° 1551.

**Plagiotrochus ilicis** FABR. 1640

**Plagiotrochus ilicis** FABR. VAR. **Lichtensteini** KIEFF. 1641

Kieffer, 1901, p. 604, 607, pl. XXI, 15, ⊕ ; 1901<sup>b</sup>, p. 438-439.

E-S.

E. — Cécidie sphérique, de 3-4 mm. de diamètre, uniloculaire, juteuse, couverte de longs poils dressés, à peine saillante à la face supérieure où elle apparaît sous forme d'un disque à peine convexe, et formant à la face inférieure une baie charnue.

**[Neuroterus tricolor** HARTIG] 1642

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 90, n° 83 ; 1901, p. 644, pl. XXI, 21, ⊕ ; 1901<sup>b</sup>, p. 437.

F.E.

— Cécidie à peine saillante à la face supérieure, où elle s'ouvre à maturité par la déhiscence d'un opercule circulaire, apparaissant à la face opposée comme une saillie discoïde, couverte de poils nombreux, de 5 mm. de diamètre sur 2 mm. de hauteur. M.C.

**Dryomyia circinnans** GIRAUD 1643

Stefani, 1898<sup>c</sup>, p. (31), n° 64 ; 1906, p. 181 ; Cecconi, 1902, p. 142, n° 52 ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVIII, n° 434, ⊕.

I.

— Cécidie semblable à celle du *Quercus Cerris*, mais la saillie de la face supérieure, au lieu d'être subconique, est plutôt hémisphérique (fig. 503-504).

**Arnoldia cerris** KOLLAR 1644

Stefani, 1901, p. 448, n° 21 ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XI, n° 272, ⊕ ; Cecconi, 1906, p. 41, n° 42.

I.

— Cécidie brillante, couverte de poils. Voir n° 1878.

**Andricus Adleri** MAYR 1645

Seurat, 1900, p. 6, 1° ; Stefani, 1901, p. 454, n° 40 ; 1906, p. 181.

si, TU, [P.]

— Petites cécidies charnues, éparses à la face supérieure du

limbe, coniques, d'un diamètre de 1-1,5 mm., de teinte brun rougeâtre ; une touffe de poils roux signale les galles à la face inférieure. **Cécidomyide** 1646

Cecconi, 1902<sup>c</sup>, p. 622-623 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 472. *I.*

— Cécidie ne différant des précédentes que par le dessous glabre et par une petite verrue située au centre d'un enfoncement hypophylle. **Cécidomyide** 1647

Cecconi, 1902<sup>c</sup>, p. 623 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 472. *I.*

**Quercus Suber** L. var. **occidentalis** LAG. (**Q. occidentalis** GAY)

**Ac. bg.** — Cécidie arrondie munie d'une couronne de nodosités. Voir n°1604. **Cynips quercus-tozæ** Bosc 1648

Pérez, 1894, p. 262. *E.*

**Pl. fe.** — *Erineum suberinum* FÉE. Voir n°1631. **Ériophyide** 1649

Cecconi, 1901<sup>f</sup>, p. 1037, n°17. *I.*

**Quercus alnifolia** POECH

**Pl. fe.** — Érinéum à la face inférieure du limbe, sans élevure correspondante. **Ériophyide** 1650

Rübsaamen, 1902, p. 15, n° 5 ; 1902<sup>c</sup>, p. 301, 303, 305, 307, fig. FF, Θ. *ch.*

**Quercus lusitanea** LAMK.

(y compris les variétés *faginea*, *Broteri*, *alpestris*)

**Ac. fr.** — Cécidie de 30-40 mm. de diamètre formée de nombreux appendices ramifiés. Voir n°1169. **Cynips caput-medusæ** HARTIG 1651


Trotter, 1903, p. 54, n°147. *A-M.*

— Grosse cécidie tronconique (20 mm. de hauteur, 20-25 mm. de largeur à la base, 11-13 mm. de diamètre à la partie supérieure), munie de deux couronnes basilaires d'appendices de 15 mm. environ de long et d'une couronne d'appendices plus courts et plus irréguliers autour de l'orifice supérieur (fig. 505-506). Cet orifice communique avec un espace conique qui sur-

monte la galle interne. Surface de la cécidie d'abord couleur violacée, puis brunâtre, couverte d'une substance gluante qui disparaît à la maturité. Cynipide janvier-février II.

**Cynips Panteli** TAVARES 1652

TAVARES, 1900, p. 42-44, n° 60 ; 1905, p. 84-85, pl. VI, 5, ⊕ ; Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 530-532, pl. XXVII, P. 1. ⊕.



*Quercus lusitanica*  
*Cynips Panteli* (n° 1652)  
Fig. 505 (a). — Im. KIEFF.  
Fig. 506 (b). — Im. KIEFF.



*Quercus lusitanica*  
*Cynips Fortii* (n° 1653)  
Fig. 507 (a). — Im. TROTTER  
Fig. 508 (b). — Im. TROTTER

— Cécidie du fruit, ligneuse, uniloculaire, subcylindrique, haute de 4-7 mm., large de 5-9 mm., légèrement atténuée et arrondie à l'insertion (fig. 507-508), plus ou moins aplatie et munie d'un court ombilic central à la partie supérieure. La surface externe porte une petite collerette au milieu de la hauteur ou au voisinage de la région terminale et est revêtue d'une pubescence roussâtre, courte, mais serrée. Quelques exemplaires rappellent la cécidie du *Cynips tomentosa* décrite plus loin (n° 1673).

**Cynips Fortii** TROTTER 1633

Trotter, 1903, p. 212, n° 166 ; 1907, p. 12-23, fig. 1-5, ⊕.

A-M.

— Grosse cécidie laineuse, sphérique, de 20-30 mm. de diamètre, contenant au centre une galle sphéroïdale ligneuse développée aux dépens de la cupule du gland. Voir n° 1184.

**Andricus Theophrasteus** TROTTER 1634

Trotter, 1902<sup>b</sup>, p. 254-257 ; 1903, p. 205-208, n° 159 ; Kieffer, 1905, p. 575-577, pl. XX, 6, ⊕.

A-M.



— Petite cécidie arrondie, de 5-6 mm. de diamètre, située au bord de la cupule. Voir n° 1183. **Andricus superfetationis** PASZL. 1655

Trotter, 1901, p. 157, n° 60; TAVARES, 1905, p. 84, pl. IV, 9, ⊕. P.

— Cécidie ovoïdale très petite (3 mm. sur 2,5), un peu aiguë au sommet, luisante, glabre, de teinte jaune paille, cachée entre les écailles de la cupule; gland atrophié. Cynipide août-septembre I. **Andricus Nobrei** TAVARES 1656

TAVARES, 1906, p. 84. P.

**Ac. fl.** — Cécidie subarrondie, de la grosseur d'une cerise, couverte de poils blancs, renfermant plusieurs coques ovoïdes, ligneuses, de 2 mm. de longueur, et formée aux dépens d'un chaton qui ne se développe pas.

**Andricus ramuli** L. var. **trifasciata** KIEFF. 1657

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 95, n° 102; 1899<sup>b</sup>, p. 408; TAVARES, 1905, p. 82-83, pl. IV, 10, ⊕. E, P.

**Ac. ti.** — Renflement conique (12 mm. sur 7 mm.) situé à l'extrémité des rameaux; galle interne libre supérieurement. Cynipide fin avril-mai I. Voir n° 1205. **Andricus inflator** HARTIG 1658

TAVARES, 1905, p. 63-64. P.

— Renflement semblable, mais de taille moindre (5-6 mm. sur 4-5 mm.); galle interne enveloppée par du tissu spongieux. Cynipide mai-juin I. **Andricus pseudo-inflator** TAVARES 1659

TAVARES, 1900, p. 35-36, n° 49, pl. II, 12; 1905, p. 64, pl. II, 18, pl. XI, 3, 17, ⊕. P.

**Ac. bg.** { Cécidie en forme de bourgeon plus ou moins grossi. . . . . A.  
 { Cécidie fusiforme ou ovoïdale (ne dépassant pas alors 5 mm. de long). B.  
 { Cécidie arrondie ou subconique à surface lisse ou garnie de nodosités disposées sans ordre. . . . . C.  
 { Cécidie arrondie, à surface garnie de nodosités ou de mamelons disposés régulièrement. . . . . D.  
 { Cécidie munie de longs prolongements disposés sans ordre. . . . . E.  
 { Cécidie munie de longs prolongements disposés en couronne. . . . . F.

A. — Cécidie constituée aux dépens d'un bourgeon d'aspect normal mesurant 4,5 mm. de long sur 2 mm. de large; loge larvaire située dans la partie basilaire du bourgeon, à parois se confondant insensiblement avec les tissus environnants; trou de sortie sur le côté. **Cynipide** 1660

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 416. P.

- Cécidie ovoïdale, de 2 mm. de longueur, enfoncée dans un bourgeon qui extérieurement ne diffère pas d'un bourgeon normal; trou d'éclosion sur le côté. Voir n° 1210. **Cynipide** 1661  
 Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 416-417.
- Bourgeon très grossi, un peu entr'ouvert: larves vitellines grégaires. M.T. **Contarinia quercicola** RÜBS. 1662  
 Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 461. P.
- Cécidie ovoïde à écailles hypertrophiées soudées. Voir n° 1215. **Neuroterus aprilius** GIRAUD 1663  
 Trotter, 1903, p. 214, n° 173; TAVARES, 1902, p. 114, n° 264; 1905, p. 69. P, T, A, M.
- Cécidie ayant l'apparence d'un artichaut; écailles très agrandies; petite galle interne ligneuse. **Andricus fecundator** HARTIG 1664  
 TAVARES, 1900, p. 32, n° 41; 1905, p. 69. P.
- B. — Cécidie fusiforme verte, puis brune. Voir n° 1255. **Andricus solitarius** FONSC. 1665  
 Trotter, 1901, p. 156-157, n° 59; TAVARES, 1905, p. 70-71, pl. V, 15, ⊕. E, P.
- Cécidie fusiforme sessile ou brièvement pédonculée, tombant à maturité. Voir n° 1283. [**Andricus Malpighii** ADLER] 1666  
 Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 96, n° 103 bis; 1901<sup>b</sup>, p. 416. E.
- Cécidie ovoïde, de 3-4,5 mm. de diamètre, verte, mucronée, à surface réticulée quand elle est sèche. Voir n° 1277. **Andricus globuli** HARTIG 1667  
 TAVARES, 1900, p. 32, n° 40; 1905, p. 70. P.
- Cécidie de même forme et de même taille, mais à surface cannelée longitudinalement quand elle est sèche (fig. 516). **Cynipide** octobre I. **Andricus Bocagei** TAVARES 1668  
 TAVARES, 1902, p. 107-108, n° 255; 1905, p. 70, pl. II, 22, pl. XI, 9-10, ⊕; Kieffer, 1905, p. 569-570, pl. X, 8, ⊕. P.
- Cécidie ovoïde, longue de 4-5 mm., large de 2,5, pubescente, non enfoncée dans le bourgeon (fig. 517-518). **Cynipide** 1669  
 Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 96, n° 104, pl. XXI, 18, ⊕; 1901<sup>b</sup>, p. 421. E.
- Cécidie ligneuse arrondie, ne dépassant pas la taille d'un grain de chènevis, de la couleur de l'écorce, sortant de la base

- d'un très petit bourgeon qu'elle dépasse 3 fois environ en grosseur. **Cynipide** 1670  
 Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 96, n° 103 ; 1901<sup>b</sup>, p. 420. *E.*
- Cécidie ellipsoïdale, mesurant 2,3 mm. sur 1,8 mm., à parois minces, enfoncée dans le bourgeon. **Cynipide** 1671  
 Tavares, 1905, p. 70. — Cécidie sans doute identique à celle décrite plus haut au n° 1660. *P.*
- C. — Cécidie multiloculaire, charnue, à surface lisse, pouvant atteindre la taille d'une petite pomme. Voir n° 1262. **Biorrhiza pallida** OLIV. 1672  
 Trotter, 1903, p. 53, n° 142 ; Tavares, 1905, p. 67. *E, P, A-M.*
- Cécidie uniloculaire ayant la forme d'un cône allongé, de 12-18 mm. de hauteur, avec 15-18 mm. de diamètre à la base qui embrasse complètement le rameau et les pétioles de plusieurs feuilles ; surface couverte d'une pubescence fauve, courte, très dense. Voir n° 1271. **Cynips tomentosa** TROTTER 1673  
 Kieffer, 1905, p. 574-575, pl. IX, 6, ⊕. *P-B, A-M.*
- Cécidie uniloculaire, sphérique, de 12-30 mm. de diamètre. Voir n° 1248. **Cynips Kollari** HARTIG 1674  
 Trotter, 1899<sup>b</sup>, p. 201, n° 14 ; 1903, p. 203, n° 155 ; 1904<sup>b</sup>, p. 15 ; Tavares, 1905, p. 67-68. *P, MA, 1-M.*
- Cécidie sphérique, de 10 mm. de diamètre environ, lisse ou avec des nodosités disposées sans ordre, à parois très épaisses, dont l'épaisseur dépasse sensiblement le rayon de la cavité larvaire ; galle interne soudée de toutes parts avec le tissu environnant. **Cynips Kollari** HARTIG var. **minor** KIEFF. 1675  
 Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 96, n° 106, pl. XXI, 9-10, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 68. *E.P.*
- Cécidie arrondie, de la grosseur d'un pois, irrégulièrement bosselée, de la couleur de l'écorce, à parois épaisses, mais dont l'épaisseur est plus petite que le rayon de la cavité larvaire ; pas de galle interne. **Cynipide** 1676  
 Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 96, n° 105 ; 1901<sup>b</sup>, p. 422. *E.*
- Cécidie ligneuse, dure, compacte, uniloculaire, globuleuse (fig. 519), d'un diamètre de 15-20 mm., de couleur brun jaunâtre à maturité, à surface glabre parsemée de petites nodosités obtuses qui sont réunies entre elles par de petites crêtes ;

galle interne ligneuse, de 8-12 mm. de diamètre. Cynipide septembre I. *Galle d'Alep, Galle de Smyrne, Galle du Levant, Galle turque, Noix de galle proprement dite.*

**Cynips tinctoria OLIV. 1677**

Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VIII, n° 177. ⊕.


A.-M.

— Cécidie ligneuse, compacte, uniloculaire, glabre, jaune roussâtre, subpiriforme, haute de 10-12 mm., à surface totalement chagrinée et garnie de nodosités éparses.

**Cynips tinctoria OLIV. var. nostra STEFANI 1678**

Trotter, 1903, p. 208-209, n° 161.

A.-M.




*Quercus lusitanica*

*Cynips mediterranea* (n° 1680)

Fig. 509 (a). — Im. TROTTER

Fig. 510 (b). — Schématique.



*Quercus lusitanica*

*Cynipides* (n° 1689, 1690, 1682)

Fig. 511, 512 (a, b). — Im. KIEFF.

Fig. 513, 514 (c, d). — Im. KIEFF.

Fig. 515 (e). — Im. KIEFF.

D. — Cécidie arrondie, de 8-12 mm. de diamètre, à surface découpée en facettes polygonales au centre de chacune desquelles se voit une petite nodosité. Voir n° 1243.

**Cynips truncicola GIRAUD 1679**

Trotter, 1903, p. 211, n° 164.

A.-M.

— Cécidie solitaire, arrondie, de 20-30 mm. de diamètre, subligneuse, d'une consistance un peu spongieuse (fig. 509). Sa surface est couverte de gros mamelons pyramidaux, plus larges que hauts, se touchant par leur base et parcourus par des

sillons longitudinaux profonds. Quand la galle est jeune, ces mamelons pyramidaux ont leur sommet d'un beau bleu tandis que leur base est rouge vif et leur région médiane jaune pâle; à la maturité ces belles couleurs disparaissent et font place à une teinte jaunâtre puis brune. Cavité larvaire unique, située dans la région basilaire de la cécidie (fig. 510). Cynipide mars-avril II.

**Cynips mediterranea** TROTTER 1680

Trotter, 1903, p. 204-205, n° 157, pl. II, 16 ⊕; Kieffer, 1905, p. 573-574, pl. IX, 5, ⊕.

A.-M.

— Cécidie subarrondie, de 20-30 mm. de haut, portant des nodosités disposées en couronne. Voir n° 1241.

**Cynips quercus-tozæ** Bosc 1681

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 97-98; Trotter, 1899<sup>b</sup>, p. 201, n° 15; Tavares, 1905, p. 67, pl. XI, 6, ⊕.

E.P.

— Cécidie subconique, de la grosseur d'une prune, ligneuse, embrassant le rameau par sa région inférieure et se terminant par un disque plan, gluant, bordé d'une couronne de grosses nodosités (fig. 515; forme anormale de la galle précédente ??).

**Cynipide** 1682

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 98, n° 110, pl. XXII, 6, ⊕; 1901<sup>b</sup>, p. 424.

E.

— Cécidie semblable à la précédente, mais le disque est convexe et non gluant.

**Cynipide** 1683

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 98, n° 111.

E.

E. — Petite cécidie arrondie, de 4 mm. de diamètre, à surface parsemée de petits prolongements. Voir n° 1245.

**Andricus Kirchsbergi** WACHTL 1684

Tavares, 1900, p. 32, n° 42; 1905, p. 65-66, pl. IV, 1, ⊕.

P.

— Cécidie pluriloculaire, arrondie, couverte de nombreux prolongements dressés, subcylindriques, gluants, longs de 4-8 mm. Voir n° 1226.

**Andricus lucidus** HARTIG 1685

Trotter, 1903, p. 50-51, n° 135.

A.-M.

— Cécidie subarrondie, pluriloculaire, de 10 mm. de diamètre, dont la base embrasse le rameau et de la surface de laquelle se détachent des prolongements longs de 5-7 mm., larges de 2-4 mm., comprimés, striés, faiblement courbés, à sommet obtus teint de rouge et gluant. Cynipide hiver I ou printemps II.

**Andricus Panteli** KIEFF. 1686

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 97, n° 107, pl. XXI, 13, ⊕; Trotter, 1903, p. 51, n° 137 : 1904<sup>b</sup>, p. 15; Tavares, 1905, p. 68. E.P.  
M.A.A.M.

— Cécidie arrondie, de 8-10 mm. de diamètre, n'embrassant pas le rameau ; de sa surface partent isolément des prolongements coniques, longs de 3-5 mm., recourbés irrégulièrement, terminés en une pointe non gluante. Cynipide décembre I ou janvier-février II. **Cynips coriaria** HALIM. var. **lusitanica** KIEFF. 1687

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 97, n° 108, pl. XXII, 8, ⊕; Tavares, 1905, p. 68. E.P.

— Cécidie de 18 mm. de diamètre, n'embrassant pas le rameau ; de sa surface se détachent 3 ou 4 groupes de prolongements qui atteignent 6-8 mm. de long. **Cynipide** 1688

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 97, n° 109 ; 1901<sup>b</sup>, p. 427-428. E.

F. — Des appendices squamiformes, appliqués ou étalés, partent de la base de la cécidie qui présente au milieu de sa hauteur un rebord circulaire plus ou moins incisé (fig. 511-512); au-dessus se trouve une partie hémisphérique portant encore 4-5 appendices plus petits, disposés en couronne autour d'une ouverture circulaire apicale ; hauteur de la cécidie 12 mm. ; largeur 14 mm. **Cynipide** 1689

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 98, n° 112, pl. XXI, 17, ⊕; 1901<sup>b</sup>, p. 459-460. E.

— Des appendices formant une couronne basilaires se réfléchissent pour embrasser le rameau (fig. 513-514); en outre, 6-7 appendices pointus, légèrement recourbés en arrière, sont disposés en une nouvelle couronne à mi-hauteur de la cécidie qui se termine par une sorte de cône tronqué. **Cynipide** 1690

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 98-99, n° 113, pl. XXI, 12, ⊕. E.

Pl.ra. — Cécidie profondément enfouie dans le sol. Voir n° 1289. **Biorrhiza aptera** BOSC 1691

Tavares, 1905, p. 60. P.

— Grosse cécidie pluriloculaire située au niveau du sol, sur les racines ou la base de la tige. Voir n° 1290.

**Andricus radiceis** FABR. 1692

Tavares, 1900, p. 34, n° 47 ; 1905, p. 60-61. P.

Pl.ti. { Cécidie située sur le tronc..... A.  
 { Cécidie située sur les rameaux..... B.

A. — Sur la partie souterraine d'une jeune tige, renflement

fusiforme, multiloculaire, pouvant atteindre 25 mm. de long sur 10 mm. de diamètre.

**Cynipide** 1693

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 95, n° 99 ; 1901<sup>b</sup>, p. 403.

*E.*

— Cécidie en forme de cône allongé, non strié longitudinalement. Voir n° 1291.

**Andricus corticis** HARTIG 1694

Tavares, 1902, p. 103, n° 250 ; 1905, p. 61-62.


*P.*

— Cécidie semblable à la précédente dont elle ne diffère que par une sorte de cylindre cannelé intérieurement qui surmonte la cavité larvaire (fig. 520-522). Cynipide printemps II.

**Andricus Krajnovici** TAVARES 1695

Tavares, 1900, p. 36-37, n° 50, pl. I, 4, ⊕ ; 1905, p. 62, pl. I, 7, pl. IV, 15, ⊕ ; Kieffer, 1905, p. 570-571, pl. IX, 2, ⊕.

*P.*



*Quercus lusitanica*

- |                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fig. 516 (a) : <i>Andricus Bocagei</i> (n°1668) . . . . .            | Im. TAVARES           |
| Fig. 517, 518 (b, c) : <i>Cynipide</i> (n°1669) . . . . .            | Im. KIEFF.            |
| Fig. 519 (d) : <i>Cynips tinctoria</i> (n°1677) . . . . .            | D'ap. nat.            |
| Fig. 520-522 (e-g) : <i>Andricus Krajnovici</i> (n°1695) . . . . .   | Im. TAVARES et KIEFF. |
| Fig. 523 (h) : <i>Andricus trilineatus</i> (n°1698) . . . . .        | Im. KIEFF.            |
| Fig. 524, 525 (i, n) : <i>Trigonaspis Mendesi</i> (n°1708) . . . . . | Im. TAVARES           |

— Cécidie en forme de cône surbaissé, ligneux, strié dans sa partie inférieure seulement. Voir n° 1292.

**Andricus rhizomæ** HARTIG 1696

Tavares, 1900, p. 35, n° 48 ; 1905, p. 62, pl. IV, 4, ⊕.

*P.*

— Cécidie en forme de cône surbaissé, ligneux, présentant des stries qui partent du sommet. Voir n° 1293.

**Andricus Sieboldi** HARTIG 1697

Tavares, 1900, p. 34, n° 46 ; 1905, p. 62, pl. IV, 7, ⊕.

*P.*

B. — Renflement peu apparent (1-3 mm.) des rameaux (fig. 523).

**Andricus trilineatus** HARTIG 1698

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 95, n° 100, pl. XXI, 14, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 65. E, P.

— Cécidies arrondies situées dans l'axe du rameau et non visibles au dehors. Voir n° 1485.

**Andricus trilineatus** HARTIG var. **beirensis** TAVARES 1699

Tavares, 1902, p. 105-106, n° 253 ; 1905, p. 64-65. P.

— Cécidie ellipsoïdale, de 2 mm. de longueur sur 1,5 mm. de largeur. Voir n° 1298. **Andricus furunculus** BEIJERINGCK 1700

Tavares, 1902, p. 106, n° 253 bis ; 1905, p. 64. P.

— Cécidie ovoïde, de 2 mm. de longueur, glabre, lisse, verte, à parois minces, fixée sur l'écorce du rameau (parfois sur le pétiole des feuilles). Voir n° 1297. **Andricus gemmatus** ADLER 1701

Tavares, 1900, p. 30, n° 31 ; 1905, p. 65. P.

— Renflement du coussinet d'une feuille ; trou de sortie sur le côté. **Cynipide** 1702

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 95, n° 101 ; 1901<sup>b</sup>, p. 432. E.

|                                                                |   |                                                                     |    |                                |    |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|
| Pl. fe.                                                        | { | Cécidie formée aux dépens du pétiole ou de la face inférieure de la |    |                                |    |
|                                                                |   | nervure médiane .....                                               | A. |                                |    |
|                                                                |   | Cécidie ouverte déformant le limbe ou son bord.....                 | B. |                                |    |
|                                                                |   | Cécidie visible sur une face                                        | {  | cécidie lenticulaire.....      | C. |
|                                                                |   | seulement du limbe                                                  |    | cécidie arrondie.....          | D. |
|                                                                |   |                                                                     |    | cécidie en forme de corne..... | E. |
| Cécidie également saillante sur les deux faces du limbe.....   |   | F.                                                                  |    |                                |    |
| Cécidie inégalement saillante sur les deux faces du limbe..... |   | G.                                                                  |    |                                |    |

A. — Voir plus haut n° 1698. . . . [**Andricus trilineatus** HARTIG] 1703

[**Andricus testaceipes** HARTIG] 1704

Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 440, 441. E.

— Renflement de la base du pétiole. Voir n° 1316.

[**Heliozela stanneella** FISCH. v. R.] 1705

Tavares, 1900, p. 98, n° 209 ; 1905, p. 73. P.

— Cécidie ovoïde comprise entre deux expansions lamelleuses de la nervure médiane. Voir n° 1326. **Andricus ostreus** GIRAUD 1706

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 99 ; Trotter, 1903, p. 51, n° 136 ; Tavares, 1905, p. 77. E, P, A-M.

— Cécidie ovoïde sortant d'une déchirure de la nervure médiane. Voir n° 1857. [**Neuroterus saltans** GIRAUD] 1707

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 99 ; 1901<sup>b</sup>, p. 433. E.



- Cécidie de couleur rouge, glabre, ligneuse, en forme de navette (fig.524), de 4-5 mm. de long, rattachée à la nervure médiane (rarement à une nervure secondaire) par un pédicule cylindrique un peu strié, haut de 2-3 mm.; cavité larvaire ovale (fig.525). Cécidie apparaissant en juillet-août. Cynipide janvier-février II. **Trigonaspis Mendesi** TAVARES 1708  
Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p.99-100, n°115, pl.XXI, 11, ⊕; TAVARES, 1900, p.45-46, n°62, pl.I, 9, pl.II, 13, ⊕; 1905, p.76, pl.IV, 12, pl.XI, 11, ⊕; Zimmermann, 1906, p.71-77, 3 fig., pl.VII-VIII, ⊕. *E, P.*
- Cécidie en forme d'urne. Voir n°1341. **Andricus urnæformis** MAYR 1709  
Trotter, 1903, p.52-53, n°141. *A-M.*
- B. — Érinéum hypophylle, blanc rougeâtre, plus tard brun, situé dans une légère dépression du limbe. **Ériophyide** 1710  
Trotter, 1903, p.47-48, n°126. *A-M.*
- Bord du limbe rabattu vers la face inférieure. Voir n°1306. **Macrodiplosis dryobia** F.LÖW 1711  
Trotter, 1903, p.48, n°127. *A-M.*
- Enroulement étroit du bord par en haut. Voir n°1307. **Macrodiplosis volvens** KIEFF. 1712  
Trotter, 1903, p.48, n°128. *A-M.*
- Bord du limbe rabattu. . . . **Phylloxera coccinea** HEYDEN 1713  
Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.469. *E.*
- C. — Cécidie lenticulaire conique, de 4-5 mm. de diamètre. Voir n°1336. **Neuroterus lenticularis** OLIV. 1714  
Rolfe, 1881, p.56; Gatta, 1901, p.347; TAVARES, 1905, p.82. *E, P, I-B.*
- Cécidie de 4,5-5 mm. de diamètre, à surface supérieure conique, blanchâtre, munie de rangées concentriques de poils étoilés bruns; le dessous, glabre ou parsemé de poils étoilés bruns, est blanc avec un semis de petits points sombres. Cynipide février II. **Neuroterus lenticularis** OLIV. var. **histrion** KIEFF. 1715  
Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p.100-101, n°118; TAVARES, 1902, p.113, n°263; 1905, p.81. *E, P.*
- Cécidie semblable à la précédente, mais jaune rougeâtre, peu velue, et d'un diamètre de 6 mm. **Neuroterus** 1716  
TAVARES, 1905, p.82. *P.*

— Cécidie circulaire, de 5 mm. de diamètre, plane, avec une légère dépression et une petite verrue au centre de la face supérieure. Cynipide février II.

**Neuroterus læviusculus** SCHENCK var. **lusitanica** TAVARES 1717

Tavares, 1905, p. 80, pl. V, 7, ⊕.

P.

— Cécidie de 2 mm. de diamètre, à contour circulaire; la face supérieure plane, marquée d'une verrue centrale, est brune et parsemée de poils étoilés; la face inférieure, glabre, présente des stries rayonnantes et des stries concentriques formant réseau.

[**Neuroterus læviusculus** SCHENCK] 1718

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 101, n° 120, pl. XXII, 5, ⊕; 1901<sup>b</sup>, p. 442.

E.

— Cécidie de 1,5 mm. de diamètre, à contour irrégulier; la face supérieure plane est couverte de poils rouges dressés.

**Cynipide** 1719

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 101, n° 119, pl. XXI, 6, ⊕; 1901<sup>b</sup>, p. 442.

E.

— Cécidie lenticulaire de 2-3 mm. de diamètre. Voir n° 1338.

**Neuroterus fumipennis** HARTIG 1720

Rolle, 1881, p. 56; Trotter, 1903, p. 215, n° 175; 1904, p. 15; Tavares, 1905, p. 80.

I-B, P,  
M, A-M.

— Cécidie de 3 mm. de diamètre environ, ressemblant à un petit bouton soyeux. Voir n° 1340. **Neuroterus numismatis** OLIV.

1721

Rolle, 1883, p. 30; Tavares, 1900, p. 52, n° 77; 1905, p. 79.

I-B, P.

D. — Cécidie de 8-10 mm. de diamètre, parsemée de petites verrues noires, entourées chacune d'une tache brune. Voir n° 1323.

**Dryophanta pubescentis** MAYR 1722

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 100, n° 116, pl. XXI, 16, ⊕; Trotter, 1903, p. 213, n° 171; Tavares, 1905, p. 78.

E, P,  
A-M.

— Cécide en sphéroïde aplati (7 mm. sur 5). Voir n° 1328.

**Dryophanta divisa** HARTIG 1723

Rolle, 1881, p. 56; Kieffer, 1897, p. 101; 1901<sup>b</sup>, p. 447.

I-B.

— Cécidie charnue lisse de 5-7 mm. de diamètre. Voir n° 1321.

**Trigonaspis synaspis** HARTIG 1724

Trotter, 1903, p. 216, n° 181.

A-M.

— Cécidie atteignant au plus la grosseur d'un pois, légèrement plus large que haute, tronquée au sommet et présentant un

- ombilic apical; au-dessus de la chambre larvaire se trouve une seconde cavité. Voir n°1329. **Dryophanta disticha** HARTIG 1725  
Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 100, pl. XXI, 19, ⊕; 1901<sup>b</sup>, p. 446. E.
- Cécidie différant de la précédente par sa forme plus haute que large, par son sommet arrondi et l'existence d'une seule cavité. **Cynipide** 1726  
Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 100, n°117. E.
- E. — Cécidie en forme de corne, fixée par un court pédicule à une nervure de la face inférieure. Voir n°1342. **Dryophanta cornifex** HARTIG 1727  
Trotter, 1903, p. 212, n°167. A-M.
- F. — Feuilles crispées, portant une cécidie pisiforme également saillante sur les deux faces. Voir n°1351. **Andricus curvator** HARTIG 1728  
**Andricus curvator** HARTIG var. *lusitanica* KIEFF. 1729  
Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 99, n°114, note 3; Trotter, 1899<sup>b</sup>, p. 201, n°16; 1903, p. 49, n°130; Tavares, 1905, p. 74-75, pl. V, 5, ⊕. E, P, A-M.
- Cécidie pustuleuse, à contour elliptique. Voir n°1352. **Andricus sufflator** MAYR 1730  
Trotter, 1903, p. 52, n°139. A-M.
- Pustule circulaire décolorée, de 3 mm. de diamètre, avec une minime verrue au milieu de la face inférieure. Larve blanche. **Oligotrophus** 1731  
Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 466. E.
- Cécidie ellipsoïdale, de 2 mm. sur 1 mm., d'un blanc jaunâtre, d'abord velue puis glabre, fixée dans toute sa longueur au bord du limbe. **Neuroterus albipes** SCHENCK 1732  
Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 99, note 1; Tavares, 1905, p. 76-77. E, P.
- G. — Cécidie en grain de raisin mesurant environ 8 mm. de diamètre. Voir n°1355. **Neuroterus baccarum** L. 1733  
Rolfe, 1881, p. 56; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 99, note 2; Trotter, 1903, p. 214, n°174; Tavares, 1905, p. 75. I-B, E, P, A-M.
- Cécidie sphérique, de 3-5 mm. de diamètre, couverte de longs poils blancs. Voir n°1356. **Neuroterus tricolor** HARTIG 1734  
Tavares, 1900, p. 50, n° 70; 1905, p. 75, pl. V, 14, ⊕. P.

**Quercus lusitanea** LAMK. var. **bactica** WILLK. et LANGE  
(**Q. bactica** WEBBER)

- Ac.bg. — Voir n°1248. . . . . **Cynips Kollari** HARTIG 1735  
Stefani, 1897, p. 95; 1898<sup>c</sup>, p. (14-15), n°10; 1906, p. 182. si.
- Voir n°1244. . . . . **Cynips caliciformis** GIRAUD 1736  
Stefani, 1897, p. 95-97; 1898<sup>c</sup>, p. (15), n°11; 1906, p. 182. si.

**Quercus lusitanea** LAMK. var. **Mirbecki** GÜRKE  
(**Q. Mirbecki** DURIEU)

- Ac.bg. { Cécidie arrondie dépassant 10 mm. de diamètre..... A.  
          { Cécidie ovoïde ou en bouton atteignant au plus 10 mm. de long.... B.  
          { Cécidie munie de prolongements..... C.

A. — Cécidie charnue, multiloculaire, un peu comprimée de haut en bas, sillonnée de plis divergeant à partir du sommet, mamelonnée, versicolore, de teinte générale vert-de-gris avec des teintes azurées ou grisâtres juxtaposées à des tons carminés ou lilas. **Biorrhiza pallida** OLIV. var. **Mirbecki** MARCHAL 1737

P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 14-15, n°1; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 103, n°123. A-L.

— Cécidie brun grisâtre atteignant 40 mm. de diamètre et présentant vers la partie supérieure une couronne de nodosités (fig. 526). [**Cynips quercus-tozæ** Bosc] 1738

P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 15, n°2; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 103, n°124. AL, TU.

— Cécidie sphérique, de la grosseur d'une cerise, lisse ou avec nodosités disposées sans ordre (fig. 527); cavité interne sphérique (fig. 528). [**Cynips Kollari** HARTIG] 1739

P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 16, n°5; Senrat, 1900, p. 7, 2°. AL, TU.

B. — Cécidie ovoïde, terminée en pointe, haute de 10 mm. [**Andricus solitarius** Fonsc.] 1740

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 104, n°127. AL.

— Petite cécidie en forme de bouton, de 3 mm. de diamètre. **Cynipide** 1741

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 104, n°128. AL.

C. — Cécidie munie de prolongements contournés. Voir n° 1222.

**Cynips coriaria** HAIMH. 1742

Seurat, 1900, p. 7, 1°.

TC.

— Cécidie formée d'un pédoncule cylindrique très court se divisant en 2-4 prolongements aplatis, marqués de sillons longitudinaux, terminés en une pointe recourbée, longs de 7-10 mm. et larges de 4-8 mm. à leur base (fig. 529) ; entre ces prolongements, à des distances égales de leurs bases, se trouve une verrue conique légèrement pubescente. La cavité de la galle est vaste et sphérique (fig. 530).

**Cynips polycera** GIRAUD var. **Marchali** KIEFF. 1743

P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 15-16, n° 3 ; Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 525-526, pl. XXIV, 8, ⊕.


AL.



*Quercus Mirbecki*

*Cynips quercus-toza* (n° 1738)

Fig. 526. — D'ap. nat.




*Quercus Mirbecki*

*Cynips Kollari* (n° 1739)

Fig. 527 (a). — D'ap. nat.

Fig. 528 (b). — D'ap. nat.



*Quercus Mirbecki*

*Cynips polycera* var. *Marchali* (n° 1743)

Fig. 529 (a). — Im. KIEFF.

Fig. 530 (b). — Im. KIEFF.

— Cécidie formée d'un pédoncule cylindrique terminé par 2-5 prolongements arrondis. Voir n° 1253.

**[Cynips corruptrix SCHL.]** 1744

P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 16, n° 4.

AL.

**Pl.ra** — Grosse galle arrondie, multiloculaire. Voir n° 1290.

**Andricus radiceis** FABR. 1745

**Pl.ti.** — La cécidie précédente peut aussi se trouver sur la partie inférieure de la tige. **Andricus radialis** FABR. 1746

P.Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 16, n° 7 ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 102, n° 121. AL.

— Sur un jeune rameau, renflement multiloculaire à surface bosselée irrégulière. [**Andricus trilineatus** HARTIG] 1747

P.Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 16, n° 7 ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 102, n° 122. AL.

**Pl.fe.** — Galle ellipsoïdale, longue de 2 mm. **Neuroterus albipes** SCHENCK 1748

P.Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 16, n° 9 ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 104, n° 129. AL.

— Galle fusiforme également saillante sur les deux faces de la feuille, qui est crispée. **Andricus curvator** HARTIG 1749

P.Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 16, n° 6 ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 104, n° 131. AL.

— Galle en grain de raisin faisant surtout saillie à la face inférieure. **Neuroterus baccarum** L. 1750

P.Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 16, n° 8 ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 104, n° 130. AL.

— Galle sphérique insérée en un point seulement de la face inférieure. **Dryophanta divisa** HARTIG 1751

P.Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 16, n° 6. AL.

— Galle lenticulaire. . . . **Neuroterus lenticularis** OLIV. 1752

Stefani, 1907, p. 11. AL.

**Quercus lusitanea** LAMK. subsp. **orientalis** = **petiolaris** DC.  
(**Quercus petiolaris** BOISSIER, **Q. cypri** KOTSCHY)

**Pl.fe.** — Sur une nervure primaire et à la face inférieure de la feuille, cécidie uniloculaire, sphérique, de 2-2,5 mm. de diamètre, brillante, jaunâtre, glabre ou couverte de quelques poils étoilés ; elle est fixée au limbe par une large base. **Cynipide** 1753

Hieronimus, 1890, p. 227, n° 660. ch.

**Quercus lusitanea** LAMK. var. **syriaca** (**Q. syriaca** KOTSCHY)

**Ac.bg.** — Galle en soucoupe. Voir n° 1272. . [**Cynips Stefani** KIEFF.] 1754

Massalongo, 1893, p. (188) ; Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 523 ; 1901<sup>b</sup>, p. 410. A-M

**Quercus lusitanica** LAMK. var. **tauricola**  
(**Q. tauricola** KOTSCHY)

- Ac. bg.** — Voir n°1222. . . . . [Cynips coriaria HAIMML.] 1755  
Trotter, 1901<sup>c</sup>, p. 73, n° 36. A-M.  
— Cécidie de 58 mm. sur 44 mm. avec taches blanches. Voir  
n°1770. Cynips insana MAYR 1756  
Mayr, 1901, p. 67; Kieffer, 1905, p. 572-573. A-M.

**Quercus lusitanica** LAMK. var. **polycarpus** KOTSCHY

- Ac. fr.** — Cécidie chevelue. Voir n°1169. Cynips caput-medusæ HARTIG 1757  
Trotter, 1901<sup>c</sup>, p. 73, n° 35. A-M.

[**Quercus lusitanica** × **pedunculata** COUTINHO]

- Ac. fr.** — Cécidie avec 2 couronnes de prolongements. Voir n°1652.  
Cynips Panteli TAVARES 1768  
Trotter, 1901, p. 159, n° 72. P.  
**Ac. bg.** — Cécidie munie de prolongements. Voir n°1686.  
Andricus Panteli KIEFF. 1759  
Trotter, 1901, p. 159, n° 71. P.  
**Pl. fe.** — Pétiole renflé. Voir n°1316. [Heliozela stanneella FISCH. v. R.] 1760  
Trotter, 1901, p. 159, n° 73. P.

**Quercus macranthera** FISCH. et MEYER

- Pl. fe.** { Cécidie de forme lenticulaire. . . . . A.  
{ Cécidie ovoïde ou arrondie. . . . . B.  
A. — Voir n°1336. . . . . Neuroterus lenticularis OLIV. 1761  
Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 313, n° 97. A-M.  
— Voir n°1340. . . . . Neuroterus numismatis OLIV. 1762  
Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 312, n° 96, pl. XV, 36, ⊕. A-M.

- B. — Voir n°1326. . . . . **Andricus ostreus** GIRAUD 1763  
 Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p.313, n°98. A-M.
- Voir n°1326. . . . . [**Dryophanta folii** L.] 1764  
 Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p.312, n°94. A-M.
- Voir n°1327. . . . . [**Dryophanta agama** HARTIG] 1765  
 Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p.312, n°93. A-M.
- Voir n°1328. . . . . [**Dryophanta divisa** HARTIG] 1766  
 Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p.312, n°95. A-M.
- Cécidie présentant beaucoup de ressemblance avec celle  
 du *Neuroterus minutulus* (n°1865), mais les petits tubercules  
 sont moins épais. **Neuroterus** 1767  
 Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p.313, n°99, pl.XV, 36-37, ⊕. A-M.

**Quercus infectoria** OLIV.(Q. **lusitanica** LAMK. subsp. **orientalis**  $\alpha$  **infectoria** DC.)

- Ac.fr.** — Cécidie sphérique composée de filaments ramifiés, enche-  
 vêtrés. Voir n°1169. **Cynips caput-medusæ** HARTIG 1768  
 Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p.310, n°89. A-M.
- Ac.fl.** — Cécidie rappelant par son aspect celle de l'*Andricus ramuli*  
 (n°1186). **Cynipide** 1769  
 Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p.310, n°89. A-M.
- Ac.bg.** — Cécidie arrondie, de 40 mm. de diamètre, portée par un  
 petit pédicule et présentant une minime verrue apicale ; un  
 peu au-dessus de l'équateur, elle est marquée de 6 à 8 nodo-  
 sités autour de chacune desquelles se trouve une petite plage  
 circulaire blanchâtre. La surface de la galle, lisse, brune et  
 mate, est le plus souvent enduite d'une sorte de résine bril-  
 lante ; au centre se trouve une cavité de la taille d'un pois.  
*Galle de Bassorah, Pomme de Sodome.* **Cynips insana** MAYR 1770  
 Mayr, 1901, p.65-68 ; Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p.310-312, n°91 ; Kieffer, 1905, p.572-573, pl.X,  
 1-2, ⊕. A-M,  
 S Y.
- Cécidie sphérique, de 15-20 mm. de diamètre, d'un brun



- grisâtre, à surface couverte d'aspérités. *Galle d'Alep, Galle du Levant, Galle de Smyrne*, etc. **Cynips tinctoria** OLIV. 1771  
 Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 566-567, pl. XIII, 5, ⊕; Trotter, 1904<sup>d</sup>, p. 146-151. A-M.
- Cécidie subglobuleuse couverte d'appendices courts. Voir n° 1222. **[Cynips coriaria** HAIMH.] 1772  
 Trotter, 1901<sup>c</sup>, p. 73, n° 33. A-M.
- Pl. fe.** { Cécidie lenticulaire..... A.  
 { Cécidie affectant une autre forme..... B.
- A. — Cécidie lenticulaire à face supérieure conique. Voir n° 1336. **[Neuroterus lenticularis** OLIV.] 1773  
 Rolfe, 1881, p. 56; Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 309-310, n° 87. I-B, A-M.
- Cécidie lenticulaire avec excavation centrale. Voir n° 1340. **[Neuroterus numismatis** OLIV.] 1774  
 Rolfe, 1881, p. 56. I-B.
- B. — Bord du limbe replié par en bas. Voir n° 1307. **Macrodiplosis volvens** KIEFF. 1775  
 Trotter, 1901<sup>c</sup>, p. 73, n° 34. A-M.
- Cécidie en grain de raisin. Voir n° 1355. **[Neuroterus baccarum** L.] 1776  
 Rolfe, 1881, p. 56. I-B.
- Cécidie pisiforme, verte, déformant le limbe. Voir n° 1351. **[Andricus curvator** HARTIG] 1777  
 Rolfe, 1881, p. 56. I-B.
- Petite cécidie ellipsoïdale, fixée à la face inférieure de la nervure médiane et accompagnée de deux expansions lamelleuses. Voir n° 1326. **[Andricus ostreus** GIRAUD] 1778  
 Rolfe, 1881, p. 56. I-B.
- Cécidie ressemblant à un petit fromage de Hollande (5 mm. sur 8 mm.), fixée à la face inférieure de la nervure médiane du limbe, près de la pointe; surface glabre, peu luisante, brun jaunâtre; grande cavité larvaire (4,5 mm. sur 2,5) entourée par du tissu rayonnant. **Cynipide** 1779  
 Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 312, n° 92.

— Cécidie ovoïde (4 mm. de longueur) fixée par un point à la face inférieure du limbe. Voir n°1327.

**Dryophanta agama** HARTIG] 1780

Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 310, n° 88.

A-M.

**Quercus infectoria** OLIV. var. **Boissieri** GÜRKE

(**Quercus lusitanica** LAMK. subsp. **orientalis** β **Boissieri** DC.)

(**Q. Boissieri** REUTER)

Pl. fe. — Cécidie soyeuse. Voir n°1340. [**Neuroterus numismatis** OLIV.] 1781

Rolfe, 1883, p. 30.

I-B.

**Quercus humilis** LAMK.

(y compris les formes *genuina* et *prasina*)

Ac. fl. — A la place d'un chaton, cécidie cotonneuse blanche ou jaunâtre, pouvant atteindre la grosseur d'une noix. Voir n°1657.

**Andricus ramuli** L. var. **trifasciata** KIEFF. 1782

Trotter, 1899<sup>b</sup>, p. 200, n° 13; Tavares, 1905, p. 82-83.

P.

Ac. bg. { Cécidie fusiforme..... A.  
 { Cécidie globuleuse, à surface lisse ou tuberculeuse..... B.  
 { Cécidie munie de prolongements..... C.

A. — Cécidie fusiforme, pédiculée. Voir n°1282.

**Andricus Giraudi** WAGHTL 1783

Tavares, 1900, p. 30, n° 34; 1905, p. 71.

P.

B. — Grosse cécidie uniloculaire, sphérique, brune. Voir n°1248.

**Cynips Kollari** HARTIG 1784

Trotter, 1899<sup>b</sup>, p. 199, n° 8; Tavares, 1905, p. 67-68.

P.

— Cécidie plus petite que la précédente. Voir n°1675.

[**Cynips Kollari** HARTIG var. **minor** KIEFF.] 1785

Tavares, 1900, p. 42, n° 58; 1905, p. 68.

P.

— Cécidie globuleuse, de 14-18 mm. de diamètre, couverte de tubercules peu saillants. Voir n°1677. **Cynips** [**tinctoria** OLIV.] 1786

Trotter, 1899<sup>b</sup>, p. 199, n° 9.

P.

— Cécidie arrondie, de 20 à 35 mm. de diamètre, présentant une couronne de nodosités. Voir n°1241.

**Cynips quercus-tozæ** BOSCH 1787

Tavares, 1905, p. 67.

P.

C. — Cécidie à surface non gluante. Voir n°1687.

**Cynips coriaria** HAIMB. var. **lusitanica** KIEFF. 1788

Tavares, 1905, p. 68.

P.

— Cécidie à surface gluante. Voir n°1686.

**Andricus Panteli** KIEFF. 1789

Tavares, 1900, p. 33, n°44 ; 1905, p. 68.

P.

Pl.ra. — Voir n°1289. . . . . **Biorrhiza aptera** BOSCH 1790

Tavares, 1905, p. 60.

P.

— Voir n°1290. . . . . **Andricus radiceis** FABR. 1791

Tavares, 1905, p. 60-61.

P.

Pl.ti. — Petit renflement. Voir n°1294. . **Andricus trilineatus** HARTIG 1792

Tavares, 1900, p. 30, n°32 ; 1905, p. 65, pl. VII, 20, ⊕.

P.

— Petite cécidie ellipsoïdale (2 mm. sur 1,5). Voir n°1298.

**Andricus furunculus** BELJERINCK 1793

Tavares, 1905, p. 64.

P.

— Cécidie rougeâtre ou bien conique, ligneuse et striée ; à la base de la tige. Voir n°1293.

**Andricus Sieboldi** HARTIG 1794

Tavares, 1905, p. 62.

P.

Pl.fe. { Cécidie formée aux dépens de la nervure médiane..... A.  
 { Cécidie du limbe : forme lenticulaire..... B.  
 { Cécidie du limbe : forme sphéroïdale ou ovoïdale..... C.

A. — Renflement irrégulier. Voir nos 1317-1318.

**Andricus trilineatus** HARTIG 1795

**Andricus testaceipes** HARTIG 1796

Tavares, 1905, p. 73, pl. VII, 19, ⊕.

P.

— Cécidie ovoïde munie de deux valves. Voir n°1326.

**Andricus ostreus** GIRAUD 1797

Trotter, 1900 b, p. 157, n°35 ; Tavares, 1900, p. 27, n°27 ; 1905, p. 77, pl. IV, 26, ⊕.

P.

- B. — Cécidie lenticulaire, à face supérieure conique Voir n°1336.  
**Neuroterus lenticularis OLIV.** 1798  
**Neuroterus lenticularis OLIV. var. histrio KIEFF.** 1799  
 Trotter, 1899<sup>b</sup>, p. 200, n°10; Tavares, 1900, p. 52, n°76; 1905, p. 81. P.
- Cécidie lenticulaire, à face supérieure plane. Voir n°1332.  
**[Neuroterus læviusculus SCHENCK]** 1800  
 Hieronymus, 1890, p. 203, n° 633. E.
- Cécidie lenticulaire, à face supérieure déprimée munie d'un gros mamelon. Voir n°1338. **Neuroterus fumipennis HARTIG** 1801  
 Tavares, 1900, p. 51-52, n°75; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 442-443. P.
- C. — Cécidie sphérique, glabre, de 5-7 mm. de diamètre. Voir n°1321. **Trigonaspis synaspis HARTIG** 1802  
 Trotter, 1899<sup>b</sup>, p. 200, n°12; Tavares, 1905, p. 78-79, pl. IV, 27, pl. XI, 23, ⊕. P.
- Cécidie sphérique, de 8-10 mm. de diamètre. Voir n°1323.  
**Dryophanta pubescentis MAYR** 1803  
 Tavares, 1902, p. 115, n° 268; 1905, p. 78. P.
- Cécidie sphérique, de 3-4 mm. de diamètre, couverte de longs poils. Voir n°1356. **Neuroterus tricolor HARTIG** 1804  
 Trotter, 1899<sup>b</sup>, p. 200, n°11; Tavares, 1905, p. 75, pl. V, 17, ⊕. P.
- Cécidie en grain de raisin. Voir n°1355. **Neuroterus baccarum L.** 1805  
 Tavares, 1900, p. 50, n° 71; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 436-437. P.
- Minime cécidie, de 2 mm. de long, fixée au bord du limbe. Voir n°1346. **Neuroterus albipes SCHENCK** 1806  
 Tavares, 1905, p. 76-77. P.

**Quercus Cerris L.**

Ac. fr. voir p. 322

Ac. fl. voir p. 323

Ac. ti. voir p. 326

Ac. bg. voir p. 327

Pl. ti. voir p. 330



Pl. fe. voir p. 332

Ac. fr. — D'un disque, formé aux dépens de la cupule, s'irradient des prolongements très nombreux, longs, ramifiés et enchevêtrés de façon à former un amas atteignant la grosseur d'une noix.

Le disque porte en son centre une galle interne qui y adhère par sa base. Cynipide février II. *Cynips caput-medusæ* HARTIG 1807  
Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 544; 1901<sup>b</sup>, p. 458-459. E-G.

— L'ensemble du gland et de sa cupule est remplacé par une masse charnue dont la partie distale, représentant le gland, est un peu convexe et présente une pointe apicale bien développée (fig. 531-532) tandis que la partie proximale, dérivée de la cupule, est couverte de petites écailles (fig. 542). Cynipide mai-juin I. *Neuroterus glandiformis* GIRAUD 1808

Giraud, 1859, p. 365, n° 2; Mayr, 1871, p. 31, n° 91, pl. VII, 91, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VIII, n° 237, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 178-179, n° 1, pl. XII, 1, ⊕. A-H, I.



*Quercus Cerris*  
*Neuroterus glandiformis* (n° 1808)  
Fig. 531 (a). — Im. GIRAUD  
Fig. 532 (b). — Im. MAYR

*Quercus Cerris*  
*Chilaspis larwi* (n° 1810)  
Fig. 533 (a). — Im. WACHTL  
Fig. 534 (b). — Im. WACHTL

*Quercus Cerris*  
*Andricus arstivalis* (n° 1811)  
Fig. 535 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 536 (b). — D'ap. nat.  
Fig. 537 (c). — D'ap. nat.

— Petite cécidie dure, ligneuse, brune, multiloculaire, formée aux dépens de l'amande et de la membrane du gland dont la surface se boursoufle. Cynipide I-IV.

*Callirhytis glandium* GIRAUD 1809

Giraud, 1859, p. 355-356, n° 1; Mayr, 1871, p. 32, n° 92, pl. VII, 92, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. X, n° 293, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 179-180, n° 2, pl. XXIII, 11, ⊕. E-G, I-B

Ac. fl. { Cécidie dépassant 5 mm. de longueur..... A.  
          { Petite cécidie atteignant à peine 3 mm..... B.

A. — La cécidie sphérique, de la grosseur d'une cerise en géné-

ral, mais pouvant atteindre la taille d'une noix (fig.533-534), est en réalité formée par l'agglomération des fleurs d'un chaton, transformées chacune en une cécidie de 2-3 mm. de long, couverte de longs poils blancs (fig.538). Cynipide juin I.

**Chilaspis Löwi** WACHTL 1810

Wachtl, 1882 b, p. 291-293, pl. IV, 2, ⊕ ; Schlechtendal, 1888 b, p. 245-246 ; Kieffer, 1897, p. 82, n° 64, pl. XX, 12, ⊕ ; 1901, p. 599-600. A-H,  
A.

— Une fleur d'un chaton est transformée en une sorte d'urne, de 15 mm. de hauteur sur 10 mm. de largeur (fig.536), dure, pluriloculaire (fig.537), terminée par une collerette évasée. En général, l'axe du chaton étant très raccourci, de semblables cécidies sont groupées en amas pouvant atteindre 40 mm. de diamètre (fig.535). Cynipide juillet-aout I.

**Andricus æstivalis** GIRAUD 1811

Giraud, 1859, p. 356-357, n° 3 ; Mayr, 1871, p. 21, n° 79, pl. VI, 79, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. X, n° 291, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 180-181, n° 3, pl. XIX, 1-3, ⊕. E-C.I,  
I-B.



Quercus Cerris

- Fig. 538 (a) : *Chilaspis Löwi* (n°1810) . . . . . Im. WACHTL
- Fig. 539 (b) : *Andricus burgundus* (n°1814) . . . . . D'ap. nat.
- Fig. 540 (c) : *Andricus cerri* (n°1816) . . . . . Im. BEIJERINCK
- Fig. 541 (d) : *Andricus grossulariæ* (n°1812) . . . . . D'ap. nat.
- Fig. 542 (e) : *Neuroterus glandiformis* (n°1808) . . . . . Im. MAYR

— Une fleur se transforme en une cécidie rouge, charnue, ovoïde ou piriforme, de 6-7 mm. de haut sur 5-7 mm. de diamètre (fig.541 et 543) ; au-dessus de la cavité larvaire ovoïde, située à la base de la galle, se trouve un canal cylindrique débouchant à l'extérieur par une ouverture circulaire apicale (fig.544). Cynipide juin I. **Andricus grossulariæ** GIRAUD 1812

Giraud, 1859, p. 358-359, n° 5 ; Mayr, 1871, p. 21, n° 80, pl. VI, 80, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 311, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIV, n° 346, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 181-182, n° 4, pl. XIII, 2, ⊕. E-C.I.


— Cécidie présentant quelque analogie avec la précédente : elle est courbée en arc (fig.545-548), longue de 4-6 mm., large

de 1,5-2,5 mm., presque cylindrique, charnue, à surface verdâtre puis rougeâtre, sillonnée longitudinalement et garnie de poils simples ou étoilés; l'extrémité souvent fourchue de la galle donne accès dans une cavité allongée qui est séparée par une cloison horizontale de la chambre larvaire basilaire. Deux cécidies, parfois trois, peuvent se développer dans une même fleur et se fusionner plus ou moins complètement. Cynipide juillet I.

**Andricus vindobonensis MÜLLNER 1813**

Müllner, 1901, p. 529, pl. IV, 7-13, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1905, fasc. XIII, n° 362, ⊕.

E-G.



*Quercus Cerris*

*Quercus Cerris*

- Andricus grossulariae* (n°1812) Fig. 545-548 (a-d) : *Andricus vindobonensis* (n°1813) . Im MÜLLNER  
 Fig. 543 (a) . — D'ap. nat. Fig. 549 (e) : *Andricus Beijerincki* (n°1815) . . . . . Im. TROTTER  
 Fig. 544 (b) . — Im MAYR Fig. 550 (f) : *Andricus cerri* (n°1816) . . . . . Im. BEIJERINCK  
 Fig. 551-553 (g-k) : *Neuroterus cerri-floralis* (n°1817) . Im. MÜLLNER

B. — Sur le filet de l'étamine, dans le chaton encore enfermé dans le bourgeon (fig. 539), cécidie ovoïde de 2 - 2,5 mm. de haut.

Cynipide mai I.

**Andricus burgundus GIRAUD 1814**

Girard, 1859, p. 359, n° 6; Mayr, 1870, p. 31, n° 40, pl. IV, 40, ⊕; Beijerinck, 1897, p. 413, note 1, pl. XVIII, 7, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1907, fasc. XV, n° 413, ⊕; Darboux et Honard, 1907, p. 182-183, n° 5, pl. XII, 2-3, ⊕.

E-G.  
si.

— Cécidie ovoïde, haute de 2,5 mm. et formée par une moitié d'anthere hypertrophiée (fig. 549); l'autre moitié avortée se voit sur le côté de la cécidie. Cynipide avril I.

**Andricus Beijerincki TROTTER 1815**

Trotter, 1899, p. 290, n° 18, pl. XVII, 4-5, ⊕.

I.

— Cécidie conique, ne dépassant pas 2 mm. de hauteur, de même nature morphologique que la précédente (fig. 546 et 550).  
Cynipide mai I.

**Andricus cerri** BÉDERINCK 1816

Beijerinck, 1897, p. 410-418, pl. XVI, 7, 9, pl. XVII, 13, pl. XVIII, 2, 5-6, 8, ⊕.

H.

— Cécidie ovoïdale, de 1,5-1,75 mm. de long sur 1,25 mm. de large, formée aux dépens de la moitié d'une anthère dont l'autre moitié avortée se voit sur le côté (fig. 551-553) ; surface de la galle d'abord jaune orangé, puis jaune brun, couverte de poils dressés, assez longs. Cynipide mai I.

**Neuroterus cerrifloralis** MÜLLNER 1817

Müllner, 1901, p. 527-529, pl. IV, 1-6, ⊕.

A-H.

— Cécidie ovoïde, de 2-2,5 mm. de long, couverte de poils dans la moitié supérieure seulement. Voir n° 1190.

**Andricus occultus** TSCHER 1818

Szépligeti, 1890, p. 19.

A-H.

**Ac.ti.** — Les entre-nœuds terminaux demeurant courts, les feuilles, ainsi rapprochées et d'ailleurs déformées, constituent un amas arrondi atteignant la grosseur d'une noisette ou même celle d'une noix (fig. 554) et à l'intérieur duquel se trouvent de nombreuses galles. Cynipide juin I.

**Andricus multiplicatus** GIRAUD 1819

Giraud, 1859, p. 360, n° 7 ; Mayr, 1871, p. 7, n° 58, pl. V, 58, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 312, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VII, n° 74, ⊕ ; Darboux et Honard, 1907, p. 184, n° 7, pl. XVIII, 1, ⊕.

E-G, I,  
P-B,  
A-M.

— Renflement terminal (fig. 555), ovoïde, ligneux, pluriloculaire, de la dimension d'une grosse noisette ; il présente une ouverture apicale et peut porter quelques feuilles. Cynipide juin I.

**Andricus cydoniæ** GIRAUD 1820

Giraud, 1859, p. 357, n° 4 ; Mayr, 1871, p. 8, n° 59, pl. V, 59, ⊕ ; Trotter, 1903, p. 42, n° 108 ; Darboux et Honard, 1907, p. 184-185, n° 8, pl. XVIII, 6, ⊕.

A-H,  
B.U.

— Renflement terminal piriforme (fig. 556), de couleur verdâtre, uniloculaire, de la grosseur d'un pois, présentant une ouverture apicale (fig. 557) et donnant insertion à quelques feuilles bien développées ainsi qu'à d'autres tout à fait rudimentaires. Cynipide juin I.

**Andricus singulus** MAYR 1821

Mayr, 1871, p. 34, n° 95, pl. VII, 95, ⊕ ; Stefani, 1898, p. (27), n° 48 ; Hieronymus, Pax, etc., 1907, fasc. XV, n° 415, ⊕.


E-C,  
si.



— Entre-nœuds terminaux demeurés courts; feuilles réunies en bouquets et crispées. Voir n° 1207. *Contarinia quercina* Rüb. 1822

Cecconi, 1903<sup>b</sup>, p. 352, n° 20.

L.



*Quercus Cerris*

*Andricus multiplicatus* (n° 1814)

Fig. 554 (a). — D'ap. nat.



*Quercus Cerris*

*Andricus cydoniae* (n° 1820)

Fig. 555 (a). — Im. GIRAUD



*Quercus Cerris*

*Andricus singulus* (n° 1821)

Fig. 556 (a). — Im. KIEFF.

Fig. 557 (b). — Im. MAVR

- Ac.bg. { Bourgeon hypertrophié..... A.  
 Cécidie pourvue d'appendices..... B.  
 Cécidie sans appendices; taille de la galle comprise entre 5 et 30 mm. C.  
 Cécidie sans appendices; taille de la galle ne dépassant pas 5 mm. D.

A. — Bourgeon grossi, long de 10 mm., large de 4-5 mm. Une seule larve.

*Contarinia* 1823

F. Löw, 1885<sup>c</sup>, p. 507.

E-G.

— Cécidie identique. Larves grégaires rouge orangé.

*Contarinia* 1824

Schlechtendal, 1891, p. 2.

E-G.

— Cécidie identique. Larves grégaires de couleur vitelline.

M.T.

*Contarinia quercicola* Rüb. 1825

Rubsamen, 1899<sup>b</sup>, p. 599-600, n° 85, note 1; Trotter, 1899, p. 293, n° 22, pl. XVIII, 1; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. XXXVI, 6, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VIII, n° 235, ⊕; Tavares, 1902<sup>b</sup>, p. 92, n° 52.

E-G.

L.

- Bourgeon hypertrophié, situé sur des branches âgées de 6 à 8 ans. **Eriophyes cerreus** NAL. 1826  
Nalepa, 1898<sup>b</sup>, p. 234 ; 1900, p. 210. E-C.
- B. — Cécidie à parois épaisses et ligneuses, d'un brun-marron brillant, gluante à l'état frais. Sur un disque de 10 mm. de diamètre, qui en forme la base et qui embrasse le rameau, s'élève une partie subcylindrique ou en tronc de cône, terminée par une calotte à ombilic apical ; la hauteur de l'ensemble atteint 8-10 mm. Cynipide février-mars II. **Cynips mitrata** MAYR 1827  
Bargagli, 1895, p. 42. I.
- Cécidie ailée rappelant assez celle du *Cynips polycera* ; galle interne à paroi mince en partie dégagée du parenchyme. **Cynips [picta** ROSENU.] 1828  
Rosenhauer, 1856, p. 374 ; Dalla Torre, 1893, p. 75. E.
- Cécidie ovoïdale (4-5 mm. sur 2-3) surmontée de plusieurs petits prolongements. Voir n° 1236. [**Cynips galeata** MAYR] 1829  
Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 56, n° 20. I.
- Cécidie sphérique, de 3,5 mm. de diamètre, portant de nombreux prolongements grêles, longs de 3 à 4 mm. environ. Voir n° 1221. [**Andricus hystrix** TROTTER] 1830  
Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 428. E-S.
- Cécidie subglobuleuse (20-22 mm. sur 18-20 mm.), dure, lisse, conique à la base, aplatie dans la région distale et pourvue de 7 à 10 prolongements obtus. Cavité larvaire arrondie et spacieuse. *Galle couronnée de Morée*. **Cynips moreæ** GRÆFFE 1831  
Græffe, 1905, p. 372-373, fig. 2, ⊕. G.
- Cécidie uniloculaire, deux fois aussi grosse qu'un grain de chènevis, ou pluriloculaire de la taille d'un pois, arrondie, à paroi mince ; sa surface est recouverte de filaments coniques, glabres, creux, recourbés, longs de 2-3 mm., ce qui lui donne l'aspect et la couleur de la galle du *Rhodites Mayri*. Cynipide 1832  
Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 78, n° 50 bis. I.
- C. — Cécidie de forme arrondie, de 6-15 mm. de diamètre, de la couleur de l'écorce, à parois très épaisses, très dures, à surface

parsemée de petites verrues blanchâtres (fig. 560-561). Cynipide mars-juillet II.

**Synophrus politus** HARTIG 1833

Mayr, 1870, p. 27, n° 36, pl. IV, 36, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 313, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 26, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 183, n° 6, pl. XXVI, ⊕. E-C,  
P-B, I,  
A-M.

— Cécidie arrondie, de 5-10 mm. de diamètre, dure, à surface écailleuse. Voir n° 1244.

[**Cynips caliciformis** GIRAUD] 1834

Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 56, n° 19. I.

— Cécidie arrondie, charnue. Voir n° 1262.


[**Biorrhiza pallida** OLIV.] 1835

Misciattelli, 1895<sup>b</sup>, p. 89, n° 25 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 414. I.

— Cécidie conique, couverte d'une épaisse pilosité très courte. Voir n° 1271.

[**Cynips tomentosa** TROTTER] 1836

Hieronymus, 1890, p. 201, n° 627 ; Trotter, 1903, p. 210. co.



*Quercus Cerris*

- |                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Fig. 558, 559 (a) : <i>Neuroterus aggregatus</i> (n° 1838). . . . . | Im. WACHTL |
| Fig. 560, 561 (b) : <i>Synophrus politus</i> (n° 1833). . . . .     | Im. KIEFF. |
| Fig. 562, 563 (c) : <i>Neuroterus obtectus</i> (n° 1839). . . . .   | Im. WACHTL |
| Fig. 564, 565 (d) : <i>Andricus circulans</i> (n° 1840). . . . .    | Im. MAYR   |
| Fig. 566, 567 (e) : <i>Neuroterus cryptobius</i> (n° 1841). . . . . | Im. WACHTL |

D. — Cécidie ovoïdale, allongée (1,5 mm. sur 1 mm.), terminée par une pointe un peu courbée, uniloculaire, couverte de longs poils dressés ; paroi mince. La galle est en général solitaire à l'aisselle d'une feuille. Cynipide juillet-août I.

**Fioriella Meunieri** KIEFF. 1837

Kieffer, 1902<sup>c</sup>, p. 495-496 ; 1905, p. 549, pl. X, 3-4, ⊕. I.

— Sur les bourgeons adventifs du tronc, galles petites, ovoïdes, de 1-2 mm. de diamètre (fig. 558-559), à paroi très mince, à surface finement granuleuse, verdâtres ou d'un rouge rosé ou encore violet-pourpre, généralement agglomérées. Cynipide mai I.

**Neuroterus aggregatus** WACHTL 1838

Wachtl, 1880, p. 541-542, n° 3, pl. XVIII, 5, ⊕ ; Paszlavszky, 1884, p. 74, n° 16. A-H.

— A la face interne des écailles d'un bourgeon (fig.562-563), cécidies ellipsoïdales de 1,5-2 mm. de long, jaunâtres, presque lisses, généralement en grand nombre dans un bourgeon. Cynipide mai I.

**Neuroterus obtectus** WACHTL 1839

Wachtl, 1880, p.540-541, n° 2, pl. XVIII, 4, ⊕ ; Paszlayzsky, 1884, p.74, n° 15.

A-H.

— Cécidie ovoïde, de 2-2,5 mm. de long (fig.564-565), glabre, jaune brunâtre ou rouge, à surface lisse, enfoncée à moitié dans le bourgeon qui peut contenir jusqu'à huit cécidies semblables. Cynipide mars-mai I.

**Andricus circulans** MAYR 1810

Mayr, 1870, p.30, n° 39, pl. IV, 39, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. X, n° 292, ⊕.

A-H, H, I-B, I.

— Cécidie en pépin de pomme (fig.566-567), longue de 3 à 3,5 mm., brune, avec une pointe brun jaunâtre, entourée comme d'une collerette par les feuilles du bourgeon qui se développent encore en partie. Cynipide mai I.

**Andricus cryptobius** WACHTL 1841

Wachtl, 1880, p.538-540, n° 1, pl. XVIII, 3, ⊕ ; Mayr, 1882, p.(17).

A-H.

— Cécidie de 2,5 mm. de long. Voir n° 1259.

[**Dryophanta Taschenbergi** SCHL.] 1842

Ormerod, 1877, p.42-43, 1 fig., ⊕ ; Kieffer, 1901b, p.410.

I-B.

Pl. ti. { Rameau non épaissi..... A.  
 { Rameau épaissi..... B.

A. — Sur un rameau, qu'elle embrasse par sa base, cécidie subglobuleuse de 5-20 mm. de diamètre (fig.568), de teinte verdâtre à l'état jeune, plus tard sombre, présentant des poils étoilés caducs. De semblables cécidies sont souvent groupées en amas et alors polyédriques par pression réciproque. Cynipide décembre I-II.

**Aphelonyx cerricola** GIRAUD 1843

Giraud, 1859, p.346-347, n° 7 ; Mayr, 1870, p.9, n° 6, pl. I, 6, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 78, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p.185-186, n° 9, pl. XXVII, 7, ⊕.

A-H, I.

P-B, A-M.

— Cécidie fusiforme, longue de 2 mm., fixée dans le sens de sa longueur dans une fente de l'écorce d'un jeune rameau (fig.572). Consulter le n° 1857.

**Neuroterus saltans** GIRAUD 1844

— Cécidies sphériques ou coniques, pluriloculaires, de la grosseur d'un pois, isolées ou réunies et, dans ce dernier cas, de forme irrégulière; surface lisse ou verruqueuse, de teinte vert

pâle avec une coloration rouge foncé du côté de la lumière.  
Cynipide mai I.

**Dryocosmus Mayri** MÜLLNER 1845

Müllner, 1901, p. 525-527, pl. III, 1-6, ⊕.


A.H.

B. — Vers l'extrémité d'un jeune rameau, à l'insertion d'une feuille ou encore sur le coussinet d'un bourgeon, épaississement irrégulier et considérable, le plus souvent unilatéral ; le pétiole et quelquefois la nervure médiane peuvent participer à l'hypertrophie, soit que le parasite s'y loge soit qu'il se soit logé tout près. Galle verte à l'état frais, devenant brune par dessiccation.

**Lépidoptère** 1846

Trotter, 1900, p. 200, n° 15, pl. IX, 8, ⊕ ; 1903, p. 45, n° 17.

I.BU.




*Quercus Cerris*

*Aphelonyx cerricola* (n° 1843)  
Fig. 568. — D'ap. nat.



*Quercus Cerris*

*Neuroterus macropterus* (n° 1848)  
Fig. 569 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 570 (b). — D'ap. nat.



*Quercus Cerris*

*Dryocosmus cerriphilus* (n° 1849)  
Fig. 571 (a). — D'ap. nat.

— Renflement unilatéral et irrégulier d'un rameau, de 10-15 mm. de longueur sur 6-8 mm. de diamètre, alors que le rameau n'a que 1,5 mm. d'épaisseur ; le trou de sortie est situé à l'extrémité du renflement dont la surface se couvre de rides après la migration de la chenille.

**Lépidoptère** 1847

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 401.

P.

— Renflement allongé, subfusiforme (fig. 569), de 10-40 mm. de diamètre et de 8-120 mm. de longueur, souvent couvert de nodosités et renfermant de nombreuses loges ovoïdes (fig. 570),

dont le grand axe est généralement perpendiculaire à la surface de la cécidie. Cynipide hiver II-IV.

**Neuroterus macropterus** HARTIG 1848

Mayr, 1870, p. 10, n° 8, pl. I, 8, ⊕; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 79, ⊕; Kieffer, 1901, p. 667-668, pl. XVII, 6, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 189, n° 11, pl. XXVII, 9, ⊕. E-C,  
I.A-M.

— Sur un rameau, renflement accentué dont l'écorce éclatée livre passage à un nombre considérable de petites galles arrondies, obovales ou fusiformes (fig. 571), atteignant au plus le volume d'un noyau de cerise, uniloculaires, à épiderme lisse, tendre, mince, d'un vert pâle nuancé de rose ou de rougeâtre, lubrifié par une matière sucrée; au-dessous, coque dure à surface cannelée. Cette galle tombe en juillet. Cynipide printemps II.

**Dryocosmus cerriphilus** GIRAUD 1849

Giraud, 1859, p. 354-355, n° 1; Mayr, 1870, p. 10, n° 7, pl. I, 7, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 189-191, n° 12, pl. XXIII, 10, ⊕. A-H, I.

— Renflement à peine perceptible, semblable à celui que produit l'*Andricus trilineatus*. Voir n° 1294. Cynipide 1850

Cecconi, 1898, p. 232-233, n° 10; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 406. I.

— Petites bosselettes. . . . **Asterodiaspis quercicola** BOUCHÉ 1851

Szépligéti, 1895, p. 218, n° 97; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 468. A-H.

- |                                    |                              |                                                                           |                                      |                                                |  |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Pl. fe.                            | }                            | Cécidie formée aux dépens du pétiole ou de la nervure médiane. . . . . A. |                                      |                                                |  |
|                                    |                              | Cécidie déformant le bord du limbe ou bien largement ouverte. . . . . B.  |                                      |                                                |  |
|                                    |                              | Cécidie visible d'un seul côté du limbe,                                  | {                                    | de forme arrondie. . . . . C                   |  |
|                                    |                              |                                                                           |                                      | de forme lenticulaire ou en urne. . . . . D.   |  |
|                                    |                              | Cécidie visible sur les deux faces du limbe,                              | {                                    | également saillante des deux côtés. . . . . E. |  |
| inégalement saillante              | { sans ouverture. . . . . F. |                                                                           |                                      |                                                |  |
|                                    | { avec ouverture. . . . . G. |                                                                           |                                      |                                                |  |
|                                    | {                            | munie d'un opercule déhiscent                                             | { avec appendice central. . . . . H. |                                                |  |
| { sans aucun appendice. . . . . K. |                              |                                                                           |                                      |                                                |  |

A. — Renflement irrégulier. Voir n°s 1317-1318.

[**Andricus trilineatus** HARTIG] 1852

[**Andricus testaceipes** HARTIG] 1853

Szépligéti, 1890, p. 20; Trotter, 1897, p. 153, n° 3; Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 440, 441. A-H, I.

— Renflement irrégulier de la nervure médiane (parfois d'une nervure latérale), un peu allongé, faisant saillie sur le dessous du limbe. Chambre larvaire unique, longue, placée latéralement.

**Arnoldia** 1854

Trotter, 1898, p. 26-27, n° 39. I, SE, BU.


- Petite cécidie ovoïde, de 2-3 mm. de long, vert pâle ou jaunâtre, tigrée de taches rouges, comprise entre deux valves. Voir n°1326. [**Andricus ostreus** GIRAUD] 1855  
 Mayr, 1872, p. 723 ; Kieffer, 1899<sup>b</sup>, p. 393 ; 1901<sup>b</sup>, p. 433. *E-G.*
- Cécidies implantées parallèlement à leur longueur sur une nervure latérale, de 2 à 3 mm. de long sur 1 à 1,5 mm. de diamètre ; la nervure développe au voisinage de leur insertion une petite écaille. La cécidie est multiloculaire et présente des poils courts, simples, caducs, pluricellulaires unisériés. **Neuroterus** 1856  
 Massalongo, 1893, p. (162), n°125, pl. XVIII, 1 c, ⊕ ; 1897, p. 139, n° 54 bis ; Trotter, 1903, p. 43, n°112. *I, BU, SE.*
- Cécidie en forme de navette, de 2 mm. de long, enfoncée dans une fente de la nervure (fig. 573), d'abord vert pâle, puis plus ou moins rouge. **Neuroterus saltans** GIRAUD 1857  
 Giraud, 1859, p. 351-353, n° 3 ; Mayr, 1871, p. 13, n° 68, pl. VI, 68, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1905, fasc. XIII, n° 360, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIV, n° 347, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 186-188, n°10, pl. XXIII, 6-9, ⊕. *E-C, I.*
- B. — Cécidie ovoïde, de 2 mm. de longueur, fixée au bord du limbe. Voir n°1346. **Neuroterus albipes** SCHENCK 1858  
 Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 56-57, n° 21. *I.*
- Bord de la feuille replié ou enroulé par en bas, hypertrophié et d'un rouge vif ; ou encore sur le limbe, bosselure allongée, teinte de rouge-sang, faisant saillie à la face supérieure. Les larves jaunâtres vivent à la face inférieure de la feuille, qui est plus ou moins contournée. M.T. **Arnoldia** 1859  
 Trotter, 1899, p. 293, n° 21. *I.*
- Petite bosselure faisant saillie à la face supérieure ; légère dépression sur l'autre face. **Trioza** 1860  
 F. Löw, 1888, p. 40, n°123 ; Massalongo, 1895, p. 54, n° 33. *A-H, I.*
- Minime excavation à la face inférieure du limbe occupée par une larve couleur chair ; saillie très faible à la face opposée avec auréole décolorée. **Cécidomyide** 1861  
 Massalongo, 1904, p. 119, n° 33. *I.*
- Petite bosselure du limbe. . . . **Cécidomyide** 1862  
 Rübсаamen, 1902<sup>c</sup>, p. 308, n°81. *A-M.*

— Limbe fortement bombé (fig. 574-576) et présentant dans les concavités ainsi formées des poils de deux sortes, les uns longs et contournés, les autres plus courts, cylindriques ou en massue. *Erineum quercinum* PERS. \* **Eriophyes cerreus** NAL. 1863

Massalongo, 1891, p. 96, n° 30; Rübsaamen, 1900<sup>b</sup>, p. 231, fig. 18, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 314, ⊕; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIV, n° 348, ⊕.

\* Accompagné par *Eriophyes tristernalis* Nal., mais en plus petit nombre (Nalepa, 1898<sup>b</sup>, p. 235; 1900, p. 209-210, pl. IV, 1-2, p. 211, pl. IV, 5-6).

E-C,  
I, BU,  
A-M.



*Quercus Cerris*

*Quercus Cerris*

*Quercus Cerris*

*Neuroterus saltans* (n° 1844, 1857)

*Eriophyes cerreus* (n° 1863)

*Neuroterus lanuginosus* (n° 1867)

Fig. 572 (a). — D'ap. nat.

Fig. 574 (a). — D'ap. nat.

Fig. 577 (a). — D'ap. nat.

Fig. 573 (b). — D'ap. nat.

Fig. 575 (b). — D'ap. nat.

Fig. 578 (b). — D'ap. nat.

Fig. 576 (c). — D'ap. nat.

C. — A la face inférieure des feuilles, rattachée à une nervure secondaire par un pédicule court et mince, cécidie uniloculaire (fig. 579-580), arrondie, de 4-6 mm. de diamètre, vert clair, couverte de poils feutrés, à parois assez épaisses et spongieuses. Cynipide juillet-août I-V. **Chilaspis nitida** GIRAUD 1864

Giraud, 1859, p. 361-362, n° 9; Mayr, 1871, p. 9, n° 60, pl. V, 60, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VIII, n° 236, ⊕; 1907, fasc. XV, n° 414, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 191-192, n° 13, pl. XXIII, 2, ⊕.

A-H,  
A, I.

— Cécidie uniloculaire, de 1-1,5 mm. de diamètre (fig. 581), couverte de tubercules mous (fig. 582), d'un blanc de lait au début, plus tard vert jaunâtre tendre; à maturité, les tuber-



cules sont souvent d'un beau rouge. Cécidie rattachée à une nervure secondaire par un pédicule court et mince.

**Neuroterus minutulus** GIRAUD 1865

Giraud, 1859, p. 353, n° 4; Mayr, 1871, p. 14, n° 69, pl. VI, 69, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. I, n° 25, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 192, n° 14, pl. XXIII, 3-5, ⊕. A-II, I.

— A la face inférieure du limbe, cécidie semblable à la précédente, mais un peu aplatie (2-2,5 mm. de longueur sur 1,5-2 mm. de large), à surface blanchâtre ou rouge clair, couverte de tubercules rouge sombre serrés et pointus (fig. 599-600); une chambre larvaire limitée par des parois épaisses.

**Dryocosmus** 1866

Müllner, 1901, p. 527, pl. III, 7-8, ⊕.

A-II.

— Cécidie uniloculaire, de 4-5 mm. de diamètre, rattachée à une nervure par un pédicule très court et très mince, un peu moins haute que large (fig. 577), couverte de poils soyeux fins et assez longs (fig. 578); d'abord blanc grisâtre, puis mêlée de rose, de rouge ou même quelquefois de bleuâtre, la cécidie présente au sommet une légère dépression annulaire de laquelle les poils s'écartent; elle paraît en septembre et tombe en octobre. Cynipide mars II.

**Neuroterus lanuginosus** GIRAUD 1867

Giraud, 1859, p. 351, n° 2; Mayr, 1871, p. 12, n° 66, pl. VI, 66, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n° 212, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 192-193, n° 15, pl. XXIII, 1, ⊕. A-II, SE, I.

D. — Cécidie lenticulaire. . . . **Neuroterus lenticularis** OLIV. 1868

Rübsaamen, 1902 c, p. 308, n° 80.

A-M.

— Cécidie en forme d'urne. Voir n° 1341.

**Andricus urnæformis** MAYR 1869

Paszlavszyk, 1882, p. 154, n° 22.

A-II.

E. — Cécidie de la grosseur d'un pois, subsphérique, également saillante sur les deux faces de la feuille (fig. 583-584), translucide, verte, avec pilosité courte et peu serrée; elle est formée aux dépens de la partie subterminale d'une nervure latérale qui s'est dilatée dans tous les sens. Cynipide juin I.

**Dryocosmus nervosus** GIRAUD 1870

Giraud, 1859, p. 365-366, n° 3; Mayr, 1871, p. 18, n° 75, pl. VI, 75, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1905, fasc. XIII, n° 361, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 194, n° 16, pl. XIII, 3, ⊕. A-II.


— Cécidie ovoïde, faisant également saillie sur les deux faces du limbe (fig. 585), longue de 2 mm. et large de 1 mm., fixée

à une nervure latérale de telle sorte que son grand axe est parallèle au plan du limbe ; sa surface est couverte de longs poils simples et le bord de la feuille est découpé jusqu'à la galle. Quand la cécidie se trouve sur la nervure médiane, la feuille est en outre courbée. Cynipide mai-juin I.

**Andricus Schröckingeri** WACHTL 1871

Wachtl, 1876, p. 713, pl. XIV, 2-3, ⊕ ; Dalla Torre, 1893, p. 98.

A-H.



**Quercus Cerris**

- |                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Fig. 579, 580 (a) : <i>Chilaspis nitida</i> (n°1864).     | IM. KIEFF.  |
| Fig. 581, 582 (b) : <i>Neuroterus minutulus</i> (n°1865). | IM. KIEFF.  |
| Fig. 583, 584 (c) : <i>Dryocosmus nervosus</i> (n°1870).  | IM. KIEFF.  |
| Fig. 585 (d) : <i>Andricus Schröckingeri</i> (n°1871).    | IM. WACHTL. |
| Fig. 586 (e) : <i>Andricus crispator</i> (n°1877).        | IM. KIEFF.  |

— Renflement du parenchyme produisant une pustule circulaire de 2 mm. de diamètre offrant sur chacune des faces un petit disque à peine convexe ; une seule loge. **Cynipide** 1872

Mayr, 1882, p. (20) ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 80, note 1 ; 1901<sup>b</sup>, p. 439.

A-H.

— Pustule circulaire de 2-2,5 mm. de diamètre, très aplatie puisque son épaisseur totale ne dépasse pas 0,5 mm. ; sa couleur est à peine plus sombre que celle de la feuille ; au centre des deux faces convexes on aperçoit un petit tubercule. Une larve rouge pâle. **Cécidomyide** 1873

F. Löw, 1877, p. 33, n° 2 ; Schlechtendal, 1890, p. 18, n° 167.

A-H.

— Pustule semblable à la précédente. Une larve blanche.

**Arnoldia** 1874

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 466.

I.

— Cécidie subligneuse, visible sur les deux faces ; le dessous légèrement proéminent est revêtu d'une courte pubescence tandis que le dessus, glabre et jaunâtre, est muni d'un petit mucron de 1 mm. environ. Chambre larvaire unique, centrale.

**Arnoldia** 1875

Trotter, 1903, p. 40, n° 99, pl. I, 14<sup>a</sup> a. ⊕.

A-M.

F. — Cécidie de la grosseur d'un pois, très juteuse, à peine saillante à la face supérieure, située presque tout entière à la face inférieure.

[*Neuroterus baccarum* L.] 1876

Kieffer, 1901, p. 651.

si.

— Cécidie ellipsoïdale, haute de 2-2,5 mm., large de 1,5 mm., d'abord juteuse, verte ou rouge, présentant sur toute sa surface, mais plus abondamment à la face supérieure, où se trouve la plus grande partie de la galle, de nombreux poils étoilés, dressés, non courbés (fig. 586). La cécidie mûre est dure et jaunâtre. Cynipide juin I. *Andricus crispator* TSCHÉK 1877

Tschek, 1871, p. 798; Massalongo, 1904, p. 118-119, n° 32.

A-H.I.



*Quercus Cerris*

*Andricus Adleri* (n° 1878)

Fig. 587 (a). — D'ap. nat.

Fig. 588 (b). — D'ap. nat.

*Quercus Cerris*

*Dryomyia circinnans* (n° 1882)

Fig. 589 (a). — D'ap. nat.

Fig. 590 (b). — D'ap. nat.

Fig. 591 (c). — D'ap. nat.

*Quercus Cerris*

*Contarinia subulifera* (n° 1883)

Fig. 592 (a). — D'ap. nat.

Fig. 593 (b). — D'ap. nat.

— Cécidie semblable à la précédente (fig. 587-588), mais sa surface est brillante et porte deux sortes de poils, les uns simples, les autres étoilés, tous plus ou moins courbés. Cynipide juin I.

*Andricus Adleri* MAYR 1878

Mayr, 1871, p. 9, n° 61, pl. VII, 61, ⊕; 1880, p. 5-8; 1882, p. (15); Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VI, n° 127, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1905, fasc. XIII, n° 363, ⊕.

E-C.I.

— Galle subsemilenticulaire, peu apparente, de 2 mm. de diamètre environ, faisant saillie à la face inférieure; à la face

opposée, tache décolorée, souvent mucronée au centre. Larve blanchâtre. M.T.

**Perrisia** 1879

Massalongo, 1894<sup>b</sup>, p. 85, n° 9.

I.

— Petite cécidie ovoïde, longue de 1 mm. environ, fixée par un très court pédicule à la face inférieure du limbe qui montre sur l'autre face une minime callosité brune de 0,5 mm. de diamètre (fig. 601) ; la surface de la cécidie est couverte de poils cylindriques, pluricellulaires, longs de 3-5 mm. Souvent plusieurs galls sont réunies en une grosse masse de couleur rouge vineux.

[**Neuroterus**] 1880

Trotter, 1903<sup>b</sup>, p. 16-17, n° 45, fig. 6 7, ⊕.

I.

G. — A la face supérieure, saillie hémisphérique ou tronconique, lisse, glabre, jaunâtre, haute de 1-1,5 mm. et de 1,5-2 mm. de diamètre ; à la face inférieure, tube cylindrique long de 2-2,5 mm. portant un orifice terminal et garni de poils sur toute sa longueur ainsi qu'au bord de l'ouverture ; les parois assez dures de la cécidie sont deux fois aussi épaisses que le limbe normal. Larve jaune. M.T.

**Cécidomyide** 1881

F. Löw, 1878<sup>b</sup>, p. 399, n° 6, pl. IV, 7, ⊕ ; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. XXXVIII, 5, ⊕.

E-C.

— A la face inférieure, saillie orbiculaire, de 4-6 mm. de diamètre sur 2-2,5 mm. de hauteur (fig. 589), couverte de poils gris abondants groupés en faisceaux (fig. 590) ; elle présente, à la face supérieure (fig. 591), un orifice de 1 mm. de diamètre, entouré d'un bourrelet ; enfin la cavité larvaire, située au-dessous du plan du limbe, a une forme spiralée. Une larve. M.C.

**Dryomyia circinnans** GIRAUD 1882

Giraud, 1861, p. 475, pl. XVII, 2, ⊕ ; Mayr, 1871, p. 54, n° 78, pl. VI, 78, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 30, ⊕ ; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. XXXVIII, 3, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. X, n° 289, ⊕.

E-C, I,  
P-B,  
A-M.

— Cécidie en forme de corne mince, presque filiforme, à peu près glabre, un peu courbée (fig. 592), haute de 5 mm., faisant saillie à la face supérieure (fig. 593) ; à la face inférieure, dans le plan du limbe, on aperçoit un orifice fermé par des poils disposés sur son pourtour. Larve jaune. M.T.

**Contarinia subulifex** KIEFF. 1883

Giraud, 1861, p. 477 ; F. Löw, 1874<sup>b</sup>, p. 159, n° 6 ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. X, n° 290, ⊕ ; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. XXXVIII, 4, ⊕.

E-C.

H. — Cécidie aplatie, dure, presque ligneuse, de 4-5 mm de diamètre, formant à la face inférieure un disque épais de 2-3 mm. (fig. 594), un peu convexe au milieu, où se trouve en outre un petit tubercule saillant ; à la face supérieure, la galle apparaît sous la forme d'une pustule jaunâtre arrondie, à peine saillante, dont le centre est marqué par une pointe qui porte quelques poils (fig. 595). La partie inférieure, qui se détache à maturité (*opercule*), est couverte de poils sur toute sa surface, et c'est dans son épaisseur que se trouve la cellule larvaire. Larve rouge, solitaire. M.T. Adulte avril H.

*Arnoldia homocera* F.Löw 1884


F.Löw, 1877, p. 8-10, pl. I, 2, ⊕ ; Massalongo 1893, p. 122-124, n° 84, pl. XVIII, 2-3, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 28, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VIII, n° 234, ⊕.

*E.C.*  
*P-B.L.*



*Quercus Cerris*  
*Arnoldia homocera* (n° 1884)

Fig. 594 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 595 (b). — D'ap. nat.



*Quercus Cerris*  
*Arnoldia Szepielii* (n° 1886)  
*Dryocosmus* (n° 1866)  
*Neuroterus* (n° 1880)

Fig. 596, 597, 598 (a, b, c). — D'ap. nat.  
Fig. 599, 600 (d, e). — Im. MULLSER  
Fig. 601 (f). — Im. TROTTER



*Quercus Cerris*  
*Arnoldia cerris* (n° 1887)

Fig. 602 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 603 (b). — D'ap. nat.  
Fig. 604 (c). — D'ap. nat.

— Cécidie faisant saillie à la face supérieure sous la forme d'un cône jaunâtre, glabre, plus large que haut, à l'intérieur duquel est creusée la cavité larvaire ; dans le plan de la face

inférieure se trouve un *opercule* glabre de 2 mm. de diamètre, portant en son centre un appendice terminé en pointe mousse et garni, dans sa partie apicale seulement, de poils longs et dressés.

**Arnoldia** 1885

Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. XXXVIII, 10, ⊕ : 1901<sup>b</sup>, p. 464.

— Pustules circulaires très petites, éparées sur les feuilles (fig. 596-598) ; le dessous est muni en son centre d'une pointe très petite ; à maturité la partie centrale se détache, formant l'*opercule*. Larve rouge.

**Arnoldia Szepligetii** KIEFF. 1886

Trotter et Ceconi, 1900, fasc. II, n° 26, ⊕ : Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 310, ⊕. E-G,  
P-B, I, A-M.

K. — A la face supérieure de la feuille (fig. 603), cécidie conique de 3 mm. de diamètre à la base, de 1,5-2 mm. de hauteur, avec une pointe centrale, glabre, verdâtre, pâle au début, plus tard jaune ou brun-jaune ; à la face inférieure (fig. 602), où se formera l'*opercule*, disque de 5 mm. de diamètre, peu saillant, couvert de poils gris serrés (fig. 604). C'est dans la partie supérieure que se trouve la cavité larvaire, dont les bords sont mis à nu par la chute de l'*opercule*. Larve rouge.

**Arnoldia cerris** KOLLAR 1887

Girard, 1861, p. 471, pl. XVII, 1, ⊕ ; Mayr, 1871, p. 53, n° 77, pl. VI, 77, ⊕ ; F. Löw, 1877, p. 10, pl. I, 3, ⊕ ; Trotter et Ceconi, 1900, fasc. II, n° 27, ⊕ ; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. XXXVIII, 2, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 309, ⊕. E-C, I,  
P-B,  
A-M.

— A la face supérieure, pustule verdâtre, à peine saillante, de 2,5-3 mm. de diamètre, presque glabre ou couverte de longs poils brunâtres éparés ; à la face inférieure, où se formera l'*opercule*, saillie peu marquée de 3-5 mm. de diamètre, couverte de poils gris et contenant la cavité larvaire ; après la chute de l'*opercule*, le bord de la cavité est orné d'un anneau de poils gris. Larve rouge.

**Arnoldia** 1888

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 464.

— A la face supérieure, bossette de teinte jaunâtre, de 2 mm. de haut sur 1,5-2 mm. de diamètre ; à la face inférieure, dépression au fond de laquelle se trouve un *opercule* brun, entièrement glabre. Larve rouge.

**Arnoldia** 1889

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 465. — Cette cécidie est peut-être une forme anormale de celle engendrée par l'*Arnoldia cerris*.

**Quercus Cerris** L. var. **Lucombeana** HORT. (**Q. Cerris** × **Suber**)

- Ac.fr.** — Voir n°1809. . . . . **Callirhytis glandium** GIRAUD 1890  
Ormerod, 1878, p. 202-204, fig. 2-3, ⊕ ; Rolfe, 1883, p. 31-32. I-B.
- Ac.bg.** — Voir n°1840. . . . . **Andricus circulans** MAYR 1891  
Ormerod, 1878, p. 201-204. I-B.
- Voir n°1259. . . . . [**Dryophanta Taschenbergi** SCHL.] 1892  
Ormerod, 1877, p. 42-43, 1 fig., ⊕. I-B.

**Quercus Egilops** L.

- Ac.fr.** — Cécidie uniloculaire formée aux dépens du fruit et présentant des côtes longitudinales carénées. Voir n°1180.  
**Cynips calicis** BURGD. 1893  
Koch, 1873 ; Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 547 ; 1901<sup>b</sup>, p. 458.
- Cécidie brune se développant aux dépens de la membrane du gland. Voir n°1168. **Callirhytis glandium** GIRAUD 1894  
Kieffer, 1899<sup>b</sup>, p. 386 ; 1901<sup>b</sup>, p. 455. P-B.
- Ac.bg.** — Cécidie arrondie, uniloculaire, brune, de 15-18 mm. de diamètre, à surface glabre parsemée d'aspérités irrégulières. Voir n°1677. **Cynips tinctoria** OLIV. 1895  
Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 425. I-B.
- Pl.fe.** { Cécidie du limbe, largement ouverte. . . . . A.  
Cécidie visible seulement sur l'une des faces du limbe . . . . . B.  
Cécidie visible sur { faisant également saillie sur les deux faces. . C.  
les deux faces { faisant inégalement saillie sur les deux faces. . D.
- A. — Érinéum brun, hypophylle, situé dans une dépression du limbe ; poils unicellulaires, longs, contournés, variablement renflés à l'extrémité. **Eriophyide** 1896  
Trotter, 1903, p. 39, n°96. G.
- [*Erineum quercinum* PERS.]. Voir n°1313. **Eriophyes Carueli** CAN. 1897  
Nalepa, 1898, p. 11, n°17 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 471. I.

- B. — Cécidie fixée à une nervure et rappelant celle du *Neuroterus saltans* ; elle est ovoïdale, obtuse aux extrémités et revêtue d'une courte pubescence blanchâtre. **Neuroterus** 1898  
 Trotter, 1903, p. 43, n° 111. *G.*
- Cécidie hypophylle, sphérique (diamètre de 4-6 mm.), de consistance molle, fixée par un point à une nervure, revêtue d'une fine pubescence blanchâtre très courte au pôle apical et de couleur fauve ; chambre larvaire unique, centrale. **Neuroterus** 1899  
 Trotter, 1903, p. 44, n° 114. *G.*
- C. — Pustule elliptique, uniloculaire, solitaire le plus souvent, mesurant 1-1,5 mm. de diamètre, de couleur jaunâtre ou brune, surtout à la face supérieure. Trou de sortie situé à une extrémité de la galle. **Andricus** 1900  
 Trotter, 1903, p. 42, n° 105. *G.*
- D. — Cécidie rappelant celle de l'*Arnoldia homocera*, mais en différant par la région hypophylle. **Arnoldia** 1901  
 Trotter, 1901<sup>c</sup>, p. 70, n° 14. *A-M.*
- Voir n° 1887. . . . . **Arnoldia cerris** KOLLAR 1902  
 Trotter, 1901<sup>c</sup>, p. 70, n° 15 ; 1903, p. 40-41, n° 101 ; Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 49, note 1. *G, A-M.*
- Cécidie subligneuse consistant, à la face supérieure, en une éminence presque hémisphérique, jaunâtre, glabre ; sur l'autre face se remarque un léger épaissement au centre duquel se trouve un petit mucron, tubuleux, droit ou recourbé, long de 1-2 mm. Chambre larvaire unique, centrale. **Arnoldia** 1903  
 Trotter, 1903, p. 40, n° 98, pl. I, 14<sup>a</sup>, b, ⊕. *G.*
- Cécidie saillante surtout à la face supérieure où elle adhère fortement ; elle est uniloculaire, arrondie, de 1-2 mm. de diamètre et revêtue de poils fasciculés semblables à ceux qui se trouvent à l'état normal sur le limbe ; une petite papille signale la galle sur la face inférieure. **Cécidomyide** 1904  
 Trotter, 1901<sup>c</sup>, p. 70-71, n° 16. *A-M.*



**Quercus Egllops** L. var. **græca** GÜRKE (**Q. græca** KOTSCHY)

- Pl.fe.** — Érinéum occupant une boursoufflure saillante sur la face supérieure. **Ériophyide** 1905  
 Rübsaamen, 1902, p. 15, n° 4; 1902 c, p. 304-307, fig. III, ⊕. *G.*  
 — Voir n° 1887. . . . . [**Arnoldia cerris** KOLLAR] 1906  
 Rübsaamen, 1902, p. 15, n° 3. *G.*

**Quercus Egllops** L. var. **Ungeri** KOTSCHY

- Pl.fe.** — Voir n° 1884. . . . . [**Arnoldia homocera** F. LÖW] 1907  
 Trotter, 1901 c, p. 71, n° 19. *A.-M.*  
 — Voir n° 1904. . . . . **Cécidomyide** 1908  
 Trotter, 1901 c, p. 71, n° 20. *A.-M.*

**Quercus Egllops** L. var. **Gedeli** BALANSA et KOTSCHY

- Pl.fe.** — Voir n° 1887. . . . . **Arnoldia cerris** KOLLAR 1909  
 Trotter, 1901 c, p. 71, n° 17. *A.-M.*

**Quercus Egllops** L. var. **macrolepis** BOISSIER  
(**Q. macrolepis** KOTSCHY)

- Pl.fe.** — Cécidie visible seulement à la face inférieure, où elle n'est attachée que par un point, couverte de longs poils blanchâtres à la base, teintée de brun-rouge au sommet. **Cynipide** 1910  
 Rübsaamen, 1899, p. 240, n° 29. *G.*  
 — A la face inférieure, petit épaissement avec pilosité blanche auquel correspond, à la face supérieure, une saillie faiblement marquée, parfois légèrement mucronée en son centre, teintée de brun jaunâtre. [**Arnoldia cerris** KOLLAR] 1911  
 Rübsaamen, 1899, p. 239, n° 28. *G.*  
 — A la face inférieure, cécidie arrondie, de 2-3 mm. de diamètre, avec nombreux poils fins jaune-brun; à la face supérieure, saillie nettement convexe et lisse. **Cécidomyide** 1912  
 Karsch, 1880, p. 303, n° 23. *G.*

**Quercus Egilops** L. var. **vallonea** (**Q. vallonea** KOTSCHY)

- Pl.fe.** — Cécidie en forme de pustule, présentant à la face inférieure un feutrage jaune ; à la face supérieure, l'ostiole est limité par un bourrelet noirâtre légèrement velu. [**Cécidomyide**] 1913  
 Rübsaamen, 1899, p. 250-251, n° 71, pl. II, 4, ⊕. A-M.

**Quercus Egilops** L. var. **ithaburencis** (**Q. ithaburencis** DECAISNE)

- Ac.bg.** — Cécidie uniloculaire, sphérique, de la grosseur d'un pois, à surface rugueuse, à paroi dure et ligneuse, située sur les bourgeons axillaires hypertrophiés et lignifiés ; la cavité galleuse est spacieuse et à parois irrégulières. **Hyménoptère** 1914  
 Focke, 1895, p. 498-500, 2<sup>e</sup>, pl. XIV, 2, ⊕ ; 1897, p. 110-112, pl. VII, 3, ⊕. SY.

- Pl.fe.** — Petite cécidie pustuleuse, formant à la face supérieure du limbe une saillie discoïde de 2,5 mm. de diamètre, à surface lisse marquée d'un mucron central. **Cécidomyide** 1915  
 Focke, 1895, p. 500-501, 3<sup>e</sup>, pl. XIV, 1, ⊕ ; 1897, p. 113-114, pl. VII, 1-2, ⊕. SY.

- Cécidie ayant la forme d'une petite pustule munie d'un opercule. Voir n° 1886. [**Arnoldia Szepligetii** KIEFF.] 1916  
 Trotter, 1901<sup>e</sup>, p. 71, n° 18. SY.


- Érinéum à la face inférieure du limbe. Voir n° 1544. **Eriophyes ilicis** CAN. 1917  
 Focke, 1892, p. 232 ; Nalepa, 1898, p. 11, n° 18. SY.

**Quercus macedonica** DC. (**Q. ostryaefolia** BORBAS)

- Ac.fl.** — Cécidie subligneuse, provenant de la transformation d'une fleur, rarement solitaire et en forme de disque, le plus souvent agglomérée en un amas arrondi de 20 mm. de diamètre (fig. 605) et alors comprimée de façon à devenir tétraédrique (hauteur 10 mm., largeur de la région externe 10-20 mm.). La surface de la galle est brillante, jaune ou rouge. Une grande cavité existe dans la partie élargie de la cécidie (fig. 606) et surmonte les loges larvaires, au nombre de 2 à 4, placées

dans un petit mamelon conique qui occupe le sommet du tétraèdre. **Andricus Cecconii** KIEFF. 1918

Cecconi, 1902<sup>c</sup>, p.630-632; Trotter et Cecconi, 1902, fasc.VIII, n°178, ⊕; Kieffer, 1902<sup>d</sup>, p.639-640, n°2; 1905, p.557-559, pl.VIII.1-2, ⊕. I.



Quercus macedonica  
 Fig.605,606 (a, b) : *Andricus Cecconii* (n°1918) . . . . . D'ap. nat.  
 Fig.607,608 (c, d) : *Andricus Zappellai* (n°1920). . . . . Im. KIEFF.

— Cécidie ovoïdale, charnue, de 6-7 mm. de hauteur, d'abord verte puis rouge violacé. Voir n°1812. **Andricus grossulariæ** GIRAUD 1919

Cecconi, 1901, p.740, n°74; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.451; Trotter et Cecconi, 1907, fasc.XVIII, n°432, ⊕. I.

— Chaton transformé en une masse rouge, charnue, longue de 5-13 mm., épaisse de 4-6 mm., composée d'une série de renflements (fig.607) contenant chacun une loge larvaire à paroi ligneuse mince (fig.608); surface sans trace de fleurs, couverte en partie de poils gris. **Andricus Zappellai** KIEFF. 1920

Cecconi, 1902<sup>c</sup>, p.633; Kieffer, 1905, p.555, pl. VIII, 3-4, ⊕. I.

**Ac.ti.** — Renflement terminal d'une pousse. Voir n°1819. **[Andricus multiplicatus** GIRAUD 1921

Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p.740, n°75; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.408-409. I.

**Ac.bg.** — Cécidie dure, de 10 mm. de diamètre. Voir n°1833. **Synphrus politus** HARTIG 1922

Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p.740, n°76; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.423. I.

- Pl. fe. { Cécidie déformant le bord du limbe. . . . . A.  
 { Cécidie formée aux dépens d'une nervure . . . . . B.  
 { Cécidie altérant la surface du limbe. . . . . C.

A. — Lobe replié par en bas. Voir n°1306.

**Macrodiplosis dryobia** F.LÖW 1923

Cecconi, 1902<sup>c</sup>, p. 621.

I.

— Petite cécidie ovoïde (2 mm. sur 1 mm.), fixée au bord du limbe. Voir n°1346.

**Neuroterus albipes** SCHENCK 1924

Cecconi, 1902<sup>c</sup>, p. 634; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 434.

I.

B. — Sur la nervure médiane ou sur une nervure secondaire, épaissement, de la taille d'un grain d'orge, faisant saillie à la face supérieure du limbe, où se produit une extroflexion; feuille recourbée vers la face supérieure.

**Cécidomyide** 1925

Baldrati, 1900, p. 59, n°142; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 462.

I.

— Cécidie ellipsoïdale (2 mm. sur 1,5 mm.), largement arrondie aux deux extrémités, mate, de la couleur de la nervure sur laquelle elle est insérée dans le sens de la longueur; elle est bordée d'un côté par une valve, de l'autre par un enfoncement semi-circulaire contigu à un bourrelet.

**Cynipide** 1926

Cecconi, 1902<sup>c</sup>, p. 633-634; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 433.

I.

C. — Cécidie en grain de raisin. Voir n°1355.

**Neuroterus baccarum** L. 1927

Cecconi, 1904, p. 84.

I.

— Cécidie munie d'un opercule. Voir n°1884.

**Arnoldia homocera** F.LÖW 1928

Rübsaamen, 1902, p. 16, n°21.

P-B.

— Cécidie munie d'un opercule. Voir n°1887.

**Arnoldia cerris** KOLLAR 1929

Cecconi, 1901<sup>e</sup>, p. 736, n°37; Rübsaamen, 1902, p. 16, n°20; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIV, n°350, ⊕.

I, P-B.

— Cécidie sans opercule, à chambre larvaire spiralée. Voir n°1882.

**Dryomyia circinnans** GIRAUD 1930

Cecconi, 1901<sup>e</sup>, p. 736, n°38; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 467-468.

I.

— Soulèvement hémisphérique à la face supérieure du limbe, de la taille d'un grain de chènevis. **Ériophyide** 1931  
Stefani, 1907, p. 11. I.

**Quercus Look** KOTSCHY

**Pl. fe.** — Cécidie assez semblable à celle décrite au n° 1882, mais en différant par la région inférieure qui est réniforme, irrégulière et pauvrement pubescente. [**Dryomyia circinnans** GIRAUD] 1932  
Trotter, 1901<sup>c</sup>, p. 73, n° 32. A-M.

**Quercus libani** OLIV.

**Ac. bg.** — Cécidie ligneuse, arrondie. Voir n° 1833. **Synophrus politus** HARTIG 1933  
Trotter, 1903, p. 44-45, n° 116. A-M.

— Petite cécidie semblable à celle de l'*Andricus circulans* ou à celle de l'*A. luteicornis* (située sur un appendice à la base de la galle du *Synophrus politus*). **Andricus** 1934  
Trotter, 1903, p. 42, n° 106. A-M.

**Pl. fe.** { Cécidie largement ouverte ou altérant une nervure. . . . . A.  
Cécidie également saillante sur les deux faces du limbe ou en forme  
de pustule. . . . . B.  
Cécidie inégalement saillante sur les deux faces du limbe. . . . . C.

**A.** — Érinéum brun, hypophylle, situé dans une dépression plus ou moins profonde du limbe ; poils unicellulaires, allongés, contournés, diversement renflés à l'extrémité. **Ériophyide** 1935  
Trotter, 1901<sup>c</sup>, p. 72, n° 27 ; 1903, p. 39, n° 96. A-M.

— Nervure secondaire légèrement épaissie. . . . **Cynipide** 1936  
Trotter, 1901<sup>c</sup>, p. 72, n° 24. A-M.

— Cécidie hypophylle, un peu aplatie, subligneuse, uniloculaire, revêtue d'abondants poils blancs. Voir n° 1867. **Neuroterus lanuginosus** GIRAUD 1937  
Trotter, 1903, p. 44, n° 113. A-M.

- B. — Cécidie ovoïde, longue de 2 mm., pubescente, à parois minces. Voir n°1871. **Andricus Schröckingeri** WACHTL 1938  
Trotter, 1903, p. 42, n°107. A-M.
- Pustule circulaire de petite taille, munie d'un opercule. Voir n°1886. **Arnoldia Szepligetii** KIEFF. 1939  
Trotter, 1901 c, p. 72, n° 26. A-M.
- C. — Cécidie munie d'un opercule. Voir n°1887. **Arnoldia cerris** KOLLAR 1940  
Trotter, 1901 c, p. 72, n° 25. A-M.
- Épaississement rougeâtre, discoïdal, moins saillant à la face supérieure que sur l'autre, présentant un mucron central sur ses deux faces et rappelant un peu la galle de l'*Arnoldia homocera* (n°1884). **Cécidomyide** 1941  
Trotter, 1903 c, p. 31. A-M.
- Cécidie uniloculaire, ligneuse, à ostiole épiphyllé et chambre larvaire spiralée. Voir n°1882. **Dryomyia circinnans** GIRAUD 1942  
Trotter, 1903, p. 41-42, n°104. A-M.
- Quercus libani** OLIV. var. **vesca** BOISSIER (**Q. vesca** KOTSCHY)
- Pl. fe. — Voir n°1887. . . . . **Arnoldia cerris** KOLLAR 1943  
Trotter, 1901 c, p. 73, n° 30. A-M.
- Cécidie rappelant celle de l'*Arnoldia homocera*, mais en différant par la région hypophylle. **Arnoldia** 1944  
Trotter, 1901 c, p. 72, n° 28. A-M.
- Cécidie assez semblable à celle qui est décrite au n°1882, mais en différant par la région inférieure qui est très peu velue. [**Dryomyia circinnans** GIRAUD] 1945  
Trotter, 1901 c, p. 72-73, n° 29. A-M.
- Cécidie semblable à celle qui est décrite au n°1904. **Cécidomyide** 1946  
Trotter, 1901 c, p. 73, n° 31. A-M.

**Quercus Pseudo-Suber** SANTI

- Ac.ti.** — Renflement de l'extrémité d'une pousse avec agglomération de feuilles et de cécidies ovoïdales. Voir n°1819.  
**Andricus multiplicatus** GIRAUD 1947  
 Cecconi, 1900, p.234, n°15 ; 1904<sup>b</sup>, p.182, n°17 ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc.XV, n°351, ⊕. I.
- Ac.bg.** — Cécidie sphérique, dure, mesurant 10 mm. de diamètre. Voir n°1833.  
**Synophrus politus** HARTIG 1948  
 Cecconi, 1897, p.444 ; Trotter, 1898, p.17. I.  
 — Cécidie haute de 6 mm., large de 11 mm. et épaisse de 7 mm., entourant en partie la base d'une pousse ; surface brunâtre, raboteuse ou finement ridée, couverte d'une pubescence éparsée, très fine ; paroi épaisse ; galle interne de 3 mm. de diamètre, située vers la base. Cynipide mars II.  
**Cynips gracilicornis** KIEFF. 1949  
 Kieffer, 1905, p.577-578, pl.XXI, 1, ⊕. I.
- Pl.ti.** — Renflement du rameau, près du sommet. Voir n°1300.  
**[Pelatea festivana HÜBNER]** 1950  
 Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.401-402. I.  
 — Renflement pluriloculaire. Voir n°1848.  
**[Neuroterus macropterus HARTIG]** 1951  
 Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p.54-55, n°15 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.406. I.  
 — Cécidie subglobuleuse, de 20 mm. environ de diamètre, à surface couleur de liège couverte de poils étoilés et de verrues arrondies, espacées ; elle est située latéralement par rapport au rameau auquel elle adhère sur une grande partie de sa longueur.  
**[Aphelonyx cerricola GIRAUD]** 1952  
 Cecconi, 1897, p.444 ; Trotter, 1898, p.17 ; Massalongo, 1906, p.30, n°52, fig.1, ⊕. I.
- Pl.fe.** { Cécidie déformant le pétiole ou la nervure médiane..... A.  
 { Cécidie du limbe, largement ouverte..... B.  
 { Cécidie du limbe, visible sur une face seulement..... C.  
 { Cécidie visible sur les deux faces du limbe..... D.
- A.** — Renflement irrégulier du pétiole ou de la nervure médiane. Voir n°1316.  
**[Heliozela stanneella FISC. v. R.]** 1953  
 Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p.60, n°28 ; 1904<sup>b</sup>, p.182, n°18. I.

- Cécidie ovoïde, enfoncée dans une fente longitudinale de la nervure médiane. Voir n°1857. **Neuroterus saltans** GIRAUD 1934  
 Trotter, 1899, p. 296-297, n° 27; Cecconi, 1901 c, p. 55, n° 16. I.
- Cécidie ellipsoïdale munie d'une valve et fixée à la nervure médiane ou à une nervure secondaire. Voir n°1926. **Cynipide** 1935  
 Cecconi, 1902 b, p. 353-354, n° 27. I.
- Renflement fusiforme à peine apparent de la nervure médiane (parfois d'une nervure latérale). **Arnoldia** 1936  
 Cecconi, 1901 c, p. 51, n° 7; Trotter, 1901 d, p. 371, n° 35. I.
- B. — Érinéum d'ordinaire situé à la face supérieure, blanchâtre puis brun-fauve; les poils cylindriques, allongés, terminés en pointe sont diversement recourbés. *Erineum pseudosuberis* CORDA. **Ériophyide** 1937  
 Corda, 1870, p. 3, n° 9, pl. 1, 9, ⊕; Trotter, 1900 c, p. 198, n° 13. I.
- Fossette du limbe . . . . . **Trioza** 1938  
 Trotter, 1901 d, p. 371, n° 36.
- C. — Cécidie arrondie, couverte de petits tubercules et ne dépassant pas la grosseur d'une tête d'épingle. Voir n°1865. **Neuroterus minutulus** GIRAUD 1939  
 Trotter, 1899, p. 296, n° 26; Cecconi, 1904 b, p. 182-183, n° 19. I.
- Cécidie arrondie et lisse, atteignant 8-10 mm. de diamètre. Voir n°1323. **Dryophanta pubescentis** MAYR 1960  
 Kieffer, 1901 b, p. 446. I.
- Cécidie un peu aplatie, de 4-5 mm. de diamètre, couverte de longs poils soyeux. Voir n°1867. **Neuroterus lanuginosus** GIRAUD 1961  
 Stefani, 1907, p. 11. I.
- Cécidies sphériques, déprimées, de 1,5 mm. de diamètre, couvertes de poils blancs longs et denses, alignées de chaque côté d'une nervure, à la face inférieure du limbe. **Cynipide** 1962  
 Cecconi, 1902 b, p. 353, n° 26; Kieffer, 1901 b, p. 471. I.
- D. — Cécidie pustuleuse, également saillante sur les deux faces du limbe. Voir n°1558. **Andricus coriaceus** MAYR 1963  
 Cecconi, 1902 b, p. 353, n° 24; Kieffer, 1901 b, p. 439. I.



— Pustule brune, à peine saillante sur l'une et l'autre face, présentant à la face inférieure un ombilic central ; à maturité, il y a déhiscence d'un opercule de forme circulaire ayant pour centre cet ombilic. M.T.

**Arnoldia Szepligetii** KIEFF. 1964

Trotter, 1899, p. 297, n° 28 ; Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 51, n° 6.

I.

— Cécidie à peine saillante à la face supérieure, où elle s'ouvre à maturité par la déhiscence d'un opercule circulaire ; elle apparaît à la face opposée comme une saillie discoïde, couverte de poils nombreux, de 5 mm. de diamètre sur 2 mm. de hauteur. M.C.

**Dryomyia circinnans** GIRAUD 1965

Massalongo, 1893, p. (126), n° 87 ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VI, n° 130, ⊕.

I.

— Cécidie apparaissant à la face supérieure sous la forme d'une petite saillie de 1-2 mm. de haut, hémisphérique, avec une petite pointe, et se montrant à la face inférieure sous la forme d'un couvercle plan, tombant à maturité et couvert de poils bien développés.

**Arnoldia cerris** KOLLAR 1966

Massalongo, 1893, p. (125), n° 86, pl. XXXVI, 4-6, ⊕ ; Cecconi, 1900, p. 232, n° 7.

I.

### **Quercus coccifera** L.

(y compris les variétés *vera* et *imbricata*)

**Ac.fl.** — L'axe d'un chaton mâle présente un renflement fusiforme, rouge ou vert, faiblement pileux, qui peut atteindre 15 mm. de long sur 6-7 mm. d'épaisseur (fig. 609-610) et à la surface duquel se détachent en blanc jaunâtre les fleurs mâles plus ou moins déformées. Cynipide mai-juin I.

**Plagiotrochus fusifex** MAYR 1967

P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 17, n° 2, pl. I, 28, ⊕ ; Houard, 1901<sup>d</sup>, p. 705, n° 46 ; 1903<sup>e</sup>, p. 229-233, fig. 139-145, ⊕.

F, E, P,  
AL.

— Petite cécidie dure, conique, formée aux dépens d'une étamine (fig. 613-614) et portant sur le côté une demi-anthère atrophiée ; surface glabre, jaune verdâtre.

**Cynipide** 1968

Houard, 1901<sup>d</sup>, p. 705-706, fig. 8-10, ⊕ ; 1902, p. 89-90, fig. 1-2, ⊕.

AL.

**Ac.ti.** — A l'extrémité d'un rameau, renflement uniloculaire, fusiforme, ligneux, de la couleur de l'écorce et de 8-10 mm. de longueur sur 4-5 mm. d'épaisseur.

**Cynipide** 1969

Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 84, n° 72 ; Tavares, 1900, p. 103, n° 222.

E, P.

— Rameau raccourci et transformé en une cécidie ligneuse, irrégulière, tordue, pluriloculaire, de 4-6 mm. de longueur.

**Cynipide** 1970

Trotter, 1902, p. 123.

*E.*

**Ac.bg.** — A l'intérieur d'un bourgeon, qui, à l'extérieur, ne diffère en rien des bourgeons normaux, petite cécidie ovoïde de 2 mm. de longueur.

**Cynipide** 1971

Kieffer, 1901 b, p. 416-417.

*F.*

— Cécidie ovoïde (1,5 mm. sur 1 mm.) semblable à celle de l'*Andricus luteicornis* : uniloculaire, paroi mince, large orifice d'éclosion situé près du sommet. Voir n° 1606.

**Cynipide** 1972

Tavares, 1905, p. 56.

*P.*

— Cécidie uniloculaire, ellipsoïdale (1,5-1,8 mm. sur 0,8), à surface glabre, lisse et de teinte vermillon ; sa base est enveloppée par les écailles du bourgeon ; cavité larvaire spacieuse, limitée par une paroi subligneuse mince. Trou d'éclosion terminal.

[**Andricus Mayeti** KIEFF.] 1973

Tavares, 1905, p. 56, pl. XII, 4, ⊕.

*P.*

— Cécidie ayant la forme d'un gros bourgeon, semblable à celle que produit l'*Andricus fecundator*. M.T. Adulte mai II.

**Contarinia cocciferæ** TAVARES 1974

Trotter, 1899 b, p. 199, n° 6 ; 1901, p. 155, n° 53 ; 1904, p. 15 ; Tavares, 1900, p. 72-74, n° 125, pl. II, 8, ⊕ ; 1905, p. 55.

*E, P,*  
*P-B, MA.*

— A la place d'un bourgeon, grosse cécidie brune, sphérique, de 15-30 mm. de diamètre, portant sur sa partie supérieure des nodosités disposées en couronne. Cynipide février-mars II.

**Cynips quercus-tozæ** BOSC 1975

Kieffer, 1897 b, p. 81 ; 1901 b, p. 424.

*E-S.*

**Pl.ti.** — Cécidie unilatérale en forme de cône surbaissé (2 mm. de hauteur sur 2 mm. de diamètre à la base et 0,5-0,8 mm. de largeur à la pointe), avec ouverture apicale ; une chambre larvaire basilaire ou plusieurs. M.C. Diptère mars-avril II.

**Contarinia luteola** TAVARES 1976

Tavares, 1900, p. 72, n° 124 ; 1905, p. 54.

*P.*

— Renflement allongé, fusiforme (15 mm. sur 5 mm.), de la

couleur de l'écorce, à surface lisse, contenant de nombreuses cellules ovoïdes de 1,5-2 mm. de long, éparses dans la couche ligneuse. Cynipide automne I, en général mars-avril II.


**Plagiotrochus Kiefferianus TAVARES** 1977

TAVARES, 1900, p. 48-49, n° 68, pl. II, 9-19, ⊕ ; 1905, p. 53 ; Trotter, 1902, p. 123 ; 1903, p. 47, n° 123 ; 1904<sup>b</sup>, p. 15. *E, P, G, MA.*

— Renflement piriforme ou ovoïde (10-25 mm. sur 6-10 mm.), contenant plusieurs cavités larvaires alignées dans la moelle (fig. 611-612).

**[Dryocosmus Fonscolombi KIEFF.]** 1978

Kieffer, 1901, p. 612, pl. XXI, 5, ⊕ ; TAVARES, 1905, p. 53-54, pl. IV, 6, ⊕. *P.*



*Quercus cocifera*

*Plagiotrochus fusifer* (n° 1967)

*Dryocosmus Fonscolombi* (n° 1978)

Fig. 609, 610 (a, b). — D'ap. nat.

Fig. 611, 612 (c, d). — Im. KIEFF.

*Quercus cocifera*

*Cynipide* (n° 1968)

Fig. 613 (a). — D'ap. nat.

Fig. 614 (b). — D'ap. nat.

*Quercus cocifera*

*Dryomyia cocifera* (n° 1997)

Fig. 615 (a). — D'ap. nat.

Fig. 616 (b). — D'ap. nat.

Fig. 617 (c). — D'ap. nat.

— Cécidie cylindrique ou ellipsoïdale formée par le renflement du rameau.

**[Dryocosmus ramulorum FONSC.]** 1979

Boyer de Fonscolombe, 1832, p. 196, n° 14 ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 83, n° 70 bis. *F.*

— Renflement irrégulier des rameaux (2-3 mm. sur 1 mm.). Voir n° 1294.

**[Andricus trilineatus HARTIG]** 1980

Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p. 440 ; TAVARES 1905, p. 53. *F, E, P.*

— Renflement un peu unilatéral, subglobuleux, d'un diamètre de 5-8 mm. ; cavité larvaire arrondie, de 2 mm. environ de diamètre.

**Cynipide** 1981

Trotter, 1903, p. 46, n° 122. *G.*

HOUBARD, *Zoocécidies*.

- Pl. fe. { Cécidie déformant le pétiole ou la nervure médiane..... A.  
 { Cécidie du limbe, largement ouverte ou bien visible sur une seule face..... B.  
 { Cécidie visible sur les deux faces { saillies égales sur les deux faces..... C.  
 { saillies inégales sur les deux faces..... D.

A. — Renflement noueux de la grosseur d'un grain de chènevis. Voir nos 1317-1318. [Andricus trilineatus HARTIG] 1982  
 [Andricus testaceipes HARTIG] 1983

Kieffer, 1897 b, p. 84, n° 73, pl. XXI, 4, ⊕; 1900 b, p. 440, 441. F. E. G.

— Nervure médiane arrêtée dans son développement en longueur, portant à son extrémité une cécidie uniloculaire, glabre, un peu fusiforme ; limbe incisé et contourné.

[Andricus Schroeckingeri WACHTEL] 1984

Trotter, 1903, p. 123. E.

B. — Sur l'une des faces, généralement sur la face supérieure, bosselure très marquée, à laquelle correspond à la face opposée une profonde dépression contenant un amas de poils bruns, feutrés, les uns très longs et fortement courbés, hyalins, atténués à la pointe, les autres plus courts, cylindriques ou présentant un léger renflement médian ou terminal. *Erineum impressum* CORDA. *Erineum cocciferum* CASTAGNE.

**Eriophyes ilicis** CAN. 1985

Corda, 1840, p. 3, n° 8, pl. I, 8, ⊕; Rübssaamen, 1900 b, p. 215, n° 19, fig. 14, ⊕; Nalepa, 1903, p. 293. B-M.

— A la base de la nervure médiane, amas de poils anormaux étoilés dont les rayons présentent ou non des renflements ; limbe non bosselé.

**Ériophyide** 1986

Rübssaamen, 1902, p. 15, n° 10; 1902 c, p. 302, n° 4, p. 305 et p. 306, fig. JJ, KK, ⊕. P-B.

— Petite cécidie ovoïde, insérée sur une nervure, entre deux expansions lamelleuses de cette nervure. Voir n° 1326.

**Andricus ostreus** GIRAUD] 1987

Kieffer, 1897 b, p. 85, n° 75; Gatta, 1901, p. 346-347. E.

— Cécidie subcylindrique, dure, de 4-5 mm. de diamètre, à parois ligneuses, présentant une seconde cavité au-dessus de la chambre larvaire. Voir n° 1329. **Dryophanta disticha** HARTIG 1988

Kieffer, 1897 b, p. 85. E-S.

- C. — Cécidie de la grosseur et de la forme d'un pois, glabre, généralement teintée de rouge vif, juteuse : au centre se trouve une galle interne, à parois minces, rattachée au parenchyme externe par des fibres blanches, rayonnantes. Cynipide avril-juin I. **Dryocosmus australis** MAYR 1989  
Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 84, note 1, pl. XXI, 7-8, ⊕ ; Houard, 1901<sup>d</sup>, p. 706, n° 48. *E, AL.*
- Cécidie ellipsoïdale, charnue, multiloculaire, d'un rouge brillant, pouvant occuper tout le limbe et ne laisser subsister que les dents épineuses du bord. **Plagiotrochus ilicis** FABR. 1990  
**Plagiotrochus ilicis** FABR. var. **Emeryi** MAYR 1991  
**Plagiotrochus ilicis** FABR. var. **Lichtensteini** KIEFF. 1992  
Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 84, n° 74, pl. XXI, 3, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 50. *B-M.*
- Pustule circulaire, de 2-2,5 mm. de diamètre, de 1 mm. de hauteur, de la même couleur que la feuille ou un peu plus pâle ; trou de sortie latéral. Cynipide mai I ou mars II.  
**Andricus coriaceus** MAYR 1993  
**Andricus coriaceus** MAYR var. **barrensis** TAVARES 1994  
Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 85, n° 75, pl. XXI, 1, ⊕ ; Houard, 1901<sup>d</sup>, p. 706, n° 49 ; Tavares, 1905, p. 52. *E, P, AL.*
- Pustule elliptique, longue de 1-1,5 mm., solitaire ou concrescente, colorée en brun à la maturité ; trou de sortie situé à une extrémité. [**Andricus pseudococcus** KIEFF.] 1995  
Trotter, 1903, p. 45-46, n° 119. *E, G.*
- Cécidie ovoïdale, longue de 1-1,5 mm., jaunâtre, légèrement pubescente, située au bord du limbe qui est plus ou moins incisé. [**Neuroterus albipes** SCHENCK] 1996  
Trotter, 1903, p. 46, n° 120. *G.*
- D. — Cécidie en forme de poche, s'ouvrant à la face supérieure (fig. 616) par une fente dont les bords sont étroitement rapprochés dans toute leur longueur, sauf au voisinage de l'une des extrémités où ils s'écartent pour laisser entre eux une ouverture circulaire ; la poche, qui fait fortement saillie à la face inférieure (fig. 615), est comprimée latéralement et présente un réseau de nervures très accentué. Une seule loge (fig. 617). M.C. Diptère avril II. **Dryomyia cocciferæ** MARCHAL 1997  
P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 17-19, n° 3, pl. I, 18-27, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 51. *E, P, AL.*
- Cécidie de forme cylindrique, très saillante à la face supé-

rière du limbe où elle se présente sous la forme d'un tube glabre, vert ou couleur paille, haut de 0,5-0,6 mm., entouré à la base par une zone circulaire de 2-3 mm. de diamètre; une petite élévation se remarque à la face opposée. M.C. Diptère mars-avril II. **Contarinia luteola** TAVARES

1998

TAVARES, 1903, p. 103, n° 223; 1902, p. 128-130, n° 297; 1905, p. 50.

P.

— Cécidie semblable à la précédente, n'en différant que par un tube conique, rarement droit, long de 1,5 mm., toujours situé au milieu de la face inférieure; une élévation courte (0,5 mm.) se remarque sur l'autre face. Chambre larvaire située dans le parenchyme. [**Contarinia subulifex** KIEFF.]

1999

TAVARES, 1905, p. 50, n° 97; TAVARES, 1907<sup>b</sup>, pl. III, 4-10, ⊕.

P.

**Quercus coccifera** L. var. **integrifolia** LAGUNA

Pl. fe. — Voir n° 1985. . . . . **Ériophyide** 2000

Rübsaamen, 1900<sup>b</sup>, p. 215, n° 20.

G.

**Quercus coccifera** L. var. **palestina** BOISSIER  
(**Q. palestina** KOTSCHY)

Pl. fe. — Érinéum avec éleveure. . . . . **Ériophyide** 2001

Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 313, n° 100, fig. LL, ⊕.

SY.

— Cécidies ovoïdes situées sur la nervure médiane épaissie et provoquant une courbure du limbe. . . . . 2002

Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 314, n° 101, pl. XV, 35, ⊕.

SY.

**Quercus calliprinos** WEBB. (**Q. coccifera** L. var. **calliprinos**)

Pl. fe. — [*Erineum impressum* CORDA]. Voir n° 1985. . . **Ériophyide** 2003

Trotter, 1901<sup>c</sup>, p. 71, n° 21.

A-M.

— Cécidie ellipsoïdale, de teinte rouge carmin, englobant presque tout le limbe. Voir n° 1551. [**Plagiotrochus ilicis** FABR.]


2004

Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 307-308, n° 77.

SY.

**Quercus dentata** THUNB.

- Pl.fe.** — Voir n°1355. . . . . **Neuroterus baccarum** L. 2005  
 Trail et Rolfe, 1906 (jardin botanique). *I-B.*



## SECTION ERYTHROBALANUS.

**Quercus coccinea** WANGENHEIM

- Pl.fe.** — A l'aisselle des nervures, à la face inférieure, érinéum blanc formé de poils étoilés dont les rayons sont terminés en pointe ou arrondis à l'extrémité et légèrement courbés.  
**Ériophyde** 2006  
 Rübсаamen, 1900<sup>b</sup>, p.231, fig.17, ⊕. *F, I.*

**Quercus phellos** L.

- Ac.bg.** — Voir n°1265. . . . . **Cynips lignicola** HARTIG 2007  
 Walker, 1875, p.4. *I-B.*

**Quercus nigra** L.

- Ac.ti.** — Voir n°1205. . . . . **Andricus inflator** HARTIG 2008  
 Kieffer, 1900<sup>b</sup>, p.451 ; 1901<sup>b</sup>, p.408 ; Trotter, 1901<sup>b</sup>, p.569 (jardin botanique). *I.*

**Quercus palustris** DUROI

- Pl.ti.** — Petite bosselette. . . . . **Lestes viridis** VAN DER LIND. 2009  
 Pierre, 1902, p.185 (parc). *F.*

**Quercus rubra** L.

- Ac.ti.** — Entre-nœuds demeurant courts sur une pousse renflée en massue.  
**Andricus inflator** HARTIG 2010  
 Lacaze-Duthiers, 1853, p.337 ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p.131. *F.*

- Ac.bg.** — Cécidie sphérique, de 15-20 mm. de diamètre, brune, couverte d'aspérités. [*Cynips tinctoria* OLIV.] 2011  
 Lacaze-Duthiers, 1853, p. 291, pl. XVI, 1, ⊕ ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 131. F.
- Cécidie sphérique de la grosseur d'un pois, verte, à surface lisse. *Andricus globuli* HARTIG 2012  
 Lacaze-Duthiers, 1853, p. 309-312, pl. XVII, 4, ⊕ ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 131. F.
- Pl.fe.** { Galle lenticulaire..... A.  
 { Galle d'une autre forme..... B.
- A.** — Cécidie de 2 mm. de diamètre, présentant en son centre une forte excavation. *Neuroterus numismatis* OLIV. 2013  
 Lacaze-Duthiers, 1853, p. 315-318, pl. XVIII, 1, ⊕ ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 131. F.
- Cécidie à face supérieure conique, de 5-6 mm. de diamètre, de couleur pâle, parsemée de poils étoilés, bruns ; la face inférieure est tachée de blanc sur le bord et entièrement glabre. *Neuroterus lenticularis* OLIV. 2014  
 Lacaze-Duthiers, 1853, p. 318-319, pl. XVIII, 2, ⊕ ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 131. F.
- Cécidie semblable à la précédente, mais plus petite et d'un blanc verdâtre. *Neuroterus* 2015  
 Lacaze-Duthiers, 1853, p. 314, pl. XVII, 3, ⊕ ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 131-132. F.
- Cécidie en forme de cône, d'un blanc rosé, assez irrégulière, évidée au sommet en un petit cratère. [*Neuroterus læviusculus* SCHENCK var. *reflexa* KIEFF.] 2016  
 Lacaze-Duthiers, 1853, p. 314, pl. XVIII, 4, ⊕ ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 132. F.
- B.** — Cécidie ovoïde, insérée sur la nervure médiane et comprise entre deux petites valves. *Andricus ostreus* GIRAUD 2017  
 Lacaze-Duthiers, 1853, p. 321-323 ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 131. F.
- Cécidie subcylindrique, implantée sur la nervure médiane. *Andricus urnæformis* MAYR 2018  
 Lacaze-Duthiers, 1853, p. 309, 312-313, pl. XVII, 7-8, ⊕ ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 131. F.

**Quercus montana** WILLD. (*Q. monticola* MICHX.)

(*Q. Prinus* L. var. *monticola* MICHX.)

- Ac.bg.** — Voir n° 1236. . . . . *Cynips galeata* MAYR 2019  
 Paszylavszky, 1884<sup>b</sup>, p. 226. A-H.



- Voir n°1253. . . . . *Cynips corruptrix* SCHL. 2020  
 Paszlavszky, 1884<sup>b</sup>, p. 226. A-II.
- Voir n°1265. . . . . *Cynips lignicola* HARTIG 2021  
 Paszlavszky, 1884<sup>b</sup>, p. 226. A-II.

**Quercus cedrorum** KOTSCHY

- Pl.fe. — Voir n°1336. . . . . *Neuroterus lenticularis* OLIV. 2022  
 Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 308, n° 78. A-M.

**Quercus iberica** MARSCH.

- Pl.fe. — Limbe crispé. . . . . *Phylloxera corticalis* KALT. 2023  
 Horváth, 1894 ; Schouteden, 1903<sup>b</sup>, p. 98.

**Quercus lanata** SMITH

- Pl.fe. — Réunion de poils courts, filiformes, dans une cavité ouverte  
à la face inférieure et correspondant à un soulèvement sur  
l'autre face. Ériophyide 2024  
 Cecconi, 1904, p. 85. I.

**Quercus Morisii** BORZI

- Pl.fe. — Érinéum à la face inférieure du limbe. . . . Ériophyide 2025  
 Cecconi, 1902, p. 129, n° 13. I.

**Quercus Pseudo-Eglops** PETZOLD

- Ac.bg. — Voir n°1248. . . . . *Cynips Kollari* HARTIG 2026  
 Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 49 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 421-422. I.

**Quercus Yellowi** HORT.

- Ac.bg. — Voir n°1248. . . . . *Cynips Kollari* HARTIG 2027  
 Paszlavszky, 1884<sup>b</sup>, p. 226. A-II.

- Voir n° 1265. . . . . *Cynips lignicola* HARTIG 2028  
 Paszlayvsky, 1884<sup>b</sup>, p. 226. . . . . A-II.
- Voir n° 1283. . . . . *Andricus Malpighii* ADLER 2029  
 Paszlayvsky, 1884<sup>b</sup>, p. 223, n° 1. . . . . A-II.

**Quercus mongolica** FISCH.

- Ac.fr. — Voir n° 1169. . . . . *Cynips caput-medusæ* HARTIG 2030  
 Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 49; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 458-459. . . . . I.
- Ac.bg. — Voir n° 1226. . . . . *Andricus lucidus* HARTIG 2031  
 Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 49; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 427. . . . . I.
- Voir n° 1248. . . . . *Cynips Kollari* HARTIG 2032  
 Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 49; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 421-422. . . . . I.
- Voir n° 1833. . . . . *Synophrus politus* HARTIG 2033  
 Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 49; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 423. . . . . I.
- Voir n° 1265. . . . . [*Cynips lignicola* HARTIG] 2034  
 Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 422. . . . . I.

**[Quercus æsculus L.]**

- Ac.bg. — Voir n° 1248. . . . . *Cynips Kollari* HARTIG 2035  
 Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 49. . . . . I.
- Voir n° 1265. . . . . *Cynips lignicola* HARTIG 2036  
 Cecconi, 1901<sup>c</sup>, p. 49. . . . . I.

**Quercus lineata** BLUME

- Pl.fe. — A la face inférieure du limbe, petite cécidie ligneuse fixée  
 par un mince pédicule. . . . . Insecte 2037  
 Stefani, 1907, p. 10-11. . . . . G.

**Quercus** sp.

- Ac.bg. — Cécidie multiloculaire, de 25-30 mm. de diamètre, un peu  
 plus large que haute, ligneuse, à surface jaune-paille, luisante

et munie de fines stries qui la font paraître réticulée ; le centre de chacune des mailles du réseau est occupé par un petit tubercule fragile, facilement caduc. **Andricus Magrettii** KIEFF. 2038  
Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 122 ; 1900<sup>b</sup>, p. 486-487, pl. XXII, 4, ⑤. A-M.

**Pl.fe.** — Érinéum. . . . . **Eriophyes breviceps** CLAV. 2039  
Nalepa, 1898, p. 11, n°19 ; Bezzi, 1899, p. 25. E-C.

### FAMILLE DES ULMACÉES

*Celtis* 2075-2079, *Ulmus* 2040-2074.

Les différentes variétés de l'Orme champêtre présentent, sur leurs feuilles, des galles d'Hémiptères et de Diptères que l'on rencontre, pour la plupart, chez les autres Ormes d'Europe et aussi sur quelques Ormes exotiques, d'introduction assez récente, surtout l'*Ulmus americana*.

Les Hémiptéroécidies des Ormes ont été particulièrement bien étudiées, en raison de leurs formes si curieuses et si variées et aussi à cause du mode de vie très intéressant des animaux qui les engendrent, pour lequel nous renvoyons le lecteur aux travaux de De Geer, Koch, Haliday, Lichtenstein, etc. ; nous avons signalé ici deux mémoires de Kessler (1878, 1880), qui comportent d'excellentes figures des animaux et de leurs galles.

Le genre *Celtis* possède plusieurs écidiées, encore assez mal connues, qui exigeraient de nouvelles recherches.



#### **Ulmus campestris** L.

(y compris les différentes variétés)

**Ac.ti.** — A l'extrémité des rameaux, dont les entre-nœuds sont un peu raccourcis et infléchis en zigzag, les feuilles sont plus ou moins atrophiées, fortement crispées et recourbées vers la face inférieure. **Aphide** 2040  
Massalongo, 1906, p. 31, n°66. I.

**Pl.ti.** — Minime bossette latérale. . . **Lestes viridis** VAN DER LIND. 2041  
Pierre, 1902, p. 185. F.

|        |                      |                                             |                                                                               |    |
|--------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |                      | Cécidie formée aux dépens des nervures..... | A.                                                                            |    |
| Pl.fe. | Cécidie sur le limbe | (                                           | Pilosité anormale à la face inférieure sans déformation... ..                 | B. |
|        |                      |                                             | Pustules formées aux dépens du parenchyme.....                                | C. |
|        |                      |                                             | Cécidie très apparente faisant fortement saillie ou déformant la feuille..... | D. |
|        |                      |                                             | Autre forme de cécidie .....                                                  | E. |

A. — Nervures épaissies portant de petites cécidies visibles sur l'une des faces (généralement l'inférieure) sous la forme d'une émergence arrondie et apparaissent sur l'autre face sous la forme d'une saillie à peu près cylindrique (fig.618). Une grande cavité (fig.619) contient une larve jaune vitellin. M.T. Adulte à partir du milieu d'avril. **Oligotrophus Lemeei** KIEFF. 2012

Hieronymus, 1890, p. 183-184, n°586 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n°49, ⊕ ; Kieller, 1900, pl. XXXV, 8, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VIII, n° 196, ⊕.

D.E-G.  
F.I.



*Ulmus campestris*  
*Oligotrophus Lemeei* (n°2042)  
Fig.618 (a). — D'ap. nat.  
Fig.619 (b). — D'ap. nat.



*Ulmus campestris*  
*Pemphigus pallidus* (n°2043)  
Fig.620 (a). — Im. KESSLER  
Fig.621 (b). — Im. KESSLER



*Ulmus campestris*  
*Tetraneura ulmi* (n°2048)  
Fig.622 (a). — D'ap. nat.  
Fig.623 (b). — D'ap. nat.

— Sur la nervure médiane, à la base de la feuille, cécidie ovoïde, de 10-14 mm. de haut sur 7-10 mm. de diamètre, couverte de poils blancs serrés, d'abord vert jaunâtre, plus tard jaune gris (fig.620-621). La feuille est plus ou moins déformée et la nervure incurvée par en bas au point attaqué, en sorte

qu'à la face supérieure la cécidie paraît enfoncée dans le limbe. A maturité la galle éclate dans sa région distale.

**Pemphigus pallidus HALIDAY 2013**

Kessler, 1880, p. 78-81, pl. II, 1-16, 23, ⊕ ; Massalongo, 1893, p. (68-69), n° 31, pl. III, 3-4, ⊕ ; E-T  
Schonteden, 1903, p. 190 ; Trotter, 1903, p. 226-227, n° 216 ; Tavares, 1905, p. 108. (e.c.c.V).

B. — A l'aisselle des nervures le plus souvent, bouquets peu apparents de poils blancs unicellulaires, semblables aux poils normaux, mais plus longs. **Ériophyide 2044**

Massalongo, 1898, p. 39, n° 30 ; Trotter, 1903, p. 226, n° 213. I.A-II.

— Le long des nervures, rangées de poils semblables aux poils normaux, mais plus longs. **Ériophyide 2045**

Kieffer, 1892\*, p. 146, n° 124 ; Martel, 1894, p. 16, n° 243. A.F.

C. — Pustules circulaires, de 3-4 mm. de diamètre, jaune sombre à la face supérieure où elles font un peu saillie, d'un jaune plus pâle à la face inférieure où il n'y a pas de saillie. Une larve blanche. M.T. **Cécidomyide 2046**

F.Löw, 1885\*, p. 509-510 ; Massalongo, 1903, p. 43, n° 19 ; Lagerheim, 1905, p. 18. E-N, E-C, F.I.

— Pustules irrégulières, d'abord vert clair, plus tard brunes, ne faisant pas saillie à la face supérieure et s'ouvrant par un ostiole à la face inférieure qu'elles dépassent à peine.

\* **Eriophyes filiformis NAL. 2047**

Hieronymus, 1890, p. 102, n° 272 ; Massalongo, 1891, p. 109-110, n° 59 ; Trotter et Ceconi, 1904, fasc. XII, n° 296, ⊕. E-C, D.I.

\* Commensal : *Phyllocoptes mastigophorus* Nal. (Nalepa, 1898, p. 14, n° 31, p. 50, n° 16).

D — A la face supérieure, cécidie allongée ou subglobuleuse, de couleur vert pâle ou roussâtre, à surface glabre et d'une hauteur de 10-12 mm. environ (fig. 622) ; ostiole hypophylle (fig. 623), garni sur son pourtour de poils blancs qui se retrouvent encore dans le col étroit faisant suite. Le limbe est décoloré et parfois un peu épaissi autour du point d'insertion de la galle. **Tetraneura ulmi DE GEER 2048**

Kessler, 1878, p. 4-7, pl. I, 1-3, ⊕ ; Massalongo, 1893, p. (71-72), n° 33, pl. VIII, 3, ⊕ ; Hieronymus, Pax. etc., fasc. I, n° 47, ⊕ ; Trotter et Ceconi, 1900, fasc. II, n° 45, ⊕. E-T.

— A la face supérieure, cécidie globuleuse ou en massue, à

surface légèrement pubescente ; l'ostiole hypophylle est entièrement glabre ainsi que le col qui lui fait suite.

**Tetraneura rubra** LICHT. 2049

Massalongo, 1893, p. (70), n° 32, pl. XL, 1, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 44, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 108-109.

E-C.  
E-O, I.

— Au bord du limbe, cécidie turgide, blanc verdâtre, à surface irrégulière (fig. 624), formée par un repliement de la partie marginale du limbe qui se rabat sur la face inférieure (fig. 625).

**Schizoneura ulmi** L. 2050

Kessler, 1878, p. 9-11, pl. I, 5-7, ⊕ ; 1880, p. 81-85, pl. II, 17-21, ⊕ ; Massalongo, 1893, p. (67), n° 30, pl. II, 5, ⊕ ; Lagerheim, 1905, p. 24 ; Hieronymus, Pax, etc., 1906, fasc. XIV, n° 399, ⊕ ; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n° 65, ⊕.

E-T.



*Ulmus campestris*

*Ulmus campestris*

*Ulmus campestris*

*Schizoneura ulmi* (n° 2050) *Schizoneura lanuginosa* (n° 2051) *Eriophyes brevipunctatus* (n° 2056)

Fig. 624 (a). — D'ap. nat.

Fig. 626 (a). — D'ap. nat.

Fig. 627 (a). — D'ap. nat.

Fig. 625 (b). — D'ap. nat.

Fig. 628 (b). — D'ap. nat.

— Cécidie vésiculeuse finement poilue, pouvant atteindre 60-80 mm. de diamètre (fig. 626) et résultant d'une déformation complète du limbe, dilaté, hypertrophié et contourné. D'abord vert pâle, la cécidie devient brune plus tard et reste attachée au rameau, même après la chute des feuilles.

**Schizoneura lanuginosa** HARTIG 2051

Ratzeburg, 1868, p. 261-263, pl. XLVI, ⊕ ; Kessler, 1878, p. 11-17, pl. I, 8-9 ⊕ ; Massalongo, 1893, p. (64-66), n° 29, pl. VIII, 2, pl. X, 1, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 48, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VI, n° 147, ⊕ ; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 49, ⊕.

E-T.  
A-M.  
AL.

- [Voir n° 2057. . . . .] **Colopha compressa** Kocu 2052  
 Rübсаamen, 1901, p. 135, n° 243, p. 142, n° 61 ; Gatta, 1901, p. 393 ; Hieronymus, Pax, etc., *E-C.E.*, fasc. III, n° 120, ⊕.
- E. — Petites cécidies faisant à la face supérieure une saillie de 1 mm. environ ; à la face inférieure, elles ont une ouverture percée à l'extrémité d'une petite proéminence cylindrique. Cécidies vertes ou rouges, souvent en grand nombre sur une même feuille. **Eriophyes ulmi** NAL. 2053  
 Licopoli, 1877, p. 23-24, pl. II, 8, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 46, ⊕ ; Trotter et Ceconi, 1900, fasc. II, n° 46, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 108, pl. IX, 21, ⊕. *E-T.*
- Feuille contractée et régulièrement plissée le long des nervures secondaires. **Ériophyide** 2054  
 Misciattelli, 1899, p. 21, n° 72 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 541. *I.*
- A la face inférieure, petite fossette marquant le centre d'une tache circulaire décolorée. M.T. **Cécidomyide** 2055  
 Thomas, 1893, p. 296-297, n° 6. *E-C.*

**Ulmus pedunculata** FOUGEROUX (**U. effusa** WILLD.)

- Pl. fe. — Sur le limbe et à la face supérieure, petites saillies vert pâle, légèrement étranglées à la base, de 1,5-2 mm. de diamètre (fig. 627) ; l'ostiole hypophylle (fig. 628), large, est garni de poils sur son pourtour. \* **Eriophyes brevipunctatus** NAL. 2056  
 Rübсаamen, 1895, p. 423, n° 43, pl. XV, 32, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 98, ⊕ ; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 27, ⊕. *E-T.*
- \* Avec *Eriophyes multistriatus* Nal. et *Anthocoptes guleatus* Nal. (Nalepa, 1898, p. 15, n° 33-34, p. 59, n° 3).
- A l'aisselle des nervures, ou le plus souvent sur le limbe, cécidies allongées parallèlement aux nervures secondaires, formant à la face inférieure une saillie carénée, rougeâtre en partie ou en totalité, avec les faces latérales striées et garnies de poils peu nombreux. La cécidie a 10 mm. de saillie, 8-10 mm. de long sur 3 mm. d'épaisseur ; son bord est frangé ; à maturité elle présente à la base un trou de sortie à bords plissés. **Colopha compressa** Kocu 2057  
 Hieronymus, 1890, p. 119, n° 369 ; Massalongo, 1893, p. (257-258), n° 209, pl. XXXIV, 3-6, ⊕ ; Lagerheim, 1905, p. 4 ; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n° 64, ⊕. *E-T.*

- Cécidie en massue ou subglobuleuse. Voir n° 2048.  
**Tetraneura ulmi** DE GEER 2058  
 Hieronymus, 1890, p. 120, n° 370; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 541. *E-C.*
- Cécidie marginale. Voir n° 2050. . . . **Schizoneura ulmi** L. 2059  
 Hieronymus, 1890, p. 119, n° 368; Rübsaamen, 1899, p. 248, n° 66. *E-C, R.*
- Sur la nervure médiane, grosse galle jaune verdâtre, velue, pouvant atteindre 20 mm. de diamètre.  
**Pemphigus pallidus** HALDADY 2060  
 Rübsaamen, 1890, p. 55, n° 219. *A.*

**Ulmus montana** WIED.

**Pl. fe.** — Se servir pour la détermination des cécidies du tableau p. 362.

- A. — Sur les nervures. Voir n° 2042. **Oligotrophus Lemeei** KIEFF. 2061  
 Hieronymus, 1890, p. 184, n° 587; Martel, 1891, p. 50, n° 120; Lemée, 1902<sup>b</sup>, p. 71, n° 24. *D, E-C, F.*
- Sur les nervures. Voir n° 2043. **Pemphigus pallidus** HALDADY 2062  
 Hieronymus, 1890, p. 119, n° 366; Lemée, 1902<sup>b</sup>, p. 71, n° 26; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n° 350, ⊕. *E-C, E-O.*
- B. — A la face inférieure, le long des nervures, rangées de poils blancs semblables aux poils normaux, mais plus longs.  
**Ériophyide** 2063  
 Martel, 1891, p. 51, n° 125; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 541. *F, A.*
- C. — Pustules circulaires. Voir n° 2046. . . . **Cécidomyide** 2064  
 Thomas, 1893, p. 295-296, n° 5. *E-C.*
- Pustules irrégulières. Voir n° 2047.  
**[Eriophyes filiformis** NAL.] 2065  
 Hieronymus, 1890, p. 102, n° 274; Nalepa, 1903, p. 293-294; 1904, p. 181. *D, E-C.*
- D. — Cécidies faisant fortement saillie à la face supérieure Voir n° 2048.  
**Tetraneura ulmi** DE GEER 2066  
 Martel, 1891, p. 51, n° 123; Lemée, 1902<sup>b</sup>, p. 71, n° 27; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VIII, n° 197, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n° 349, ⊕; Lagerheim, 1905, p. 24, n° 1. *E-T (exc. E).*
- Cécidie sur le bord du limbe. Voir n° 2050.  
**Schizoneura ulmi** L. 2067  
 Martel, 1891, p. 51, n° 122; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VIII, n° 250, ⊕; Connold, 1901, pl. CVII, ⊕; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 100, ⊕; Lagerheim, 1905, p. 24, n° 2. *E-T (exc. E).*



— Cécidie déformant toute la feuille Voir n° 2051.

*Schizoneura lanuginosa* HARTIG 2068

Hieronymus, 1890, p. 119, n° 365; Martel, 1891, p. 51, n° 121; Cecconi, 1897, p. 449. *D, A, F, I.*

E. — Nombreuses petites cécidies perforant la feuille. Voir n° 2053.

[*Eriophyes ulmi* NAL.] 2069

Martel, 1891, p. 51, n° 124. *F.*

— Cécidies nombreuses et petites à la face supérieure. Voir n° 2056

[*Eriophyes brevipunctatus* NAL.] 2070

Hieronymus, 1890, p. 102, n° 273; Rostrup, 1896, p. 27, n° 163; Lagerheim, 1905, p. 12. *E-N, E-C.*

### ***Ulmus americana* L.**

Pl. fe. — Voir n° 2048. . . . . *Tetraneura ulmi* DE GEER 2071

Cecconi, 1900, p. 239, n° 26; Tassi, 1902, p. 90, n° 17. *I.*

— Voir n° 2050. . . . . *Schizoneura ulmi* L. 2072

Cecconi, 1900, p. 239, n° 27. *I.*


— Voir n° 2057. . . . . *Colopha compressa* KOCH 2073

Cecconi, 1900, p. 239, n° 28. *I.*

### ***Ulmus turkestanica***

Pl. fe. — Voir n° 2049. . . . . *Tetraneura rubra* LIGHT. 2074

Houard, 1905<sup>b</sup>, p. 142 (jardin botanique). *F.*



### ***Celtis australis* L.**

Ac. bg. — Sur les jeunes rameaux, bourgeons hypertrophiés mesurant 8 mm. de longueur sur 3-4 mm. de diamètre transversal.

*Eriophyes Bezzii* GORTI 2075

Gorti, 1903<sup>c</sup>, p. 113-115, pl. III, 3-6, ⊕; Trotter, 1907<sup>b</sup>, p. 32, n° 30; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVI, n° 389, ⊕. *I.*

Pl. fe. — A la face supérieure, saillies de couleur vert pâle, irrégulières et confluentes; la dépression correspondante de la face inférieure est tapissée de poils blanchâtres, unicellulaires,

simples, à base renflée, à pointe effilée, à paroi épaisse. Les parties attaquées ont une épaisseur double de celle des parties saines. *Phyllerium celtidis* MASS. **Ériophyide** 2076

Massalongo, 1896, p. 54-55, n° 12 ; 1901, p. 88, pl. II, 5, ⊕.

I.

— A la face supérieure, saillies de la grosseur d'un pois, à surface bosselée, couverte d'une pilosité anormale. Le plus souvent une feuille est tout entière couverte de ces déformations et acquiert la grosseur d'une noisette ; les parties attaquées sont épaissies et charnues. Quand plusieurs feuilles situées vers l'extrémité d'un rameau sont attaquées à la fois, le rameau lui-même est épaissi et les feuilles forment un amas de la grosseur d'une noix. **Pemphigide** 2077

Rübsaamen, 1899, p. 248, n° 68 ; Schouteden, 1903<sup>b</sup>, p. 93.

A.-M.

— Feuilles terminant un rameau, décolorées et crispées transversalement. **Aphide** 2078

Corti, 1901, p. (27), n° 13 ; Stefani, 1906<sup>b</sup>, p. 129 ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVI, n° 390, ⊕ ; Mariani, 1907<sup>b</sup>, p. 296-297, n° 74.

I.

**Celtis cretica L.**

**Pl. fe.** — Éminences irrégulières, décolorées, faisant saillie à la face supérieure du limbe. **Aphide** 2079

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 287.

I.

**FAMILLE DES MORACÉES**

Cannabis 2092-2093, Ficus 2083-2090, Humulus 2091, Morus 2080-2082.

I. Le genre *Ficus* occupe une place prépondérante dans la famille des Moracées en raison de la structure spéciale de son inflorescence et des liens étroits qui existent entre les phénomènes de fécondation et la présence constante d'Hyménoptères appartenant aux genres *Blastophaga* et *Sycophaga*. La bibliographie relative à la Capriflication étant considérable, nous avons dû rapporter seulement les mémoires les plus intéressants, ceux de Saunders (1879, 1881, 1884), de P. Mayer (1882), de Westwood (1882), de Trabut (1901), qui permettent du reste, avec le Catalogue de Dalla Torre (1898),

d'établir la bibliographie complète de la question. Depuis quelques années, Leclerc du Sablon (1907, 1907<sup>b</sup>, 1908, 1908<sup>b</sup>) a repris l'étude de la Caprifitation à un point de vue plus particulièrement anatomique.

Les remarquables travaux de Solms-Laubach, publiés en 1882 et 1885, se rapportent surtout à des *Ficus* de Java; le mémoire de Mayr, paru en 1885 et consacré aux Insectes des Figes, contient un grand nombre d'indications relatives à l'Asie-Mineure, à la vallée du Nil, à l'Abyssinie, la Nubie et les côtes de la mer Rouge; nous les avons en partie relevées. Cependant, on peut dire, d'une façon générale, que la répartition géographique des galles des *Ficus Pseudocarica*, *serrata* (*palinata*), *persica*, etc., manque encore de précision et exigerait de nouvelles recherches.

II. Plusieurs cécidies très intéressantes ont été signalées récemment sur le Mûrier, le Chanvre et le Houblon: elles sont dues à diverses espèces de *Phorodon* et d'*Histeropteron*. Consulter surtout Vaccari (1905), qui a longuement décrit et figuré les déformations florales du Chanvre, et Ribaga (1907).

~~~~~

Morus alba L.

- Pl.ti.** — Renflement d'un rameau. **Morophaga morella** DUP. 2080
Sorhagen, 1898, p. 115; Kieffer, 1901^b, p. 366. F.
- Pl.fe.** — Limbe déformé. **Ériophyide** 2081
Amerling, 1868, p. 169; Thomas, 1869, p. 352, n° 29. E-C.
- Limbe crispé, avec élevûres à la face supérieure.
Histeropteron grylloides FABR. 2082
Ribaga, 1907. I.

~~~~~

**Ficus Carica** L.


- Acre.** — A l'intérieur de la fige, petites galles arrondies et brillantes (fig. 629-632). **Blastophaga grossorum** GRAVENHORST 2083  
Mayr, 1885, p. 153, n° 4, p. 177-179, n° 12; Trabut, 1901, p. 115-138, 19 fig., ⊕; Tavares, 1905, p. 22, pl. IX, 10, ⊕; Trotter et Ceccconi, 1906, fasc. XIII, n° 319, ⊕; Stefani, 1906, p. 110. B-M.
- Pl.ra.** — Nodosités avec cavité interne. **Heterodera radicolica** GREEFF 2084  
Frank, 1896, p. 22; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 321; Stefani, 1906, p. 110.

**Ficus antiquorum** MIQUEL

- Acre.** — Voir n° 2083. . . . . **Sycophaga sycomori** HASSELQUIST 2084A  
P. Mayer, 1882, p. 566; Mayr, 1885, p. 192-193. ÉG.

**Ficus panifica** DELILE

Acre. — Voir n° 2083. . . . . **Blastophaga occultiventris** MAYR 2085  
 Mayer, 1882, p. 570, n° 12, pl. XXVI, 16; Mayr, 1885, p. 153, n° 12, p. 166-167, n° 2; Dalla Torre, 1898, p. 324. ÈG.



**Ficus Carica**  
*Blastophaga grossorum* (n° 2083)  
 Fig. 629 (a). — D'ap. nat.  
 Fig. 630 (b). — Im. SOLMS-L.  
 Fig. 631 (c). — Im. SOLMS-L.  
 Fig. 632 (d). — D'ap. nat.

**Ficus Sycomorus** L.

Pl. fe. — Boursoufflures hémisphériques, saillantes à la face supérieure, avec dépression correspondante à la face inférieure (1-2 mm. de diamètre). **Aleurodes** 2086  
 Frauenfeld, 1859, p. 326, pl. VII, 14. ⊕; Trotter, 1901\*, p. 70, n° 13. ÈG.

**Ficus comosa** ROXBURG

Pl. fe. — Limbe enroulé vers la face supérieure, le long de la nervure médiane, et parsemé inférieurement de petites élévations rougeâtres auxquelles correspondent des dépressions sur l'autre face. **[Ériophyide]** 2087  
 Tavares, 1903<sup>b</sup>, p. 182, n° 10. m.

**Ficus multinervia** HEER (fossile)

- Pl.fe. — Macules arrondies, de 3 mm. de diamètre. *Phyllerites ficicola* ETTINGSU. **Eriophyidites** 2088  
 Meschinelli, 1892, p. 808, n° 13 ; 1898, p. 107, pl. XXX, 7, ⊕ ; Trotter, 1903<sup>e</sup>, p. 17. A-H.

**Ficus** sp.

- A cre. — Voir n° 2083. . . . . **Sycophaga sycomori** HASSELQUIST 2089  
**Sycophaga perplexa** COQUIEREL 2090  
 Mayer, 1882, p. 570, n° 14 ; Mayr, 1885, p. 153, n° 14. ÉG.

**Humulus Lupulus** L.

- Pl.fe. — Limbe enroulé légèrement. Puceron vert. **Phorodon humuli** SCHIBANK 2091  
 Schouteden, 1903, p. 176. E-T

**Cannabis sativa** L.

- Ac.fl. — Déformation des pièces florales, accompagnée de castration parasitaire. **Phorodon cannabis** PASS. 2092  
 Vaccari, 1905, p. 87-94, 15 fig., ⊕ ; Signa, 1905, p. 176-177, 1 fig. I.
- Pl.ra. — Renflements. . . . . **Heterodera Schachtii** SCHMIDT 2093  
 Gain, 1894, p. 254. F.

## FAMILLE DES URTICACÉES

*Credneria* 2104, *Parietaria* 2103, *Urtica* 2094-2102.

Les feuilles de presque toutes les espèces du genre *Urtica* sont crispées ou enroulées par le *Trioza urticae* et par l'*Aphis urticae* ; cette dernière espèce déforme également celles de la Pariétaire.

La cécidie érinéenne d'un *Credneria* fossile, rencontré en Europe, présente quelque intérêt.

**Urtica dioica L.**

**Ac.ti.** — A l'extrémité des rameaux, bouquets de feuilles présentant un enroulement marginal. Puceron vert foncé, marbré de clair. **Aphis urticæ** FABR. 2094

Martel, 1894, p. 16-17, n° 244; Schouteden, 1903, p. 190.

F.B.

**Pl.fe.** — Cécidies uniloculaires, arrondies, d'un blanc verdâtre, parfois violacées, de 3-8 mm. de diamètre, groupées le plus souvent à la base du limbe (fig. 633 et 635); ouverture ostiolaire allongée et à la face supérieure. Ces cécidies peuvent aussi se trouver sur la tige et les pédoncules floraux (fig. 634). Larves blanches. **M.T.** **Perrisia urticæ** PERRIS 2095

Perris, 1840<sup>b</sup>, p. 401-406, pl. XL, 1-9, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. III, n° 121, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 47, ⊕; Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. LXI, 8, ⊕; Connold, 1901, p. 211-212, fig. 3, pl. XC, ⊕.

E.T.



*Urtica dioica*

*Perrisia urticæ* (n° 2095).

Fig. 633 (a). — D'ap. nat.

Fig. 634 (b). — D'ap. nat.

Fig. 635 (c). — D'ap. nat.

— Enroulement marginal du limbe qui est froissé.

**Perrisia dioicæ** RÜBS. 2096

Rubsaamen, 1895<sup>c</sup>, p. 179, n° 4; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XII, n° 297, ⊕.

A.F.I.

— Feuilles crispées. . . . . **Trioxa urticæ** L. 2097

F. Löw, 1888, p. 23, n° 66; Liebel, 1889, p. 307, n° 463; Cecconi, 1902, p. 143, n° 80.

E-T.

**Urtica urens L.**

- Ac.ti.** — Voir n° 2094. . . . . **Aphis urticæ FABR.** 2098  
 Tavares, 1905, p. 110. P.
- Pl.fe.** — Cécidies arrondies. Voir n° 2095. . . **Perrisia urticæ PERRIS** 2099  
 Brischke, 1881, p. 173; Focken, 1890, p. 237; Darboux, 1902<sup>b</sup>, p. 33. A.F.
- Feuilles crispées. . . . . **Trioza urticæ L.** 2100  
 F.Löw, 1888, p. 23, n° 90; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 313. E.C.F.

**Urtica membranacea POIR.**

- Ac.ti.** — Voir n° 2094. . . . . **Aphis urticæ FABR.** 2101  
 Schouteden, 1903<sup>b</sup>, p. 99.
- Pl.fe.** — Feuilles crispées. . . . . **Trioza urticæ L.** 2102  
 Tavares, 1903<sup>b</sup>, p. 186, n° 28; 1905<sup>b</sup>, p. 227, n° 57. m.



**Parietaria ramiflora MÖNCH (P. diffusa MERTENS et KOCH)**

- Pl.fe.** — Limbe crispé. Puceron vert foncé, marbré de clair.  
**Aphis urticæ FABR.** 2103  
 Schouteden, 1903, p. 179. E.C., E.O.



**Credneria acuminata HAMPE (fossile)**

- Pl.fe.** — Taches érinéennes. . . . . **Eriophyidites** 2104  
 Meschinelli, 1892, p. 807, n° 10; 1898, p. 106, pl. XXX, 1, ⊕; Trotter, 1903<sup>c</sup>, p. 17. E.O.

**FAMILLE DES LORANTHACÉES**



**Viscum album L.**

- Pl.fe.** — Sur l'une des faces du limbe, petites excavations auxquelles correspondent, sur la face opposée, des saillies à peine sen-

sibles. Quand ces cécidies sont en grand nombre sur une feuille, celle-ci peut se trouver légèrement incurvée.

**Diaspis visci** SCIBRANK 2105

F.Löw, 1872, p.273-278, pl.IV, ⊕ ; Schlechtendal, 1890, p.86, n° 942.

E-G.

**FAMILLE DES SANTALACÉES**

Osyris 2106, Thesium 2107-2113.

L'inflorescence de plusieurs *Thesium* est déformée par un Acarien qui semble être dans tous les cas l'*Eriophyes anthonomus* Nal. Des renflements arrondis ou fusiformes se remarquent sur les tiges de *Thesium* et d'*Osyris* : on les rapporte à l'action d'un Coléoptère (?) et d'un Coccide.



**Osyris alba** L.

Pl.ti. — Renflement globuleux, cylindrique ou fusiforme, long de 6-10 mm., à surface crevassée.

Coccide 2106

Trotter, 1901<sup>d</sup>, p.367, n° 22 ; Stefani, 1906, p.115, n° 61.

si.



**Thesium alpinum** L.

Acre. — Voir n° 2111. . . . . **Eriophyes anthonomus** NAL.] 2107

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p.527.

A.

**Thesium divaricatum** JAN

Acre. — Chloranthie et phyllomanie de l'inflorescence ; les feuilles représentant les organes floraux forment un amas sphérique.

**Eriophyes anthonomus** NAL. 2108

Massalongo, 1892, p.75, n° 12 ; Nalepa, 1898, p.32, n° 97.

E-C, I.

**Thesium humifusum** DC.

Acre. — Chloranthie et cladomanie. | **Eriophyes anthonomus** NAL. 2109

Liebel, 1886, p.573, n° 292 ; Martel, 1894, p.15, n° 237.

A.F.



**Pl.ti.** — Nodosités jaunâtres, globuleuses (2-8 mm. de diamètre), à surface rugueuse, groupées sur la tige au voisinage du collet.

[Coléoptère] 2110

C. Marchal et Chateau, 1905, p. 308.

F.

**Thesium intermedium** SCHRAD.

**Aerc.** — Chloranthie et cladomanie ; il se forme un épi plus ou moins allongé, vert jaunâtre, constitué par les organes floraux transformés en feuilles dont la taille diminue de la base au sommet de l'épi.

[Eriophyes anthonomus NAL.] 2111

Liebel, 1886, p. 573, n° 292 ; Massalongo, 1892, p. 76, n° 13 ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VI, n° 145, ⊕.

E-C,  
I.

**Thesium linophyllum** L.

**Aerc.** — Inflorescence déformée par chloranthie et cladomanie ; les pièces florales sont transformées en petites feuilles d'un jaune verdâtre, lancéolées ; les pédoncules floraux donnent naissance à de nombreux rameaux normaux ou à entre-nœuds raccourcis.

[Eriophyes anthonomus NAL.] 2112

F. Löw, 1881, p. 7 ; Szépligéti, 1890, p. 23.

E-C.

**Thesium montanum** ENRI.

**Pl.ti.** — Renflement fusiforme. . . . . Coccide 2113

Trotter, 1907<sup>b</sup>, p. 31, n° 24.

I.

**FAMILLE DES ARISTOLOCHIACÉES**

Zoocécidies mal connues, exigeant de nouvelles recherches. Nous n'avons pas cru utile de mentionner la galle décrite par Rudow sur l'*Aristolochia Sipho* (1891, p. 332-333, n° 13, pl. VI, 1, ⊕).

**Aristolochia Clematidis** L.

**Ac.fl.** — [Renflement de l'ovaire. . . . . Cécidomyide] 2114

Kirchner, 1855, p. 133 ; Kaltenbach, 1874, p. 523, n° 6 ; Bergenstamm et Löw, 1876, p. 60, n° 328 ; Kertész, 1902, p. 115-116.

A.

Pl. fe. — Nodosités. . . . . **Heterodera radicola** GREEFF 2115

Renseignément de D. H. R. von Schlechtendal.

A.

## FAMILLE DES POLYGONACÉES

Calligonum 2151, Fagopyrum 2175, Polygonum 2152-2174, Rheum 2150, Rumex 2116-2149.

Les fleurs de plusieurs Rumex sont gonflées par les larves de deux diptères : *Contarinia runcicis* et *Contarinia acetosa* (synonyme, *Contarinia acetosella* Rüb. ; Kertész, 1902, p. 98), qu'accompagnent souvent les larves de *Contarinia rubicundula* Rüb. (Rübsaamen, 1891c, pl. III, 10-13) et de *Lestodiplosis rhopalothrix* Kieff. (Kieffer, 1904, p. 77-78). Nous pensons que des recherches seraient encore nécessaires pour préciser les espèces réellement cécidogènes.

Quant aux fleurs du *Rumex scutatus*, elles sont transformées par un Hémiptère, le *Trioza runcicis*, en de très curieuses galles pour le détail desquelles nous renvoyons aux mémoires bien connus de Peyritsch (1872, 1876) et de Strasburger (1879). Rappelons que ces cécidies ont été longtemps considérées comme de simples cas tératologiques (Consulter : Penzig, 1894, p. 267).

Les cécidies dues au raccourcissement des entre-nœuds supérieurs des pousses sont pleines d'intérêt : citons celle que produit l'*Augasma aeratella* chez plusieurs espèces du genre *Polygonum*, celles de l'*Apion affine* et de l'*Aphalara maculata*. Parfois même, sous l'influence du *Tylenchus devastatrix*, le raccourcissement peut être si accentué que le port de la plante est totalement modifié : tel est le cas de plusieurs *Polygonum*, comme l'a montré Ritzema-Bos.

On connaît, chez les *Rumex*, plusieurs renflements de tiges engendrés par l'*Apion violaceum*, ainsi que des nodosités arrondies, assez grosses, des tiges souterraines et des racines, dues à un autre *Apion*, l'*Apion sanguineum*. On rapporte avec quelque doute une cécidie de même forme à l'action de la chenille du *Sesia triannuliformis*.

D'autres larves de Coléoptères (*Apion frumentarium*, *humile* et *miniatum*) se logent dans les pétioles et les nervures médianes des feuilles de plusieurs *Rumex* et y produisent des renflements fusiformes.

Les cécidies foliaires de diverses espèces du genre *Polygonum* consistent en rouleaux allongés, très vivement teintés de rouge, dus au repliement par en bas du bord du limbe sous l'influence des grosses larves d'un Diptère, le *Perrisia persicariæ*. Plusieurs galles semblables sont engendrées par des Cécidomyies qui n'ont pas encore été obtenues par éclosion. Enfin, des déformations de même ordre peuvent être provoquées par un Hémiptère, le *Phorodon galeopsidis*, ou par un Ériophyide non encore décrit (sur *Polygonum alpestre*).

La plupart des cécidies foliaires des *Rumex* consistent en déformations, crispatures ou enroulements du limbe par divers Aphides, notamment l'*Aphis runcicis* très répandu partout.



**Rumex domesticus** HARTM.

- Pl. fe. — Limbe crispé et enroulé par en bas. . . . . Aphide 2116  
Lagerheim, 1905, p. 23, 26. E-N.

**Rumex Hydrolapathum** HUDSON

- Pl. fe. — Sur la moitié du limbe ou sur le limbe tout entier, enroulement par en bas, accompagné d'une crispation de la feuille ; la partie enroulée devient quelquefois rouge. Aphide 2117  
Kieffer, 1893, p. 23 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 294. A, F.

**Rumex conglomeratus** MURRAY

- Pl. fe. — Renflement fusiforme de la nervure médiane. Une larve orangé clair. Apion miniatum GERMAR 2118  
Perris, 1863, p. 459 ; Tavares, 1905, p. 90 ; Stefani, 1906, p. 184. F, P, si.
- Enroulement marginal. . . . . Aphis rumicis L. 2119  
Hieronymus, Pax, etc., 1907, fasc. XV, n° 422, ⊕. A.

**Rumex nemorosus** SCHRAD.

- Pl. fe. — Voir n° 2118. . . . . Apion miniatum GERMAR 2120  
Perris, 1863, p. 459 ; Tavares, 1900, p. 95, n° 200 ; 1905, p. 90. E-O.

**Rumex Patientia** L.

- Pl. fe. — Voir n° 2132, 2133. . . . . Apion frumentarium L. 2121  
Apion humile GERMAR 2122  
Stefani, 1906, p. 184. si.

**Rumex divaricatus** L.

- Ac. fl. — Boutons gonflés, demeurant fermés. Contarinia rumicis H. Löw 2123  
Kieffer, 1898<sup>e</sup>, p. 64 ; Kertész, 1902, p. 98. A.

**Rumex obtusifolius** WALLER.

- Pl.fe.** — Enroulement marginal. . . . . **Aphis rumicis** L. 2124  
 Rübsaamen, 1890, p. 47, n° 154; Trotter, 1898, p. 32, n° 60; Loisel, 1903, p. (6); C. Marchal et Chateau, 1905, p. 295; Mariani, 1907<sup>b</sup>, p. 311, n° 145. A, F, I.

**Rumex pulcher** L.

- Pl.ti.** — Petits renflements fusiformes sur la tige et les rameaux latéraux. **Apion violaceum** KIRBY 2125  
 Stefani, 1905, p. (1-2); 1906, p. 184. si.

- Pl.fe.** — Enroulement marginal. . . . . **Aphis rumicis** L. 2126  
 Tavares, 1900, p. 83, n° 147; 1905, p. 90. P.

**Rumex Acetosella** L.

- Ac.inf.** — Inflorescence d'aspect rachitique, à axe courbé. Pucerons rougeâtres. **Aphide** 2127  
 Tavares, 1905, p. 90, pl. IX, 3, ⊕. P.

- Ac.fl.** — Boutons atteignant le double de la taille normale et prenant une forme plus allongée; organes reproducteurs atrophiés; cécidie jaune. **Contarinia rumicis** H. LÖW 2128  
**Contarinia acetosæ** KIEFF. 2129  
 Rübsaamen, 1891<sup>c</sup>, p. 126-131, pl. III, 3-9, ⊕; Kieffer, 1901<sup>c</sup>, p. 31-32; Tavares, 1905, p. 90, pl. IX, 4, ⊕. E-N, E-O, P.

- Pl.ra.** — Sur les racines, ou sur la tige souterraine, cécidies arrondies, de la grosseur d'un pois à celle d'une noisette. Une larve blanche. **Apion sanguineum** DE GEER 2130  
 Liebel, 1886, p. 566, n° 75; Hieronymus, 1890, p. 268-269, n° 797. A, F, P.

- Renflement allongé, de forme irrégulière, pouvant atteindre 15 mm. de long. Une chenille blanche avec tête et premier anneau brun-noir. M. C. H. [**Sesia triannuliformis** FREYER] 2131  
 Kaltenbach, 1874, p. 515; Kieffer, 1892<sup>c</sup>, p. 74, n° 543; Rostrup, 1896, p. 28, n° 167. D. A.

- Pl.fe.** — Sur la nervure médiane ou le pétiole, renflement fusiforme.

jaune ou rouge, entouré d'une zone de même couleur, mesurant 10 mm. de long sur 5 mm. de large. Une larve orangée.

*Apion frumentarium* L. 2132

*Apion humile* GERMAR 2133

Perris, 1853, p. 459; Hieronymus, 1890, p. 268, n° 796; Fockeu, 1890, p. 61; Rostrup, 1896, p. 28, n° 168; Trotter, 1904, p. 11-12, n° 22; Tavares, 1905, p. 90. E-T  
(ecc.E).

— Limbe déformé, atrophié, décoloré. *Aphalara calthæ* L. 2134

Dalla Torre, 1892, p. 151; Bezzi, 1899, p. 30. E-G.

— Limbe enroulé par en bas sans hypertrophie bien apparente.

*Aphis rumicis* L. 2135

Kieffer, 1901 b, p. 484.

### **Rumex Acetosa L.**

**Ac.fl.** — Boutons gonflés et fermés. . . . *Contarinia acetosæ* KIEFF. 2136

Rübsaamen, 1891 b, p. 465, n° 9; Kieffer, 1901 b, p. 484; 1901 c, p. 31-32. A.F.

**Ac.ti.** — Renflement d'un rameau florifère, axial, parfois unilatéral, subsphérique ou subconique ou subovoïdal (1,5-3 mm. sur 2-4 mm.), dur, uniloculaire; il est parfois nodal ou internodal, mais le plus souvent contigu au nœud et au-dessus de lui; il y a toujours raccourcissement de l'entre-nœud correspondant.

*Apion affine* KIRBY 2137

Pierre, 1903, p. 45; 1905, p. 171-172. F.

**Pl.ti.** — Bourrelet annulaire, mince, d'un vert sombre, situé sur les entre-nœuds.

*Apion violaceum* KIRBY 2138

Pierre, 1905, p. 172. F.

**Pl.fe.** — Renflement fusiforme jaune ou rouge de la nervure médiane. Voir nos 2132, 2133.

*Apion frumentarium* L. 2139

*Apion humile* GERMAR 2140

Fockeu, 1890, p. 61; Kieffer, 1901 b, p. 483. F.

### **Rumex thyrsoides DESF.**


**Pl.fe.** — Voir n° 2118. . . . . *Apion miniatum* GERMAR 2141

Stefani, 1906, p. 184, n° 9°. si.

- Voir nos 2132, 2133. . . . . *Apion frumentarium* L. 2142  
*Apion humile* GERMAR 2143  
 Stefani, 1906, p. 184, n° 93. . . . . *si.*

***Rumex arifolius* ALL.**

- Ac.fl. — Voir n° 2145. . . . . *Trioxa rumicis* F.Löw 2144  
 Massalongo, 1881, p. 229-234, pl. V, ♂ : F. Löw, 1886, p. 169 : Hieronymus, 1890, p. 109, n° 302. . . . . *E-C.*



*Rumex sculatus*

*Trioxa rumicis* (n° 2145)  
 Fig. 635 (a). — D'ap. nat.  
 Fig. 637 (b). — D'ap. nat.  
 Fig. 638 (c). — D'ap. nat.  
 Fig. 639 (b'). — D'ap. nat.



*Calligonum comosum*

*Insecte* (n° 2151)  
 Fig. 640 (a). — Im. FRAUENF.  
 Fig. 641 (b). — Im. FRAUENF.

***Rumex scutatus* L.**

- Ac.fl. — Si l'attaque est légère, les feuilles du périgone sont faiblement épaissies et durcies ; l'ovaire est un peu hypertrophié. Dans le cas contraire, l'ovaire devient cylindrique ou subconique ; il atteint parfois 25 mm. de long, il est diversement contourné et très fréquemment divisé à l'extrémité en trois lobes ou trois dents (fig. 636-639). *Trioxa rumicis* F.Löw 2145

Peyritsch, 1872, p. 127, pl. IX, 11-14, ⊕ ; 1876, p. 135-136, pl. III, 45-63, ⊕ ; Strasburger, 1879, p. 37-43, pl. VII, 1-35, ⊕ ; Houard, 1902<sup>b</sup>, p. 46-47, fig. 23-26, ⊕ ; Massalongo, 1906<sup>b</sup>, p. 155, n° 66. E-G.  
F.

**Pl.fe.** — Feuilles atrophiées, déformées et décolorées.

**Aphalara calthæ L.** 2146

Dalla Torre, 1892, p. 151, a ; Bezzi, 1899, p. 30.

E-G.

— Enroulement marginal faible et local ou, au contraire, très étendu et très accentué ; dans ce dernier cas la partie enroulée devient coriace. Voir plus haut n° 2145.

**Trioza rumicis F. Löw** 2147

### **Rumex bucephalophorus L.**

**Pl.ti.** — Voir n° 2125. . . . . **Apion violaceum Kirby** 2148

Stefani, 1906, p. 184.

si.

### **Rumex sp.**

**Ac.ti.** — Entre-nœuds floraux raccourcis et épaissis. . . . **Apion** 2149

Rostrup, 1896, p. 28, n° 169.

D.



### **Rheum rhaponticum L.**

**Pl.fe.** — Limbe crispé et enroulé. Puceron noir. . . **Aphis rumicis L.** 2150

Del Guercio, 1900 ; Schouteden, 1903, p. 186 ; Mariani, 1907<sup>b</sup>, p. 309, n° 134.

B, I.




### **Calligonum comosum L'HÉRIT.**

**Pl.ti.** — Au milieu de la tige, épaississement noueux, ou encore, à l'extrémité des rameaux, renflement arrondi en forme de grosseille (fig. 640) ; cécidie dure, ligneuse, à cavité irrégulière (fig. 641).

**Insecte** 2151

Frauenfeld, 1859, p. 327, pl. VI, 17, ⊕ ; Amblard, 1859, p. 734-735.

AL. ÉG.



**Polygonum romanum** Jacq.

- Ac.ti. — Voir n° 2154. . . . . Augasma aeratella ZELL. 2152  
Trotter, 1903 b, p. 16, n° 43. I.

**Polygonum aviculare** L.

- Ac.fl. — Boutons gonflés. . . . . Augasma aeratella ZELL. 2153

- Ac.ti. — A l'extrémité des tiges ou à l'aisselle d'une feuille (fig. 642-644), renflement conique, fusiforme ou corniculé, teinté de rouge et pouvant atteindre 15 mm. de long sur 3 mm. d'épaisseur. Une chenille verte. Augasma aeratella ZELL. 2154

Fraenfeld, 1869 b, p. 936 ; Perris, 1873, p. 95 ; Hieronymus, 1890, p. 260, n° 777 ; Houard, E-T  
1902 b, p. 44, fig. 15-17, ⊕. (exc. E).

- Pl.fe. — Limbe coloré par places, souvent courbé ou enroulé. Sipha polygoni SCHOUTEDEN 2155  
Grevillins et Niessen, 1908, fasc. III, n° 66, ⊕. II.

**Polygonum arenarium** WALDST. et KIT.

- Acre. — Fleurs et bourgeons déformés. Voir n°s 2153, 2154. Augasma aeratella ZELL. 2156  
Licopoli, 1877, p. 14-15 ; Szepilgeti, 1890, p. 18. E-C, I.

**Polygonum amphibium** L.

- Ac.fl. — Fleur déformée. . . . . Perrisia persicariæ L. 2157

- Ac.ti. — Entre-nœuds terminaux n'atteignant pas leur taille normale ; les feuilles ainsi rapprochées sont contournées et présentent un enroulement marginal. Larves grégaires. Aphalara maculata F. Löw 2158

Kieffer, 1895, p. 175 ; 1897 c, p. 22-23. A.

- Pl.fe. — Enroulement marginal par en bas, peu serré (fig. 646-647), donnant naissance à une cécidie cylindrique, molle, fortement



colorée en rouge (fig. 645). Larves grégaires rouges. M.C.

**Perrisia persicariæ L. 2159**

Connold, 1901, p. 196, pl. LXXXII, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. III, n° 107, ⊕.


E-T.

— Cécidie semblable à celle de *Mikiola fagi*, située sur le dessus du limbe.

**Cécidomyide 2160**

H. Löw, 1853, d'après une communication de F. Bouché (in Kieffer, 1901 b, p. 386) ; Schlechtendal, 1890, p. 43, n° 372.

E-C.



**Polygonum aviculare**

*Augasma aeratella* (n° 2154)

Fig. 642 (a). — D'ap. nat.

Fig. 643 (b). — D'ap. nat.

Fig. 644 (c). — D'ap. nat.

**Polygonum amphibium**

*Perrisia persicariæ* (n° 2159)

Fig. 645 (a). — D'ap. nat.

Fig. 646 (b). — D'ap. nat.

Fig. 647 (c). — D'ap. nat.

**Polygonum amphibium L. var. terrestre LEERS**

Pl. fe. — Voir n° 2159. . . . . **Perrisia persicariæ L. 2161**

Massalongo, 1895, p. 59, n° 29 ; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n° 71, ⊕.

A.J.

**Polygonum Persicaria L.**

Pl. fe. — Enroulement marginal par en bas ; la partie enroulée est de consistance molle et souvent teintée de rouge ; l'enroulement est lâche. Larves rouges. M.C. **Perrisia persicariæ L. 2162**

F. Löw, 1885 c, p. 489-491 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 279.

E-C, F, J.

**Polygonum Persicaria** L. var. **clatum** GRENIER et GODR.

- Pl. fe. — Bord des feuilles jeunes étroitement enroulé par en bas jusqu'à la nervure médiane. **Phorodon galeopsidis** KALT. 2163  
Tavares, 1905, p. 42. P.

**Polygonum lapathifolium** L.

- Ac. ti. — Voir n° 2154. . . . . **Augasma aeratella** ZELL. 2164  
Sorhagen, 1902, p. 79, n° 149; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 385. E-C.

**Polygonum tomentosum** SEIDRANK

- Ac. fl. — Hypertrophie et chloranthie du péricône, atrophie des étamines, hypertrophie de l'ovaire. Une larve dans chaque fleur. **Psyllide** 2165  
Hieronymus, 1890, p. 108-109, n° 299; Frank, 1896, p. 180, n° 6. E-C.

**Polygonum viviparum** L.

- Ac. fl. — Inflorescence vivipare, épaissie. . . . . **Psyllide** 2166  
F. Löw, 1888, p. 29, n° 118; Dalla Torre, 1892, p. 143. E-C.

- Pl. fe. — Enroulement marginal par en bas, lâche; la partie enroulée, de consistance molle, est souvent teintée de rouge. Larves rouges. M.C. **Perrisia persicariæ** L. 2167  
Thomas, 1878, p. 705; Hieronymus, 1890, p. 150, n° 479; Corti, 1902, p. 237-238, n° 154. E-T (v.c.c. E).

**Polygonum Bistorta** L.

- Pl. fe. — A la face inférieure, petites fossettes avec saillie correspondante à la face supérieure. **Cécidomyide** 2168  
Thomas, 1890, p. 304; Rübsaamen, 1890, p. 251, n° 242; Lagerheim, 1903, p. 342, n° 2; Mariani, 1907<sup>b</sup>, p. 306, n° 116. E-C, I.
- Enroulement marginal par en bas. . . . . **Psyllide** 2168A  
Thomas, 1892<sup>b</sup>, p. 9. E-C.

— Enroulement marginal par en bas; la partie enroulée, à surface ridée, est faiblement hypertrophiée et de consistance molle; la cécidie a 6 mm. de diamètre et l'enroulement comprend deux à trois tours. Larve rouge. [M.T.]. **Cécidomyide** 2169  
 Thomas, 1878, p. 705; 1892<sup>b</sup>, p. 8-9, n° 12; Hieronymus, 1890, p. 149, n° 478; Appel, 1891, p. 644; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 385. *E-G.*

— Enroulement marginal par en bas; la partie enroulée, de consistance coriace, présente une hypertrophie marquée; néanmoins la surface est lisse. L'enroulement qui a 2-2,5 mm. de diamètre et comprend un tour ou un tour et quart, ne porte que sur une faible partie (15-20 mm.) de la longueur du bord; celui-ci s'incurve en faucille ou en croissant et prend un aspect brillant, avec une teinte vert jaunâtre clair ou jaune cireux ou enfin rougeâtre. Larve blanche. **Cécidomyide** 2170  
 Thomas, 1892<sup>b</sup>, p. 8-9, n° 12; Kieffer, 1898, p. 151; Mariani, 1907<sup>b</sup>, p. 306, n° 117. *E-G, I.*

### **Polygonum Convolvulus L.**

**Ac. ti.** — Renflement et torsion de la tige dont les entre-nœuds sont courts et épais; les feuilles sont souvent hypertrophiées.

**Tylenchus devastatrix** Kühn 2171

Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 16; 1891, p. 735; Frank, 1896, p. 31. *E-O.*

**Pl. fe.** — Enroulement marginal par en bas; la partie enroulée est décolorée.

**Aphide** 2172

Liebel, 1886, p. 552, n° 160; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 279; Tavares, 1905, p. 42. *A, E, P.*

### **Polygonum alpestre**

**Pl. fe.** — Limbe enroulé par en bas jusqu'à la nervure médiane, épaissi et coloré en rouge carmin.

**Ériophyde** 2173

Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 282, n° 63, fig. 0, ⊕. *A-M.*

### **Polygonum Hydropiper L.**

**Pl. ti.** — Au niveau d'un nœud, renflement uniloculaire, atténué à la partie supérieure.

**Lépidoptère** 2174

Massalongo, 1908, p. 2-3, n° 5, fig. 5, ⊕. *I.*

**Fagopyrum esculentum MÖNCH (Polygonum Fagopyrum L.)**

Ac.ti. — Voir n° 2171. . . . . Tylenchus devastatrix Künx 2175  
 Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n° 15 ; 1891, p. 760, fig. 434, ⊕ ; 1892, p. 341-342, fig., ⊕. E-O.

## FAMILLE DES CHÉNOPODIACÉES

Anabasis 2247, Arthrocnemum 2235, Atriplex 2192-2231, Beta 2176-2178, Chenopodium 2179-2188, Kochia, 2232-2234, Salicornia 2236-2242, Salsola, 2243-2246, Spinacia 2189-2191, Suaeda 2248-2249.

Les plus grandes ressemblances existent entre les galles décrites sur les diverses espèces des genres *Atriplex* et *Obione* que, du reste, beaucoup de botanistes fusionnent en un seul. — Dans les deux genres, les fleurs sont déformées par l'*Eriophyes Heimi* ; les bractées florales sont hypertrophiées par des larves de Cécidomyides ; les tiges se renflent sous l'influence de grosses chenilles de Lépidoptères ou par l'action de larves plus petites appartenant à plusieurs Cécidomyidés du genre *Stefaniella* ; les limbes peuvent être enroulés par des Psyllides ou présenter des pustules grâce à des larves qui sont peut-être dans tous les cas celles du *Stefaniella brevipalpis*, ou encore s'orner par places de petits soulèvements hémisphériques dans lesquels on rencontre l'*Eriophyes brevipes*.

Les racines de quelques Chénopodes et de plusieurs Arroches sont renflées par un Coléoptère, le *Mecaspis fasciatus*, tandis que celles de l'épinard et de la Betterave abritent, dans des nodosités, l'*Heterodera radicicola* et surtout l'*Heterodera Schachtii*. Comme chacun sait, l'importance de ce dernier parasite est de tout premier ordre en Europe : les dégâts qu'il cause dans les plantations de betteraves sucrières ont obligé les agronomes à l'étudier avec soin depuis une cinquantaine d'années et sa bibliographie est considérable ; aussi renvoyons-nous le lecteur, désireux d'approfondir cette question, aux mémoires de Schacht, Schmidt, Strubell, Kühn, etc., et aux périodiques relatifs à l'industrie du sucre.

On peut rapprocher les cécidies caulinaires de l'*Obione pedunculata* et de *Suaeda fruticosa*, dont la grande cavité interne est occupée par des Ériophyides (*Eriophyes obiones* et *E. caulobius*), de même que deux diptéroécidies de *Salicornia* et de *Salsola*.

Signalons aussi un certain air de parenté entre les galles terminales, en forme de boules de feuilles velues, de l'*Atriplex Halimus* (attribuées à *Asphondylia punicea* et *A. conglomérata*) et celles de divers *Kochia*, *Salsola*, *Salicornia*, *Suaeda*, engendrées par des Cécidomyides ou des Ériophyides.

Toutes ces Chénopodiacées des régions désertiques et salées de l'Est de l'Europe, du Nord de l'Afrique ou du bord de la Méditerranée, possèdent du reste beaucoup de cécidies intéressantes, pour la plupart encore mal connues, qui nécessiteraient de nouvelles recherches ; en particulier, celles

qui ont été recueillies au Maroc (n° 2235), en Syrie (n°s 2239, 2244, 2245, 2246) ou en Égypte (n°s 2238, 2247).

Les galles les plus répandues des Chénopodiacées des champs et des jardins d'Europe consistent en enroulements foliaires dans lesquels on trouve, en général, l'*Aphis atriplicis* (un grand nombre d'espèces pour le genre *Atriplex* et 6 espèces environ pour le genre *Chenopodium*). L'*Aphis rumicis*, déjà signalé dans la famille des Polygonacées, crisper et enroule le limbe de *Spinacia oleracea* et d'*Atriplex hortense*.

~~~~~

Beta vulgaris L.

(avec les variétés *Rapa*, *Rapacea* et *Cycta*)

Pl.ra. — Nodosités arrondies avec cavité interne contenant des anguillules. **Heterodera radiculicola** GREEFF 2176

Vuillemin et Legrain, 1894, p. 549-551; Corti, 1903^b, p. 343, n° 20. E-T, A.L.

— Nodosités allongées, de forme très irrégulière; pas de cavité interne; anguillules ectoparasites.

Heterodera Schachtii SCHMIDT 2177

Chatin, 1891, p. (1-52), 9 pl.; 1887, p. 130-132; Ritzema-Bos, 1891, p. 765-777, fig. 437, ⊕; 1894, p. 226-228; Willot, 1901, p. 703. E-T.

Pl.fe. — Limbe crispé et replié. **Aphis rumicis** L. 2178

Cecconi, 1901⁴, p. 263, n° 8; Schouteden, 1903, p. 170; Tavares, 1905, p. 6; 1907^b, p. 110. E-O, I.

~~~~~

**Chenopodium polyspermum L.**

**Pl.fe.** — Enroulement marginal par en haut. . . **Aphis atriplicis** L. 2179

Houard, 1902<sup>2</sup>, p. 26; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 250. c. F.

**Chenopodium album L.**

**Pl.ra.** — Renflements. . . . . **Mecaspis fasciatus** MÜLLER 2180

Rostrup, 1896, p. 30, n° 186; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 249; Hieronymus Pax, etc., 1906, fasc. XIV, n° 383, ⊕. D, A  
F

**Pl.ti.** — Renflement fusiforme, multiloculaire, de la taille d'une

noisette, à surface verdâtre ; cavités larvaires allongées et cylindriques. Larve couleur jaune d'œuf.

**Aplonyx chenopodii** STEFANI 2181

Stefani, 1907<sup>b</sup>, p. (5), n° 3 ; 1907<sup>d</sup>, p. 174-176.

si.

Pl.fe. — Enroulement marginal par en haut avec hypertrophie et décoloration (fig. 648-650). Puceron vert fortement pulvérulent.

**Aphis atriplicis** L. 2182

Massalongo, 1893, p. (258-259), n° 210 ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. V, n° 106, ⊕.

E.T.



**Chenopodium album**

*Aphis atriplicis* (n° 2182)

Fig. 648 (a). — D'ap. nat.

Fig. 649 (b). -- D'ap. nat.

Fig. 650 (c). — D'ap. nat.

— Amas de poils. . . . . **Ériophyide** 2183

Rostrup, 1896, p. 30, n° 185 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 249.

D.F.

**Chenopodium murale** L.

Pl.fe. — Enroulement par en haut. Voir n° 2182. **Aphis atriplicis** L. 2184

Corti, 1904, p. 7, n° 18.

S.

**Chenopodium urticum** L.

Pl.fe. — Enroulement par en haut. Voir n° 2182. **Aphis atriplicis** L. 2185

C. Marchal et Chateau, 1905, p. 250.

F.

**Chenopodium Quinoa** WILLD.

- Pl.fe. — Enroulement par en haut. Voir n° 2182. **Aphis atriplicis** L. 2186  
Rübsaamen, 1890, p. 34, n° 37; Schlechtendal, 1890, p. 45, n° 390 A.

**Chenopodium vulvaria** L.

- Pl.fe. — Voir n° 2182. . . . . **Aphis atriplicis** L. 2187  
Geisenheyner, 1902, p. 309, n° 61; Stefani, 1906<sup>b</sup>, p. 129-130; Mariani, 1907<sup>b</sup>, p. 297, n° 78. A.I.

**Chenopodium (Blitum) glaucum** L.

- Pl.ra. — Renflements. . . . . **Mecaspis fasciatus** MÜLLER 2188  
Rostrup, 1896, p. 29, n° 183. D.

**Sphaecia oleracea** L.

- Pl.ra. — Nodosités sans cavité interne. **Heterodera Schachtii** SCHMIDT 2189  
— Nodosités avec cavité interne. **Heterodera radicolica** GREEFF 2190  
Schmidt, 1871; Kieffer, 1892<sup>d</sup>, p. 224; 1901<sup>b</sup>, p. 517; Schlechtendal, 1895, p. 16. E.C.

- Pl.fe. — Limbe crispé, replié sur la face supérieure ou enroulé en  
hélice autour de la nervure médiane. **Aphis rumicis** L. 2191  
Cecconi, 1900, p. 240, n° 30; Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 129. I.P.

**Atriplex hortense** L.

- Pl.fe. — Limbe enroulé par en haut. Puceron vert fortement pulvé-  
rulent. **Aphis atriplicis** L. 2192  
Rübsaamen, 1890, p. 31, n° 20. A.

- Limbe des feuilles jeunes crispé, enroulé souvent oblique-  
ment par en bas : de petites éminences se montrent sur les  
feuilles âgées. Puceron noir ou vert foncé. **Aphis rumicis** L. 2193  
Schouteden, 1903<sup>b</sup>, p. 92. B.

**Atriplex patulum** L. (**A. angustifolia** SMITH)

**Pl.ra.** — Renflements. . . . . **Mecaspis fasciatus** MÜLLER 2194  
Rostrup, 1896, p. 29, n° 182. *D.*

**Pl.ti.** — Renflement en ovoïde allongé, presque ligneux, pluriloculaire (fig. 651-652), situé sur les rameaux ou l'axe d'inflorescence. Larves jaune orangé clair. **Stefaniella** 2195  
Cecconi, 1901 f, p. 1030-1031, n° 2. *s, F.*



*Atriplex patulum*  
*Stefaniella* (n° 2195)

Fig. 651 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 652 (b). — D'ap. nat.

— Renflement fusiforme, pluriloculaire, de 3-4 mm. de diamètre transversal. **Coléoptère** 2196  
Massalongo, 1908, p. 1, n° 1, fig. 1-2, ⊕. *I.*

**Pl.fe.** — Limbe enroulé par en haut. . . . . **Aphis atriplicis** L. 2197  
Kaltenbach, 1874 p. 508, n° 36; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VI, n° 178, ⊕; Connold, 1901, p. 233-234, pl. Cl, ⊕; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 34, ⊕. *E-C*  
*E-O, J.*

— Pli marginal irrégulier. . . . . **Triozia atriplicis** LICHT. 2198  
Lichtenstein, 1879, p. 82-84; Scott, 1879, p. 114-115. *E-O.*

**Atriplex litorale** L.

**Pl.ra.** — Renflements. . . . . **Mecaspis fasciatus** MÜLLER 2199  
Rostrup, 1896, p. 29, n° 181. *D.*

**Pl.fe.** — Limbe enroulé par en haut. . . . . **Aphis atriplicis** L. 2200  
Rostrup, 1896, p. 29, n° 180. *D.*



**Atriplex hastatum** L. (**A. latifolia** WAHL.)

- Pl.ra.** — Renflements. . . . . **Mecaspis fasciatus** MÜLLER 2201  
Rostrup, 1896, p. 29, n° 179. *D.*
- Pl.ti.** — Léger renflement de 4-10 mm. de long ; petite loge larvaire. [M.C.]. **Cécidomyide** 2202  
Trotter, 1901 d, p. 361, n° 5. *I.*
- Pl.fe.** — A la face inférieure du limbe, saillie en forme de poche allongée, blanchâtre, s'ouvrant à la face supérieure par une fente. **Aphide** 2203  
Kieffer, 1891, p. 20, n° 6 ; Schouteden, 1903, p. 170. *A.*
- Limbe enroulé par en haut. . . . . **Aphis atriplicis** L. 2204  
Martel, 1891, p. 13, n° 16 ; Loïsele, 1903, p. (2) ; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 242. *F.*

**Atriplex Babingtoni** WOODS

- Pl.fe.** — Limbe enroulé par en haut. . . . . **Aphis atriplicis** L. 2205  
Schlechtendal, 1890, p. 44, n° 388 ; Kieffer, 1901 b, p. 266. *I-B.*

**Atriplex Halimus** L.

- Ac.fl.** — Les bourgeons floraux sont transformés en masses sphériques de la grosseur d'un pois, de couleur verte, charnues, laineuses, hérissées de petites pointes ; chambre larvaire sphérique. Larve d'un blanc sale. M.C. **Asphondylia conglomerata** STEFANI 2206  
Stefani, 1900, p. 14-17, n° 4 pl. fig. 9, ⊕ ; 1906, p. 95. *si.*
- Fleurs déformées et velues. . . . **Eriophyes Heimi** NAL. 2207  
Stefani, 1900, p. 26-27, n° 9 ; 1901 b, p. 225-226, n° 7 ; 1906, p. 96. *si.*
- Ac.ti.** — Cécidie terminale ou axillaire formée de feuilles irrégulières, de tailles variées, pour la plupart contournées en cuiller, serrées les unes contre les autres et se recouvrant partiellement (fig. 653) ; l'axe arrêté dans son développement se renfle en une masse ovoïde, très dure, portant plusieurs renflements

arrondis qui contiennent chacun une cavité (fig. 654). Une larve orangée dans chaque loge. M.C.

**Asphondylia punica** MARCHAL 2208

P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 20-21, n° 1, pl. I, 15-16, ⊕ ; Houard, 1901<sup>d</sup>, p. 701, n° 6


AL.

— Feuilles contournées sur elles-mêmes (fig. 655), avec, le plus souvent, repliement des bords sur la face supérieure (fig. 656); le rameau reste court.

**Psyllide** 2209

P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 22, n° 3; Houard, 1901<sup>d</sup>, p. 702, n° 10.

AL.



*Atriplex Halimus*  
*Asphondylia punica* (n° 2208)  
Fig. 653 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 654 (b). — D'ap. nat.



*Atriplex Halimus*  
*Psyllide* (n° 2209)  
Fig. 655 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 656 (b). — D'ap. nat.



*Atriplex Halimus*  
*Coleophora Stefani* (n° 2212)  
Fig. 657 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 658 (b). — D'ap. nat.

Ac.bg. — Sur les rameaux latéraux, les bourgeons foliaires se transforment en grosses agglomérations subsphériques ou allongées, formées de petites galles uniloculaires, surmontées de petites feuilles; chambre larvaire sphérique.

**Asphondylia conglomerata** STEFANI 2210

Stefani, 1900, p. 17-18, n° 5, pl. fig. 10-11, ⊕; 1906, p. 94-95; Rübсаamen, 1902<sup>c</sup>, p. 256-258, si, SY, n° 18, fig. J-K, ⊕; Trotter et Ceconi, 1904, fasc. IX, n° 215, ⊕.

— A l'aisselle des feuilles, renflement subsphérique, de couleur verte, à surface blanchâtre, un peu plus petit qu'un pois. Une chambre larvaire contenant une larve jaunâtre.

[**Asphondylia conglomerata** STEFANI] 2211


Stefani, 1900, p. 18-20, n° 6, pl. fig. 12, ⊕; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 266,

si.

**Pl.ti.** — Sur un rameau, renflement de 30 mm. de long sur 9-10 mm. de diamètre (fig.657) ; cavité allongée (fig.658) avec, à la partie inférieure, un pédoncule ligneux supportant le tube soyeux de la chrysalide ; ouverture à la partie supérieure. Larve blanc sale, de 5 mm. de long. Adulte juillet-août.

**Coleophora Stefani** JOANNIS 2212

Stefani, 1900, p.20-24, n° 7, pl. fig. 13-16, ⊕ ; 1906, p.95-96 ; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. III, 1, AL, n° 52, ⊕ ; Houard, 1901 d, p.702, n° 12 ; 1903 c, p.339-345, fig.304-314, ⊕.



*Atriplex Halimus*  
*Stefaniella trinacriæ* (n° 2213)

Fig.659 (a). — D'ap. nat.  
Fig.660 (b). — D'ap. nat.  
Fig.661 (c). — D'ap. nat.

*Atriplex Halimus*  
*Stefaniella* (n° 2216)

*Eriophyes brevipes* (n° 2217)  
Fig.662-664 (a-c). — D'ap. nat.  
Fig.665-667 (d-f). — D'ap. nat.

*Atriplex portulacoides*  
*Lépidoptère* (n° 2226)

Fig.668 (a). — D'ap. nat.  
Fig.669 (b). — D'ap. nat.  
Fig.670 (c). — D'ap. nat.

— Sur les rameaux, épaississement fusiforme (fig.659) pouvant atteindre la grosseur d'une noix, dur, ligneux, à surface lisse, présentant plusieurs chambres larvaires tubiformes fermées par de petites membranes parcheminées (fig.661) ; plus rarement la cécidie se trouve sur le pétiole des feuilles (fig.660) ou la nervure médiane. Dans chaque loge habite une larve blanc jaunâtre. M.C. Adulte été II. **Stefaniella trinacriæ** STEFANI 2213

Stefani, 1900, p. 4-11, n° 1, pl. fig. 1-5, ⊕ ; Houard, 1901 d, p.701, n° 7, fig. 3-7, ⊕ ; 1903 c, p.305-310, fig.248-253, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. IX, n° 216, ⊕.

F. L.  
AL.

— Cécidie de forme variable, globuleuse ou fusiforme, constituant un renflement charnu sur les rameaux ou l'axe d'infloraison.

rescence, sur le pétiole ou la nervure médiane d'une feuille ; cavités larvaires nombreuses, allongées (5 mm. sur 0,6), avec membrane transversale. Larve orangée dans un cocon blanc.

**Stefaniella brevialpis** KIEFF. ] 2214

Tavares, 1905, p. 6 ; 1907 b, pl. III, 11-12, ⊕.

P.

— Sur la tige, petit renflement ovoïde, de 4-5 mm. de diamètre au maximum ; cavité larvaire non fermée par une membrane. Larve blanche.

**Stefaniella atriplicis** KIEFF. 2215

Kieffer, 1898 c, p. 56 ; 1900 c, pl. XXXVII, 5, ⊕ ; Houard, 1901 d, p. 701, n° 8 ; Darboux, 1902 b, p. 32 ; Stefani, 1906, p. 94.

F.I.  
A.L.

**Pl.fe.** — Sur le limbe et la nervure médiane, cécidie lenticulaire de 3,5-5 mm. de diamètre (fig. 662-664). Larve jaunâtre. M.T.

**Stefaniella** 2216

Stefani, 1900, p. 12-14, n° 3, pl. fig. 8, ⊕ ; Houard, 1901 d, p. 701, n° 9 ; Rübsaamen, 1902 c, p. 258-259 ; Trotter et Ceconi, 1904, fasc. IX, n° 217, ⊕.

I.G.  
A.L.

— Cécidie formée par un soulèvement hémisphérique, gros comme un grain de chènevis, de la face inférieure du limbe ; un enfoncement circulaire y correspond à la face supérieure (fig. 665-667).

**Eriophyes brevipes** NAL. 2217

Stefani, 1900, p. 24-26, n° 8 ; 1901 b, p. 225, n° 6 ; Houard, 1901 d, p. 702, n° 11 ; Trotter et Ceconi, 1901, fasc. III, n° 53, ⊕.

I.A.L.

— Sur la partie dorsale des bractées florales, très petite cécidie de couleur roussâtre, plus longue que large et creusée d'une minime chambre larvaire tubuleuse. Une larve couleur jaune d'œuf.

**Cécidomyide** 2218

Stefani, 1900, p. 11-12, n° 2, pl. fig. 7, ⊕ ; 1905 d, p. 114 ; 1906, p. 95.

si.

**Atriplex roscum** L.

**Pl.ra.** — Renflement au-dessous du collet.

**Mecaspis fasciatus** MÜLLER 2219

G. Marchal, 1885, p. 81, 1° ; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 242.

F.

**Atriplex tataricum** L.

**Pl.fe.** — Limbe déformé et enroulé. . . . . **Aphide** 2220

Geisenheyner, 1902, p. 309, n° 61.

A.

**Atriplex (Oblone) portulacoides L.**

- Ac.fl.** — Galle de l'inflorescence dont les fleurs se développent peu, restent fermées et forment une masse arrondie de la grosseur d'un pois. Cécidomyide 2221  
*Stefani, 1898<sup>c</sup>, p.(4), n°3.* *si.*
- Fleurs déformées. . . . . **Eriophyes Heimi** NAL. 2222  
*Kieffer, 1901 b, p.266.*
- Ac.ti.** — Les feuilles terminales des jeunes rameaux sont légèrement repliées ou présentent des bosselures roussâtres à la face supérieure, avec légère hypertrophie de la partie ainsi déformée. Psyllide 2223  
*Baldrati, 1900, p.31-32, n°57; Kieffer, 1901 b, p.266.* *I.*
- Pl.ti.** — Sur la tige ou sur l'axe de l'inflorescence, renflement ovoïde ou fusiforme contenant des larves orangées, M.C. Stefaniella brevipalpis KIEFF. 2224  
*Stefani, 1898<sup>c</sup>, p.(4), n°2; Baldrati, 1900, p.54, n°129, pl.V, 2, ⊕.* *I.*
- Cécidie de la tige ou de l'axe d'inflorescence offrant le même aspect que la précédente, mais à loge larvaire moins profonde. Stefaniella 2225  
*Trotter, 1903, p.15, n°12.* *T.*
- Vers l'extrémité des jeunes rameaux, galles fusiformes (fig.668-670) de 35 mm. de long sur 5-6 mm. de large et contenant une chenille dans une grande cavité larvaire. Lépidoptère 2226  
*Stefani, 1898<sup>c</sup>, p.(5), n°5; Houard, 1902 b, p.37, n°8.* *si, F.*
- Pl.fe.** — Sur les feuilles, renflements lenticulaires visibles sur les deux faces, verts au début, blanchâtres à maturité et contenant une larve orangée. Stefaniella brevipalpis KIEFF. 2227
- Pustule du limbe visible sur les deux faces, discoïdale, blanchâtre, de 2-3 mm. de diamètre. Cécidomyide 2228  
*Stefani, 1898<sup>c</sup>, p.(4), n°1; Trotter, 1903, p.14-15, n°11.* *si, T.*

— Dans l'épaisseur des bractées florales, cécidies tubulaires de petites dimensions, fort peu apparentes. **Cécidomyide** 2229  
 Stefani, 1898<sup>c</sup>, p. (4), n° 4. *si.*

— Cécidie consistant en un soulèvement hémisphérique saillant à la face inférieure du limbe et auquel correspond une petite excavation sur l'autre face. [**Eriophyes brevipes** NAL.] 2230  
 Cecconi, 1901, p. 139, n° 1<sup>a</sup>; 1901<sup>b</sup>, p. 39, n° 2. *s.ch.*

**Atriplex (Obione) pedunculatum L.**

**Pl.ti.** — Renflement irrégulier de l'axe florifère au niveau des pédoncles floraux. **Eriophyes obiones** MOLL. 2231  
 Mollard, 1902, p. 21-29, pl. 1, 7-12, ⊕. *F.*



**Kochia prostrata** SCHRAD.

**Ac.ti.** — Déformation de l'extrémité des tiges et des fleurs : les bourgeons se transforment en petites cécidies allongées, uniloculaires, à parois minces, couvertes de poils très longs et très serrés, et l'ensemble offre l'aspect d'une sphère laineuse un peu plus grosse qu'un pois (fig. 671) ; les fleurs peuvent présenter une pilosité anormale. **Cécidomyide** 2232

Rubsamen, 1895, p. 447, n° 70, pl. XIII, 8, pl. XVI, 10, ⊕ ; 1902<sup>c</sup>, p. 272, n° 47 ; Mik, 1897, *E.R.*  
 p. 294-296, n° 7, pl. IV, ⊕ ; Honard, 1906<sup>g</sup>, p. 68-69, n° 4. *A-M.*

— Les fleurs, au lieu d'être isolées ou réunies en petits amas à l'aisselle des rameaux, sont groupées au sommet des rameaux et entourées de quelques bractées anormalement pileuses (fig. 672). **Eriophyide** 2233

Mik, 1897, p. 296, pl. IV, ⊕. *R.*

— Extrémité de l'axe d'inflorescence hypertrophiée et contournée. **Anguillulide** 2234

Mariani, 1907, p. 64, n° 7 ; 1907<sup>b</sup>, p. 301, n° 56. *I.*



**Arthrocnemum glaucum** UNGERN-STERNBERG

**Acre.** — Renflement ovoïdal (7 mm. sur 3 mm.), charnu, vert, formé aux dépens du dernier entre-nœud des rameaux. Larve orangée.

**Cécidomyide** 2235

Cecconi, 1901, p. 1030, n° 1; Trotter, 1904<sup>b</sup>, p. 141, fig., ⊕.

s. M. L.



*Kochia prostrata*

*Cécidomyide* (n° 2235)

*Eriophyide* (n° 2233)

Fig. 671 (a). — Im. MİK

Fig. 672 (b). — Im. MİK

*Salicornia fruticosa*

*Baldratia salicorniæ* (n° 2240)

*Eriophyes salicorniæ* (n° 2236)

Fig. 673 (a). — Im. BALDR.

Fig. 674 (b). — Im. BALDR.

**Salicornia fruticosa** L.

**Acre.** — Par suite de cladomanie et de prolifération axillaires, répétées à courts intervalles, il se forme des glomérules compacts et irréguliers (fig. 674), de la grosseur d'une noisette à celle du poing.

**Eriophyes salicorniæ** NAL. 2236

Massalongo, 1898, p. 37-38, n° 27; Baldrati, 1900, p. 23, n° 31, pl. I, 6, ⊕; Cecconi, 1901<sup>b</sup>, p. 40, n° 7; 1901<sup>c</sup>, p. 1030, n° 22; Nalepa, 1902, p. 222-223.

I, 8,  
ch.

— Rameaux florifères latéraux transformés en amas sphériques ou ovoïdes, pédonculés ou sessiles.

**Eriophyide** 2237

Misciattelli, 1899, p. 17, n° 55.

I.

— Glomérules irréguliers, de la grosseur d'un pois, couverts d'un feutrage épais au travers duquel émergent des appendices de 3-9 mm. de longueur; 10-14 chambres larvaires ovoïdes, de 2 mm. de diamètre. **Hyménoptère** 2238

Frauenfeld, 1859, p. 378, pl. VII, 19, ⊕. *ÉG.*

— Cécidie en artichaut. . . . . **Insecte** 2239

Focken, 1892, p. 158-159. — Sur cette galle l'*Eriophyes syriacus* Focken vit en liberté (Nalepa, 1898, p. 15, n° 36). *SY.*

**Plre.** — Les entre-nœuds des jeunes rameaux présentent des renflements unilatéraux (fig. 673), colorés en roux; cavité larvaire centrale mesurant 4 mm. sur 1,5 mm. Larve solitaire rougeâtre. **M.C.H.** **Baldratia salicorniæ** KIEFF. 2240

Kieffer, 1900\*, pl. XXXVII, 4, ⊕; Baldrati, 1900, p. 60, n° 148, pl. V, 5, ⊕; Tavares, 1905, p. 91: 1907<sup>b</sup>, pl. II, 7-9, ⊕; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XV, n° 360, ⊕. *LP.*

— Renflement fusiforme (1,5 mm. sur 5 mm.), charnu, bi ou pluriloculaire, des rameaux ou de la tige. **Cécidomyide** 2241

Tavares, 1905, p. 90-91, pl. VIII, 6, ⊕. *P.*

**Salicornia herbacea L.**

**Plre.** — Voir n° 2240. . . . . **Baldratia salicorniæ** KIEFF. 2242

Trotter, 1903, p. 218, n° 188. *T.*



**Salsola vermiculata L. var. microphylla**

**Aerc.** — Bourgeon transformé en une masse charnue, uniloculaire, globuleuse, de 15-18 mm. de diamètre, couverte d'un grand nombre de feuilles plus ou moins velues. **M.C.** **Stefaniella salsolæ** TAVARES 2243

Tavares, 1904, p. 293-294. *E.*

**Salsola rigida PALL. var. tenuifolia BOISSIER**

**Ac.ti.** — Tige raccourcie et renflée, avec feuilles fortement velues. **Cécidomyide** 2244

Rubsaamen, 1902\*, p. 322, n° 128. *SY.*




— Extrémité des pousses déformée, semblable à un petit bourgeon, de 3,5 mm. de hauteur sur 3 mm. de diamètre transversal, dont les feuilles élargies à la base enveloppent une larve.

Cécidomyide 2245

Rübsaamen, 1902\*, p. 322, n° 129.

SY.



*Salsola* sp.

Diptère (n° 2246)

Fig. 675 (a). — Im. FOCKEÜ

Fig. 676 (b). — Im. FOCKEÜ

Fig. 677 (c). — Im. FOCKEÜ

*Suaeda fruticosa*

*Eriophyes caulobius* (n° 2248)

Fig. 678 (a). — D'ap. nat.

Fig. 665 (b). — D'ap. nat.


### *Salsola* sp.

Pl.ti. — Sur le trajet des rameaux ou vers leur extrémité, renflement sphérique ou ovoïde, de couleur noire, de 10-20 mm. de long sur 5-10 mm. de diamètre (fig. 675), portant soit des feuilles rudimentaires, soit les cicatrices que ces feuilles laissent après leur chute; il n'existe qu'une cavité centrale irrégulière, d'où partent des galeries aboutissant aux trous de sortie, visibles à la surface de la cécidie (fig. 676-677).

Diptère 2246

Fockeu, 1895, p. 595, pl. XV, 5, ⊕ : 1897, p. 37, pl. XV, 5, ⊕.

SY.



**Anabasis articulata** Moq.

**Ac.ti.** — Les deux feuilles supérieures d'un rameau sont dressées, appliquées par leurs bords de façon à former une poche, et le rameau lui-même est aplati en une lame divisant cette cécidie ovoïde en deux moitiés.

**Psyllide** 2247

Frauenfeld, 1859, p. 327, pl. VII, 16, ⊕ ; Frank, 1896, p. 180, n° 8 ; Massart, 1898, p. 291-292. *AL, ÉG.*

**Suaeda fruticosa** Forsk.

**Pl.ti.** — Renflement ellipsoïdal allongé des jeunes rameaux ; grande cavité interne irrégulière (fig. 678-679).

**Eriophyes caulobius** NAL. 2248

Cavara, 1900, p. 323, Trotter et Cecconi, 1901, fasc IV, n° 98 ; Cecconi, 1901, p. 142-143, n° 27. *s.*

**Suaeda vermiculata** Forsk.

**Ac.ti.** — Cécidie globuleuse, de la taille d'une petite prune, charnue, très velue ; cavité larvaire allongée et étroite.

**Cécidomyide** 2249

Kieffer, 1900<sup>c</sup>, pl. XLIII, 5, ⊕ ; 1901<sup>b</sup>, p. 522.

## FAMILLE DES AMARANTACÉES

*Amarantus* 2250-2251, *Bosia* 2252.

L'espèce du genre *Bosia* signalée ici est originaire de l'Inde et cultivée dans les jardins botaniques de l'Europe.

**Amarantus caudatus** L.

**Pl.fe.** — Éminences à la face supérieure du limbe qui se crispe et dont les bords se rabattent, parfois de façon à se toucher ; décoloration partielle.

**Aphis rumicis** L. 2250

Schouteden, 1903<sup>b</sup>, p. 92.

*B.*

**Amarantus retroflexus L.**

Pl.fe. — Limbe des feuilles jeunes ridé et un peu crispé.

[*Aphis rumicis* L.] 2251

TAVARES, 1903, p. 161, n° 3 : 1905, p. 3.

P.

**Bosia (Rodetia) Amherstiana Moq.**Pl.ra. — Nodosités. . . . . *Heterodera radicola* GREEFF 2252

Trotter, 1905, p. 52-53 (jardin botanique).

I.

## FAMILLE DES NYCTAGINACÉES

Bougainvillea 2255, *Mirabilis* 2253-2254.

Sur ces plantes, originaires de la région méditerranéenne ou cultivées dans les jardins, on ne connaît guère que des hémiptéroécidies foliaires dans lesquelles la réaction végétale semble très faible.

**Mirabilis dichotoma L.**

Pl.fe. — Limbe courbé par en bas, perpendiculairement à la nervure médiane, et fortement crispé.

Aphide 2253

TAVARES, 1905, p. 38.

P.

**Mirabilis divaricata LOWE**

Pl.fe. — Limbe crispé. . . . . Psyllide 2254

TAVARES, 1903<sup>b</sup>, p. 183, n° 14.

m.

**Bougainvillea brasiliensis WILLD.**

Pl.fe. — Limbe des feuilles jeunes enroulé par en bas et tordu en

HOUBARD, *Zoocécidies*.

26

hélice autour de la nervure médiane Puceron à la face inférieure.

Aphide 2255

Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 110 (jardin botanique).

P.

## FAMILLE DES PORTULACACÉES



### *Portulaca oleracea* L.

Pl. fe. — Limbe courbé par en bas et enroulé en hélice autour de la nervure médiane. Puceron noir, à la face inférieure. Aphide

2256

Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 123.

P.

## FAMILLE DES CARYOPHYLLACÉES

*Arenaria* 2355, *Cerastium* 2322-2352, *Cucubalus* 2296, *Dianthus* 2299-2365, *Gypsophila* 2297-2298, *Lychnis* 2290, *Melandryum* 2291-2295, *Mohringia* 2356-2359, *Sagina* 2353-2354, *Saponaria* 2306-2307, *Silene* 2261-2289, *Spergula* 2360-2361, *Stellaria* 2308-2321, *Viscaria* 2257-2260.

Dans la famille des Caryophyllacées, nombreux sont les genres qui présentent des Zoocécidies, leur aire de dispersion assez étendue étant des plus favorables aux insectes producteurs de galles.

Beaucoup de Silénées, en particulier les représentants du genre *Silene*, la plupart des Alsiniées, et surtout les différentes espèces du genre *Cerastium*, possèdent des déformations florales engendrées par des diptères. Ces diptéroécidies consistent, le plus souvent, en boutons floraux gonflés, demeurant clos, par suite de la présence, au milieu des pièces hypertrophiées des différents verticilles, de larves grégaires vivement colorées de plusieurs *Perrisia*: *P. lotharingia* des Céraistes, *P. floriperda*, *P. Bergrothiana* des Silènes, *P. moravia* du *Viscaria vulgaris*. Ce dernier hôte présente en commun avec le *Lychnis Flos-cuculi* la cécidie du *Perrisia praticola*, ce qui met en évidence l'affinité bien connue des deux genres *Viscaria* et *Lychnis*. On peut aussi rencontrer dans les boutons floraux gonflés des larves capables de sauter, par exemple celles du *Contarinia Steini*.

Plusieurs cas de chloranthie sont dus à la présence de diptères; ils sont beaucoup plus accentués et s'accompagnent de phénomènes de virescence ou de cladomanie lorsque ce sont des Ériophyides qui parasitent les inflo-

rescences (*Melandryum*, *Stellaria*, *Mohringia*). L'*Aphis cucubali* déforme de même les fleurs des Silènes.

Les capsules renflées de plusieurs Caryophyllacées (*Stellaria*, *Cerastium*, *Sagina*) ont fourni des larves d'insectes variés : Lépidoptères, Muscides, Cécidomyiides, Curculionides ; aussi ces recherches mériteraient-elles d'être reprises.

Les déformations terminales des tiges sont toujours dues au raccourcissement des entre-nœuds supérieurs : d'où la formation de galles en artichaut, ou tout au moins en touffes fusiformes constituées par 4 ou parfois même par 2 feuilles, dressées et rapprochées. Citons celles produites par *Perrisia viscaria*, *P. alpina*, *P. lychnidis*, *P. lotharingia*, etc., par *Macrolabis stellariae*. Des bouquets de feuilles sont aussi engendrés par des Aphidiens, parmi lesquels *Aphis cucubali*, *A. cerastii* ; l'*Hyalopteras melanocephalus* déforme l'extrémité des tiges des Silènes, tandis que le *Trioxa cerastii* fournit des galles très communes sur la plupart des espèces du genre *Cerastium*.

Dans certains cas, la déformation parasitaire peut s'étendre à la plante entière : tel est le cas du *Tylenchus devastatrix*, helminthe fort redouté par suite des dégâts considérables qu'il produit dans les cultures d'oignons (*Dianthus caryophyllus* surtout). Sous son influence, la plante reste courte ; elle se renfle, élargit ses feuilles à la base et prend un aspect caractéristique ; c'est la « maladie en ananas », bien connue des Horticulteurs. Nous renvoyons pour cette question au mémoire de Ritzema-Bos (1890, p. 149). La même anguillule attaque *Spergula arvensis* et sans doute aussi *Dianthus barbatus* (n° 2299).

Les tiges des Caryophyllacées présentent souvent de gros renflements fusiformes dus aux volumineuses larves de deux Lépidoptères du genre *Gelechia* et d'un Coléoptère (*Sibinia femoralis*).

Des recherches nouvelles seraient à désirer concernant la galle de *Stellaria media* décrite au n° 2316 ; on manque également de renseignements sur la cécidie radriculaire de *Mohringia* (n° 2358), signalée par Kirchner en 1855.

Enfin, les galles foliaires des Caryophyllacées sont peu importantes : elles consistent, en général, en enroulements du limbe sous l'influence de divers Pucerons, du *Brachycolus stellariae* surtout ; quelques-unes sont dues à l'action de l'*Eriophyes atrichus*. On ne connaît aucune cécidie érinécienne, aucune galle saillante, sauf celle qui est signalée au n° 2293 (*Melandryum albam*) et sur la nature de laquelle il est difficile de se prononcer.

### **Viscaria vulgaris** REICH.

(*V. viscosa* ASCHERSON, *Lychnis viscaria* L.)


**Ac.fl.** — Boutons gonflés demeurant fermés. Larves grégaires rouges. M.T.

*Perrisia praticola* KIEFF. 2257

Kieffer, 1898<sup>c</sup>, p. 12 ; 1901<sup>b</sup>, p. 360 ; Kertész, 1902, p. 46.

E-G.

- Cécidie identique à la précédente ; de quatre à huit larves d'un rouge jaunâtre. M.T. **Perrisia moraviæ** WACHTL 2258  
 Wachtl, 1883, p. 478 ; 1886, p. 209, n° 1, pl. III. ⊕. E-C.
- Ac.ti.** — Les quatre dernières feuilles d'une pousse sont dressées et forment une cécidie glabre, en forme de fuseau allongé. Larves grégaires rouges. M.T. **Perrisia viscariaë** KIEFFER 2259  
 Liebel, 1886, p. 579, n° 333 ; Kieffer, 1886, p. 332-333 ; 1888, p. 314. A.
- Pl.fe.** — Enroulement marginal par en haut. . . . . **Aphide** 2260  
 Liebel, 1886, p. 579, n° 335 ; Kieffer, 1891, f. p. 46, n° 80 ; Lagerheim, 1905, p. 24. E-N, A.



**Silene inflata** SMITH

- Ac.fl.** — Chloranthie et hypertrophie de tous les organes floraux, à l'exception du calice, qui demeure fermé. Larves grégaires rouge pâle. M.T. **Perrisia floriperda** F.LÖW 2261  
 F.Löw, 1888<sup>b</sup>, p. 231 ; Corti, 1904, p. 126, n° 105 ; Massalongo, 1906<sup>b</sup>, p. 156, n° 70, fig. 4. ⊕. E-C, I.
- Entre-nœuds floraux raccourcis ; l'inflorescence ramassée est entourée par les feuilles très développées des nœuds supérieurs. Voir le n° suivant. **Aphis cucubali** PASS. 2262
- Ac.ti.** — Les entre-nœuds terminaux demeurent courts et les feuilles, ainsi rapprochées en bouquets lâches, sont déformées. Puceron ovalaire, pâle, pulvérulent, à queue et cornicules foncés. **Aphis cucubali** PASS. 2263  
 Molliard, 1895, p. 143-145, pl. XI, 8-9, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. III, n° 115, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 102 ; Lagerheim, 1905, p. 23. E-T (exc. E)
- Sommet de la plante déformé. Puceron allongé, verdâtre, à queue et cornicules concolores. **Hyalopterus melanocephalus** BUCKTON 2264  
 Buckton, 1870, p. 116-117, pl. LXXVII, 5-7 ; Schouteden, 1903, p. 187. I-B.
- Les deux feuilles terminales, dressées et appliquées, forment une cécidie en forme de poche. Larves blanches non sauteuses. M.T. **Macrolabis** 2265  
 Kieffer, 1888, p. 114 ; 1901<sup>b</sup>, p. 512 ; Liebel, 1889, p. 305, n° 389. A.

— Cécidie semblable à la précédente. Larves blanches sauteuses. M. T. Contarinia 2266  
Trotter, 1899, p. 306, n° 47, pl. II, 12 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 512. I.

**Ac. bg.** — Bourgeons souterrains hypertrophiés, atteignant 3-4 mm. de diamètre, sphériques ou ovoïdes ; les feuilles sont transformées en écailles blanches et charnues. Une seule larve blanche. Cécidomyide 2267  
E. Löw, 1885<sup>c</sup>, p. 507 ; Dalla Torre, 1892, p. 161, a. E. C.

**Pl. ti.** — Entre-nœuds renflés. . . . *Gelechia cauligenella* SCHMID 2268  
Trotter, 1898, p. 34, n° 66 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VI, n° 197, ⊕ ; Massalongo, 1903, p. 42, n° 15. I.

### **Silene gallica L.**

**Pl. ti.** — Renflement fusiforme (10-15 mm. sur 8-10 mm.). 2269  
[*Gelechia cauligenella* SCHMID] P.  
Tavares, 1900, p. 99, n° 211 ; 1905, p. 102.

### **Silene valesia L.**

**Ac. ti.** — Déformation terminale arrêtant la croissance de la tige. Tortricide 2270  
Thomas, 1893, p. 303-304, n° 12 ; Mariani, 1907<sup>b</sup>, p. 313, n° 153. E. C. I.

### **Silene portensis L.**

**Pl. ti.** — Renflement fusiforme (10-15 mm. sur 8-10 mm.). 2271  
[*Gelechia cauligenella* SCHMID] P.  
Tavares, 1900, p. 99, n° 211 ; 1905, p. 102.

### **Silene inaperta L.**

**Pl. ti.** — Renflement fusiforme (10-15 mm. sur 8-10 mm.). 2272  
[*Gelechia cauligenella* SCHMID] P.  
Tavares, 1905, p. 102.

**Silene saxifraga L.**

**Ac.ti.** — Cécidie située à l'extrémité des rameaux, ovoïde (10 mm. sur 7), constituée par les deux dernières feuilles imbriquées, concaves, anormalement grossies. Chenille solitaire, blanchâtre, longue de 5-6 mm.

**Lépidoptère 2273**

Massalongo, 1904, p. 121, n° 38, fig. 3, ⊕.

I.

**Silene acaulis L.**

**Ac.ti.** — Les entre-nœuds terminaux demeurent courts ; les feuilles, très rapprochées les unes des autres, restent courtes aussi, mais deviennent très larges et très épaisses ; elles sont en général décolorées, presque blanches à la base, vertes à l'extrémité seulement et forment une cécidie en artichaut. Larves grégaires rouge rosé. M.T.

**Perrisia alpina F.Löw 2274**

F.Löw, 1877, p. 33-34, n° 3 ; 1885 d, p. 110-112, n° 2 ; Bezzi, 1899 b, p. (13), n° 18 ; Hieronymus, Pax, etc., 1906, fasc. XIV, n° 397, ⊕.

E-C,  
I, I-B.

**Silene Otites SMITH**

**Ac.fl.** — Galle de la taille d'un gros pois, constituée par des fleurs déformées dans lesquelles les étamines sont normales, les pétales virescents et le calice couvert de poils anormaux. Larves rouges, non sauteuses.

**Perrisia 2275**

Rübsaamen, 1899, p. 235, n° 17 ; Kieffer, 1901 b, p. 512.

A.

**Ac.ti.** — Entre-nœuds raccourcis ; feuilles enroulées en tubes. Puceron jaune pâle

**Aphide 2276**

Geisenheyner, 1902, p. 311-312, n° 68 ; Schouteden, 1903, p. 187.

A.

**Pl.ti.** — Sur la tige, renflements ou excroissances (fig. 680-681) atteignant 4 ou 5 fois l'épaisseur des parties restées saines ; d'ordinaire la cécidie est plus longue que large, de forme cylindrique, et terminée brusquement. M.T.

**Sibinia femoralis GERMAR 2277**

Giraud, 1861, p. 491-493, pl. XVII, 7, ⊕ ; Hieronymus, 1890, p. 269-270, n° 798.

E-C.



**Silene nutans** L.

**Ac.fl.** — Voir n° 2263. . . . . **Aphis cucubali** PASS. 2278

Schlechtendal, 1890, p. 46, n° 499 ; Schouteden, 1903, p. 187.

*E-C.*

— Fleurs très jeunes déformées, plus ou moins globuleuses, demeurant fermées, un peu pubescentes et arrêtées dans leur développement. Larves blanchâtres.

**Cécidomyide** 2279

Trotter, 1900, p. 202, n° 20 ; Lagerheim, 1905, p. 17.


*E-N, F, I.*

— Déformation des boutons (fig. 682), dans lesquels le calice s'épaissit beaucoup ; la cécidie est couverte de poils anormaux.

Larves grégaires rouge pâle. M. T. **Perrisia Bergrothiana** MIK 2280

Thomas, 1878, p. 705-706 ; Mik, 1888, p. 311-312, pl. IV, 1-5, ♂.

*E-C.*




*Silene Otites*

*Sibinia femoralis* (n° 2277)

Fig. 680 (a). — D'ap. nat.


Fig. 681 (b). — D'ap. nat.



*Silene nutans*

*Perrisia Bergrothiana* (n° 2280)

Fig. 682. — Im. Mik



*Silene italica*

*Gelechia cauligenella* (n° 2285)

Fig. 683. — D'ap. nat.

**Ac.ti.** — Voir n° 2264. . . . . **Hyalopterus melanocephalus** BUCKTON 2281

Schouteden, 1903, p. 187.

[*I-B.*]

**Pl.ti.** — Entre-nœuds renflés. . . . . **Gelechia cauligenella** SCHMID 2282

Schmid, 1863, p. 63 ; Massalongo, 1897, p. 140-141, n° 57 ; Sorhagen, 1898, p. 116.

*D, E-C, I.*

— Voir n° 2277. . . . . **Sibinia femoralis** GERMAR 2283

Szépligéti, 1890, p. 22.

*A-H.*

**Silene italica** PERS.

**Ac.fl.** — Voir n° 2280. . . . . **Perrisia Bergrothiana** MIK 2284  
Trotter, 1907<sup>b</sup>, p. 30, n° 23. I.

**Pl.ti.** — Entre-nœuds renflés (fig. 683). [**Gelechia cauligenella** SCHMID] 2285  
Darboux et Houard, 1901, p. 424, n° 3550, fig. 744, ⊕ : Trotter, 1901<sup>d</sup>, p. 377-378, n° 52 :  
Stefani, 1906, p. 187 : Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XV, n° 365, ⊕. F.J.

**Silene longicilla** OTTH.

**Ac.ti.** — Feuilles terminales hypertrophiées, velues, crispées, carénées à la face inférieure et réunies par leurs bords. Larves grégaires, blanches. **Cécidomyide** 2286  
Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 128-129, pl. II, 10, 21, ⊕. P.

**Pl.ti.** — Renflement fusiforme (10-15 mm. sur 8-10 mm.). [**Gelechia cauligenella** SCHMID] 2287  
Tavares, 1905, p. 102, pl. X, 11, ⊕. P.

**Silene** sp.

**Ac.fl.** — Petits amas de la grosseur d'un pois, constitués par des fleurs déformées dont les pétales sont atrophiés et virescents, tandis que les étamines restent normales ; les sépales, épaissis et agrandis, couverts d'une pilosité assez forte, enveloppent le tout. **Perrisia [floriperda** F. Löw] 2288  
Rübsaamen, 1895, p. 461, n° 86, pl. XVI, 17. R.

**Pl.ti.** — Renflement fusiforme de 20 mm. de longueur. **Lépidoptère** 2289  
Rübsaamen, 1902<sup>c</sup>, p. 324, n° 133. A-M.

**Lychnis Flos-cuculi** L.

**Ac.fl.** — Boutons gonflés, demeurant fermés, pouvant atteindre 6 mm. de diamètre. Larves grégaires rouges. M.T. **Perrisia praticola** KIEFF. 2290  
Rübsaamen, 1890, p. 39, n° 86 : Kieffer, 1892<sup>f</sup>, p. 216-217, pl. I, 4, 9, 16. A.

**Melandryum album** GARCKE**(Lychnis vespertina** SIBTH., **alba** MILLER, **dioica** DC.)

- Ac.fl.** — Boutons gonflés, demeurant fermés. Larves grégaires, blanches ou jaunâtres. M.T.H. **Contarinia Steini** KARSCH 2291  
 Liebel, 1886, p. 549, n° 135; Martel, 1891, p. 25, n° 46; Molliard, 1895, p. 179-183, pl. VII, 19-27, ⊕. A, F.
- Ac.ti.** — Amas arrondi, terminal ou axillaire, de feuilles déformées se couvrant et pourvues d'une abondante pilosité blanche (fig. 684-685). Larves grégaires blanches. M.C.L. **Perrisia lychnidis** HEYDEN 2292  
 Hieronymus, 1890, p. 147, n° 466; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. X, n° 286, ⊕; Kertész, 1902, p. 42. E-T.
- Pl.fe.** — Sur le bord du limbe, cécidie de la grosseur d'un pois, faisant saillie sur les deux faces. **Cécidomyide** 2293  
 Misciattelli, 1895<sup>c</sup>, p. 114, n° 10; Kieffer, 1901 b, p. 360-361. I.

**Melandryum rubrum** GARCKE**(Lychnis diurna** SIBTH., **silvestris** HOPPE)

- Ac.fl.** — Boutons gonflés, oviformes, demeurant fermés. Larves grégaires blanches ou jaunâtres. M.T. [**Contarinia Steini** KARSCH] 2294  
 Rostrup, 1896, p. 29, n° 176; Rübсаamen, 1899, p. 233, n° 11; Kieffer, 1901 b, p. 360. D, E-C.
- Chloranthie à des degrés divers : la fleur peut conserver sa forme normale, le calice étant à peine déformé, tandis que les pétales sont phyllodiés et les étamines anormalement pileuses ; mais il arrive aussi que toutes les parties de la fleur subissent la phyllodie et que les feuilles de consistance molle ainsi formées sont incurvées et tordues. **Ériophyide** 2295  
 Rübсаamen, 1899, p. 233, n° 12. E-C.

**Cucubalus baccifer** L.

- Ac.fl.** — Fleurs gonflées ne s'ouvrant pas, recouvertes d'une abondante pilosité blanche. Parfois les feuilles voisines participent

à la déformation. Une ou plusieurs larves dans chaque fleur.

**Perrisia** 2296


Corti, 1903 b, p. 349-350, n° 46; C. Marchal et Chateau, 1903, p. 387, n° 4; 1905, p. 253; Bezzi, 1908, p. 12-13, n° 2. *F.J.*



**Gypsophila paniculata L.**

Pl.ti. — Renflement. . . . . **Gelechia gypsophila** STANTON 2297

Sorhagen, 1898, p. 116; Kieffer, 1901 b, p. 333. *E-S.*



**Melandryum album**  
*Perrisia tynchoidis* (n° 2292)  
Fig. 684 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 685 (b). — D'ap. nat.

**Dianthus barbatus**  
*Tylenchus* (n° 2299)  
Fig. 686. — D'ap. nat.

**Dianthus monspessulanus**  
*Eriophyde* (n° 2304)  
Fig. 687 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 688 (b). — D'ap. nat.

**Gypsophila saxifraga L. (Tunica saxifraga SCOP.)**

Pl.ti. — Renflement. . . . . **Gelechia gypsophila** STANTON 2298

Schlechtendal, 1895, p. 17; Sorhagen, 1898, p. 116; Kieffer, 1901 b, p. 333. *E-S.*



**Dianthus barbatus L.**

**Ac.ti.** — Entre-nœuds terminaux raccourcis (fig.686) ; bourgeons déformés ; feuilles crispées, contournées et élargies.

**Tylenchus** 2299

Trotter et Cecconi, 1906, fasc.XIII, n° 315, ⊕.

I.

**Dianthus carthusianorum L.**

**Ac.fl.** — Boutons faiblement gonflés, ne s'ouvrant pas. Larves grégaires rouges. M.T.H.

**Perrisia** 2300

Kieffer, 1894, p.296 ; 1901 b, p.306.

A.

**Dianthus Caryophyllus L.**

**Ac.ti.** — Entre-nœuds terminaux raccourcis ; la pousse renflée à son extrémité porte des feuilles élargies et hypertrophiées formant une touffe terminale. Parfois, fleurs vertes avec pièces florales déformées, hypertrophiées. *Maladie en ananas.*

**Tylenchus devastatrix** KÜHN 2301

Ritzema-Bos, 1890, p.149 ; Frank, 1896, p.30 ; Tavares, 1905 b, p.222, n° 35.

E-O, m.

**Pl.ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radiculicola** GREEFF 2302

Trotter, 1903 d, p.156-157.

I.

**Pl.fe.** — Feuilles enroulées et crispées. . . . . **Aphide** 2303

Schlechtendal, 1895, p.17 ; Kieffer, 1901 b, p.306 ; Schouteden, 1903, p.173.

E-G.

**Dianthus monspessulanus L.**

**Aerc.** — Bourgeons atrophiés ; feuilles contournées ; fleurs souvent parasitées et se présentent alors déformées ou rudimentaires (fig.687-688).

**Ériophyide** 2304

Trotter, 1903 b, p.10, n° 16 ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc.XIII, n° 316, ⊕.

I.

**Dianthus deltoides L.**

**Plrc.** — Plante déformée. . . . . **Eriophyes dianthi** LINDROTH 2305

Lindroth, 1904, p.12-14.

E-V.



**Saponaria officinalis L.**

- Ac.fl.** — Fleurs doublées. . . . . **Ériophyide** 2306  
 Dalla Torre, 1892, p. 158. E-G.
- Boutons boursoufflés, demeurant fermés. Larves grégaires.  
**Contarinia Steini** KARSCH 2307  
 Schlechtendal, 1895, p. 17. A.



**Stellaria aquatica** Scop. (**Malachium aquaticum** L.)

- Ac.fl.** — Fleurs doublées ou virescentes. . . . . **Ériophyide** 2308  
 Dalla Torre, 1895, p. 147, a, b. E-G.
- Ac.ti.** — Les deux feuilles supérieures, faiblement hypertrophiées, sont dressées et accolées par leurs bords. Dans la poche ainsi formée vivent des larves grégaires blanches. M. T.  
**Macrolabis stellariae** LIEBEL 2309  
 Schlechtendal, 1895, p. 17; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 362. E-G.

**Stellaria Holostea** L.

- Ac.ti.** — Entre-nœuds terminaux courts; les feuilles rapprochées sont déformées, leurs deux moitiés se relevant un peu vers le haut, en tournant autour de la nervure médiane. Puceron vert foncé ovalaire.  
**Aphis cerastii** KALT. 2310  
 Kaltenbach, 1874, p. 58, n° 11; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 306. E. G. F.
- Les deux feuilles supérieures d'une pousse, dressées, faiblement hypertrophiées et décolorées à leur base, un peu concaves, sont accolées par leurs bords.  
**Perrisia** 2311  
 Kieffer, 1898<sup>c</sup>, p. 97, n° 49; Rübbsaamen, 1901, p. 87, p. 13<sup>n</sup>, n° 227, fig. 17, ⊕. F. A.
- Pl.fe.** — Enroulement marginal par en haut; les feuilles attaquées sont souvent courbées en arc (fig. 689-690). Puceron très allongé, verdâtre, pulvérent.  
**Brachycolus stellariae** HARDY 2312  
 Martel, 1894, p. 14, n° 33; Connold, 1901, pl. III, ⊕. E. T. (exc. S.)

- Limbe enroulé par en haut. Puceron vert. . . . . Aphide 2313  
Kieffer, 1898c, p. 99, n° 76 ; 1901 b, p. 520 ; Schouteden, 1903, p. 188. F.

**Stellaria media** VILL.


- Ac.fl.** — Chloranthie. . . . . 2314  
Peyritsch, 1882, p. 19-20 ; Dalla Torre, 1892, p. 163-164. E-G.
- Ac.ti.** — Les deux feuilles supérieures d'une pousse, dressées et un peu concaves, sont accolées par leurs bords. Larves grégaires jaune citron. M.T.I. **Macrolabis stellariæ** LIEBEL 2315  
Liebel, 1889, p. 282 ; Schlechtendal, 1895, p. 17 ; Kertész, 1902, p. 57. A.
- Pl.ti.** — Cécidie pisiforme, charnue et verte. . . . . [Diptère] 2316  
Kieffer, 1901 b, p. 520. I-B.
- Pl.fe.** — Limbes tordus, enroulés ; plante entière arrêtée dans son développement. [Thrips] 2317  
Rübsaamen, 1901, p. 87, p. 132-133, n° 229. A.

**Stellaria glauca** WITT. (**S. palustris** EHRH.)

- Pl.fe.** — Enroulement marginal par en haut ; feuilles courbées en faucille. [Eriophyes atrichus] NAL. 2318  
Thomas, 1877, p. 362, n° 7 ; Rostrup, 1896, p. 28, n° 174 ; Lindroth, 1899, p. 14 ; Lagerheim, 1905, p. 11. E-N,  
E-G.

**Stellaria graminea** L.

- Ac.fr.** — Capsule renflée. . . . . Lépidoptère 2319  
Kieffer, 1901 b, p. 520. F.
- Capsule renflée. . . . . Muscide 2320  
Kieffer, 1901 b, p. 520. F.
- Pl.fe.** — Enroulement marginal par en haut ; feuilles courbées. **Eriophyes atrichus** NAL. 2321  
Liebel, 1886, p. 572, n° 284 ; Rostrup, 1896, p. 28, n° 173 ; Nalepa, 1898, p. 16, n° 38 ; Trotter, 1905 b, p. 102, n° 20. E-T  
(ecc.E).



**Cerastium glomeratum** THUILL. (**C. viscosum** L.)

- Ac.fl.** — Boutons gonflés. Voir n°2343. . . . **Perrisia lotharingiæ** KIEFF. 2322  
 — Chloranthie. Voir n°2344. . . . **Trioza cerastii** H.LÖW 2323
- Ac.ti.** — Cécidie formée de deux feuilles terminales dressées et déformés. Voir n°2345. . . . **Perrisia lotharingiæ** KIEFF. 2324  
 Liebel, 1886, p.540, n°63 ; 1889, p.297 ; Kieffer, 1888, p.107-109. A.  
 — Cécidie arrondie formée de plusieurs feuilles imbriquées. Voir n°2346. . . . **Trioza cerastii** H.LÖW 2325  
 Peyritsch, 1882, p.16 (expérimental) ; Kieffer, 1897<sup>e</sup>, p.19, n°1. E-C.  
 — Cécidie ovoïde, sans pilosité anormale ni cladomanie. Voir n°2347. . . . **Aphis cerastii** KALT. 2326  
 Liebel, 1886, p.540, n°64. A.  
 — Cécidie ovoïde, avec pilosité anormale et cladomanie. . . . [**Eriophyes cerastii** NAL.] 2327  
 Kieffer, 1897<sup>e</sup>, p.19, n°2 ; 1901<sup>b</sup>, p.291. A.  
 — Amas de feuilles déformées. . . . **Perrisia cerastii** BINNIE 2328  
 Binnie, 1877, p.181 ; Fitch, 1880, p.150. E-O.

**Cerastium semidecandrum** L.

- Ac.ti.** — Voir n°2346. . . . . **Trioza cerastii** H.LÖW 2329  
 F. Löw, 1888, p.26, n°105 ; Dalla Torre, 1892, p.115 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p.249. E-C,F.

**Cerastium triviale** LINK (**C. vulgatum** L.)

- Ac.fr.** — Capsule faiblement gonflée. Larves orangées. M.T. . . . **Perrisia fructuum** RÜBS. 2330  
 Rubsaamen, 1895<sup>e</sup>, p.258-259 ; Schlechtendal, 1895, p.16. A.
- Ac.fl.** — Boutons gonflés. Voir n°2343. . . . **Perrisia lotharingiæ** KIEFF. 2331  
 — Boutons globuleux, non coniques. . . . **Aphis cerastii** KALT. 2332  
 — Chloranthie. Voir n°2344. . . . **Trioza cerastii** H.LÖW 2333



**Ac.ti.** — Cécidie formée par les deux feuilles terminales dressées et déformées. Voir n° 2345. **Perrisia lotharingæ** KIEFF. 2334


Liebel, 1886, p. 540, n° 63 ; 1889, p. 297 ; Kieffer, 1888, p. 107-109 ; Molliard, 1895, p. 177-179, pl. VII, 13-18, ⊕. A, F.

— Cécidie arrondie constituée par plusieurs feuilles imbriquées. Voir n° 2346. **Trioza cerastii** H. LÖW 2335

F. Löw, 1888, p. 26, n° 105 ; 1888<sup>c</sup>, p. 543, n° 20 ; Massalongo, 1904, p. 116, n° 25 ; Lagerheim, 1905, p. 21, n° 1. E-T (e.c.E).

— Cécidie ovoïde, sans pilosité anormale, formée de plusieurs feuilles. Voir n° 2347. **Aphis cerastii** KALT. 2336

Thomas, 1877, p. 377, n° 16 ; Dalla Torre, 1895, p. 139, b ; Molliard, 1895, p. 146-147 ; Lagerheim, 1905, p. 21, n° 2. E-V, E-C, F.



*Stellaria holostea*

*Brachycolus stellariæ* (n° 2312)

Fig. 689 (a). — D'ap. nat.

Fig. 690 (b). — D'ap. nat.



*Cerastium tomentosum*

*Aphis cerastii* (n° 2346)

Fig. 691. — D'ap. nat.



*Mœhringia polygonoides*

*Ériophyide* (n° 2357)

Fig. 692. — Im. THOMAS

— Cécidie ovoïde, avec pilosité anormale et cladomanie. **Eriophyes cerastii** NAL. 2337

Thomas, 1877, p. 379 ; Nalepa, 1898, p. 16, n° 37.

E-C.

— A l'extrémité d'une pousse, amas de feuilles velues plus ou moins rouges, se couvrant mutuellement et formant ainsi une cécidie ovoïde. A la base de chacune des feuilles, on

trouve une ou plusieurs larves orangées. M.C.

*Perrisia cerastii* BINNIE 2338

Kieffer, 1898<sup>a</sup>, p. 90, n° 7 ; Tavares, 1905, p. 9. *F.P.*

Pl. fê. — Feuilles imbriquées et roulées. *Brachycolus stellariae* HARDY 2339

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 291. *E.O.*

***Cerastium tomentosum* L.**

Ac. ti. — Voir n° 2347 (fig. 691). . . . . *Aphis cerastii* KALT. 2340

Trotter, 1905<sup>b</sup>, p. 98, n° 5 ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIII, n° 312, ⊕. *I.*

***Cerastium alpinum* L.**

Ac. ti. — Voir n° 2346. . . . . *Trioza cerastii* H. LÖW 2341

Dalla Torre, 1892, p. 115. *E-C.*

— Voir n° 2345. . . . . *Perrisia lotharingiae* KIEFF. 2342

Gorti, 1902, p. 196, n° 114. *I.*

***Cerastium arvense* L.**

Ac. fl. — Boutons gonflés, globuleux, ne s'épanouissant pas. Larves grégaires rouges. M.C.I.H. *Perrisia lotharingiae* KIEFF. 2343

— Chloranthie avec axe floral raccourci et formation d'amas de fleurs vivescentes. *Trioza cerastii* H. LÖW 2344

Ac. ti. — Les deux feuilles terminales dressées se touchent par leurs bords ; élargies, hypertrophiées, elles deviennent convexes surtout à la base et délimitent ainsi une cavité dans laquelle vivent des larves rouges. M.C.I.H. *Perrisia lotharingiae* KIEFF. 2345

Liebel, 1886, p. 540, n° 63 ; 1889, p. 297 ; Kieffer, 1888, p. 107-109 ; Trotter, 1907<sup>b</sup>, p. 32, n° 31. *A.I.*

— Plusieurs feuilles terminales dressées, élargies, pliées en carène ou incurvées en cuiller, rapprochées par le raccourcissement des entre-nœuds, forment en s'imbriquant une écidié arrondie de 10-20 mm. de diamètre. *Trioza cerastii* H. LÖW 2346

Köllenbach, 1874, p. 58, n° 12 ; Dalla Torre, 1892, p. 115. *E-C.*

— Plusieurs feuilles terminales élargies, rapprochées par le raccourcissement des entre-nœuds, forment en se recouvrant un bouquet lâche, ovoïde, sans pilosité anormale.

**Aphis cerastii** KALT. 2347

Kaltenbach, 1874, p. 58, n° 11 ; Massalongo, 1893, p. (44), n° 8 ; Grevillins et Niessen, 1907, fasc. II, n° 35, ⊕.

E-G,  
F,I.

— Cécidie semblable à la précédente, mais les feuilles qui la constituent ont leur limbe ridé et sont couvertes d'une pubescence anormale. En outre il y a cladomanie.

[**Eriophyes cerastii** NAL.] 2348

Thomas, 1877, p. 377, n° 16 ; Hieronymus, 1890, p. 67, n° 75.

A.

### **Cerastium alsinoides** PERS.

**Ac.ti.** — Extrémité des pousses déformée, sans pilosité anormale. Voir n° 2347.

**Aphis cerastii** KALT. 2349

Kieffer, 1897<sup>a</sup>, p. 19 ; 1901<sup>b</sup>, p. 290.

A.

— Cladomanie et formation d'amas de feuilles ridées et recouvertes d'une pilosité anormale.

[**Eriophyes cerastii** NAL.] 2350

Liebel, 1886, p. 540, n° 65 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 291.

A.

### **Cerastium campanulatum** VIV.

**Ac.ti.** — Voir n° 2347. . . . . **Aphis cerastii** KALT. 2351

Cecconi, 1906, p. 47, n° 48.

I.

### **Cerastium** sp.

**Pl.ti.** — Renflement de la tige. . . . . Cécidomyide 2352

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 290.

E-G.



### **Sagina procumbens** L.

**Ac.fr.** — Capsule renflée affectant la forme d'un cône de grand angle, à base concave extérieurement, à surface creusée d'un

HOUARD, *Zoocécidies*.

sillon pour loger le filet de l'étamine. Pédoncule épaissi. [M.T.]  
 Curculionide 2353  
 Pierre, 1905, p. 172; Lagerheim, 1905, p. 25, 26, pl. 1, 4, 5, ⊕.  
 E-N, F.

**Sagina ciliata** FRIES

— Plante déformée. . . . . 2354  
 Trail, 1904, p. 130.  
 I-B.

**Arenaria serpyllifolia** L.

Ac. fr. — Capsule renflée. . . . . Curculionide 2355  
 Lagerheim, 1905, p. 24, 25.  
 E-N.

**Mœhringia muscosa** L.

Acre. — Chloranthie et cladomanie. . . . . Ériophyide 2356  
 Thomas, 1893<sup>b</sup>, p. 7; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 366.  
 E-C.

**Mœhringia polygonoides** MERTENS et KOCH

Acre. — A la place des fleurs ou à l'extrémité des tiges, bouquets de 3-6 mm. de diamètre, formés de feuilles pliées en carène et courbées en faucille (fig. 692); il y a souvent prolifération et la deuxième fleur est plus déformée que la première.  
 Ériophyide 2357  
 Thomas, 1876, p. 261, n° 3, pl. IX, 10, ⊕; Dalla Torre, 1892, p. 139.  
 E-C.

**Mœhringia trinervia** CLAIRV.

Pl. ra. — Nodosités de la grosseur d'une lentille. . . Coléoptère 2358  
 Kirchner, 1855; Schlechtendal, 1890, p. 46, n° 402; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 366.  
 E-C.

**Mœhringia lateriflora** FENZL.

Acre. — Chloranthie et cladomanie. Eriophyes mœhringiae LINDROTH 2359  
 Lindroth, 1899, p. 14-15.  
 E-N.

**Spergula arvensis** L. (**S. sativa** Boenn.)

**Plrc.** — Tige déformée. . . . . **Tylenchus devastatrix** Kühn 2360  
Ritzema-Bos, 1888, p. 261, n° 3 ; 1892, p. 337 ; Frank, 1896, p. 31. *E-O.*

**Spergula pentandra** L.

**Acre.** — Déformation des pousses avec enroulement du limbe.  
Ériophyide 2361  
Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 517. *F.*

## FAMILLE DES NYMPHÉACÉES

Nuphar 2363, Nymphaea 2362.

Cécidies mal connues, exigeant de nouvelles recherches.


**Nymphaea alba** L.

**Pl.fe.** — Limbe déformé, boursoufflé. Puceron vert foncé, à queue  
pâle et cornicules renflés. **Rhopalosiphum nymphææ** L. 2362  
Schouteden, 1903, p. 179 ; Goury et Guignon, 1905, p. 39. *I.F.*

**Nuphar luteum** L.

**Pl.fe.** — [Limbe déformé. . . . . **Rhopalosiphum nymphææ** L.] 2363  
Kaltenbach, 1874, p. 20 ; Goury et Guignon, 1905, p. 39.

## FAMILLE DES MAGNOLIACÉES

**Magnolia fuscata** ANDR.

Pl. fe. — Limbe jeune garni de saillies à la face supérieure ; bord souvent enroulé par en bas.

Psyllide 2364

Tavares, 1905 b, p. 223, n° 42.

m.

## FAMILLE DES RENONCULACÉES

Aconitum 2370-2372, Actæa 2373, Anemone 2380-2387, Aquilegia 2374-2378, Caltha 2365-2366, Clematis 2388-2413, Delphinium 2379, Helleborus 2367-2369, Ranunculus 2414-2440, Thalictrum 2441-2458.

Les cécidies des Renonculacées sont assez nombreuses et affectent les parties aériennes et souterraines de ces plantes. Les fruits eux-mêmes, malgré leur dureté, réagissent à l'influence parasitaire des larves de plusieurs diptères qui vivent à leur base : ils se renflent et délimitent de véritables chambres dans lesquelles on aperçoit les larves de *Perrisia pulsatillæ*, pour les Anémones du groupe *Pulsatilla*, de *Clinodiplosis thalictrocola* chez un grand nombre de *Thalictrum*. Il reste encore à obtenir l'éclosion de plusieurs Cécidomyiides qui se rencontrent chez diverses Anémones et Renoncules.

Les fleurs sont transformées en galles de plusieurs manières. Elles peuvent rester fermées, se gonfler en englobant des larves de diptères (quelques Aconits, diverses Renoncules) ou bien avoir toutes leurs pièces contournées, couvertes de verrues, par l'action d'un Ériophyide de la section *Epitrimerus*, signalé depuis peu par Gerber (n° 2404). Parfois les fleurs deviennent doubles sous l'influence d'Ériophyides (observations de Dalla Torre sur des Renoncules) ou bien présentent des phénomènes de chloranthie grâce à la présence de Pucerons (observations de Peyritsch sur plusieurs *Aquilegia*).

C'est seulement dans les *Thalictrum* que l'on rencontre des acrocécidies caulinaires en forme de bouquets de feuilles (*Perrisia thalictrocola*).

Les tiges des Renonculacées sont rarement déformées ; on connaît cependant des helminthocécidies sur une Anémone (n° 2387) et diverses Renoncules (nos 2437, 2440, etc.). Très nombreuses, au contraire, sont les galles des racines, dues à *Heterodera ralicicola* ; leur importance en Horticulture est assez considérable puisqu'on les rencontre sur la plupart des Clématites

ornementales cultivées dans les jardins pour leurs larges fleurs ; on trouvera de bons renseignements sur ce sujet dans le mémoire de Chifflet paru en 1900.

Les feuilles des Renonculacées possèdent plusieurs sortes de galles. Le limbe peut être entièrement déformé, crispé, boursoufflé par des Ériophyides (*Eriophyes vitalba* et *Epitrimerus heterogaster*, *Epitr. flammula*), parfois par des diptères (*Perrisia Braganca* des *Thalictrum*) ou des pucerons (*Aphalara*, *Rhopalosiphum*) ; le bord peut être enroulé, épaissi et coloré par des Cécidomyiides dont la plus connue, *Perrisia ranunculii*, se rencontre chez un grand nombre de Renonculées ; enfin, la surface du limbe elle-même présente souvent des pustules, dues à des Tenthredinides appartenant aux genres *Monophadnus* (*M. monticola* des Hellebores, par exemple) et *Athalia*, ou encore d'autres petites déformations désignées par Fr. Thomas sous le nom de « procécidies » et signalées depuis quelques années par Rübsaamen, Massalongo et Trotter. — On consultera avec profit le très intéressant mémoire de Schlechtendel (1901) relatif à *Phytomyza vitalba* (sur *Clematis Vitalba*)



### ***Caltha palustris* L.**

- Pl.fe.** — Limbe déformé, atrophié et décoloré. [*Aphalara calthæ* L.] 2365  
 F.Löw, 1888, p. 13 ; Dalla Torre, 1892, p. 111 ; Bezzi, 1899, p. 16. E-C, F.
- Limbe légèrement crispé. Puceron noir brillant, à cornicules extrêmement renflés. *Rhopalosiphum calthæ* Koch 2366  
 Schouteden, 1903<sup>b</sup>, p. 92. B.



### ***Helleborus foetidus* L.**

- Pl.fe.** — Pustules de couleur pâle, de la taille d'un grain de millet, saillantes sur les deux faces et généralement alignées de part et d'autre de la nervure médiane.
- Monophadnus monticola* HARTIG 2367**
- Kieffer, 1891, p. 231-232, n° 430 ; Pierre, 1900, p. 164-165 ; Mariani, 1907, p. 63, n° 5. A, F, I.

### ***Helleborus niger* L.**

- Pl.fe** — Voir n° 2367. . . . ***Monophadnus monticola* HARTIG 2368**  
 Thomas, 1893 p. 303, n° 11 ; Schlechtendal, 1895, p. 18. E-C.

**Helicoborus viridis L.**

Pl. fe. — Voir n° 2367. . . . . **Monophadnus monticola** HARTIG 2369  
 Thomas, 1893, p. 303, n° 11; Corti, 1903<sup>b</sup>, p. 355, n° 70. *E-C, I.*



**Aconitum lycoctonum L.**

Ac. fl. — Fleurs déformées, globuleuses et fermées, d'un vert jaunâtre. **Contarinia** 2370  
 Appel, 1891, p. 643. *S.*

**Aconitum Napellus L.**

Ac. fl. — Même déformation; fleurs d'un vert bleuâtre. **Contarinia** 2371  
 Appel, 1891, p. 643. *S.*

**Aconitum variegatum L.**

Pl. fe. — Minime pustule, de 0,5 mm. de diamètre. **Tenthredinide** 2372  
 Trotter, 1906, p. 111, n° 1. *I.*



**Actaea spicata L.**

Acre. — Extrémité des tiges florales déformée et contractée; feuilles crispées, rabattues contre le pétiole et bizarrement courbées. Puceron brun, noir ou vert foncé. **Aphis viburni** Scop.] 2373  
 Schouteden, 1903, p. 168. *B.*



**Aquilegia atrata Koch**

Ac. fl. — Chloranthie. La déformation des parties reproductrices est variable: les ovules sont toujours modifiés. **Aphide** 2374  
 Peyritsch 1882, p. 19 (jardin botanique); Dalla Torre, 1892, p. 165. *E-C.*



- Pl.fe.** — Constriction des feuilles accompagnée d'une atrophie du limbe dont le bord est en partie crispé. **Ériophyide** 2375  
 Thomas, 1877, p. 360, n° 5 ; 1886, p. 306 ; Dalla Torre, 1893, p. 106. *E-C.*

**Aquilegia vulgaris L.**

- Ac.fl.** — Chloranthie. Voir n° 2374. . . . . **Aphide** 2376  
 Peyritsch, 1882, p. 15 (jardin botanique) ; Dalla Torre, 1892, p. 105-106 ; 1893 b, p. 5-6. *E-C.*  
 — Fleurs doublées. . . . . **Ériophyide** 2377  
 Dalla Torre, 1895, p. 137. *E-C.*

- Pl.fe.** — Segments foliaires crispés et repliés par en haut, décolorés, un peu hypertrophiés ainsi que les nervures. **Cécidomyide** 2378  
 Trotter, 1901 d, p. 360, n° 2 ; Kieffer, 1901 b, p. 255. *I.*



**Delphinium longipes MORIS**

- Pl.ti.** — Petit renflement fusiforme (5-10 mm. de long sur 2-4 mm. de diamètre transversal), rouge ou brun, situé à proximité de l'insertion d'une feuille et contenant une cavité spacieuse. **Thamnurgus delphinii ROSENH.** 2379  
 Stefani, 1902 b, p. 103, n° 2 ; 1906, p. 108, n° 25. *si.*



**Anemone nemorosa L.**

- Pl.rc.** — Limbe déformé. . . . . **Diptère** 2380  
 Geisenheyrer, 1902, p. 195, n° 4. *A.*

**Anemone apennina L.**

- Pl.ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radicolica GREEFF** 2381  
 Trotter, 1905, p. 52-53. *I.*

**Anemone silvestris L.**

**Pl.fe.** — Enroulement marginal plus ou moins accentué des lobes des feuilles qui se teintent de rouge ; dans l'enroulement, larves grégaires rouges.

**Cécidomyide 2382**

F.Löw, 1885 c, p.500 ; Lagerheim, 1905, p.3.

*E-N, E-G.*

**Anemone alpina L.**

**Acre.** — L'axe floral raccourci porte des fleurs rapprochées dont le périanthe est peu développé et qui demeurent stériles.

**Ériophyide 2383**

Dalla Torre, 1892, p.105 ; 1893<sup>b</sup>, p.5.

*E-G.*

**Anemone Pulsatilla L. (Pulsatilla vulgaris MILLER)**

**Ac.fr.** — Les prolongements velus que possède le fruit normal sont contournés et ne s'étalent pas à la maturité ; ils présentent en outre à la base un épaississement considérable et sont couverts de longs poils anormaux. M.T.

**Perrisia pulsatillæ KIEFF. 2384**

Martel, 1893, p.3-4, n° 140 ; Kieffer, 1894, p.297 ; Kertész, 1902, p.46.

*F.A.*

**Anemone pratensis L. (Pulsatilla pratensis MILLER)**

**Ac.fr.** — Déformation de l'ovaire ou de la graine ; nombreuses larves jaunes entre les akènes

**Cécidomyide 2385**

Rostrup, 1896, p.30, n° 187 ; Lagerheim, 1905, p.16.

*E-N.*

**Anemone vernalis L.**

**Ac.fr.** — Voir n° 2384. . . . . **Perrisia pulsatillæ KIEFF. 2386**

Kieffer, 1894, p.297 ; Kertész, 1902, p.46.

*A.*

**Anemone japonica SIEB. et ZUCC.**

**Pl.ti.** — Légère courbure de l'axe floral. **Tylenchus devastatrix KÜHN 2387**

Ritzema-Bos, 1893, p.197-198.

*H.*



**Clematis (Atragene) alpina** MILLER

- Pl.fe.** — Enroulement marginal du limbe qui présente en outre des bosselures. **Epitrimerus heterogaster** NAL. 2388  
 Thomas, 1876, p. 280-281, n° 22, pl. XI, 29, ⊕ ; Hieronymus, 1890, p. 63, n° 48 ; Nalepa, 1898, p. 64, n° 8 ; Hieronymus, Pax, etc., 1908, fasc. XVI, n° 429, ⊕. *E-G.*
- Sur le limbe, auréole subarrondie ou ovulaire, de 0,3-0,4 mm. de diamètre ; un petit orifice un peu excentrique existe à la face inférieure. **Insecte** 2389  
 Massalongo, 1904, p. 115, n° 22. *I.*

**Clematis cirrhosa** L.

- Pl.fe.** — Bord du limbe enroulé et présentant de nombreuses boursofflures ; souvent toute la feuille est recroquevillée et couverte de plis irréguliers, hérissés eux-mêmes de boursofflures secondaires. **Epitrimerus heterogaster** NAL. 2390  
 P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 23, 4° ; Nalepa, 1898, p. 64, n° 8. *AL.*

**Clematis florida** THUNB.

- Pl.ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radicolica** GREEFF 2391  
 Chiffot, 1900, p. 128-134. *F.*

**Clematis patens** MORR. et DECAISNE

- Pl.ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radicolica** GREEFF 2392  
 Chiffot, 1900, p. 128-134. *F.*

**Clematis lanuginosa** LINDL.

- Pl.ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radicolica** GREEFF 2393  
 Chiffot, 1900, p. 128-134. *F.*

**Clematis Jackmanni** JACKMANN (**C. florida** × **Viticella** GUASCO)

- Pl.ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radicolica** GREEFF 2394  
 Chiffot, 1900, p. 128-134. *F.*

**Clematis viticella L.**

- Ac.fl.** — Fleur gonflée, demeurant fermée. . . . . **Cécidomyide** 2395  
 Frauenfeld, 1855, p. 21 ; Schlechtendal, 1890, p. 48, n° 426 ; Frank, 1896, p. 125, n° 12. *E-C.*
- Pl.ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radicolica GREEFF** 2396  
 Chiffolot, 1900, p. 128-134. *F.*

**Clematis viticella L. var. campaniflora WILK.**

- Pl.fe.** — Folioles hypertrophiées, enroulées en hélice autour de la nervure médiane ; fleurs parfois attaquées. **Ériophyide** 2397  
 Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 114. *P.*

**Clematis recta L.**

- Ac.inf.** — Inflorescence déformée avec pilosité anormale. **Ériophyide** 2398  
 Szépligeti, 1890, p. 41 ; Kieller, 1901<sup>b</sup>, p. 295. *A-H.*
- Pl.ti.** — Sur les jeunes rameaux, renflements pustuleux de 3 mm. de long sur 1 mm. de large, uniloculaires. Larve blanc verdâtre à tête brune M.T. Adulte Lou II. **Athalia lugens KLUG** 2399
- Pl.fe.** — Sur le pétiole ou les nervures, renflements pustuleux. Voir n° 2399. **Athalia lugens KLUG** 2400  
 Bouché, 1896, p. 290 ; Hieronymus, 1890, p. 246-247, n° 738. *E-C.*
- Les feuilles terminales, à l'époque où elles forment encore une sorte de bourgeon nu, se recouvrent d'une laine blanche formée de longs poils entremêlés ; plus tard on trouve ça et là des poils semblables sur le rachis ou le pétiole des feuilles qui ont été ainsi attaquées. **Perrisia** 2401  
 Massalongo, 1897, p. 98, n° 44. *I.*
- Feuilles plissées et épaissies, le plus souvent le long des nervures, ou encore boursoufflées avec pilosité anormale. **Epitrimerus heterogaster NAL.** 2402  
 Thomas, 1877, p. 369, n° 11, pl. VI, 1, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. X, n° 279, ⊕ ; *E-C, I.*  
 Nalepa, 1898, p. 64, n° 8 ; Corti, 1903<sup>b</sup>, p. 347, n° 36

— Procécidie du limbe, presque identique à celle décrite au n° 2411. Insecte 2403

Massalongo, 1901<sup>a</sup>, p. 190, n° 3 ; 1903, p. 37, n° 2. I.

### **Clematis Flammula L.**

**Ac.fl.** — Fleurs déformées : pièces du périanthe brunes, allongées, épaissies, à surface mamelonnée ; étamines à filet hypertrophié et rugueux ; carpelles atrophiés ; pédicelle floral souvent modifié. Les folioles sont aussi contournées en tous sens et charnues ; leur surface est couverte de verrues et de petites pustules. Epitrimerus flammulæ GERBER 2404

Gerber, 1901<sup>b</sup>, p. 524-533, fig. 1-10, ⊕. F.

**Ac.ti.** — Tige à entre-nœuds courts, à épiderme épais, rugueux, le plus souvent teinté de rouge (fig. 693) ; les feuilles dont le limbe est épaissi, sont rugueuses, diversement contournées et leur bord est très irrégulier (fig. 694). Toutes les parties attaquées sont glabres et brillantes. Ériophyide 2405

L. Löw, 1881, p. 2, pl. III, 3, ⊕ ; Massalongo, 1907, p. 34-35 n° 6. A, H, F.

**Pl.ti.** — Tige épaissie au point de bifurcation des rameaux. Larves grégaires blanchâtres. Cécidomyide 2406

Trotter, 1907<sup>b</sup>, p. 25, n° 4. I.

— Renflement unilatéral de la tige. Athalia lugens KIEFFER 2407

Trotter, 1907<sup>b</sup>, p. 25, n° 5. I.

**Pl.fe.** — Limbe épaissi, couvert de bosselures ou de papilles et enroulé par en haut, parfois jusqu'à prendre l'aspect d'un petit corps vermiforme d'un rouge vineux.

**Epitrimerus flammulæ GERBER 2408**

Thomas, 1877, p. 370, n° 12, pl. VI, 2-5, ⊕ ; Cecconi, 1901, p. 137, n° 5 ; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. III, n° 57, ⊕ ; Gerber, 1901<sup>b</sup>, p. 524-533, fig. 1-10, ⊕ ; Lemée, 1902, p. 140, n° 161. E-G, F.I.

— Limbe crispé et enroulé. Eriophyes vitalbæ GÄN. 2409

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 295, Lemée, 1902, p. 140, n° 160. A, F.

— Fossette d'environ 0,5 mm. de diamètre. Cécidomyide 2410

Trotter, 1907<sup>b</sup>, p. 25, n° 3. I.

— Dans le parenchyme, épaissement lenticulaire de 0,75-1,5 mm. de diamètre, de teinte blanc jaunâtre (Procécidie).

**Insecte** 2411

Rihsaamen, 1900<sup>b</sup>, p. 196, n° 5, fig. 10, ⊕ ; Trotter, 1907<sup>b</sup>, p. 24-25, n° 2 ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVI, n° 395, ⊕.


I.G.

**Clematis Vitalba L.**

**Pl.ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radicola** GREEFF 2412

Cornu, 1879, p. 173-174, 189 ; Schlechtendal, 1890, p. 48, n° 15 ; Frank, 1896, p. 22.

F.



**Clematis Flammula**  
*Eriophyide* (n° 2405)  
Fig. 693 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 694 (b). — D'ap. nat.

**Clematis Vitalba**  
*Eriophyes vitalbæ* (n° 2413)  
Fig. 695 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 696 (b). — D'ap. nat.

**Ranunculus lanuginosus**  
*Perrisia ranunculi* (n° 2426)  
Fig. 697-698 (a, b). — D'ap. nat.  
Fig. 699 (c). — D'ap. nat.

**Pl.fe.** — Sur les feuilles terminales, enroulement ou inflexion par en haut du bord des folioles (fig. 695-696). Il peut y avoir aussi déformation de l'extrémité de la tige. **Eriophyes vitalbæ** CAN. 2413

Massalongo, 1891, p. 112, n° 65 ; Nalepa, 1898, p. 17, n° 42

I.F.



**Ranunculus alpestris** JACQ.

**Pl.fe.** — Feuilles conservant la torsion qu'elles présentaient dans le bourgeon. **Epitrimerus rynchothrix** NAL. 2414

Thomas, 1893<sup>b</sup>, p. 7 ; Nalepa, 1897<sup>b</sup>, p. 32-33 ; 1898, p. 64, n° 9.

E.C.

**Ranunculus aconitifolius L.**

- Ac.fl.** — Fleurs doublées. . . . . Ériophyide 2415  
Dalla Torre, 1895, p. 153. *E-G.*

**Ranunculus Flammula L.**

- Pl.fe.** — Lobes enroulés. . . . . Pemphigus ranunculi KALT. 2416  
Kaltenbach, 1874, p. 10, n° 13. *A.*

**Ranunculus auricomus L.**

- Ac.fr.** — Akènes épaissis, délimitant de petites chambres larvaires.  
Larves grégaires jaunes. Cécidomyide 2417  
Thomas, 1893<sup>b</sup>, p. 15, n° 24. *E-G.*
- Ac.ti.** — Tige raccourcie et courbée. . . . . Anguillulide 2418  
Geisenhayer, 1902, p. 311, n° 67. *A.*

**Ranunculus montanus WILLD.**

- Ac.fl.** — Fleurs doublées. . . . . Ériophyide 2419  
Dalla Torre, 1895, p. 153. *E-G.*

**Ranunculus acris L.**

- Ac.fl.** — Bouton floral demeurant fermé ; les pétales épaissis prennent une teinte brun violet. Larves grégaires couleur chair.  
Cécidomyide 2420  
Hieronymus, 1890, p. 158, n° 496 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. IV, n° 139, ⊕ ; Rubsamen, 1890, p. 259, n° 256. *E-G.*
- Fleurs doublées. . . . . Ériophyide 2421  
Dalla Torre, 1893<sup>b</sup>, p. 15 ; 1895, p. 153. *E-G.*
- Ac.ti.** — Plante déformée. . . . . Tylenchus devastatrix KÜHN 2422  
Ritzema-Bos, 1888, p. 261 ; Frank, 1896, p. 31. *E-G.*

**Pl.fe.** — Feuilles enroulées en cornet, épaissies, coriaces, teintées de rouge. Larves grégaires rouges M.C. ou M.T.

**Perrisia ranunculi BREMI** 2423

Rübsaamen, 1890, p. 45, n° 142; Trotter, 1904, p. 11, n° 18; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XI, n° 274, ⊕; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 291. E-T  
(e.c.c.E).

— Limbe crispé et courbé, à bord étroitement enroulé.

**Epitrimerus rhynchotrix NAL.** 2424

Rübsaamen, 1901, p. 126, n° 163. A.

**Ranunculus lanuginosus L.**

**Ac.fl.** — Fleurs doublées. . . . . **Ériophyide** 2425

Dalla Torre, 1895, p. 153. E-C.

**Pl.fe.** — Enroulement partiel par en haut du bord du limbe (fig. 697-698); la partie enroulée est coriace et épaissie (fig. 699). Larves grégaires rouges. M.C. Cocon blanc.

**Perrisia ranunculi BREMI** 2426

Thomas, 1892<sup>b</sup>, p. 9-10, n° 13; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 472; Trotter, 1904, p. 11, n° 19. E-C, F, I.

— Minimes pustules, de 0,5 mm. de diamètre, éparses sur le limbe. [Tenthredinide] 2427

Trotter, 1904, p. 11, n° 20. I.

**Ranunculus polyanthemus**

**Pl.fe.** — Feuilles terminales courbées. . . . . **Cécidomyide** 2428

Hellwig, 1901, p. 163. A.

**Ranunculus repens L.**

**Ac.fl.** — Boutons demeurant fermés. Voir n° 2420. . . **Cécidomyide** 2429

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 472. E-O.

— Fleurs doublées. . . . . **Ériophyide** 2430

Dalla Torre, 1893<sup>b</sup>, p. 15. E-C.

**Pl.fe.** — Voir n° 2423. . . . . **Perrisia ranunculi BREMI** 2431

Fitch, 1880, p. 145-146, 1 fig. ⊕; Martel, 1891, p. 38, n° 85; Connold, 1901, pl. LXXXIV, ⊕. E-C, E-O.



- Limbe enroulé. . . . . **Pemphigus ranunculi** KALT. 2432  
Kaltenbach, 1874, p. 10, n° 13; Rübssaamen, 1890, p. 45, n° 141. A.
- Limbe irrégulièrement contourné et plié. **Rhopalosiphum dianthi** SULZER 2433  
Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n° 63, Θ. A.
- Voir n° 2414. . . . . **Epitrimerus rhynchothrix** NAL. 2434  
Nalepa, 1902, p. 223. A.
- Petite pustule du limbe. . . . . **Insecte** 2435  
Massalongo, 1903, p. 41, n° 13. I.

**Ranunculus bulbosus** L.

- Ac.fl.** — Chloranthie. . . . . **Ériophyide** 2436  
Hellwig, 1901, p. 163. A.
- Pl.ti.** — Renflement fusiforme plus ou moins allongé et courbé du  
pédoncule floral. **Tylenchus** 2437  
Massalongo, 1903<sup>b</sup>, p. 139-140, 2 fig., Θ. I.
- Pl.fe.** — Feuilles enroulées en cornet, épaissies, coriaces, teintées  
de rouge. Larves grégaires rouges. **M.C.**
- Perrisia ranunculi** BREMI 2438  
Bremi, 1847, p. 29, n° 34, p. 54, n° 13; Focken, 1890, p. 237-238; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 291. E-C, F.
- Lobes des feuilles faiblement enroulés. Puceron jaune ver-  
dâtre, fortement lanugineux. **Pemphigus ranunculi** KALT. 2439  
Kaltenbach, 1874, p. 10, n° 13; Schouteden, 1903, p. 185. A.

**Ranunculus velutinus** TEN.

- Pl.ti.** — Renflement caulinaire; fleurs déformées. . **Tylenchus** 2440  
Ferrari, 1906, p. 989-993. I.

**Thalictrum minus** L.

- Ac.fl.** — Akènes grossis. . . . . **Clinodiplosis thalictricola** RÜBS. 2441  
Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 526. I-B.

**Ac.ti.** — Extrémité de la tige déformée. Larve blanche. **Cécidomyide** 2442  
Schlechtendal, 1895, p. 18. A.

**Pl.fe.** — Pétioles et folioles courts et épais, pouvant atteindre la grosseur d'une noisette, blanches, à surface spongieuse, à partie centrale dure. Larves blanches grégaires. **Cécidomyide** 2443  
Mik, 1892, p. 307-308, pl. III, 4, ⊕ ; Schlechtendal, 1895, p. 18. E-C.

— Folioles ridées et crispées. . . . . **Ériophyide** 2444  
Thomas, 1878, p. 708 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 308 ; Rostrup, 1896, p. 30, n° 190. D, E-C, F.

**Thalictrum majus L.**

**Ac.fr.** — Akènes grossis. . . . . [**Clinodiplosis thalicticola** RübS.] 2445  
Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 526. E-O.

**Thalictrum simplex L.**

**Ac.fr.** — Akènes gonflés, sphériques. [**Clinodiplosis thalicticola** RübS.] 2446  
Hieronymus, 1890, p. 176, n° 568 ; Lagerheim, 1905, p. 17. E-N, A.

**Thalictrum angustifolium L.**

**Ac.fr.** — Akènes gonflés, sphériques. [**Clinodiplosis thalicticola** RübS.] 2447  
Hieronymus, 1890, p. 176, n° 566 ; Schlechtendal, 1890, p. 48, n° 432. A.

**Thalictrum flavum L.**

**Ac.fr.** — Akènes gonflés, sphériques. Larves jaunes. M.T. Adulte juillet II. **Clinodiplosis thalicticola** RübS. 2448  
Hieronymus, 1890, p. 176, n° 567 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. III, n° 119, ⊕ ; Rubsaaenen, 1895<sup>c</sup>, p. 257-258, n° 1 ; Rostrup, 1896, p. 30, n° 189 ; Lagerheim, 1905, p. 17. E-N, A.

**Ac.fl.** — Fleur déformée. . . . . **Perrisia thalicti** RübS. 2449  
Rubsaaenen, 1895<sup>d</sup>, p. 184. A.

**Ac.ti.** — A l'extrémité des tiges, bouquet de feuilles blanches, pileuses, de la grosseur d'un pois à celle d'une noisette. Larves d'un rouge brillant. M.T. Adulte février-mars II.

**Perrisia thalictri** RÜBS. 2450

Rübsaamen, 1895 d, p. 181-184, pl. 1, 4, 8, 10, 17-18, 21; Kertész, 1902, p. 51.

A.

**Thalictrum flexuosum** BERNH.

**Ac.fr.** — Akènes gonflés, sphériques.

[**Clinodiplosis thalictricola** RÜBS.] 2451

Fitch, 1881, p. 22; Kieffer, 1901 b, p. 526.

I-B.

**Pl.fe.** — Constriction du limbe. . . . . **Ériophyide** 2452

Dalla Torre, 1892, p. 166.

E-C.

**Thalictrum collinum** WALLR.

**Pl.fe.** — Feuilles demeurant petites, à folioles ridées et froissées, formant souvent des paquets.

**Ériophyide** 2453

Szépligéti, 1890, p. 23, 43.

A-II.

**Thalictrum glaucum** DESF.

**Ac.fr.** — Akènes gonflés, sphériques.

[**Clinodiplosis thalictricola** RÜBS.] 2454

Tavares, 1903, p. 174-175, n° 50; 1905, p. 105.

P.

**Pl.fe.** — Folioles crispées, à bord replié sur la face supérieure, constituant par leur ensemble une cécidie subglobuleuse, de volume variable, Larves grégaires rougeâtres. M.C., dans un cocon blanc. Adulte mai-juin I. **Perrisia Bragancæ** TAVARES 2455

Tavares, 1903, p. 175, n° 51; 1904 b, p. 298-299; 1905, p. 105, pl. 1, 13, ⊕.

P.

**Thalictrum dumense** DUM.

**Pl.fe.** — Enroulement marginal. . . . . **Cécidomyide** 2456

Kieffer, 1901 b, p. 527.

I-B.

HOVARD, *Zoocécidies*.

**Thalictrum riparium** JORDAN


**Ac.fr.** — Akène épaissi formant une cécidie subsphérique à paroi dure, un peu plus grosse que le fruit normal; ovule atrophié. Une ou deux larves. [Clinodiplosis thalictricola RÜBS.] 2457  
Pierre, 1905, p. 175. F.

**Thalictrum flabellatum**

**Pl.fe.** — Limbe crispé. M.C. Cocons blancs. . . . Cécidomyide 2458  
Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 527. P.

FAMILLE DES BERBÉRIDACÉES

Berberis 2460-2466, Epimedium 2459.



**Epimedium alpinum** L.

**Pl.fe.** — Plis saillants à la face inférieure du limbe, de longueur variable, souvent situés près du bord et parallèles à celui-ci. Ériophyide 2459  
Trotter, 1903<sup>b</sup>, p. 11, n° 19, fig. 2-3, ⊕; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. X, n° 231, ⊕. I.



**Berberis vulgaris** L.

**Ac.ti.** — A l'extrémité des rameaux, ou plus souvent sur les bourgeons axillaires, enroulement par en haut, étroit et serré, du limbe des feuilles; la partie enroulée est rouge sombre ou violet, coriace et fortement hypertrophiée. Parfois l'axe s'allonge un peu et les feuilles ainsi séparées sont froissées, vertes et enroulées. Cécidomyide 2460  
F. Low, 1885<sup>c</sup>, p. 501; Thomas, 1892, p. 379, n° 12; Dalla Torre, 1892, p. 110; 1895, p. 138; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 243. E-G, F, I.

**Pl.ra.** — Nodosités à cavité interne. . . **Heterodera radiceicola** GREEFF 2461  
 Frauk, 1896, p. 22; Kieller, 1901<sup>b</sup>, p. 269. . . . . A.

**Pl.ti.** — Sur le côté d'un rameau, renflement à surface bosselée, multiloculaire et d'un beau rouge. M.C.  
**Lasioptera berberina** SCHRANK 2462  
 Schrank, 1781, p. 435, n° 885; Kertész, 1902, p. 15-16. . . . . E.-C., E.-O.



*Berberis vulgaris*

*Eriophyes curvatus* (n° 2463)

Fig. 700 (a). — IM. FOCKEU

Fig. 701 (b). — IM. FOCKEU

**Pl.fe.** — Sur le limbe, et aussi à la base du pétiole, cécidie pustuleuse de la grosseur d'un grain de mil (fig. 700), faisant saillie sur les deux faces de la feuille (fig. 701).  
**Eriophyes curvatus** FOCKEU 2463

Fockeu, 1892, p. 152-153, 1 fig., pl. XV, 7, ⊕; Nalepa, 1898, p. 16, n° 40. . . . . SY.

— A la face inférieure de la feuille, fossettes de la grosseur d'une tête d'épingle avec saillie correspondante à la face supérieure, plus claire que le reste du limbe. **Trioza Scotti** F. LÖW 2464

Frauenfeld, 1866, p. 979; F. Löw, 1888, p. 22, n° 84; Hieronymus, 1890, p. 107, n° 290; Lemée, 1902, p. (33), n° 7°; Massalongo, 1908, p. 1-2, n° 2; Hieronymus, Pax, etc., 1908, fasc. XVI, n° 430, ⊕. . . . . E.-C., F.I.

— Limbe déformé, courbé et décoloré. Puceron jaune à cornicules renflés. **Rhopalosiphum berberidis** KALT 2465

Kaltenbach, 1874, p. 18-19, n° 20; Schouteden, 1903<sup>b</sup>, p. 92. . . . . A.


— Limbe brun rougeâtre. . . . . **Eriophyes granulatus** NAL. 2466

Nalepa, 1898, p. 16, n° 41; 1900, p. 204, pl. 1, 5-6, ⊕. . . . . A.-H.

## FAMILLE DES LAURACÉES

Apollonias 2/68, Laurus 2/69-2/74, Persea 2/67.

La cécidie florale présentée par quelques espèces du genre *Laurus*, le plus important de cette famille, est fort curieuse ; aussi avons nous tenu à en donner un dessin original (fig. 702-704). Quant à l'enroulement foliaire dû au *Trioza alacris*, il est bien connu de tous. Remarquons encore la grande ressemblance qui existe entre la formation érinécenne du limbe du *Laurus nobilis* (n° 2/71) et les macules arrondies rencontrées sur une feuille fossile (n° 2/74). Enfin, nous avons tenu compte dans notre texte de l'importante rectification signalée par Rübsaamen (1902 d, p. 61) : *Apollonias canariensis*, au lieu du *Laurus canariensis* admis, par les anciens auteurs (n° 2/68), comme substratum de la déformation connue sous le nom d' « *Erineum sepultum* ».

**Persea indica** SPRENG.

Pl.fe. — Limbe crispé ; cécidozoaire fixé au voisinage de la nervure médiane, à la face inférieure. **Aspidiotus ancylus** PUTNAM

2467

Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 120 (jardin botanique).

P.




**Apollonias canariensis** NEES  
(**Phœbe Barbusana** WEBBER et BERTH.)

Pl.fe. — A la face supérieure du limbe, bosselures auxquelles correspond sur le dessous un amas de poils bruns. *Erineum sepultum* KUNZE. **Ériophyide**

2468

Fée, 1834, p. 120, n° 60, pl. V, 2, ⊕ ; Rübsaamen, 1902 d, p. 60-61, n° 2 ; Tavares, 1903<sup>b</sup>, p. 181, n° 2.


m.

**Laurus nobilis** L.


Ac.fl. — Fleur hypertrophiée, de 6-10 mm. de diamètre (fig. 702-704) ; calice grossi ; pétales élargis et épaissis ; filet des étami-

nes charnu et garni de papilles ; pistil atrophié. La cécidie est couverte de poils cylindriques contournés et amincis à l'extrémité, de couleur fauve. **Eriophyes Malpighianus** CAN. et MASS. 2469

Hieronymus, 1890, p. 76, n° 137 ; Massalongo, 1893, p. 420-421, n° 16 ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. IX, n° 261, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIV, n° 330, ⊕. *L. s. s.*



*Laurus nobilis*  
*Eriophyes Malpighianus* (n° 2469)  
Fig. 702 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 703, 704 (b, c). — D'ap. nat.



*Laurus nobilis*  
*Trioza alacris* (n° 2470)  
Fig. 705 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 706 (b). — D'ap. nat.

Pl. fe. — Enroulement marginal par en bas, accompagné d'une décoloration et d'une forte hypertrophie (fig. 705-706).

**Trioza alacris** FLOR 2470

Massalongo, 1893, p. (39-42), n° 5, pl. III, 1-2, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VIII, n° 231, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. III, n° 69, ⊕ ; Trotter, 1903, p. 28-29, n° 55 ; Tavares, 1905, (p. 33) ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 268 ; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n° 68, ⊕. *E-T*  
*A-M.*

— A la face inférieure du limbe, plages bien délimitées de poils noirâtres, pluricellulaires, irréguliers. **Ériophyide** 2471

Röll, 1855, p. 518 ; Rübsaamen, 1900<sup>b</sup>, p. 196-197, n° 11, fig. 11, ⊕. *A-H, G.*

***Laurus canariensis* WEBBER**

(y compris la variété *azorica* SEUB. et HOCST.)

Ac. fl. — Voir n° 2469. **Eriophyes Malpighianus** CAN. et MASS. 2472

Bohlin, 1901, p. 81-89, fig. A, B, C, fig. 1-10, ⊕ ; Rübsaamen, 1902<sup>d</sup>, p. 63, n° 12. *ca.*

- Voir n° 2470. . . . . **Trioxa alacris** FLOR 2473  
 Böhlia, 1901, p. 89-92, fig. D, E, F, fig. 11, ⊕; Rübssaamen, 1902<sup>3</sup>, p. 62-63, n° 11; Tavares, *ca. m.*, 1905<sup>b</sup>, p. 223, n° 40.

**Laurus** sp. (fossile)

- Pl. fe.** — Macules arrondies, de 0,5-2 mm. de diamètre. *Phylloerites palao-lauri* ETTINGSH. **Eriophyidites** 2474  
 Ettingshansen, 1888, p. 264-265, pl. 1, 4, ⊕; Meschinelli, 1890, p. 806-807, n° 6; 1898, p. 105, *A-H.*, pl. XXX, 3, ⊕; Trotter, 1903<sup>e</sup>, p. 17.

**FAMILLE DES PAPAVERACÉES**

*Fumaria* 2488, *Hypecoum* 2475, *Papaver* 2476-2487.

Dans le tableau des galles des Papavéracées, dressé ici, nous avons laissé de côté les deux galles de *Chelidonium majus* signalées par Rudow (1891, p. 332, n° 12, pl. VI, 2, ⊕), mais qui n'ont pas été rencontrées depuis. Remarquons cependant, en passant, que la cécidie du fruit dont parle cet Auteur a quelque ressemblance avec celle que Trotter signale sur l'*Hypecoum* (n° 2475).


Les galles des Pavots sont toutes fort intéressantes. Elles consistent en déformations de capsules; celle de l'*Aulax papaveris* est la mieux connue histologiquement (voir n° 2481); les autres, dues à l'*Aulax minor* et au *Perrisia papaveris*, nécessiteraient quelques recherches anatomiques destinées à mettre en évidence l'origine de la déformation.

On a signalé deux acrocécidies (sur *Papaver* et *Fumaria*) dans lesquelles le port de la plante est modifié par des Pucerons.



**Hypecoum grandiflorum** BENTH.

- Ac. fr.** — Extrémité de la silique renflée et globuleuse. **Cécidomyide** 2475  
 Trotter, 1903, p. 27, n° 48 bis. *G.*





**Papaver Rhœas L.**

**Acre.** — Plante entièrement déformée. Puceron noir ou vert foncé.

**Aphis rumicis L.** 2476

Schouteden, 1963<sup>b</sup>, p. 96.


A.

**Ac. fr.** — Fruit gonflé, à surface irrégulière brillante, renfermant des cécidies pluriloculaires dures et d'un jaune brunâtre pâle ; les cloisons sont détruites à l'intérieur de la capsule déformée. Cynipide fin avril-juin II.

**Aulax papaveris PERRIS** 2477

Mayr, 1876, p. 22-24, n° 19, pl. III, 19, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. X, n° 287, ⊕ ; Connold, 1901, pl. CXXVIII, ⊕ ; Houard, 1901<sup>d</sup>, p. 705, n° 37.

E-T,  
A.L.



Galles des Pavots

Fig. 707-713 (a, b, 1, 3, 4, A, B) *Papaver dubium* : *Aulax papaveris* (n° 2481). D'ap. nat. et d'ap. MOLL.  
Fig. 714 (c) *Papaver Rhœas* : *Aulax minor* (n° 2478). . . . D'ap. nat.

— Capsule très faiblement déformée, non gonflée ; les cloisons internes subsistent et portent des galles uniloculaires, ovoïdes (fig. 714). Cynipide mai II.

**Aulax minor HARTIG** 2478

Mayr, 1876, p. 24, n° 20, pl. III, 20, ⊕ ; Massalongo, 1893, p. (154-155), n° 119, pl. XXIV, 4-5, ⊕ ; Kieffer, 1897<sup>b</sup>, p. 69, n° 22, pl. VIII, 3, ⊕.

E-C,  
E-O.

— Dans la capsule, dont les lamelles sont renflées, nombreuses larves. M.C.

**Perrisia papaveris WINN.** 2479

Winnertz, 1853, p. 229-230, n° 16 ; Goury et Guignon, 1905<sup>b</sup>, p. 120.

A.F.

**Pl.ra.** — Nodosités. . . . . [**Heterodera Schachtii** SCHMIDT] 2480  
 Gain, 1894, p. 254. F.

**Papaver dubium** L.

(y compris les variétés *calcicolum*, *Lecoqui*, etc.).

**Ac.fr.** — Voir n° 2477. Fig. 707-713. . . . **Aulax papaveris** PERRIS 2481  
 Perris, 1840, p. 93-98, pl. VI, 11-16, ⊕ ; Molliard, 1899, p. 209-217, fig. 43-53, ⊕ ; Connold, E-T,  
 1901, pl. CXXVIII, ⊕ ; Reijnevaa et Leeuwen, 1906<sup>b</sup>, p. 137-151, 3 fig., ⊕. AL.

— Voir n° 2478. . . . . **Aulax minor** HARTIG 2482  
 Goury et Guignon, 1905<sup>b</sup>, p. 109. F.

— Voir n° 2479. . . . . **Perrisia papaveris** WINN. 2483  
 Winnertz, 1853, p. 229-230, n° 16 ; Goury et Guignon, 1905<sup>b</sup>, p. 109. A, F.

**Papaver Argemone** L.

**Ac.fr.** — Voir n° 2478. . . . . **Aulax minor** HARTIG 2484  
 Kieffer, 1898<sup>c</sup>, p. 98, n° 56 ; Goury et Guignon, 1905<sup>b</sup>, p. 108-109. F.


— Voir n° 2477. . . . . **Aulax papaveris** PERRIS 2485  
 Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 371 ; Goury et Guignon, 1905<sup>b</sup>, p. 108. F.

**Papaver somniferum** L.

**Ac.fr.** — Voir n° 2479. . . . . **Perrisia papaveris** WINN. 2486  
 Goury et Guignon, 1905<sup>b</sup>, p. 121. F.

**Papaver pyrenaeum** WILLD. (**P. alpinum** L.)

**Ac.fl.** — Fleurs doublées. . . . . **Ériophyide** 2487  
 Dalla Torre, 1893<sup>b</sup>, p. 11 ; Goury et Guignon, 1905<sup>b</sup>, p. 108. E-C, F.



**Fumaria muralis** SOND.

**Acre.** — Inflorescence à entre-nœuds raccourcis, rameaux jeunes et  
 pétioles déformés, limbes repliés par en bas. 2488  
**Aphis papaveris** FABR.  
 Tavares, 1905, p. 24. P.

## FAMILLE DES CRUCIFÈRES

Alliaria 2512-2515, Alyssum 2726-2732, Arabis 2698-2715, Barbarea 2637-2643, Berteroa 2733-2736, Biscutella 2499-2503, Brassica 2569-2618, Cakile 2542-2543, Camelina 2683-2686, Capsella 2678-2682, Cardamine 2654-2674, Carrichtera 2551, Cheiranthus 2725, Cochlearia 2510-2511, Coronopus 2497-2498, Crambe 2636, Dentaria 2675, Diplotaxis 2556-2563, Draba 2687-2693, Eruca 2553, Erucastrum 2564-2568, Erysimum 2716-2724, Hesperis 2737-2739, Hutchinsia 2676-2677, Isatis 2546-2724, Lepidium 2489-2496, Matthiola 2740-2741, Moricandia 2742, Myagrum 2544-2545, Nasturtium 2644-2653, Raphanistrum 2633-2634, Raphanus 2619-2632, Rapistrum 2635, Sinapis 2554-2555, Sisymbrium 2516-2541, Stenophragma 2694-2696, Thlaspi 2504-2509, Turrilis 2697, Zilla 2552.

Les galles des Crucifères sont nombreuses et variées en raison du nombre considérable d'espèces qui croissent en Europe ou sur les bords de la Méditerranée.

Les siliques se gonflent parfois sous l'influence de larves d'*Asphondylia* (*A. Stefani*), de *Contarinia* ou de *Dasyneura* (*D. brassicae* et *D. Sisymbrii*).

Les fleurs possèdent des galles très communes. Elles restent closes et se gonflent en hypertrophiant leurs différentes pièces lorsqu'elles hébergent des larves de diptères; parfois même plusieurs espèces de larves s'y rencontrent simultanément, les unes pouvant sauter, les autres incapables de le faire, de sorte qu'il est souvent fort difficile de distinguer les espèces réellement cécidogènes. Tel est le cas pour *Contarinia ruderalis*, *C. nasturtii*, *Dasyneura Sisymbrii* et *D. raphanistri*; de nouvelles recherches seraient à effectuer. — Signalons encore *Perrisia cardaminis* qui gonfle les fleurs des Cardamines et rappelons que les diptères des fleurs gonflées de *Cakile*, *Myagrum*, *Zilla*, *Diplotaxis*, *Erucastrum*, etc. n'ont pas encore été obtenus et nommés.

En outre, les fleurs peuvent devenir vertes et se transformer en pièces foliacées sous l'influence de l'*Ériophyes drabe* (*Lepidium*, *Sisymbrium*, *Hutchinsia*, *Capsella* etc.) et de divers Ériophyides non décrits, ou encore quand elles hébergent des Pucerons. Nous avons mis en évidence dans le texte ci-contre les curieuses modifications florales (pétalodie, proliférations, etc.) obtenues expérimentalement par Peyritsch, à l'aide d'Ériophyides et d'Aphides (cas des *Arabis*), et décrites dans ses mémoires de 1882 et 1888 dont nous recommandons la lecture. Ce sont là des expériences pleines d'intérêt qui mériteraient d'être reprises et poursuivies.

En général ces déformations sont accompagnées de modifications dans les feuilles, mais fort peu importantes: elles ne consistent guère qu'en boursouflures ou enroulements marginaux du limbe dus à des Aphides, par exemple l'*Aphis brassicae*.

Les galles terminales des Crucifères affectent la forme de touffes arrondies, spongieuses, et proviennent d'une déformation de l'inflorescence avec raccourcissement des entre-nœuds supérieurs. *Dasyneura sisymbrii* engendre les cécidies bien connues des *Nasturtium*; *Perrisia Fiorii* produit

une petite galle arrondie et *Janetiella fallax* un renflement allongé terminal couronné par quelques feuilles (n° 2728).

Très importants sont les renflements provoqués sur les tiges ou les racines des Crucifères par des larves de Coléoptères : *Baïis caeruleus*, des *Ceuthorrhynchus*, *C. hirtulus*, *C. napi*, *C. assimilis*, *C. contractus* et surtout *C. pleurostigma*. On les rencontre sur la plupart des espèces d'Europe et leur nombre augmente chaque jour en raison des travaux des Cécidologues. A ce propos, il est bon de noter les intéressantes recherches de Pierre (1901), qui ont eu pour effet de préciser la biologie des *Ceuthorrhynchus griseus* et *atomus*.

Diverses larves de Coléoptères appartenant à ce même genre *Ceuthorrhynchus* peuvent même en zendrer des renflements sur les pétioles ou sur les nervures médianes des feuilles. Citons *C. caeruleus*, *C. pectoralis*, *C. chalybeus*, *C. quadridentis*; le *C. Rübsaameni* est capable d'épaissir le parenchyme des feuilles de plusieurs *Brassica*.

Les cécidies caulinaires dues à des Insectes autres que des Coléoptères sont peu nombreuses : citons cependant le renflement d'une tige d'*Arabis* (n° 2763) signalé depuis peu par Trotter (dû à un *Asterolecaium*), puis les galles engendrées par *Perrisia alyssi*.

Quant aux galles des racines, produites par *Heterodera radicicola* et *H. Schachtii*, elles se rencontrent fréquemment et ne peuvent être négligées en raison de l'utilisation de nombreuses Crucifères comme plantes alimentaires ou industrielles.



### **Lepidium Draba L.**

**Ac.fl.** — Chloranthie avec pilosité anormale; il peut se former des ballots sphériques de fleurs ainsi modifiées.

**Eriophyes drabæ** NAL. 2489

Hieronymus, Pax, etc. fasc. VIII, n° 232, ⊕; Rübsaamen, 1895, p. 410, n° 23; 1900<sup>b</sup>, p. 213, n° 12; Nalepa, 1898, p. 17, n° 43.

*E.-C.*  
*R.I.*

**Ac.ti.** — Les entre-nœuds terminaux demeurent courts et les bourgeons latéraux ainsi rapprochés les uns des autres sont transformés, comme le bourgeon terminal, en un petit bouquet de feuilles. Larves jaunâtres. M.T.

**Contarinia** 2490

Rübsaamen, 1895, p. 449, n° 71.

*R.*

**Plrc.** — Renflements noueux, de volume très variable, situés sur la tige ou les racines (fig. 715-717).

**Ceuthorrhynchus pleurostigma** MARSH. 2491

Frauenfeld, 1857, p. 120; Jacob de Gordenoy, 1902, p. 120, fig. 2, ⊕; Darboux, 1902, p. 178-179, 1°; Honard, 1902<sup>b</sup>, p. 42, n° 28.

*A.-H.*  
*F.*

**Lepidium campestre** R. BROWN

- Pl.ti.** — Tumeurs sphéroïdales situées dans la région inférieure de la tige. **Ceuthorrhynchus pleurostigma** MARSH. 2492  
Pierre, 1903, p. 45 ; 1905, p. 163 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 268. F.
- Pl.fe.** — Sur le pétiole d'une feuille inférieure, bosselette d'un vert sombre. **Ceuthorrhynchus cærulescens** GYLLH. 2493  
Pierre, 1901<sup>c</sup>, p. 243, n° 5 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 268. F.

**Lepidium sativum** L.

- Ac.fl.** — Inflorescence déformée ; entre-nœuds raccourcis. **Aphide** 2494  
Schlechtendal, 1890, p. 51, n° 472 ; Schouteden, 1903, p. 117. A.
- Pétalodie de quelques étamines. . . . . **Eriophyide** 2495  
Peyritsch, 1888, p. 598-599 (expérimental). A-H.
- Pl.ra.** — Nodosités. . . . . [**Heterodera radicolica** GREEFF]. 2496  
Voigt, 1890 (expérimental) ; Kieffer, 1892<sup>d</sup>, p. 224 ; 1901<sup>b</sup>, p. 354. E-G.

**Coronopus niloticus** DELILE (**Seneciera nilotica** DC.)

- Pl.ti.** — Sur la tige, renflements irréguliers, arrondis ou allongés (fig. 718), de 8-10 mm. de diamètre, charnus, bi ou trilobulaires (fig. 719). Une larve rouge dans chaque loge. M.T. **Cécidomyide** 2497  
Frauenfeld, 1859, p. 326, pl. VI, 12, ⊕ ; Frank, 1896, p. 112, n° 13. ÉG.
- Renflement de la grosseur d'un pois situé à la base de la rosette foliaire. **Coléoptère** 2498  
Frauenfeld, 1855<sup>b</sup>, p. 151 ; Frank, 1896, n. 290, n° 5. ÉG.

**Bisentella auriculata** L.

- Ac.fl.** — Fleurs prolifères avec pétalodie. . . . . **Eriophyide** 2499  
Peyritsch, 1888, p. 598-599 (expérimental). A-H.


**Biscutella levigata L.**

Pl.fe. — Les feuilles, surtout celles de la rosette basilaire, ont des bords sinueux ou repliés par en bas et sont en outre déformées, plus poilues que les feuilles normales, et moins épaisses.


Ériophyide 2500

Thom. et, 1886, p. 299, n° 10; Dalla Torre, 1892, p. 111.


E-G.



**Lepidium Draba**  
*Ceuthorrh. pleurostigma* (n° 2491)  
Fig. 715 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 716 (b). — D'ap. nat.  
Fig. 717 (c). — D'ap. nat.



**Coronopus niloticus**  
*Cécidomyide* (n° 2497)  
Fig. 718 (a). — Im. FRAUENF.  
Fig. 719 (b). — Im. FRAUENF.



**Biscutella saxatilis**  
*Cécidomyide* (n° 2502)  
Fig. 720 (a). — Im. MİK  
Fig. 721 (b). — Im. MİK

**Biscutella apricorum JORDAN**  
(**Biscutella levigata L. subsp. coronopifolia L.,**  
forma **apricorum JORDAN**)

Ac.fl. — Fleur gonflée, demeurant fermée. . . . . Perrisia 2501  
Gerber, 1901, p. 61-71, fig. 1-10, ⊕.

F.

**Biscutella saxatilis SCHLEICH**

Ac.fl. — Fleur gonflée, de la grosseur d'un pois (fig. 720); silicule devenant beaucoup plus grosse que le fruit normal (fig. 721).

- Larves de 2,2 mm. de longueur, au nombre de 4-6 dans chaque fleur. M.T. Cécidomyide 2502  
 Mik, 1891<sup>b</sup>, p. 309-310, pl. IV, 1-4, ⊕; Corti, 1903<sup>b</sup>, p. 343, n° 21. A-H.I.
- Fleur à calice modifié. . . . . Ériophyide 2503  
 Peyritsch, 1888, p. 599 (expérimental). A-II.



### **Thlaspi arvense L.**

- Pl.ra.** — Renflement arrondi situé au collet. Céuthorrhynchus pleurostigma MARSH. 2504  
 Schlechtendal, 1890, p. 52, n° 488; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 527. I.
- Pl.ti.** — Cécidies allongées. . Céuthorrhynchus contractus MARSH. 2505  
 Hieronymus, 1890, p. 271, n° 801; Hellwig, 1901, p. 164; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 527. D, E-G.

### **Thlaspi montanum L.**

- Ac.ti.** — Extrémité déformée. . . . . Cécidomyide 2506  
 Schlechtendal, 1890, p. 52, n° 490; Rübsaamen, 1895, p. 450. I.

### **Thlaspi perfoliatum L.**

- Pl.ra.** — Renflement situé au collet. Céuthorrhynchus pleurostigma MARSH. 2507  
 Kieffer, 1892, p. 56, n° 31. I.
- Pl.ti.** — Cécidies arrondies, de 5-6 mm. de diamètre. Céuthorrhynchus contractus MARSH. 2508  
 Frauenfeld, 1872, p. 394-395; Szépligéti, 1890, p. 23, 44; Schlechtendal, 1890, p. 52, n° 491. E-G.
- Renflement subglobuleux. . . . . Coléoptère 2509  
 Trotter, 1907<sup>b</sup>, p. 31, n° 25. I.



**Cochlearia armoracia L.**

**Pl.ra.** — Cécidies arrondies situées au collet de la racine.

**Ceuthorrhynchus pleurostigma** MARSH. 2510

Bargagli, 1883, p. (266); Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 295; Tavares, 1902, p. 135, n° 315. I.P.

**Cochlearia officinalis L.**

**Ac.fl.** — Pétalodie de quelques étamines. . . . . **Eriophyide** 2511

Peyritsch, 1888 p. 598-599 (expérimental). A-II.



**Alliaria officinalis DC.**

(**Erystrum Alliaria** L., **Sisymbrium All.** Scop.)

**Acre.** — Chloranthie. . . . . **Aphide** 2512

Peyritsch, 1882, p. 5 (expérimental); Dalla Torre, 1892, p. 106 (note); Schouteden, 1903, p. 187. A-H.

— Phyllomanie. . . . . **Eriophyide** 2513

Thomas, 1869, p. 351, n° 27. E-C.

**Pirc.** — Nodosités sur les racines. . . **Heterodera radicicola** GREEFF 2514

Trotter, 1905, p. 52-53. I.

— Sur tige ou pétiole, épaississement fusiforme de 10-20 mm. de long, atteignant à peu près le double de l'épaisseur de l'organe sain.

[**Coléoptère ou Lépidoptère**] 2515

Rübsaamen, 1899, p. 235, n° 18; Hellwig, 1901, p. 164. A.



**Sisymbrium officinale** Scop

**Ac.fl.** — Inflorescence déformée; les pédoneules floraux, épaissis et concrecents, forment une masse charnue ou spongieuse, de laquelle émergent à peine des boutons déformés; sépales très élargis, pétales et filets des étamines épaissis. Larves grégaires blanches. M.T.

**Contarinia ruderalis** KIEFF. 2516

**Dasyneura sisymbrii** SCHRANK 2517

Hieronymus, 1890, p. 174, n° 556; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 170, Ⓞ; Molliard, 1895, p. 165-167; Massalongo, 1906<sup>b</sup>, p. 157, n° 72. E-C.  
E-O.I.



Inflorescence déformée par suite de l'arrêt de croissance en longueur des pédoncules floraux épaissis. Plante chlorotique. Puceron d'un vert vif. [**Aphis nasturtii** KALT.] 2518  
 Liebel, 1886, p. 571, n° 276 ; Schouteden, 1903, p. 187 ; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 303. A.F.

**Pl.ra.** — Excroissances charnues, de la grosseur d'un pois, situées au collet. **Ceuthorrhynchus pleurostigma** MARSU. 2519  
 Kieffer, 1891, p. 254, n° 481 ; 1892, p. 56, n° 28 ; 1901 b, p. 513. A.

**Pl.ti.** — Tige irrégulièrement élargie et renflée sur une grande longueur (15 cm. environ), à axe incurvé ; galerie intérieure presque aussi large que la tige. Plusieurs larves. M.T. **Ceuthorrhynchus napi** GYLLH. 2520  
 Pierre, 1905, p. 174. F.

— Renflement. . . . . **Curculionide** 2521  
 Rostrup, 1896, p. 31, n° 200. D.

**Pl.fe.** — Renflement axial ovoïdal ou parfois latéral, d'un vert sombre, uniloculaire (mesurant 7-18 mm. sur 4 mm.), situé sur le pétiole ou la nervure médiane. M.T. **Ceuthorrhynchus chalybæus** GERMAR 2522  
 Pierre, 1901 c, p. 241-242, n° 4 ; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 303. F.

— Sur le pétiole, léger renflement fusiforme contenant une seule larve. **Gécidomyide** 2523  
 Kieffer, 1891, p. 254, n° 483 ; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 73. A.F.

**Sisymbrium Lœseli** L.

**Acre.** — La plante entière est déformée ; toutes les parties axiales demeurent courtes et s'épaississent ; les fleurs et les feuilles supérieures sont rapprochées en amas pileux au milieu desquels vivent de nombreuses larves d'un blanc d'ivoire. **Cécidomyide** 2524  
 F. Löw, 1885 c, p. 508 ; Kieffer, 1901 b, p. 508. E.C.

— Cécidie assez semblable à la précédente, pluriloculaire, molle, spongieuse, revêtue de poils blancs. [M.C.] **Cécidomyide** 2525  
 Trotter, 1903, p. 222, n° 202. A-M.

— Voir n° 2516. . . . . [Contarinia ruderalis KIEFF.] 2526  
 Rübsaamen, 1895, p. 464, n° 88. R.

**Sisymbrium Irlo L.**

**Ac.fl.** — Boutons demeurant fermés, renflés surtout dans leur partie basilaire, en sorte qu'ils prennent une forme conique ; les sépales et les pétales sont épaissis ; il peut y avoir aussi, par suite d'un épaississement des pédoncules floraux, production d'une cécidie en ananas. Larves blanches grégaires. M.T.

**Contarinia ruderalis KIEFF.** 2527

Molliard, 1895, p. 167-170. F.

**Sisymbrium Columnae JACQ.**

**Ac.fl.** — Les entre-nœuds floraux demeurent courts ; les fleurs, réunies en un amas sphérique, ont un calice agrandi, épaissi, très pileux ; les pétales sont déformés, les organes reproducteurs atrophiés. Larves grégaires blanches. M.T.

[Contarinia ruderalis KIEFF.] 2528

Rübsaamen, 1895, p. 462, n° 87, pl. XVI, 18, 28 ; 1899, p. 248, n° 64. R.

— Les entre-nœuds floraux demeurant courts, les fleurs, qui forment des amas irréguliers et couverts de pilosité, restent pour la plupart fermées ou subissent une virescence accentuée.

**Ériophyide** 2529

Szépligéti, 1890, p. 22-23, 43 ; Kieffer, 1901 b, p. 514. A-H.

**Ac.ti.** — Voir n° 2537. . . . . [Contarinia ruderalis KIEFF.] 2530

**Pl.fe.** — Bord du limbe présentant des parties épaissies et couvertes de poils fins, ainsi qu'un enroulement marginal plus ou moins accentué. Cette déformation accompagne la cécidie florale décrite plus haut.

**Ériophyide** 2531

**Sisymbrium pannonicum JACQ.**

**Ac.fl.** — Voir n° 2527. . . . . **Contarinia ruderalis KIEFF.** 2532

Rübsaamen, 1895, p. 464, n° 89. R.

**Sisymbrium Sophia L.**

- Ac.fl.** — Les entre-nœuds terminaux des tiges florifères demeurent courts ; les fleurs, ainsi rapprochées, sont viresecentes et forment des amas couverts de poils anormaux ; les feuilles présentent des déformations diverses et particulièrement une laciniation des découpures du bord. **Eriophyes drabæ** NAL. 2533  
 Thomas, 1877, p. 368, n° 10 ; Schlechtendal, 1882, p. 37, n° 27 ; Nalepa, 1898, p. 17, n° 43 ; Hellwig, 1901, p. 164. A.
- Bractées florales plus petites qu'à l'état normal. **Eriophyide** 2534  
 Peyritsch, 1888, p. 598 (expérimental). A-H.
- Voir n° 2516. . . . . **Contarinia ruderalis** KIEFF. 2535  
**Dasyneura sisymbrii** SCHRANK 2536
- Ac.ti.** — Les rameaux latéraux, arrêtés dans leur développement, sont transformés en productions arrondies, vertes ou rougeâtres, de consistance charnue, à la base desquelles on trouve la feuille axillante élargie et hypertrophiée. M.T.  
**Contarinia ruderalis** KIEFF. 2537  
**Dasyneura sisymbrii** SCHRANK 2538  
 Brischke, 1881, p. 169 ; Hieronymus, 1890, p. 174, n° 557 ; Focke, 1891<sup>b</sup>, p. 487 ; Kertész, 1902, p. 30, 98. A, F.
- Pl.ti.** — Nodosité pisiforme, charnue, située au collet.  
**Ceuthorrhynchus pleurostigma** MARSH. 2539  
 Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 513.
- Pl.fe.** — Limbe renflé, formant avec la pousse atrophiée située à son aisselle une production arrondie, verte ou rouge, presque charnue ; larves grégaires jaune soufre. M.T.I-II.  
**[Contarinia Kiefferi SCHL.]** 2540  
 Schlechtendal, 1890, p. 52, n° 487 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 514. A.

**Sisymbrium Zannonii BALL.**

- Acre.** — Petite cécidie située au sommet des jeunes plantes (fig. 722-723) et constituée par quatre ou cinq feuilles déformées, char-

nues, pubescentes. Larves grégaires, rougeâtres. M.C. ou M.T.

**Perrisia Fiorii** CECCONI 2541

Cecconi, 1904<sup>b</sup>, p. 184-187, n° 26, 2 fig., ⊕ : Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XV, n° 366, ⊕.

I.



**Cakile maritima** SCOP.

Ac.fl. — Fleur gonflée, demeurant fermée; sépales carénés, vert jaunâtre; étamines courtes à filet épaissi et bossué; pistil et pédoncule floral renflés (fig. 724-727). Larves grégaires jaune soufre.


**Cécidomyide** 2542

Rostrup, 1896, p. 31, n° 195; Houard, 1902<sup>b</sup>, p. 37-38, n° 10, fig. 7-10, ⊕.


D, F.



*Sisybrium Zannonii*  
*Perrisia Fiorii* (n° 2541)  
Fig. 722 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 723 (b). — D'ap. nat.



*Cakile maritima*  
*Cécidomyide* (n° 2542)  
Fig. 724, 725 (a, b). — D'ap. nat.  
Fig. 726, 727 (c, d). — D'ap. nat.



*Cakile maritima*  
*Ceuthorrh. pleurostigma* (n° 2543)  
Fig. 728. — D'ap. nat.

Pl. ti. — A la partie inférieure de la tige, au-dessous des cotylédons, renflement de la grosseur d'un pois produit par une hypertrophie de l'écorce dans laquelle se trouve la cavité larvaire (fig. 728).

**Ceuthorrhynchus pleurostigma** MARSH. 2543

Hieronimus, 1890, p. 264, n° 783; Focken, 1890<sup>c</sup>, p. 38; Rostrup, 1896, p. 31, n° 196; Houard, 1902<sup>b</sup>, p. 38-39, n° 11.

D, A,  
I, B, F.



**Myagrurn perfoliatum L.**

**Ac.fl.** — Fleur déformée, légèrement doublée. . . . **Ériophyide** 2544  
Peyritsch, 1888, p. 605 (expérimental); C. Marchal et Chateau, 1905, p. 273. *A-H, F.*

**Pl.ra.** — Au collet, cécidie arrondie de la grosseur d'un pois.  
[**Ceuthorrhynchus contractus** MARSH.] 2545  
Fockeu, 1890<sup>c</sup>, p. 37-38 (jardin botanique). *F.*

**Isatis tinctoria L.**


**Ac.ti.** — Entre-nœuds terminaux raccourcis; feuilles crispées. Puceron gris foncé à bandes pâles. **Aphide** 2546  
Geisenheyner, 1902, p. 251, n° 35; Schouteden, 1903, p. 177. *A.*

— Tige raccourcie et couronnée par un bouquet de feuilles; les pétioles sont un peu élargis à la base et un peu plus poilus que d'ordinaire. [**Diptère**] 2547  
Rübsaamen, 1899, p. 228, n° 7. *A.*

**Pl.fe.** — Limbe bosselé sur l'une ou l'autre face, avec dépression et faible décoloration. Puceron entièrement jaune vert. **Aphide** 2548  
C. Marchal et Chateau, 1905, p. 266. *F.*

— Nervure médiane hypertrophiée et tordue; limbe plié et bosselé; tige courte. . . . . 2549  
C. Marchal et Chateau, 1903, p. 387, n° 6; 1905, p. 266. *F.*

— Pétiole et nervure médiane portant de petites verrues s'ouvrant en fente. . . . . 2550  
C. Marchal et Chateau, 1905, p. 266. *F.*


**Carricltera annua L. (C. Velle DC.)**

**Aerc.** — Fleurs chloranthiées et couvertes d'une pilosité anormale. Les feuilles sont contournées (fig. 729), hypertrophiées, pileuses et repliées par en haut (fig. 730). **Ériophyide** 2551  
Hieronymus, 1890, p. 67, n° 72; Honard, 1901<sup>d</sup>, p. 78<sup>a</sup>, n° 15. *s., AL.*



**Zilla myagroides** FORSK.

Ac.fl. — Fleur, légèrement grossie, charnue et fermée (fig. 731). Larves grégaires blanc d'ivoire. **Cécidomyide** 2552  
 Fraenfeld, 1859, p. 326, pl. VI, t. 3, ⊕; Bergenstamm et Löw, 1876, p. 93, n° 548. *ÉG.*



*Carrichlera annua*  
*Ériophyide* (n° 2551)  
 Fig. 729, 730 (a, b). — D'ap. nat.

*Zilla myagroides*  
*Cécidomyide* (n° 2552)  
 Fig. 731. — Im. FRAENF.

**Eruca sativa** MILLER

Ac.fl. — Pétalodie de quelques étamines. . . . **Eriophyide** 2553  
 Peyritsch, 1888, p. 598-599 (experimental). *A.H.*

**Sinapis alba** L.

Ac.fr. — Silique gonflée, déformée et courbée, fortement colorée. Petites larves grégaires blanches. **Diptère** 2554  
 Houard, 1901, p. 42-43, n° 10; 1901<sup>d</sup>, p. 706. *AL.*

Pl.ra. — Nodosités. . . . **Heterodera Schachtii** SCHMIDT 2555  
 Schmidt, 1871; Kieffer, 1892<sup>d</sup>, p. 224; 1901<sup>b</sup>, p. 513. *A.*

**Diplotaxis crassifolia** DC.

- Ac.fl.** — Fleur fortement boursoufflée, demeurant fermée, ou s'ouvrant tout juste à la pointe pour laisser passer le style et rarement aussi la pointe des pétales ; étamines courtes et épaissies. Larves grégaires. **Cécidomyide** 2556  
 Massalongo et Ross, 1898, p. 404, pl. XXVII, 2-4, ⊕ ; Stefani, 1906, p. 108. *si.*

**Diplotaxis crucoides** DC.

- Ac.fl.** — Fleurs virescentes ; sépales agrandis ; pétales courts, leur nombre pouvant se trouver augmenté ; silique remplacée par une silicule de 10-15 mm. de long sur 5-7 mm. de diamètre, contenant des feuilles à la place des ovules et portée par un pédoncule de 20 à 30 mm. de long. **Ériophyide** 2557  
 Cuboni, 1889 b, p. 507-510 ; Schlechtendal, 1895, p. 20. *l.*

**Diplotaxis tenuifolia** DC.

- Ac.fr.** — Sur la silique, renflement fusiforme occasionnant le plus souvent une torsion à angle droit de la silique (fig. 732, p. 462). **Asphondylia Stefani** KIEFF. 2558  
 Stefani, 1898 c, p. (5), n° 1 ; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. III, n° 63, ⊕ ; Houard, 1902 b, p. 40, n° 18, fig. 11, ⊕. *l, f.*

- Ac.fl.** — Fleur gonflée ne s'ouvrant pas ; pétales et étamines courts et épaissis à la base. Larves grégaires blanc jaunâtre. **Contarinia** 2559  
 Hieronymus, 1890, p. 131, n° 414 ; Cecconi, 1904, p. 83. *l.*

— Chloranthie. Puceron vert, fortement pulvérulent. **Aphis brassicæ** L. 2560  
 Schouteden, 1903, p. 174. *B.*

— Chloranthie. . . . . **Aphide** 2561  
 Peyritsch, 1882, p. 5 (expérimental) ; Dalla Torre, 1892, p. 106 (note) ; Kieffer, 1901 b, p. 307. *A-H.*

- Pl.fe.** — Renflement ellipsoïdal (5 mm. sur 2-2,5 mm.) du pétiole ou de la nervure médiane. Larve unique blanchâtre. **Coléoptère** 2562  
 Trotter, 1905 b, p. 99, n° 7. *l.*

**Diplotaxis muralis DC.**

Pl. fe. — Limbe enroulé. . . . . Aphide 2563  
 Mariani, 1907, p. 63, n° 4; 1907<sup>b</sup>, p. 298, n° 83. L.



**Erucastrum Pollichii SCHIMP. ET SPENN.**

Ac. fl. — Fleur gonflée demeurant fermée. Larves grégaires blanches. M. T. Insecte printemps-été L.

**Dasyneura raphanistri KIEFF.** 2564

Schlechtendal, 1895, p. 20; Tavares, 1902, p. 121-122, n° 284; 1905, p. 20. A. P.

— Fleurs ouvertes, chloranthiées et hypertrophiées; pédoncules floraux et axe de l'inflorescence fortement grossis (4 mm. de diamètre au lieu de 1,5 mm.). [Ériophyide] 2565

Tavares, 1905, p. 20-21. P.

Ac. ti. — Axe de l'inflorescence, pédoncules des fleurs et des fruits courbés. Puceron vert, pulvérulent. **Aphis brassicæ L.** 2566

Tavares, 1905, p. 21. P.

Pl. ra. — Renflement hémisphérique situé au collet de la racine. Insecte printemps L. **Ceuthorrhynchus [pleurostigma MARSH.]** 2567

Tavares, 1900, p. 97, n° 206; 1905, p. 20. P.

**Erucastrum varium DURIEU**

Ac. fl. — Bouton floral ne s'ouvrant pas, fortement globuleux (8 mm. de diamètre). Larves grégaires orangées. **Cécidomyide** 2568

Houard, 1902<sup>d</sup>, p. 89, n° 1. AL.



**Brassica**

**Brassica nigra KOCH (Sinapis nigra L.)**

Ac. fr. — Silique renflée. . . . . **Asphondylia Stefaniai KIEFF.** 2569

Stefaniai, 1905<sup>e</sup>, p. (2); 1906, p. 187. si.



- Ac.fl.** — Fleurs prolifères ; bractées déformées. . . . **Eriophyide** 2370  
Peyritsch, 1888, p. 598 (expérimental). A-H.

**Brassica oleracea L.**

(y compris les variétés *gongyloides*, *botrytis*, etc.)

- Ac.fr.** — Silique renflée. Voir n° 2581. [**Dasyneura brassicæ** WINN.] 2371  
Brischke, 1881, p. 170 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 274 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 244. F.
- Silique renflée. Voir n° 2592. . . . . **Contarinia** 2372  
Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 274. A.
- Ac.fl.** — Fleur gonflée. Voir n° 2594. **Dasyneura raphanistri** KIEFF. 2373  
Brischke, 1881, p. 170 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 274 ; Lemée, 1902, p. (35), n° 97 ; Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 111. A, F, P.
- Fleur gonflée. Voir n° 2593. . . . . **Contarinia** 2374  
Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 274. A.
- Pl.ra.** — Renflements situés au collet (fig. 734, p. 462). Voir n° 2597.  
**Ceuthorrhynchus pleurostigma** MARSH. 2375  
Massalongo, 1893, p. (225-226), n° 172, pl. XXXIV, 1, ⊕ ; Connold, 1901, pl. IX, ⊕ ; Houard, 1903<sup>c</sup>, p. 242-246, fig. 158-162, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. IX, n° 218, ⊕ ; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 48, ⊕. E-T.
- Renflements situés sur les racines, sans cavité interne.  
**Heterodera Schachtii** SCHMIDT 2376  
Kühn, 1870 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 275 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 244. A, F.
- Nodosités avec cavité interne. **Heterodera radicolica** GREEFF 2377  
Voigt, 1890 ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVI, n° 386, ⊕. E-C, I.
- Pl.fe.** — Bosselures saillantes et décolorées, à la face supérieure du limbe. Puceron vert pulvérulent. **Aphis brassicæ** L. 2378  
Martel, 1891, p. 15, n° 13 ; Rostrup, 1896, p. 31, n° 194 ; Tavares, 1905, p. 6. E-N, E-O.
- Boursofflures jaunâtres sur l'une ou l'autre des faces du limbe. **Psyllide** 2379  
Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 110-111. P.
- Parenchyme épaissi. **Ceuthorrhynchus Rübsaameni** KOLBE 2380  
Kolbe, 1900, p. 227, n° 5, p. 229-232 ; Geisenheyner, 1902, p. 196, n° 9. A.

**Brassica Rapa L. (B. campestris L.)**

- Ac.fr.** — Silique renflée. Larves blanches non sauteuses. M.T. 2581  
Dasyneura brassicæ WINN.  
 Winnertz, 1853, p. 231-233, n° 18 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 244. A.F.
- Silique renflée. Voir n° 2592. Contarinia 2582  
 Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 274. A.
- Ac.fl.** — Fleur gonflée. Voir n° 2594. Dasyneura raphanistri KIEFF. 2583  
 Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 274 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 244. A.F.
- Fleur gonflée. Voir n° 2593. Contarinia 2584  
 Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 274. A.
- Ac.ti.** — Raccourcissement et épaissement de toutes les parties de l'inflorescence. [Aphis brassicæ L.] 2585  
 Geisenheyner, 1902, p. 196, n° 8 ; Schouteden, 1903, p. 171. A.
- Pl.ra.** — Renflement situé au collet. Voir n° 2597. 2586  
Ceuthorrhynchus pleurostigma MARSH.  
 Schlechtendal, 1890, p. 50, n° 456 ; Massalongo, 1893, p. (233), n° 179 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 153, ⊕. E-C, I.
- Nodosités. Voir n° 2598. Heterodera Schachtii SCHMIDT 2587  
 Kühn, 1870 ; Kieffer, 1892<sup>d</sup>, p. 224 ; 1901<sup>b</sup>, p. 275. A.
- Nodosités. Voir n° 2599. Heterodera radicolica GREEFF 2588  
 Voigt, 1890 ; Trotter, 1905, p. 52-53. E-C, I.
- Pl.fe.** — Bosselures du limbe. Voir n° 2578. Aphis brassicæ L. 2589  
 Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 274. A.
- Parenchyme épaissi. Ceuthorrhynchus Rübsaameni KOLBE 2590  
 Kolbe, 1900, p. 227, n° 5, p. 229-232 ; Geisenheyner, 1902, p. 196, n° 9. A.

**Brassica Napus L.**

(y compris les variétés *esculenta*, *oleifera*, *radice-exile*)

- Ac.fr.** — Silique un peu renflée. Larves grégaires blanches, non sauteuses. M.T. 2591  
[Dasyneura brassicæ WINN.]  
 Brischke, 1881, p. 170 ; Hieronymus, 1890, p. 125, n° 392. F,A.

— Silique un peu renflée. Larves jaune vitellin, sauteuses.  
M.T. **Contarinia** 2592

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 274. A.

**Ac.fl.** — Fleur gonflée demeurant fermée; calice hypertrophié, corolle courte, étamines raccourcies et épaissies. Larves jaune citron, sautant. M.T. **Contarinia** 2593

Kieffer, 1893, p. 21; 1898<sup>c</sup>, p. 33; 1901<sup>b</sup>, p. 274. A.

— Cécidie identique à la précédente. Larves grégaires blanches, non sauteuses. M.T. **Dasyneura raphanistri** KIEFF. 2594

Brischke, 1881, p. 170; Hieronymus, 1890, p. 125, n° 392; Tavares, 1905, p. 7. A.P.

— Fleur gonflée, ne s'ouvrant pas. M.C. . . . **Dasyneura** 2595

Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 274. A.

**Ac.inf.** — Cladomanie et virescence de l'inflorescence. Larve située dans la moelle de la tige. **Insecte** 2596

Rippa, 1904, p. 101-105. I.

**Pl.ra.** — Au collet, renflements hémisphériques de la grosseur d'un pois (fig. 733); dans la cavité centrale une larve blanche. M.C. Adulte printemps II. **Ceuthorrhynchus pleurostigma** MARSH. 2597

Massalongo, 1893, p. (226-227), n° 173, pl. XXXIV, 2, pl. XXXV, 1-2, ⊕; Connold, 1901, pl. VIII, ⊕; Tavares, 1905, p. 7. E-T.

— Sur les racines, nodosités plus petites que les précédentes et sans cavité interne. Nématodes à la surface de la cécidie. **Heterodera Schachtii** SCHMIDT 2598

Kühn, 1870; Kieffer, 1892<sup>d</sup>, p. 224; 1901<sup>b</sup>, p. 275. A.

— Nodosités avec Nématodes internes. **Heterodera radicola** GREEFF 2599

Vuillemin et Legrain, 1894, p. 549-551. AL.

### **Brassica sinapistrum** BOISSIER (**Sinapis arvensis** L.)

**Ac.fr.** — Sur la silique, boursouffure peu marquée. Larves grégaires blanches, sautant. M.T. **Contarinia** 2600

Kieffer, 1891, p. 254, n° 480; 1901<sup>b</sup>, p. 513. A.

**Ac.fl.** — Axe floral très épaissi ; fleurs présentant une virescence plus ou moins accentuée. Puceron vert, fortement pulvérulent.

**Aphis brassicæ** L. 2601

Molliard, 1895, p. 136-141, pl. XI, 1-7, ⊕ ; Schouteden, 1903, p. 187.

F.

— Virescence complète de tous les organes floraux ; les feuilles florales sont garnies de poils épineux et, à leur aisselle, il se produit de petits rameaux anormaux terminés par une fleur secondaire, également virescente.

**Aphide** 2602

Molliard, 1895, p. 141-143, pl. X, 1-10, ⊕.

F.

— Chloranthie très accusée de toutes les parties de l'inflorescence qui est complètement raccourcie ; fleurs transformées en productions foliacées ; jeunes siliques contournées et tordues.

**Ériophyide** 2603

Hanuseck, 1882, p. 315-316 (experimental).

E-C.

— Fleurs virescentes ; larves logées au collet, dans une cavité de 10-20 mm. de longueur.

[**Curculionide**] 2604

Molliard, 1906, p. 50-52.

F.

**Pl.ra.** — Au collet, excroissances charnues de la grosseur d'un pois.

**Ceuthorrhynchus assimilis** PAYK. 2605

**Ceuthorrhynchus pleurostigma** MARSH. 2606

**Ceuthorrhynchus contractus** MARSH. 2607

Kirby et Spence, 1838, t. I, p. 188 ; Ballé, 1889, p. 416 ; Focke, 1890 b, p. 261-269, fig. 1-3, ⊕ ; Kieffer, 1892, p. 56, n° 27 ; Massalongo, 1903, p. 42, n° 16 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 303 ; Lagerheim, 1905, p. 25.

E-T.

— Nodosités sans cavité interne. **Heterodera Schachtii** SCHMIDT 2608

Schmidt, 1871 ; Kieffer, 1892 d, p. 224 ; 1901 b, p. 513.

A.

**Pl.ti.** — Sur tiges ou rameaux, épaississements irréguliers, couverts de poils anormaux.

**Coléoptère** 2609

Szépligéti, 1890, p. 22, 43 ; Kieffer, 1901 b, p. 513.

A-H.

**Pl.fe.** — Minimes boursoufflures du limbe. . . . [Psynllide] 2610

Szépligéti, 1890, p. 22, 43 ; Kieffer, 1901 b, p. 513.

A-H.

**Brassica Cheiranthus** VILL. (**Sinapis Cheiranthus** KOCH)

**Ac.fl.** — Fleur gonflée, déformée. M.C. . . . **Dasyneura** 2611

Kieffer, 1891, p. 254, n° 479 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 303.

F, A.

— Inflorescence courbée ; fleurs légèrement déformées. Puceron vert pulvérulent. *Aphis brassicæ* L. 2612  
Tavares, 1905, p. 7. P.

Pl.ra. — Cécidies blanches, arrondies, de 5 mm. de diamètre, uniloculaires, souvent groupées en amas de la grosseur d'une noisette à celle d'une noix. Une larve blanche. M.T.  
*Ceuthorrhynchus pleurostigma* MARSH. 2613  
Liebel, 1886, p. 571, n° 277 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 302. A.F.

Pl.fe. — Limbe boursoufflé. Voir n° 2578. . . . *Aphis brassicæ* L. 2614  
Tavares, 1905, p. 6. P.

***Brassica adpressa* BOISSIER**

Ac.fl. — Fleur renflée et déformée. Voir n° 2594.  
[*Dasyneura raphanistri* KIEFF.] 2615  
Trotter, 1900<sup>b</sup>, p. 155, n° 26 ; Tavares, 1905, p. 7. P.

***Brassica fruticulosa* CIRILLO**


Ac.fr. — Silique renflée. . . . . Cécidomyide 2616  
Trotter, 1903<sup>b</sup>, p. 9, n° 9. I.

***Brassica* (*Sinapis turgida* PERS.)**

Pl.fe. — Limbe boursoufflé. . . . . [Psyllide] 2617  
Houard, 1902<sup>b</sup>, p. 48, n° 51. F.

***Brassica amplexicaulis* JANKA**

Ac.fl. — Fleur gonflée, restant close, de la grosseur d'un pois.  
*Contarinia nasturtii* KIEFF. 2618  
Stefani, 1906, p. 104, n° 8. si.



**Raphanus sativus L.** (et variétés)

- Ac.fl.** — Fleur gonflée. . . . . *Dasyneura raphanistri* KIEFF. 2619  
*Contarinia nasturtii* KIEFF. 2620  
 Liebel, 1889, p. 304, n° 375; Schlechtendal, 1890, p. 51, n° 478; Kertész, 1903, p. 23; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 291; Tavares, 1907<sup>b</sup>, p. 123. *A. F. P.*
- Pl.ra.** — Nodosités. . . . . *Heterodera Schachtii* SCHMIDT 2621  
 Kieffer, 1892<sup>d</sup>, p. 224; 1901<sup>b</sup>, p. 473. *A.*
- Pl.fe.** — Macule du limbe correspondant à un épaississement charnu, circulaire, de 4-6 mm. de diamètre. Larve blanc verdâtre, longue de 2 mm. [ *Ceuthorrhynchus Rübsaameni* KOLBE 2622  
 Trotter, 1903<sup>b</sup>, p. 18-19, n° 50. *I.*

**Raphanus caudatus L.**

- Ac.fl.** — Fleur gonflée. . . . . *Dasyneura raphanistri* KIEFF. 2623  
*Contarinia nasturtii* KIEFF. 2624  
 Kieffer, 1890<sup>c</sup>, p. 204; 1891, p. 236, n° 460; Schlechtendal, 1890, p. 51, n° 478. *A.*

**Raphanus Raphanistrum L.** (*Raphanistrum arv.* WALLR.)


- Ac.fr.** — Silique renflée. Larves blanches. M.T. . . . . *Diplosine* 2625  
 Kieffer, 1891, p. 237, n° 461. *A.*
- Ac.fl.** — Fleur déformée; calice agrandi; corolle demeurant courte et fermée; étamines courtes, à filet très épaissi; ovaire hypertrophié. Larves grégaires blanches, ne sautant pas. M.T.  
*Dasyneura raphanistri* KIEFF. 2626  
 Rübsaamen, 1890, p. 45, n° 143, pl. II, 9, ⊕; Molliard, 1895, p. 161-165, pl. VII, 1-12, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1905, fasc. XIII, n° 364, ⊕; Tavares, 1905, p. 85. *D. E. C., E-O.*
- Fleur gonflée. Larves jaunâtres sautant. M.T.  
*Contarinia nasturtii* KIEFF. 2627  
 Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 473; Trotter, 1904, p. 11, n° 21. *A. J.*
- Virescence de toute l'inflorescence. . . . [ *Ériophyide* ] 2628  
 C. Marchal et Chateau, 1905, p. 291. *F.*

- Pl.ra.** — Sur les racines, et le plus souvent au collet, cécidie charnue, de la grosseur d'un pois à celle d'une noix et, dans ce dernier cas, pluriloculaire. Une larve blanche. M.T.  
**Ceuthorrhynchus pleurostigma** MARSH. 2629  
 Liebel, 1886, p. 564, n° 233 ; Hieronymus, 1890, p. 268, n° 795 ; Rübсаamen, 1901, p. 127, n° 166. D.A.
- Pl.ti.** — Fasciation des rameaux. . . . . Coléoptère 2630  
 Molliard, 1900 b, p. 326-327, fig. 123, ⊕. F.
- Pl.fe.** — Renflement fusiforme allongé du pétiole ou de la nervure médiane ; grande cavité axiale. Adulte juin I.  
**Ceuthorrhynchus quadridens** PANZER 2631  
 Tavares, 1902, p. 135, n° 314 ; 1905, p. 85. P.  
 — Macule du limbe correspondant à un épaississement charnu, circulaire, de 4-6 mm. de diamètre. Larve blanc verdâtre, longue de 2 mm.  
**Ceuthorrhynchus Rübсаameni** KOLBE | 2632  
 Trotter, 1903 b, p. 18-19, n° 50 ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XII, n° 276, ⊕. I.



**Raphanistrum silvestre** ASCH.

- Ac.fl.** — Voir n° 2626. . . . . **Dasyneura raphanistri** KIEFF. 2633  
 Kieffer, 1886, p. 324-326 ; Schlechtendal, 1890, p. 51, n° 476 ; Kertész, 1902, p. 29. I.
- Pl.ra.** — Voir n° 2629. . . . **Ceuthorrhynchus pleurostigma** MARSH. 2634  
 Schlechtendal, 1890, p. 51, n° 477 ; Kieffer, 1892, p. 55, n° 23 ; 1901 b, p. 473. I.




**Rapistrum Linneanum** BOISSIER ET REUTER

- Ac.fl.** — Fleur globuleuse, légèrement rétrécie à la partie supérieure et mesurant 5-8 mm. de diamètre environ ; pièces florales déformées.  
**Cécidomyide** 2635  
 Trotter, 1905 d, p. 59, n° 5. P.




**Crambe strigosa** L'HÉRIT.

Ac.fl. — Fleur déformée. . . . . Cécidomyide 2636  
 Rubsaamen, 1902<sup>d</sup>, p. 61, n° 5. ca.




**Barbarea arcuata** REHB.


Ac.fl. — Fleur déformée, fortement gonflée ; calice, pétales, étamines et pistil épaissis et élargis surtout dans leur partie basilaire, en sorte que la fleur prend une forme ovoïde. Larves grégaires, jaunes. M.C. **Dasyneura sisymbrii** SCHRANK 2637  
 Hieronymus, 1890, p. 124, n° 386 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 242-243. A, F.



*Diplotaxis tenuifolia*  
*Asphondylia Stefani* (n° 2558)  
 Fig. 732 (a). — D'ap. nat.



*Brassica Napus* et *B. oleracea*  
*Geothorh. pleurost.* (n° 2597, 2575)  
 Fig. 733 (a). — Im. Mass.  
 Fig. 734 (b). — Im. Mass.



*Barbarea vulgaris*  
*Dasyneura sisymbrii* (n° 2640)  
 Fig. 735. — D'ap. nat.

**Barbarea vulgaris** R. BROWN

Ac.fr. — Silique faiblement gonflée et décolorée ; larve orangée. **Dasyneura** 2638  
 Martel, 1893, p. 5, n° 143 ; Loiselet, 1903, p. (2). F.

Ac.fl. — Fleur gonflée ne s'ouvrant pas et formant une cécidie sub-



sphérique ; calice et corolle peu développés. M.T. *Contarinia* 2639

Kieffer, 1895, p. 171, n° 1 ; 1901 b, p. 268. A.

— Fleur gonflée, demeurant fermée et formant des cécidies ovoïdes (fig. 735) ; calice et corolle bien développés. Larves grégaires jaunes. M.C. *Dasyneura sisymbryi* SCHRANK 2640

**Ac.inf.** — Cécidies arrondies, blanches, spongieuses, situées dans l'inflorescence. Larves grégaires jaunes. M.C.

*Dasyneura sisymbrii* SCHRANK 2641

**Ac.bg.** — Cécidie spongieuse située à l'aisselle des feuilles.

*Dasyneura sisymbrii* SCHRANK 2642

**Plrc.** — Base du pétiole ou du pédoncule floral élargi ; une larve dans un enfoncement de la tige. M.C.

*Dasyneura sisymbrii* SCHRANK 2643

F. Löw, 1877, p. 22-23 ; Rübsaamen, 1890, p. 31, n° 21, pl. II, 2, ⊕ ; Martel, 1891, p. 14, n° 12 ; 1893, p. 4-5, n° 141-142. E-C, E-O, I.



### ***Nasturtium amphibium* R. BROWN**

**Acre.** — Voir n° 2648. . . . . *Dasyneura sisymbrii* SCHRANK 2644

Bezzi, 1892, p. 66, n° 318 ; Hellwig, 1901, p. 163 ; Geisenheyner, 1902, p. 276, n° 46 ; Corti, 1903 b, p. 357, n° 83. A, I.

### ***Nasturtium austriacum* CRANTZ**

**Acre.** — Voir n° 2648. . . . . *Dasyneura sisymbrii* SCHRANK 2645

Hieronymus, 1890, p. 147, n° 467 ; Kieffer, 1901 b, p. 367. A.

— Bractées modifiées. . . . . **Eriophyide** 2646

Peyritsch, 1888, p. 605 (experimental). A-II.

### ***Nasturtium austriacum* × *silvestre* RECH.**

**Acre.** — Voir n° 2648. . . . . *Dasyneura sisymbrii* SCHRANK 2647

Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 306, ⊕. A.

**Nasturtium silvestre** R. BROWN

- Acre.** — Au niveau de l'inflorescence ou à l'aisselle d'une feuille, cécidie arrondie, blanche, spongieuse (fig. 736). Larves grégaires. **Dasyneura sisymbrii** SCHRANK 2648  
 E. Löw, 1877, p. 22-23 ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. IX, n° 262, ⊕ ; Kieffer, 1900, pl. XXXV, 3, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. I, n° 13, ⊕ ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 273 ; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n° 69, ⊕. E.-C.  
E.-O.  
I. P.-B.
- Fleur gonflée. Voir n° 2651. **Contarinia nasturtii** KIEFF. 2649  
 Kieffer, 1898<sup>c</sup>, p. 33 ; 1901<sup>b</sup>, p. 367 ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VII, n° 167, ⊕ ; Trotter, 1903<sup>b</sup>, p. 14, n° 37. A. J.

**Nasturtium pyrenaicum** R. BROWN

- Ac. fl.** — Fleur gonflée, de 3 mm. de diamètre environ, incomplètement épanouie ; sépales épaissis, élargis, raidis, recouvrant à peu près les verticilles intérieurs plus courts qu'à l'état normal. Larves grégaires, citrines, sautant. M. T. **Contarinia nasturtii** KIEFF. ] 2650  
 Pierre, 1905, p. 166-167. F.

**Nasturtium palustre** DC.

- Acre.** — Fleur gonflée, oviforme, atteignant 5 mm. de long sur 3,5 mm. de diamètre ; les pétales sont atrophiés, les étamines courtes et épaissies ; l'ovaire est hypertrophié. Larves grégaires d'un jaune-citron brillant, sautant. M. T. **Contarinia nasturtii** KIEFF. 2651  
 Kieffer, 1888<sup>b</sup>, p. 263-264 ; Liebel, 1889, p. 363, n° 366. A.
- Voir n° 2648. **Dasyneura sisymbrii** SCHRANK 2652  
 Hieronymus, 1890, p. 147, n° 468 ; Rübsaamen, 1890, p. 40, n° 87 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VI, n° 190, ⊕ ; Frank, 1896, p. 121-123, fig. 34, ⊕. A. J.

**Nasturtium anceps** DC.

- Acre.** — Voir n° 2648. **Dasyneura sisymbrii** SCHRANK 2653  
 C. Marchal et Chateau, 1903, p. 389, n° 10 ; 1905, p. 273. F.



**Cardamine alpina L.**

- Pl.fe.** — Enroulement marginal par en haut, sur un bord seulement ou sur les deux, formant un cylindre de 0,75-2 mm. de diamètre, à surface très faiblement rugueuse. **Ériophyide** 2654  
 Thomas, 1885, p.5 ; 1885<sup>b</sup>, p.19 ; Dalla Torre, 1892, p.114. *E-G.*

**Cardamine resedifolia L.**

- Pl.fe.** — Enroulement marginal par en haut, sur un bord ou sur les deux. La partie enroulée forme un cylindre de 0,75 à 2 mm. de diamètre, à surface bosselée et rugueuse. **Ériophyide** 2655  
 Thomas, 1885, p.5 ; 1885<sup>b</sup>, p.19 ; Dalla Torre, 1892, p.114. *E-G.*

**Cardamine hirsuta L.**

- Acre.** — Inflorescence compacte formée de fleurs virescentes et déformées. Les feuilles sont aussi réunies en touffes de taille variable ; leur limbe, contourné et hypertrophié, est un peu crispé, vert jaunâtre, plus velu qu'à l'état normal, bossué, à bords parfois enroulés ou repliés vers la face supérieure. **[Ériophyes drabæ NAL.]** 2656  
 Misciattelli, 1899, p.18, n°18 ; Trotter, 1903<sup>b</sup>, p.9, n°11 ; Tavares, 1905, p.8. *I.P.*

- Pl.re.** — Petit renflement charnu, irrégulier, subglobuleux, uniloculaire, situé au collet ou sur le pétiole des feuilles radicales. **Ceuthorrhynchus contractus MARSH.** 2657  
 Trotter, 1904<sup>c</sup>, p.72, n°3. *I.*

— Épaississement charnu, axial, long de 15-20 mm., vert, diminuant graduellement en allant de la base au sommet d'un pétiole caulinaire qui conserve sa longueur et sa direction normales, ou se raccourcit et se contourne.

**Ceuthorrhynchus pectoralis SCHULT.** 2658

Pierre, 1905, p.149-150. *F.*

— Petit renflement de la tige, allongé, unilatéral.

**Ceuthorrhynchus** 2659

Trotter, 1903<sup>b</sup>, p.10, n°12 ; Pierre, 1905, p.150. *I.*

**Cardamine silvatica LINK**

**Ac.bg.** — Bourgeons axillaires hypertrophiés. . . . Cécidomyide 2660  
 Thomas, 1878, p. 705; Schlechtendal, 1890, p. 50, n° 467. *E-C.*

**Pl.fe.** — Minimés excavations éparses sur le limbe. . . . Psyllide 2661  
 Thomas, 1878, p. 706-707; Schlechtendal, 1890, p. 50, n° 468. *E-C.*

**Cardamine impatiens L.**

**Ac.fl.** — Voir n° 2679. . . . [Eriophyes drabæ NAL.] 2662  
 Misciattelli, 1899, p. 19, n° 19. *I.*

**Cardamine pratensis L.**

**Ac.fr.** — Silique renflée. Une (ou plusieurs) larve rouge-orangé. M.T. Cécidomyide 2663  
 Schlechtendal, 1895, p. 20; Geisenbeyner, 1902, p. 196-197, n° 13. *A.*

— Dans le tiers supérieur de la silique, les valves s'écartent en formant une sorte de fourreau autour d'un amas de productions foliacées résultant sans doute de la virescence des ovules. Ériophyide 2664  
 Dalla Torre, 1892, p. 114. *E-C.*

**Ac.fl.** — Voir n° 2672. . . . Perrisia cardaminis WINN. 2665  
 Winnertz, 1853, p. 225-226, n° 13; Inehbald, 1883, p. 194; Liebel, 1886, p. 538, n° 56; Hieronymus, 1890, p. 126, n° 398; Lagerheim, 1905, p. 13. *E-N, A, I-B, F.*

— Voir n° 2674. . . . Ériophyide 2666  
 Schlechtendal, 1890, p. 50, n° 464; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 281. *E-C.*

— Prolifération centrale. Larve mineuse vivant dans la souche et la tige aérienne. Curculionide 2667  
 Molliard, 1904, p. 931-932. *F.*

**Pl.ti.** — Épaississement axial irrégulier, très variable comme longueur, de la base de la tige ou du pétiole; loges larvaires nombreuses. Ceuthorrhynchus pectoralis SCHULT. 2668  
 Pierre, 1901<sup>c</sup>, p. 209-212, n° 3; 1905, p. 150; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 246. *F.*

— Voir n° 2673. . . . . **Psylliodes napi** KOCH 2669  
 Hieronymus, 1890, p. 264, n° 787; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VI, n° 128-129 a, ⊕. A.

**Pl. fe.** — Limbe enroulé. . . . . 2670  
 Hellwig, 1901, p. 163. A.

### **Cardamine amara** L.

**Ac. fr.** — Silique gonflée. M.T. . . . . **Cécidomyide** 2671  
 Kieffer, 1896 f, p. 144; 1901 b, p. 281. A.

**Ac. fl.** — Fleur demeurant fermée. Le calice est normal; la corolle, qui ne s'ouvre pas, est formée de pétales verts, épaissis à la base; les étamines ont leurs filets raccourcis et épaissis. Larves rouges. M.T. **Perrisia cardaminis** WINN. 2672  
 Incbald, 1883, p. 194; 1887, p. 34; Hieronymus, 1890, p. 120, n° 397; Hellwig, 1901, p. 163. A, I-B.

**Pl. ti.** — Sur la tige, et le plus souvent à sa partie inférieure, épaississement unilatéral résultant d'une hypertrophie du parenchyme cortical dans lequel est situé la cavité larvaire. La cécidie est peu apparente, l'épaississement étant très faible. **Psylliodes napi** KOCH 2673  
 Hieronymus, 1890, p. 264, n° 786; Hellwig, 1901, p. 163. A.

### **Cardamine palustris** PETERM.

**Ac. fl.** — Fleur doublée par pétalodie des deux verticilles internes. **Ériophyide** 2674  
 Schlechtendal, 1890, p. 50, n° 463; Kieffer, 1901 b, p. 281. E-C.



### **Dentaria pinnata** L.

**Pl. ti.** — Renflement fusiforme, irrégulier (70 mm. de longueur sur 10 mm. de diamètre). **Ceuthorrhynchus sulciollis** PAYK. 2675  
 Cecconi, 1902 b, p. 347-348, n° 11, pl. IX, 1, ⊕; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. X, n° 227, ⊕. I.



**Hutschinsia alpina** R. BROWN

**Ac.fl.** — Chloranthie. . . . . **Eriophyes drabæ** NAL. 2676  
 Dalla Torre, 1892, p. 134 ; Nalepa, 1907, p. 98. *E-G.*

**Pl.ti.** — A la base de la tige, renflement unilatéral, arrondi, de 3,5 mm. de diamètre et de 5 mm. de long. Une larve blanche.  
**Ceuthorrhynchus**] 2677

Thomas, 1885, p. 4 ; Schlechtendal, 1890, p. 51, n° 470 ; Frank, 1896, p. 290, n° 6 ; Kieffer, 1901 b, p. 340. *E-G.*



**Capsella Bursa-pastoris** MÖNCH

**Acre.** — Entre-nœuds de l'inflorescence raccourcis ainsi que les pédoncules floraux ; souvent aussi les calices et les corolles prennent une teinte violette ; pas de pilosité anormale sauf, parfois, sur les pédoncules et les sépales. [**Aphis capsellæ** KALT.] 2678

Hieronymus, 1890, p. 110, n° 310 ; Molliard, 1895, p. 134-136, pl. X, 11-12, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 8. *A, F, P.*

— Fleurs chloranthiées ; feuilles souvent déformées, roulées ou tordues. Rameaux, feuilles et pièces florales recouverts d'une pilosité dense, blanchâtre, formée de poils ramifiés, trois ou quatre fois aussi longs que les poils normaux.  
**Eriophyes drabæ** NAL. 2679

Thomas, 1877, p. 382, n° 21 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n° 263, ⊕ ; Molliard, 1895, p. 191-192, pl. XII, 16-17, ⊕. *D, E-G, F.*

— Bourgeons rapprochés en amas par suite de l'arrêt de développement des entre-nœuds ou encore modification des bractées de l'inflorescence.  
**Eriophyide** 2680

Peyritsch, 1888, p. 598, 605 (expérimental). *A-H.*

**Pl.ti.** — Courbure des rameaux et des silicules. Puceron vert foncé ou noir.  
**Aphis capsellæ** KALT. 2681

Schouteden, 1903 b, p. 92, n° 2. *A.*

— Tige déformée. . . . . **Tylenchus devastatrix** KÜHN 2682

Ritzema-Bos, 1888, p. 261, n° 2 ; 1892, p. 226 ; Frank, 1896, p. 31. *E-O.*



**Camelina microcarpa** ANDRANZ

**Aerc.** — Chloranthie de l'inflorescence ou déformation de l'extrémité des pousses; feuilles couvertes d'une pilosité anormale, un peu épaissies sur le bord et enroulées par en bas.

[**Eriophyes drabæ** NAL.] 2683

Hieronimus, 1890, p. 65, n° 65; Szépligéti, 1895, p. 218, n° 104; Hellwig, 1901, p. 164. *E-C.*

— Voir n° 2516. . . . . [**Contarinia ruderalis** KIEFF.] 2684

Hellwig, 1901, p. 164. *A.*

**Camelina sativa** GRANTZ

**Aerc.** — Chloranthie des fleurs, avec raccourcissement de l'axe qui les porte et développement de poils anormaux; feuilles déformées, tordues et roulées.

**Eriophyes drabæ** NAL. 2685

Schlechtendal, 1890, p. 50, n° 458; Nalepa, 1898, p. 17, n° 43. *E-C.*

— Axe de l'inflorescence raccourci et épaissi. . . . . [**Diptère**] 2686

Geisenheyner, 1902, p. 196, n° 10. *A.*

**Draba verna** L.

**Ac.fl.** — Chloranthie avec pilosité anormale.

[**Eriophyes drabæ** NAL.] 2687

Kieffer, 1892 c, p. 162.

**Pl.ti.** — A la base de la tige, renflement ovoïde contenant une larve blanche. M.T.

**Ceuthorrhynchus hirtulus** GERMAR 2688

Schlechtendal, 1890, p. 51, n° 469; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 255; Lagerheim, 1905, p. 24. *E-V.*  
*A-F.*

**Draba Thomasi** KOCH

**Ac.fl.** — Chloranthie. . . . . **Aphide** 2689

Peyritsch, 1882, p. 6 (expérimental); Dalla Torre, 1892, p. 106 (note); Schouteden, 1903, p. 174. *A-H.*

**Draba muralis L.**

**Acrc.** — Axe de l'inflorescence raccourci et épaissi. [Diptère] 2690  
Geisenheyner, 1902, p. 246-247. A.

— Feuilles contournées, repliées, épaissies et réunies en touffes de tailles variables. [Eriophyes drabæ NAL.] 2691  
Trotter, 1903b, p. 11, n° 18; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVI, n° 401, ⊕. I.

**Pl.ti.** — Renflement fusiforme de la tige qui se courbe un peu. Coccide 2692  
Trotter, 1907c, p. 103, n° 4. I.



*Nasturtium silvestre*  
*Dasyneura sisymbrii* (n° 2648)  
Fig. 736. — D'ap. nat.



*Stenophragma thalianum*  
*Centhorrhynchus atomus* (n° 2696)  
Fig. 737. — D'ap. nat.



*Arabis sagittata*  
*Aphide* (n° 2702)  
Fig. 738-740 (a-c). — Im. MOLL.

**Draba aizoides L.**

**Ac.ti.** — Cladomanie et phyllomanie avec déformation des feuilles qui, le plus souvent, sont courtes et larges, quelquefois contournées ou bosselées. Les fleurs attaquées sont virescentes. [Eriophyes drabæ NAL.] 2693  
Thomas, 1885, p. 5-6, n° 3; Kieffer, 1890c, p. 162. E-C.





**Stenophragma Thalianum** CELAKOWSKY  
**(Sisymbrium Thalianum** GAY et MONNARD)  
**(Arabis Thaliana** L.)

- Pl.ti.** — Sur tige ou pétiole, épaissement fusiforme, souvent fortement courbé; les rameaux florifères sont parfois arrêtés dans leur développement. [Lépidoptère] 2694  
 Rübsaamen, 1899, p. 236, n° 19; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 240. A.F.
- Galle sphérique située à la base de la tige.  
**Ceuthorrhynchus griseus** CIL. BRISOUT 2695  
 Pierre, 1901<sup>b</sup>, p. 77-78; Trotter, 1904<sup>c</sup>, p. 75, n° 15. F.I.
- Galle fusiforme allongée située sur la tige ou un rameau (fig. 737).  
**Ceuthorrhynchus atomus** BOHEM. 2696  
 Hieronymus, 1890, p. 270, n° 799; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 172, ⊕; Pierre, 1901<sup>b</sup>, p. 77-78; Houard, 1903<sup>c</sup>, p. 274-278, fig. 200-207, ⊕. A.F.



**Turritis glabra** L.

- Ac.re.** — Fleurs serrées les unes contre les autres, en sorte que l'inflorescence a de 30 à 100 mm. au lieu de 500; les fleurs déformées sont chloranthiées et le style très long est souvent tordu. Aphide 2697  
 Hieronymus, 1890, p. 117, n° 359; Szépligéti, 1890, p. 24, 44; Rostrup, 1896, p. 32, n° 202; D, E-C.  
 Rübsaamen, 1901, p. 134, n° 240.



**Arabis hirsuta** SCOP.

- Ac.fl.** — Axe floral raccourci; les fleurs chloranthiées ont le calice, la corolle et le pistil hypertrophiés; les anthères sont atrophiées. Aphide 2698  
 Peyritsch, 1882, p. 3, 5-8 (experimental); Hieronymus, 1890, p. 110, n° 306; Dalla Torre, 1892, p. 107; 1895, p. 137; Lagerheim, 1905, p. 20; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 240. E-N,  
E-C, F.
- Ac.ti.** — Déformation de l'extrémité des pousses. Voir n° 2708. Cécidomyide 2699  
 Schlechtendal, 1890, p. 49, n° 440; Rübsaamen, 1895, p. 450. E-C.

Pl.fe. — Limbe enroulé par en bas et anormalement velu.

Ériophyide 2700

Lagerheim, 1905, p. 6, 25.

E-N.

**Arabis ciliata** R. BROWN (**A. arcuata** SCHUTTLEWORTH)

Ac.fl. — Fleurs chloranthiées portées sur un axe raccourci.

Aphide 2701

Peyritsch, 1882, p. 3, 5-7, 9-10, 15 (expérimental); Dalla Torre, 1892, p. 106-107.

E-G.

**Arabis sagittata** DC.

Ac.fl. — Axe florifère court, à nœuds très rapprochés, les rameaux secondaires prenant beaucoup d'importance. Les pédoncules floraux forment une masse globuleuse (fig. 738), souvent colorée en rouge violacé, et cette coloration peut s'étendre à la tige et aux feuilles. Sur toutes les parties attaquées il se développe une pilosité anormale serrée. Les pièces florales des fleurs parasitées sont étalées (fig. 739) au lieu d'être dressées comme dans la fleur normale (fig. 470).

Aphide 2702

Molliard, 1895, p. 131-134, pl. IX, ⊕; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 240.

F.

**Arabis muralis** BERTOL. var. **rosea** DC.

Pl.ti. — Rameau hypertrophié fortement et irrégulièrement.

[*Asterolecanium arabidis* LIGHT.] 2703

Trotter, 1905<sup>b</sup>, p. 97; 1907<sup>b</sup>, p. 32, n° 28.

I.

**Arabis Turrita** L.

Ac.fl. — Chloranthie; axes floraux raccourcis. . . .

Aphide 2704

Peyritsch, 1882, p. 6, 11-12, 14 (expérimental); Dalla Torre, 1892, p. 106 (note).

A-II.

**Arabis pumila** JACQ.

Ac.fl. — Chloranthie; axes floraux raccourcis. . . .

Aphide 2705

Peyritsch, 1882, p. 10-11 (expérimental); Dalla Torre, 1892, p. 106 (note).

A-II.

**Arabis bellidifolia** JACQ.

- Pl.fe.** — Feuilles enroulées et en partie flétries. . . **Ériophyide** 2706  
Dalla Torre, 1895, p. 137. E-G.

**Arabis alpina** L.

- Ac.fl.** — Axe floral raccourci et fleurs chloranthiées. . . **Aphide** 2707  
Peyritsch, 1882, p. 10-11 (experimental); Dalla Torre, 1892, p. 106 (note). A-II.

- Ac.ti.** — L'extrémité des pousses non florifères et des rameaux latéraux basilaires est déformée. Les feuilles, raccourcies et élargies, ont leur partie basale déformée en cuiller et leur nervure médiane hypertrophiée fait fortement saillie sur leur face supérieure; il se constitue, par juxtaposition de ces feuilles, des poches bien fermées ou de petits amas. La cécidie, de couleur verte ou violette et de 3-6 mm de diamètre, est habitée par des larves rouges. **Cécidomyide** 2708  
Thomas, 1886, p. 299; Schlechtendal, 1890, p. 49, n° 437. E-G.

- Pl.fe.** — Sur les feuilles des rosettes radicales, pilosité plus fournie que sur les plantes saines; le bord de ces feuilles est replié par en haut. **Ériophyide** 2709  
Thomas, 1886, p. 298-299, n° 6; Schlechtendal, 1890, p. 49, n° 438. E-G.

**Arabis arenosa** Scop.

- Ac.fl.** — Chloranthie des fleurs qui se couvrent d'une pilosité anormale. **Eriophyes drabæ** NAL. 2710  
Hieronymus, 1890, p. 60, n° 36; Hellwig, 1901, p. 163; Rübsaamen, 1901, p. 87, p. 111, n° 17. A.

- Pl.fe.** — Limbe crispé et enroulé, couvert d'une pilosité anormale. **Eriophyes drabæ** NAL. 2711  
Hieronymus, 1890, p. 60, n° 36. A.

**Arabis nivalis** SPRENG.

- Ac.fl.** — Chloranthie; axes floraux raccourcis. . . . **Aphide** 2712  
Peyritsch, 1882, p. 3, 21 (experimental). A-II.

**Arabis ovirensis WULFEN**

**Ac.fl.** — Chloranthie; axes floraux raccourcis. . . . . Aphide 2713  
 Peyritsch, 1882, p. 21 (experimental). A-H.

**Arabis Soyeri REUTER**

**Ac.fl.** — Chloranthie; axes floraux raccourcis. . . . . Aphide 2714  
 Peyritsch, 1882, p. 6, 8-9 (experimental) ; Dalla Torre, 1892, p. 106 (note). A-H.

**Arabis albida STEV.**

**Pl.ra.** — Sur les racines, nodosités arrondies (4 mm. de diamètre au maximum), isolées ou groupées. Adulte été I.  
[Ceuthorrhynchus pleurostigma MARSH.] 2715  
 Renseignements de M.P. de Peyerimhoff. AL.



**Erysimum cheiranthoides L.**

**Pl.ra.** — Au collet, cécidies charnues, arrondies, de la grosseur d'un pois. [Ceuthorrhynchus pleurostigma MARSH.] 2716  
 Brischke, 1881, p. 169; Hellwig, 1901, p. 164; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n° 328, ⊕. A.

**Pl.ti.** — Renflement pluriloculaire situé à l'extrémité de la tige, dans la région de l'inflorescence. Larves jaune rougeâtre.  
[Janetiella Fortiana TROTTER 2717  
 Thomas, 1903, p. 43-44; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 155, ⊕. E-G.

**Erysimum virgatum ROTH**

**Pl.ti.** — Renflement mesurant 15 mm. sur 6 mm. . . . . Coléoptère 2718  
 Geisenheyner, 1902, p. 249, n° 26. A.

**Erysimum hieracifolium L.**

**Pl.ti.** — Renflement de l'axe d'inflorescence. . . . . Coléoptère 2719  
 Hellwig, 1901, p. 164. A.

**Erysimum odoratum** EHRL.

Pl.ti. — Renflement de l'extrémité de la tige. Voir n° 2724.

[*Janetiella Fortiana* TROTTER] 2720

Thomas, 1903, p. 43-44.

E-C.

**Erysimum caeseceus** ROTH

Ac.fl. — Chloranthie avec pilosité anormale. *Eriophyes drabæ* NAL. 2721

Nalepa, 1895, p. 22 ; 1898, p. 17, n° 43.

E-C.

— Taches jaune-paille ou blanchâtres. . . . *Curculionide* 2722

Dalla Torre, 1892, p. 122.

E-C.

**Erysimum rhaeticum** DC.

Ac.fl. — Fleur demeurant fermée, renflée et de forme ovoïde (fig. 741) ; sépales charnus, élargis, concaves à la base ; pétales courts cachés par le calice, avec onglet court et épaissi ; étamines hypertrophiées à filet fortement renflé ; style faisant plus ou moins saillie hors de la cécidie. Une seule larve jaunâtre. M.T.

*Cécidomyide* 2723

Massalongo, 1895, p. 49-50, n° 24 ; Trotter, 1899, p. 287-288, n° 11, pl. XVII, 2-3, ⊕.

I.

**Erysimum graecum** BOISSIER et HELDR.

Pl.ti. — Renflement ligneux, pluriloculaire, en forme de massue, long de 10-20 mm., large de 4-7 mm., situé le plus souvent à l'extrémité de l'axe dans la région de l'inflorescence. Larves jaune orangé. M.C., printemps H. *Janetiella Fortiana* TROTTER 2724

Trotter, 1901<sup>b</sup>, p. 346 ; 1903, p. 21, n° 31, pl. I, 2-3, ⊕.

G.

**Cheiranthus Cheiri** L.

Pl.ra. — Nodosités arrondies. Une seule larve.

*Ceuthorrhynchus pleurostigma* MARSH. 2725

Bargagli, 1883, p. (966) ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 291 ; Tavares, 1902, p. 135, n° 315.

I.P.


**Alyssum calycinum L.**

**Ac.fl.** — Fleurs virescentes, couvertes d'une pilosité anormale et formant des amas arrondis. **Eriophyes drabæ NAL.] 2726**

Nalepa, 1895, p. 22; 1898, p. 17, n° 43. E.-C.

**Pl.ti.** — Renflement fusiforme, de la grosseur d'un grain de millet jusqu'à celle d'un pois; grande cavité interne. Larves grégaires rouges. M.T. **Perrisia alyssi KIEFF. 2727**

Kieffer, 1901 b, p. 252. E.-C.



**Erysimum rhalicum**  
Cécidomyïde (n° 2723)  
Fig. 741. — Im. TROTTER

**Alyssum argenteum**  
Coléoptère (n° 2731)  
Fig. 742 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 743 (b). — D'ap. nat.  
Fig. 744 (c). — D'ap. nat.

**Matthiola lristis**  
*Baris curvulscens* (n° 2741)  
Fig. 745 (a). — D'ap. nat.  
Fig. 746 (b). — D'ap. nat.

**Alyssum arcanarium Gmelin**

**Ac.ti.** — Renflements allongés (10-15 mm. sur 6-8 mm.), situés à l'extrémité des pousses, prenant naissance par raccourcissement des entre-nœuds supérieurs et couronnés par quelques feuilles. A maturité une ouverture se produit dans la région terminale. Larves rosées. M.T. Adulte mai H.

**Janetiella fallax KIEFF. 2728**

Geisenheyner, 1902, p. 193-195, n° 3, p. 309, 2 fig., ⊕; Kieffer, 1904, p. 69-71; Hieronymus, Pax, etc., 1906, fasc. XIV, n° 378, ⊕. A.

**Alyssum Bertolonii** DESV.

**Pl.ti.** — Sur la tige, et le plus souvent dans la région florifère, épaississement fusiforme pouvant atteindre 10 mm. de long sur 4 mm. d'épaisseur; cavité larvaire dans la moelle.

Coléoptère 2729

Hieronymus, 1890, p. 262, n° 780.

/.

**Alyssum hirsutum** MARSCH.

**Ac.fl.** — Fleurs virescentes, atteignant 3-5 mm. de diamètre et transformées en un amas de folioles couvertes d'une pilosité anormale blanche.

Eriophyes drabæ NAL. 2730

Rübsaamen, 1895, p. 403, n° 9; Nalepa, 1898, p. 17, n° 43.

R.

**Alyssum argenteum** WITM.

**Pl.ti.** — Voir n° 2729. Figures 742-744. . . . . | Coléoptère 2731

Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVI, n° 381, ⊕.

/.

**Alyssum** sp.

**Ac.fl.** — Voir n° 2730. . . . . | Eriophyes drabæ NAL. 2732

Rübsaamen, 1895, p. 404.

R.

**Berteroa incana** DC. (**Alyssum incanum** L.)

**Ac.fl.** — Fleurs virescentes avec pilosité anormale, constituant des amas arrondis.

Eriophyes drabæ NAL. 2733

Schlechtendal, 1883, p. 9-10, n° 4, fig. 6-7, ⊕; Nalepa, 1898, p. 17, n° 43.

E.C.

**Pl.ra.** — Sur les racines ou les radicules, renflements arrondis blanchâtres pouvant atteindre 10 mm. de diamètre.

[**Ceuthorrhynchus pleurostigma** MARSCH.] 2734


Haimhoffen, 1855, p. 525-528; Schlechtendal, 1890, p. 49, n° 447.

E.C.

**Pl.ti.** — Au collet, nodosités arrondies, d'abord verdâtres, plus tard brunes. Une larve blanche, plus tard jaunâtre. M.T.  
**Ceuthorrhynchus pleurostigma** MARSH. 2733

Hieronymus, 1890, p. 363, n° 782 ; Schlechtendal, 1890, p. 49, n° 446. E-G.

**Pl.fe.** — Érinéum. . . . . **Ériophyide** 2736  
 Hellwig, 1901, p. 164 A.



**Hesperis matronalis** L.

**Ac.fr.** — Silique renflée. . . . **Ceuthorrhynchus inaeffectatus** GYLLH. 2737  
 Buddeberg, 1884, p. 79 ; Schlechtendal, 1895, p. 20. E-G.

**Pl.ra.** — Au collet, renflements arrondis et charnus, de 7-8 mm. de diamètre, pluriloculaires. **Ceuthorrhynchus**] 2738  
 Thomas, 1893, p. 295, n° 4 ; Schlechtendal, 1895, p. 20. E-G.

**Pl.fe.** — Enroulement marginal du limbe. Puceron vert fortement pulvérulent. **Aphis brassicæ** L. 2739  
 Schlechtendal, 1895, p. 20 ; Schouteden, 1903, p. 176. B, E-G.



**Matthiola incana** R. BROWN

**Pl.ti.** — Tubercules sur la tige. . . . **Baris laticollis** MARSH. 2740  
 Le Bouteiller, 1866, p. 139. F.

**Matthiola tristis** L.

**Pl.ti.** — Petits renflements fusiformes (fig. 745-746).  
**Baris cærulescens** Scop. 2741  
 Stefani, 1902, p. 67 ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XI, n° 254, ⊕. si.





**Moricandia arvensis** DC.

**Acre.** — Inflorescence transformée en une masse globuleuse, de la taille d'une noisette. Larves grégaires jaunâtres. Cécidomyide 2712

Renseignement inédit de M. P. de Peyerimhoff.

AL.


## FAMILLE DES CAPPARIDACÉES

**Capparis ægyptiaca** LAMK.

**Pl.ti.** — Sur les rameaux, renflement noueux, dur, ligneux, avec cavité interne irrégulière (fig. 747-748). Lépidoptère 2713

Frauenfeld, 1859, p. 329, pl. VII, 24, ⊕ ; Frank, 1896, p. 252, n° 6.

ÉG.



*Capparis ægyptiaca*

Lépidoptère (n° 2743)

Fig. 747 (a). — Im. FRAUENF.

Fig. 748 (b). — Im. FRAUENF.

**Capparis spinosa** L.

**Ac.fl.** — Fleur hypertrophiée, déformée, ne s'ouvrant pas.

**Asphondylia capparis** RÜBS. 2714

Baccarini, 1893, p. 405-414, pl. VII, ⊕ ; Rübсаamen, 1893<sup>b</sup>, p. 363-368, 8 fig. ; Stefani, 1898<sup>c</sup>, p. (5), n° 1 ; Trotter, 1903, p. 15-16, n° 13. I.G.

FAMILLE DES RÉSÉDACÉES

Ochradenus 2746, Reseda 2745.

Cécidies encore mal connues, demandant de nouvelles recherches.



**Reseda lutea L.**

Pl.ra. — Nodosités. . . . . [**Heterodera Schachti** SCHMIDT] 2745  
 Gain, 1894, p. 254. F.



**Ochradenus baccatus** DELILE

Pl.ti. — Renflement piriforme très régulier, à cavité interne tout à fait irrégulière. . . . . 2746  
 Frauenfeld, 1859, p. 326-327, pl. VII, 15, ①. ÉG.

FAMILLE DES CRASSULACÉES

Cotyledon 2772-2774, Sedum 2747-2765, Sempervivum 2766-2771.

L'une des cécidies les plus intéressantes offerte par la famille des Crassulacées est celle du *Sedum Rhodiola* (due à l'*Eriophyes rhodiola*) ; elle peut affecter toutes les parties de cette espèce spéciale de *Sedum* que l'on classe souvent dans un genre voisin, le genre *Rhodiola*. Des déformations semblables et des excroissances charnues foliaires entièrement comparables aux précédentes se rencontrent sur plusieurs autres espèces de *Sedum* ; elles se montreront sans doute toutes engendrées par l'*Eriophyes destructor*. Enfin, plusieurs *Sempervivum* sont également parasités, mais l'*Eriophyes* qui y produit des galles n'est pas encore étudié.

Les autres cécidies des feuilles sont mal connues jusqu'à présent : on les rapporte à l'action d'un *Apion*, peut-être l'*Apion morio* Germar (Schlechtendal, 1895), pour les *Sedum* et à l'action d'Aphidiens pour les *Umbilicus*.


Les racines des *Sedum* et des *Sempervivum* présentent les nodosités caractéristiques de l'*Heterodera radicola*, tandis que les tiges du *Sedum Telephium* et de divers *Umbilicus* du Sud de l'Europe et de l'Algérie se renflent sous l'influence de deux *Nanophyes* (*telephii* et *Duriei*).



**Sedum Rhodiola DC. (*Rhodiola rosea* L.)**

**Acre.** — Sur toutes les parties des fleurs, formation d'émergences identiques à celles des feuilles, charnues, glabres, en nombre parfois si considérable que l'on ne peut plus reconnaître les parties constituantes de la fleur et que l'inflorescence tout entière est transformée en un amas de semblables productions, rapprochées par suite de l'arrêt de développement de l'axe. La cécidie est vert jaunâtre, rouge par places ou veinée de violet.

**Eriophyes rhodiolæ** CAN. 2747

**Sedum Telephium**

*Nanophyes telephii* (n° 2750)

Fig. 749 (a). — D'ap. nat.

Fig. 750 (b). — D'ap. nat.

Fig. 751 (c). — D'ap. nat.

**Pl.fe.** — Sur les feuilles, excroissances charnues de 1-2 mm. de diamètre, arrondies ou ovoïdes, à bords souvent ringueux, surplombant une cavité dont le fond est pourvu de tubercules charnus, petits et de forme variable. **Eriophyes rhodiolæ** CAN. 2748

F. Löw, 1881, p. 5, pl. III, 4, ⊕; 1888, p. 540, n° 11; Hieronymus, 1850, p. 85, n° 194; Massalongo, 1893, p. 424, n° 23; Nalepa, 1898, p. 23, n° 65.

V.E.C.  
I.

**Sedum maximum** SUTER

**Pl.fe.** — Sur les feuilles, parties épaissies et teintées de rouge. M.C.I.  
**Apion** 2749  
 Schlechtendal, 1895, p. 28. A.

**Sedum Telephium** L.

**Pl.ti.** — Le long des tiges florifères, renflements charnus, noueux, bien apparents, disposés parfois en série linéaire (fig. 749-751).  
**Nanophyes telephii** BEDEL 2750  
 H. du Buysson, 1898, p. 254 ; Bedel, 1900, p. 304-305 ; Houard, 1903, p. 332-339, fig. 289-303, ⊕. F.

**Sedum purpureum** LINK

**Pl.fe.** — Voir n° 2749. . . . . **Apion** 2751  
 Schlechtendal, 1895, p. 28. A.

**Sedum dasyphyllum** L.

**Acre.** — Voir n° 2760. . . . . **Eriophyes destructor** NAL.] 2752  
 Dalla Torre, 1892, p. 160 ; Massalongo, 1893, p. 489, n° 9. E-C.I.

**Sedum album** L.

**Acre.** — Chloranthie et déformation des feuilles terminales sur lesquelles apparaissent de nombreuses excroissances excessivement petites, hémisphériques, translucides ou transparentes, incolores ou légèrement teintées de vert ou de rougeâtre, semblables à des gouttelettes d'un liquide limpide.  
**Eriophyes destructor** NAL.] 2753  
 F. Löw, 1885, p. 453-454 ; Dalla Torre, 1892, p. 160 ; Lagerheim, 1905, p. 11. E-N, E-C, I.

**Pl.ti.** — Excroissances charnues et irrégulières.  
**Eriophyes destructor** NAL.] 2754  
 Massalongo, 1904, p. 120-121, n° 38. I.

- Pl.fe.** — Feuilles fortement renflées à la base, qui devient ventrue, et colorées en rouge pâle. M.C.L. Apion 2755  
 Schlechtendal, 1895, p. 28. A.

**Sedum acre** L.

- Acre.** — Voir n° 2760. . . . . [Eriophyes destructor NAL.] 2756  
 Schlechtendal, 1882, p. 37, n° 26, c, pl. I, 14-15, ⊕ ; 1882 b, p. 665 ; 1890, p. 67, n° 669. A.

**Sedum sexangulare** L.

- Acre.** — Voir n° 2760. . . . . [Eriophyes destructor NAL.] 2757  
 Schlechtendal, 1882, p. 36, n° 26, b, pl. I, 16, ⊕ ; 1882 b, p. 665 ; 1890, p. 67, n° 669. A.

**Sedum alpestre** VILL.

- Acre.** — Voir n° 2760. . . . . [Eriophyes destructor NAL.] 2758  
 Thomas, 1886, p. 304, n° 44 ; Dalla Torre, 1892, p. 160. E-G.

**Sedum boloniense** LOIS.

- Acre.** — Voir n° 2760. . . . . [Eriophyes destructor NAL.] 2759  
 Hieronymus, 1890, p. 93, n° 235 ; Schlechtendal, 1890, p. 67, n° 699. A.

**Sedum reflexum** L.

- Acre.** — Fleurs chloranthées ou extrémités des pousses déformées ; les feuilles, très raccourcies, prennent une forme irrégulière, subovoïde ou globuleuse et leur surface est un peu ridée ; les plus jeunes sont les plus déformées. Eriophyes destructor NAL. 2760  
 Eriophyes glaber NAL. 2761

G. Muller, 1880 b, p. 349 ; Schlechtendal, 1882, p. 33, n° 26, a, pl. I, 12-13, ⊕ ; 1882 b, p. 665 ; Hieronymus, 1890, p. 93, n° 236 ; Dalla Torre, 1892, p. 160 ; Nalepa, 1898, p. 23, n° 66, p. 24, n° 67. E-G.

- Pl.fe.** — Feuilles déformées, élargies, linguiformes, lisses, brillantes, avec pointe rabattue. Puceron vert très foncé ou noir. [Aphis sedi KALT.] 2762

Schlechtendal, 1890, p. 67, n° 671 ; Schouteden, 1903, p. 186-187. A.

— Voir n° 2755. . . . . Apion 2763  
Schlechtendal, 1865, p. 28. A.

**Sedum atratum L.**

Acre. — Voir n° 2760. . . . . [Eriophyes destructor NAL.] 2763A  
Thomas, 1886, p. 304, n° 45 ; Dalla Torre, 1892, p. 160. E-G.

**Sedum rubens L.**

Acre. — Voir n° 2760. . . . . [Eriophyes destructor NAL.] 2764  
Gecconi, 1901<sup>d</sup>, p. 273, n° 38. I.

**Sedum sp.**

Pl.ra. — Nodosités. . . . . Heterodera radlicola GREEFF 2765  
Cornu, 1879, p. 174 ; Schlechtendal, 1890, p. 67, n° 670 ; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 508. A.



**Sempervivum tectorum L.**

Pl.ra. — Nodosités. . . . . Heterodera radlicola GREEFF 2766  
Licopoli, 1875, p. 39 ; 1877, p. 28 ; Frank, 1896, p. 23. I.

**Sempervivum montanum L.**

Ac.fl. — Fleurs transformées en rosettes de feuilles ; dans la rosette supérieure on reconnaît encore les diverses parties de la fleur, mais ceci est impossible dans les suivantes qui sont formées de très nombreuses petites feuilles vert pâle. Ériophyide 2767  
Thomas, 1885, p. 7-8, n° 10. E-C.

Pl.fe. — Rosette de feuilles de structure irrégulière et prenant une teinte plus grise par suite d'une exagération de la pilosité ; les feuilles peuvent porter de petites éminences en verrue. Ériophyide 2768  
Thomas, 1886, p. 304, n° 46 ; Dalla Torre, 1892, p. 161. E-C.

**Sempervivum hirtum L.**

**Pl.fe.** — A la face supérieure des feuilles, petites excroissances coniques ou foliacées, généralement agglomérées, de couleur vert pâle ou vert jaunâtre, souvent un peu teintées de rouge et recouvertes d'une pilosité abondante **Ériophyide** 2769

E.Löw, 1885, p. 454; Schlechtendal, 1890, p. 673.

*E-C.*

**Sempervivum soboliferum Sims.**

**Ac.ti.** — Tige demeurant courte et transformée en une galle de 15 mm. de long, de 5 mm. de diamètre, recouverte par la rosette radicale; cette tige se divise en rameaux courts, aplatis et élargis à leur extrémité distale, où s'insère l'inflorescence anormale. La plante est naine et déformée. **Ériophyide** 2770

Szépligéti, 1890, p. 22, 42-43; Kieffer, 1901<sup>b</sup>, p. 508

*E-C.*

**Sempervivum glaucum Ten.**

**Pl.ra.** — Nodosités. . . . . **Heterodera radicolica** GREEFF 2771

Licopoli, 1877, p. 28-31, pl. III, 10, pl. IV, 1-4, ⊕.

*I.*

**Cotyledon (Umbilicus) horizontalis Gussone**

**Pirc.** — Sur les tiges et les pétioles, cécidies de la taille et de la couleur d'un gros radis déformé. **Nanophyes Durieui** LUCAS 2772

Lucas, 1849, p. 460, pl. XXXVIII, 10; P. Marchal, 1897<sup>b</sup>, p. 23, 4<sup>e</sup>.

*AL.*

**Cotyledon (Umbilicus) pendulinus L.**

**Pl.ti.** — Cécidies irrégulières, dures, arrondies ou ovoïdes, isolées ou groupées et d'une teinte carminée très accentuée. **Nanophyes Durieui** LUCAS 2773

Lucas, 1873, p. 107; Tavares, 1905, p. 109; [Champion et Chapman, 1903, p. 87-91, pl. V, ⊕; Houard, 1906<sup>c</sup>, p. 32-38, fig. 1-8, ⊕].

*E, P.*  
*MA, AL.*

**Pl.fe.** — Bord du limbe replié par en bas. . . . . [**Aphide**] 2774

Tavares, 1905, p. 109.

*P.*

## FAMILLE DES SAXIFRAGACÉES


Deutzia 2785, Philadelphus 2783-2784, Ribes 2786-2814, Saxifraga 2775-2782.

Les fleurs de beaucoup de Saxifragacées sont gonflées par des larves de diptères (*Perrisia saxifrage*, *Contarinia ribis* et plusieurs autres espèces encore indéterminées) ou bien chloranthiées par des Ériophyides (*Eriophyes Kochi* sur la plupart des Saxifrages). Ces galles ont été rencontrées surtout dans le centre de l'Europe : pourtant Franz Löw (1888<sup>c</sup>) en a signalé quelques-unes en Norvège.

Les bourgeons sont très souvent déformés par l'*Eriophyes ribi* ; au n<sup>o</sup> 2793, nous avons cité plusieurs travaux qui se rapportent à cette maladie, assez grave, connue en Angleterre sous le nom de « Black-Currant plant disease ».

On rencontre partout à l'extrémité des pousses des Groseilliers les galles bien connues de l'*Aphis grossulariæ*, accompagnées souvent par celles du *Myzis ribis* dont les boursoufflures altèrent les feuilles sans provoquer le raccourcissement des entre-nœuds supérieurs. Les feuilles peuvent aussi être crispées ou plissées par des Ériophyides (*Eriophyes scaber*, par exemple) ou par des Cécidomyides (*Perrisia tetensis* et diverses autres espèces dont les éclosions n'ont pas encore été obtenues).

Signalons, enfin, comme étant mal connues les galles de tiges dues à un Lépidoptère (n<sup>o</sup> 2779) et à un *Lestes* (n<sup>o</sup> 2785).

**Saxifraga aizoides L. (S. autumnalis L.)**

**Aerc.** — Fleur déformée : l'ovaire est très grossi, les carpelles en sont épaissis et les styles peu distincts ; les sépales et les pétales gardent la position qu'ils avaient dans le bourgeon. Larves grégaires de teinte chair ou rosée. **Cécidomyide 2775**

Thomas, 1885, p. 8, n<sup>o</sup> 11 ; Frank, 1896, p. 129, n<sup>o</sup> 10.

*E-C.*

— Déformation de l'extrémité de la tige, accompagnée de chloranthie. **Eriophyes Kochi NAL. et THOMAS 2776**

F. Löw, 1878, p. 143, n<sup>o</sup> 22 ; 1888<sup>c</sup>, p. 542, n<sup>o</sup> 16 ; Thomas, 1886, p. 303-304, n<sup>o</sup> 42 ; Dalla Torre, 1892, p. 158 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. III, n<sup>o</sup> 114, ⊕ ; Nalepa, 1895<sup>c</sup>, p. 631 ; 1898, p. 24, n<sup>o</sup> 70. *E-N, E-C, I.*

**Saxifraga granulata L.**

**Ac.fl.** — Fleur grossie, ne s'ouvrant pas ; le réceptacle et le calice



sont très gonflés, la corolle est fermée et en partie teintée de rouge ; l'ensemble constitue une cécidie oviforme. Larves grégaires jaune soufre. M. T. Adulte printemps II.

**Perrisia saxifragæ** KIEFF. 2777

Kieffer, 1891 c, p. 262-264, 1 fig. ; Lagerheim, 1905, p. 17.

E-N, A.

— Fleurs plus ramassées que les fleurs normales. Dans l'ovaire une larve rose jaunâtre.

**Cécidomyide** 2778

Thomas, 1893, p. 298, n° 8 ; Schlechtendal, 1895, p. 29.

E-C.

**Saxifraga Aizoon** JACQ.

**Acrc.** — Sur les tiges ou rameaux florifères, cécidies de tailles diverses produites aux dépens de l'inflorescence ; l'axe se courbe en un point, se tord en spirale, puis se courbe à nouveau pour s'enrouler encore une fois en spirale... et ainsi de suite. Le plus souvent l'axe est si court qu'il se détache à peine de la rosette des feuilles ; les rameaux florifères s'allongent alors beaucoup.

[Lépidoptère] 2779

Szépligéti, 1890, p. 21-22, 42 ; Kieffer, 1901 b, p. 503.

E-C.

**Saxifraga mutata** L.

**Ac. ti.** — Déformation de l'extrémité. **Eriophyes Kochi** NAL. et THOMAS 2780

Nalepa, 1895 b, p. 313 ; 1898, p. 24, n° 70 ; Schlechtendal, 1895, p. 29.

E-C.

**Saxifraga oppositifolia** L.

**Ac. fl.** — Chloranthie ; les feuilles résultant de la transformation des organes floraux sont jaune verdâtre, ont une forme un peu différente de celle des feuilles normales et sont beaucoup plus abondamment pourvues de cils marginaux ; elles forment un amas en rosette remplaçant la fleur.

**Eriophyide** 2781

F. Löw, 1878, p. 144, n° 23 ; 1888 c, p. 542, n° 17 ; Thomas, 1885, p. 304, n° 43 ; Dalla Torre, 1892, p. 159.

E-N,

E-C.

**Saxifraga Kochi** HORNG. (**S. macropetala** KERNER)

**Ac. fl.** -- Chloranthie ; les sépales des fleurs déformées ont des

poils et des villosités ciliformes à la surface et sur le bord ; il en est de même pour la face supérieure des pétales qui varient beaucoup de forme et de couleur ; étamines normales ou pétales ; à la place des carpelles, bouquets de feuilles vertes, le plus souvent velues.

Ériophyide 2782

Thomas, 1885, p. 8-9, n° 12 ; Schlechtendal, 1890, p. 68, n° 691.

E-C.

~~~~~

Philadelphus coronarius L.

Ac. ti. — Feuilles terminales fortement crispées, plus ou moins enroulées. Puceron vert foncé ou noir. [**Aphis viburni** Scop.] 2783
Schouteden, 1903, p. 179. B.

Pl. fe. — Limbe boursoufflé à la face supérieure. . . . **Ériophyide** 2784
Geisenheyner, 1902, p. 307, n° 50. A.

~~~~~

**Deutzia crenata** Sieb. et Zucc

**Pl. ti.** — Minimes bosselettes. . . . [**Lestes viridis** Van der Lind.] 2785  
Rocquigny-Adanson, 1903, p. 56 (pare). F.

~~~~~

Ribes Grossularia L. (R. Uva-crispa L.)

Ac. fl. — Fleur grosse, demeurant fermée ; calice épaissi, charnu, blanchâtre, jaunâtre ou rouge ; corolle et étamines durcies. Une à cinq larves orangées. M. T. **Contarinia ribis** Kieff. 2786
Schlechtendal, 1890, p. 67, n° 686 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 292. A, F.

Ac. ti. — Au sommet des pousses, agglomération de feuilles crispées et recourbées en arrière. Puceron ovulaire, vert foncé. **Aphis grossulariæ** Kalt. 2787
Kaltenbach, 1874, p. 261, n° 29 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 292 ; Lagerheim, 1905, p. 23. E-N, E-C, F.

Ac.bg. — Bourgeon hypertrophié et déformé. . . **Eriophyes ribis** NAL. 2788
Rostrup, 1896, p. 37, n° 235. D.

Pl.fe. — Boursoflures plus ou moins étendues du limbe, saillantes à la face supérieure et teintées de rouge. Puceron vert pâle ou rosé. **Myzus ribis** L. 2789
Gadeau de Kerville, 1884, p. 336.

— Limbe plissé, à bord relevé par en haut, plus ou moins pileux sur la face supérieure ; quand la base de la feuille est attaquée elle prend une forme de cornet ou d'entonnoir ; l'épaississement varie jusqu'au triple. Larves grégaires, d'abord d'un blanc brillant, puis rose-chair pâle, enfin jaunes.

Cécidomyide 2790

Thomas, 1892^b, p. 5, n° 2 ; Geisenheyner, 1902, p. 307, n° 52.

E-G.

Ribes oxycanthoides L.

Pl.fe. — Voir n° 2789. **Myzus ribis** L. 2791
Gadeau de Kerville, 1884, p. 336.

Ribes nigrum L.

Ac.ti. — Voir n° 2787. **Aphis grossulariæ** KALT. 2792
Rübsaamen, 1901, p. 128, n° 171 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 292 ; Lagerheim, 1905, p. 23, n° 1. *E-N,*
F.I.

Ac.bg. — Bourgeon hypertrophié et déformé. . . **Eriophyes ribis** NAL. 2793
Heinsins, 1891, p. 146 ; Nalepa, 1898, p. 24, n° 68 ; Lindroth, 1899, p. 17 ; Connold, 1901, pl. LXXII, ⊕ ; Warburton et Eubleton, 1902, p. 366-378, pl. XXXIII-XXXIV, ⊕. *E-T.*

Pl.fe. — Limbe boursofflé. Voir n° 2789. **Myzus ribis** L. 2794
Hieronymus, 1890, p. 117, n° 355 ; Schlechtendal, 1890, p. 68, n° 683 ; Connold, 1901, pl. CVI, ⊕ ; Lagerheim, 1905, p. 23, n° 2. *E-T.*

— Limbe crispé. Larve jaune pâle M.T. **Perrisia tetensis** RÜBS. 2795
Rübsaamen, 1891^b, p. 400-401, n° 8 ; Schlechtendal, 1891, p. 29. A.

Ribes floridum L'HÉRIT.

- Pl.fe.** — Voir n° 2789. **Myzus ribis** L. 2796
Gadeau de Kerville, 1884, p. 335.

Ribes alpinum L.

- Ac.fl.** — Fleurs fermées et épaissies. M.T. **Cécidomyide** 2797
Rübsaamen, 1901, p. 128, n° 170. A.
— Inflorescence déformée. [**Cécidomyide**] 2798
Thomas, 1893^b, p. 7; Schlechtendal, 1895, p. 28. A.
- Ac.ti.** — Feuilles terminales rapprochées, groupées en amas et déformées; leur limbe est crispé en arrière. Puceron allongé, vert pâle, à longs cornicules. **Macrosiphum ribicola** KALT. 2799
Schlechtendal, 1890, p. 67, n° 678; Schouteden, 1903, p. 186. A.
- Ac.bg.** — Bourgeon déformé et grossi. . . . **Eriophyes ribis** NAL. 2800
Nalepa, 1898, p. 24, n° 68; Rübsaamen, 1901, p. 88, p. 128, n° 169; Lagerheim, 1905, p. 11. E-N, E-G.
- Pl.fe.** — Sur le limbe, plis faisant saillie sur l'une ou l'autre face, ou encore enroulement marginal; dans les deux cas il y a pilosité anormale. **Eriophyes scaber** NAL. 2801
Thomas, 1881, p. 52-53; Hieronymus, 1890, p. 86, n° 197; Hieronymus, Pax, etc., fasc. IV, n° 140, ⊕. E-G, A.
— Limbe boursoufflé. Voir n° 2789. **Myzus ribis** L. 2802
Kaltenbach, 1874, p. 261; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 291; Lagerheim, 1905, p. 23; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XV, n° 338, ⊕. E-T (exc. E).

Ribes petraeum WULFEN

- Pl.fe.** — Limbe boursoufflé. Voir n° 2789. **Myzus ribis** L. 2803
Dalla Torre, 1899, p. 149; Schlechtendal, 1895, p. 29.
— Sur le limbe, plis épaissis, raides, presque droits quand ils intéressent les nervures principales, quelquefois colorés en rouge, couverts d'une pilosité anormale grise ou brunâtre,

formée de poils dont le pédoncule multicellulaire-plurisérié porte une tête arrondie. Larves grégaires blanches.

Cécidomyide 2804

Thomas, 1893^b, p. 3-5, n° 2 ; Dalla Torre, 1893, p. 149.

E-G.

Ribes rubrum L.

Ac.fl. — Fleur fortement grossie, boursoufflée, demeurant fermée.

Cécidomyide 2805

Hieronymus, 1890, p. 159, n° 498 ; Frank, 1896, p. 125, n° 21.

A.

Ac.ti. — Voir n° 2787. **Aphis grossulariæ KALT.** 2806

Kaltenbach, 1874, p. 261, n° 29 ; Houard, 1904^b, p. 305-311, fig. 22-31, ⊕.

E-T.

Ac.bg. — Bourgeon hypertrophié et déformé. **Eriophyes ribis NAL.** 2807

Schlechtendal, 1890, p. 68, n° 685 ; Nalepa, 1898, p. 24, n° 68.

E-G, E-O.

Pl.fe. — Limbe boursoufflé. Voir n° 2789. **Myzus ribis L.** 2808

Martel, 1891, p. 39, n° 87 ; Mollard, 1899^b, p. 490-495, fig. 1, ⊕ ; Rübssaamen, 1899, p. 246, n° 52 ; Lagerheim, 1905, p. 23 ; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n° 13, ⊕.

E-T.

Ribes aureum PERSH

Ac.ti. — Voir n° 2787. **Aphis grossulariæ KALT.** 2809

Hieronymus, Pax, etc., fasc. VI, n° 195, ⊕ ; Houard, 1904^b, p. 311-312, fig. 32-35, ⊕.

A, E.

Pl.fe. — Voir n° 2789. **Myzus ribis L.** 2810

Gadeau de Kerville, 1884, p. 336 ; Dalla Torre, 1892, p. 149.

E-G.

— Petites élévations coniques, pointues, situées à la face supérieure du limbe.

Ériophyide 2811

Geisenheyner, 1902, p. 307, n° 53.

A.

Ribes palmatum DESF.

Ac.ti. — Voir n° 2787. **Aphis grossulariæ KALT.** 2812

C. Marchal et Chateau, 1905, p. 292.

F.

Ribes Gordonis DC.

- Pl.fe. — Voir n° 2789. **Myzus ribis** L. 2813
 Gadeau de Kerville, 1884, p. 336.

Ribes caucasicum MARSCH. (**R. Biebersteini** BERLAND.)

- Pl.fe. — Voir n° 2789. **Myzus ribis** L. 2814
 Cecconi, 1901^a, p. 64, n° 39; Kieffer, 1901^b, p. 476. I.

FAMILLE DES CUNONIACÉES

**Callicoma** sp. (fossile)

- Pl.fe. — Macules du limbe, de 1 mm. de diamètre. *Phyllerites calli-*
coma ENGELI. **Eriophyidites** 2815
 Meschinelli, 1892, p. 807, n° 9; 1898, p. 106, pl. XXX, 2. ⊕; Trotter, 1903^e, p. 17. A-H.

FAMILLE DES PITTOSPORACÉES

Plantes exotiques ou tout au moins extra-européennes, cultivées dans les jardins comme celles des familles voisines, et n'offrant que des galles peu visibles engendrées pour la plupart par des animaux non encore déterminés.

**Pittosporum Tobira** AITON

- Ac.bg. — Bourgeon déformé, composé de feuilles atrophiées, crispées, contournées, plus ou moins incurvées vers la base.
Aphide 2816
 Trotter, 1906, p. 120, n° 98 (jardin botanique). I.

- Pl.ti.** — Renflements irréguliers sur les jeunes rameaux et les feuilles. **Asterodiaspis quercicola** BOUCHÉ 2817
 Stefani, 1902^a, p. 161-163; 1904, p. (1-8), 2 fig., ⊕; 1906, p. 139, n° 73; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XI, n° 267, ⊕. *si.*

Pittosporum coriaceum ATTON

- Pl.fe.** — Limbe enroulé par en bas. **Aphide** 2818
 Tavares, 1903^b, p. 184, n° 19; 1907^b, p. 121. *P,m.*
 — Pustules. **Ériophyide** 2819
 Tavares, 1903^b, p. 184, n° 20. *m.*

FAMILLE DES HAMAMÉLIDACEES



Liquidambar orientalis MILLER

- Pl.ti.** — Minimes bosselettes. [**Lestes viridis** VAN DER LIND.] 2820
 Rocquigny-Adanson, 1903, p. 56 (pare). *F.*

FAMILLE DES ROSACEES

Alchemilla 3097-3099, Amelanchier 2925-2929, Cotoneaster 2842-2850, Cydonia 2851-2854, Dryas 3096, Eriobothrya 2924, Fragaria 3053-3058, Geum 3087-3095, Mespilus (et Crataegus) 2930-2961, Pirus (et Sorbus) 2855-2923, Potentilla 3059-3086, Prunus 3251-3319, Rosa 3109-3250, Rubus 2962-3052, Sanguisorba 3100-3108, Spiraea 2821-2841.

Les galles des Rosacées sont parmi les plus abondantes et les plus belles; elles intéressent à un très haut degré les arboriculteurs, les horticulteurs et les cécidologues. On en a décrit sur près de vingt genres de Rosacées, parmi lesquels les genres *Rosa* et *Rubus*, si nombreux en espèces. Nous avons rapporté dans ce Catalogue les cécidies observées sur ces deux genres. Des recherches nouvelles permettraient certainement d'allonger encore une liste déjà considérable; mais disons-le de suite, l'intérêt n'en serait que médiocre puisqu'on peut, en définitive, ramener à un très petit

nombre de types toutes les galles connues jusqu'à présent. C'est ce que nous avons fait en adoptant, pour les genres *Rosa* et *Rubus*, la méthode employée précédemment pour les Saules, c'est-à-dire en faisant précéder la liste des galles de tableaux généraux de détermination.

Les Rosiers présentent des cécidies très décoratives, de faciès bien spécial, qui ne ressemblent aucunement à celles des autres genres de Rosacées. Elles sont engendrées surtout par des *Rhodites* : *R. rosa*, *R. rosarum*, *R. eglanteriae*, *R. centifoliae*. On les rencontre en général sur les feuilles. Celle du *Rhodites Mayri* peut déformer presque tout l'appareil floral d'un Rosier de Tunisie : sépales, pétales, styles et carpelles sont transformés en masses globuleuses soudées entre elles par leur base (R. du Buisson, 1899, p. 155).

Les galles des fruits des Rosacées sont peu nombreuses. On ne peut nier cependant l'importance, pour les arboriculteurs, de la présence des larves de *Contarinia pirivora* dans les fruits boursofflés des Poiriers ainsi que l'ont mis en évidence les travaux des entomologistes américains et ceux plus récents de P. Marchal (1907). D'autre part, mais à un point de vue exclusivement théorique, des recherches nouvelles seraient encore nécessaires pour préciser le rôle joué par *Spilographa alternata* dans les déformations des fruits des Rosiers et par quelques Chalcidiens cécidogènes appartenant aux genres *Megastigmus* et *Syntomargus* : *M. picta*, par exemple, dans les graines des Sorbiers et des Aubépines, *S. druparum* dans les noyaux de ces dernières plantes, etc.

Quant aux fleurs des Rosacées, nombreuses sont celles qui restent fermées et se gonflent sous l'influence de Cécidomyies (*Pecrisia potentilla*, *Contarinia anthobia*, *Clinodiplosis rosiperda*, *Asphondylia pruniperda*) dont beaucoup n'ont pas encore été obtenues à l'état adulte. Plusieurs Coléoptères peuvent produire le même phénomène : *Anthonomus rubi*, chez un grand nombre de Ronces, *A. pomorum* du Pommier et aussi *A. piri* ; la synonymie jusque-là inexacte de ce dernier cécidozoaire a été établie grâce aux renseignements inédits de M. Bedel. — Remarquons, en outre, que les fleurs des Spirées peuvent s'hypertrophier très irrégulièrement et devenir charnues sous l'influence du *Pecrisia Engstfeldi* ou de l'*Eriophyes spirææ*.

Les déformations terminales consistent en rosettes de feuilles (*Errisia cratagi*), en fuseaux allongés (*P. tortrix* des Pruniers) ou en amas irréguliers de feuilles engendrés par des Pucerons (*Aphis sorbi*, *Fitchi*, *persicæ*, etc.). Les bourgeons eux-mêmes sont souvent modifiés : ils peuvent être légèrement déformés (*Eriophyes calycobius*) ou bien transformés en une cécidie arrondie fort gracieuse (*Asphondylia prunorum* chez plusieurs espèces de Pruniers) ou encore donner naissance à une masse dure et irrégulière, contenant les larves de *Oligotrophus Bergeestammi*, sur *Pirus communis* et *P. salicifolia*, d'après les recherches de Wachtl (1882^b) et de Del Guercio (1897) ; l'*Anthonomus rosinae* provoque la formation d'un amas de petites feuilles.

Les galles des tiges sont nombreuses et, en général, bien connues, comme par exemple les renflements volumineux des Ronces (dus à *Lasioptera rubi* et *Diastrophus rubi*), les cécidies des Potentilles engendrées par *Diastrophus Mayri* ou par divers *Xestophanes*. Elles constituent parfois de petites excroissances locales sur les Pruniers et les Cotonéasters (*Eriophyes phlæocoptes*), de simples bossettes (*Lestes viridis* sur un grand nombre de Rosacées) ou encore des renflements fusiformes supportant des Coccides. Les cécidies caulinaires de *Rosa* signalées aux nos R. 18 et R. 19 demanderaient de nouvelles recherches.

Signalons enfin les déformations très intéressantes trouvées en Angleterre sur les Fraisiers et attribuées par Ritzema-Bos aux *Aphelenchus fragariae* et *Ormerodis*.

Les nombreuses espèces de Pucerons qui se fixent à la surface inférieure du limbe des Rosacées produisent des enroulements, colorés ou non, assez difficiles à distinguer les uns des autres, pour la détermination desquels nous avons cru utile de dresser de petits tableaux en tête des genres *Pirus* et *Prunus*. De semblables enroulements prennent aussi naissance sous l'influence d'Ériophyides variés (*Epirimerus piri*, *Eriophyes goniothorax* des Aubépines et peut être même des Cotonéasters), de l'*Anthonomus spilotus* et de plusieurs Cécidomyides (*Perrisia sodalis*, *P. tortrix*, *P. piri*, *P. mali*) : quelques diptères même peuvent transformer les feuilles en gous-ses : *Perrisia rosarum*, *P. sanguisorba*, *Contarinia sorbi*, etc.

Les autres cécidies des feuilles des Rosacées se ramènent aux types suivants :


a. Productions saillantes sur les deux faces du limbe ou sur une seule, dues à des Ériophyides (*Eriophyes padi*, *E. similis*) ou des Cécidomyides (*Putoniella marsupialis*, *Perrisia ulmaria*) ou encore des Anguillulides (chez le *Dryas*) ;

b. Soulèvements circulaires, largement ouverts, dans lesquels on rencontre des larves de diptères (*Perrisia Engstfeldi*, *P. pustulans*) ou d'hémipères *Psylla crataegi* *Trioxa tripunctata*) ; boursofflures, constrictions, comme celles de l'*Aphis spiræella* récemment découvertes par Schouteden ;

c. Pustules, très répandues dans les genres *Coloneaster*, *Cydonia*, *Pirus* et rapportées à l'action de l'*Eriophyes piri* ou de l'*E. crataegi* ;

d. Amas pileux, renfermant *Eriophyes rubicoloris* et *E. gibbosus* chez les Ronces, *E. pyracanthæ* et *E. malinus* chez les Cotonéasters et les Poiriers, *E. parvulus* chez les Potentilles, *E. nudus* pour le genre *Geum* ; ce dernier parasite peut provoquer une abondante pilosité sur toute la plante ;

e. Surfaces bruniées et décolorées sur lesquelles on rencontre *Phyllocoptes Schlechtendali*, *Epirimerus armatus*, *Callytrotus Schlechtendali* et qui constituent des cécidies à caractères peu accentués. Nous les signalons dans ce Catalogue afin d'attirer l'attention des Cécidologues et provoquer de nouvelles recherches.



Spiræa crenifolia MEYER

Ac.fl. — Les bourgeons floraux ne s'ouvrent pas, deviennent fusiformes, et constituent des cécidies, à parois épaisses, de 6-9 mm. de long sur 2,5-4 mm. de diamètre (fig.752) ; l'intérieur est garni d'émergences (fig.753).

Eriophyes spirææ NAL. 2821

Rubsaamen, 1895, p.419, n° 38, pl.XIV, 4-5, ⊕ ; Nalepa, 1898, p.29, n° 87.

R.

Spiræa salicifolia L.

Pl.fe. — Enroulement marginal par en bas, parfois accompagné de

torsion des feuilles, qui peuvent se plier ; la partie enroulée est décolorée et de consistance papyracée. En général l'extrémité des tiges est déformée ainsi que les feuilles terminales.

Macrosiphum ulmariae SCHRANK 2822

Hieronymus, 1890, p. 117, n° 358 ; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n° 345, ⊕ ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 305. D.A.
F.

Spiraea Douglasi HOOKER

Pl. fe. — Enroulement marginal. **Macrosiphum ulmariae** SCHRANK | 2823

Schlechtendal, 1895, p. 33 ; Rübsaamen, 1901, p. 131, n° 274. A.

Spiraea opulifolia L.

Pl. ti. — Gros renflement ligneux. **Chyliza leptogaster** SCHOLTZ 2824

Kaltenbach, 1874, p. 242, n° 15 ; Kieffer, 1901^b, p. 518. E-G.

Pl. fe. — Bosselure et constriction du limbe.

Aphis spiræella SCHOUTEDEN 2825

Rübsaamen, 1890, p. 260, n° 263. A.

— Limbe enroulé par en bas et décoloré.

[**Macrosiphum ulmariae** SCHRANK] 2826

Kieffer, 1901^b, p. 518.

Spiraea lauceolata POIR.

Pl. fe. — Minimes élevures du limbe correspondant à de petits creux sur la face inférieure.

Psyllide 2827

C. Marchal et Chateau, 1903, p. 388 n° 11 ; 1905, p. 306. F.

Spiraea Filipendula L.

Ac. fl. — Boutons demeurant fermés, boursoufflés et le plus souvent teintés de rouge sang. Larves grégaïres rouge orangé.

Cécidomyïde 2828

Schlechtendal, 1883, p. 6, n° 16, fig. 5, ⊕ ; Lagerheim, 1905, p. 17, n° 1. E-N.A.

Pl. fe. — Voir n° 2838. [*Perrisia pustulans* RÜBS.] 2829

F.Löw, 1877, p. 34, n° 4; Schlechtendal, 1890, p. 78, n° 825. E-C.


— Sur l'axe de la feuille ou sur les nervures médianes de ses folioles, cécidies uniloculaires (fig. 754), jaunâtres, traversant la feuille, faisant une saillie cylindrique à la face supérieure et une saillie hémisphérique à la face inférieure (fig. 755). Une larve blanc jaunâtre. M.C. **Perrisia ulmariae** BREMI 2830

F.Löw, 1877, p. 23, pl. I, 6, ⊕; Lagerheim, 1905, p. 17, n° 2, pl. I, 6-7, ⊕; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XV, n° 369, ⊕. E-T.




Spiraea crenifolia

Eriophyes spiraeae (n° 2821)
Fig. 752 (a). — Im. RÜBS.
Fig. 753 (b). — Im. RÜBS.



Spiraea Filipendula

Perrisia ulmariae (n° 2830)
Fig. 754 (a). — D'ap. nat.
Fig. 755 (b). — D'ap. nat.



Spiraea Ulmaria

Perrisia ulmariae (n° 2839)
Fig. 756 (a). — D'ap. nat.
Fig. 757 (b). — D'ap. nat.
Fig. 758 (c). — D'ap. nat.

— Limbe enroulé. **Aphide** 2831

Lagerheim, 1905, p. 23, 27. E-N.

***Spiraea Ulmaria* L. (*Ulmaria pentapetala* GILIB.)**

Ac. fl. — Fleurs irrégulières dont les différentes pièces, hypertrophiées, se couvrent, à leur face externe, de poils nombreux et acquièrent une coloration rosée ou rouge; certains organes internes peuvent ne pas se développer. Larves d'abord blanches, plus tard rouge pâle. M.T. **Perrisia Engstfeldi** RÜBS. 2832

Molliard, 1895, p. 187-188, pl. VIII, 15-16, ⊕. F.

HOUBARD, *Zoocécidies*.

- Pl. fe. { Déformation du bord du limbe A.
 { Plissement ou soulèvement du limbe B.
 { Autre forme de cécidie C.

A. — Limbe enroulé, parfois tordu; la partie enroulée est de consistance papyracée et décolorée. Puceron grand, vert pâle.

Macrosiphum ulmariae SCHRANK 2833

Kaltenbach, 1874, p. 242, n° 18; Schouteden, 1903, p. 188, n° 1.

A, B, F.

— Limbe des feuilles jeunes enroulé, crispé fortement et bosselé. Puceron assez petit, vert foncé.

Aphis spiræella SCHOUTEDEN 2834

Kaltenbach, 1874, p. 243; Schouteden, 1902, p. 656-657; 1903, p. 188, n° 2; 1903^c, p. 194.

A, B.

B. — Limbe plissé. **Aphide** 2835

Dalla Torre, 1895, p. 161.

E-C.

— Plis du limbe situés le long des nervures secondaires; larves blanches à la face supérieure.

Cécidomyide 2836

Rostrup, 1896, p. 38, n° 245.

D.

— En un point du limbe, boursofflure saillante à la face supérieure, à contour ovalaire, à surface ridée, d'une teinte jaune verdâtre, entourée d'une zone rougeâtre; à la face inférieure, une dépression correspondante contient une larve d'abord blanche, plus tard rouge pâle. M.T. Assez souvent il y a plusieurs larves sur une même feuille et il se forme alors, par juxtaposition des cécidies, des plis saillants à la face supérieure ou bien tout le limbe est bosselé.

Perrisia Engstfeldi RÜBS. 2837

Rübsaamen, 1889^b, p. 375-378; 1890, p. 52, n° 202, pl. III, 17; Hieronymus, 1890, p. 182, n° 583.

E-N,
A, F.

— A la face inférieure, petite dépression circulaire, n'atteignant pas 1 mm. de profondeur; une légère saillie y correspond à la face supérieure; la galle est entourée d'une zone circulaire d'un jaune éclatant. Dans la dépression, une larve blanche, parfois teintée de verdâtre. M.T.

Perrisia pustulans RÜBS. 2838

Schlechtendal, 1883, p. 67, n° 18; Rübsaamen, 1889^b, p. 378-380; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 306-306; Lagerheim, 1905, p. 17, n° 1.

E-N,
E-C, F, J.

C. — Sur l'axe de la feuille ou sur les nervures (fig. 756), cécidies uniloculaires jaunâtres, molles, traversant la feuille, formant une saillie cylindroconique à la face inférieure (fig. 757) et une saillie hémisphérique à la face supérieure (fig. 758). Une larve blanc jaunâtre. M.C. **Perrisia ulmariae** BREMI 2839

Bremi, 1847, p. 16, n° 6, p. 52, n° 9, pl. 1, 15, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 97, ⊕; Connold, 1901, pl. LXXXIX, ⊕; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XII, n° 287, ⊕. E-C.

— Renflement des nervures médianes des lobes du limbe. **Ériophyide** 2840

Dalla Torre, 1893 b, p. 20. E-C.

— Limbe couvert d'un épais feutrage blanc. **Ériophyide** 2841

Kieffer, 1901 b, p. 519. F.



Cotoneaster vulgaris LINDL. (**C. integerrima** MEDIK.)

Pl. ti. — Sur les rameaux et généralement sur les cicatrices annulaires causées par la chute des écailles d'un bourgeon, excroissances cylindriques de 1-2 mm. de diamètre (fig. 759), réunies en amas le plus souvent et formées aux dépens de la couche corticale (fig. 760). **Ériophyide** 2842

Thomas, 1869, p. 352, n° 29; F. Löw, 1881, p. 3-4, pl. III, 2, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VIII, n° 227, ⊕. E-C.

Pl. fe. — Petites pustules circulaires faisant très faiblement saillie sur les deux faces du limbe, avec ostiole à la face inférieure. **Eriophyes piri** PAGENST. 2843

Nalepa, 1898, p. 25, n° 73; Lindroth, 1899, p. 18; Corti, 1904, p. 8, n° 22; Lagerheim, 1905, p. 7; Hieronymus, Pax, etc., 1908, fasc. XVI, n° 433, ⊕. E-N, E-C, I.

— Feuilles de l'extrémité des rameaux plus ou moins entou-
lées. Puceron vert, à cornicules noirs. **Aphis pomi** DE GEER 2844

Schouteden, 1903, p. 173. B.

Cotoneaster tomentosa LINDL.

Pl. fe. — Pustules. Voir n° 2843. **Eriophyes piri** PAGENST. 2845


Dalla Torre, 1892, p. 117; Massalongo, 1901, p. 88-89, pl. II, 6, ⊕; Corti, 1904, p. 8, n° 21. E-C, I.

Cotoneaster erythrocarpa LEDEBOUR


Pl.fe. — Pustules. Voir n° 2843. . . . [Eriophyes piri PAGENST.] 2846
 Kieffer, 1892 c, p. 162 ; 1901 b, p. 298-299. I.

Cotoneaster Pyracantha SPACH (**Crataegus Pyrac.** PERS.).

Pl.fe. — Enroulement marginal par en bas, recouvrant un amas de poils bruns, courts, en forme de massue. [Eriaceum clandestinum GRÆV.] [Eriophyes goniothorax NAL.] 2847
 Westhoff, 1883 ; Schlechtendal, 1890, p. 70, n° 725. A.



Cotoneaster vulgaris
Eriophyide (n° 2842).
 Fig. 759 (a). — Im. F. Löw
 Fig. 760 (b). — Im. F. Löw



Cotoneaster Pyracantha
Eriophyes pyracanthi (n° 2848)
 Fig. 761, 762 (a, b). — D'ap. nat.
 Fig. 763 (c). — D'ap. nat.

— A la face inférieure, amas rouge de poils courts en forme de massue (fig. 761-763). *Eriaceum pyracanthæ* DC.

Eriophyes pyracanthi CAN. 2848


Fée, 1834, p. 126, n° 72, pl. V, 5, ⊕ ; Trotter, 1903, p. 19, n° 25 ; Trotter et Ceconi, 1904, fasc. IX, n° 225, ⊕. E-S, A-M.

Cotoneaster nummularia FISCH. et MEYER

Pl.fe. — Pustules du limbe. Voir n° 2843. . . . **Eriophyes piri** PAGENST. 2849
 Corti, 1904 b, p. 250-251. AL.

Cotoneaster [**luxifolia** WALLICH.]

- Pl.ti. — Petite bossette. [**Lestes viridis** VAN DER LINDE.] 2850
 Rocquigny-Adanson, 1903, p. 56 (pare). E.

**Cydonia vulgaris** PERS.

- Pl.fe. — Cécidies pustuleuses faisant légèrement saillie à la face supérieure du limbe et s'ouvrant à la face inférieure.
- Eriophyes piri** PAGENST. 2851
- F. Löw, 1874^d, p. 498, n° 41 ; Focken, 1892, p. 156-158, 1 fig. ; Nalepa, 1902^b, p. 336 ; Tavares, 1905, p. 13 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 253. E-C.
E-S, S.Y.
- Limbe recourbé ou enroulé. **Aphis pomi** DE GEER 2852
- Aphis Fitchi** SANDERSON 2853
- Passerini, 1862, p. 163, n° 19 ; Schouteden, 1903, p. 173 ; 1903^b, p. 93 ; Tavares, 1903, p. 165, n° 16 ; 1905, p. 13. E-O,
I.

Cydonia japonica PERS.

- Pl.fe. — Voir n° 2852. **Aphis pomi** DE GEER 2854
- Passerini, 1862, p. 163, n° 19 ; Schouteden, 1903, p. 173. I.

**Pirus**

(y compris les genres *Malus* et *Sorbus*)

Les cécidies des *Pirus* les plus difficiles à déterminer sont celles des feuilles car on y rencontre une dizaine de Pucerons différents ; aussi les renseignements contenus dans les mémoires des Auteurs sont-ils souvent peu concordants. Nous engageons vivement les Cécidologues à se servir, à l'avenir, des tableaux de détermination donnés par H. Schouteden (1903, p. 184-185 ; 1903^b, p. 97) et à employer ses dénominations afin que la spécification des galles devienne plus précise et plus homogène.

Nous croyons utile de condenser ici, en un seul tableau, qui résume du reste ceux de Schouteden, les caractères essentiels des aphidocécidozoaires des Poiriers, Pommiers et Sorbiers, ce qui nous permettra de ne pas les rappeler à propos de chaque galle.

△ Déformations du limbe, colorées en rouge ou en jaune :

= Feuilles isolées, en général, présentant des bosselures colorées à la face supérieure ; parfois le limbe est replié de chaque côté de la nervure médiane, bosselé et coloré en rouge. Puceron brun noir.

Myzus oxycanthae KOCH

= Feuilles crispées, enroulées en amas terminaux. Puceron brunâtre ou verdâtre ; région des cornicules rougeâtre.

Aphis piri FONSC. (*crataegi* KALT.)

△ Déformations du limbe restant vertes :

= Puceron aptère vert ou jaune.

○ Corps piriforme, vert ou jaune ; cornicules droits amincis graduellement vers l'extrémité distale. *Aphis pomi* DE GEER

○ Corps ovulaire, vert ; aires plus sombres sur le dos ; cornicules légèrement renflés ou évasés à l'extrémité distale.

Aphis Filchi SANDERSON

○ Corps globuleux ou ovulaire, pulvérulent, de couleur variable : gris noir, vert bleuâtre, saumon, etc. ; cornicules droits ou légèrement arqués.

Aphis sorbi KALT.

○ Une tache rougeâtre à la base des cornicules.

Aphis piri FONSC. (*crataegi* KALT.)

= Puceron aptère brun ou noir.

○ Aptère noir, à pattes jaunes.

Myzus pirarius PASS.

○ Aptère brun, à dos brun noir muni d'une ligne longitudinale médiane pâle.

Aphis Kochi SCHOUTEDEN (*piri* KOCH)

○ Aptère brun, sans ligne longitudinale pâle, à queue bien distincte.

Myzus pirivorus FERRARI

○ Aptère brun, sans ligne longitudinale pâle, à queue très petite.

Myzus mali FERRARI

Pirus communis L.

Ac.fr. — Les fruits, immédiatement après la floraison, présentent de petites boursofflures.

Contarinia pirivora RILEY

2855

Connold, 1901, pl. CXXIII, ⊕ ; Kertész, 1902, p. 97 ; P. Marchal, 1907, p. 5-27, fig. 1-14, ⊕.

E-T.

Ac.fl. — Boutons gonflés demeurant fermés.

* **Anthonomus piri** KOLLAR

2856

Perris, 1873, p. 76 ; Deyrolle, 1877, p. 150 ; Decaux, 1891 ; Rubsaamen, 1901, p. 122, n° 112 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 277 ; Niezabitowski, 1905.

E-C,
F.

* D'après des renseignements inédits de M. Bedel : *A. piri* Kollar (1837) = *piri* Bohem. (1843). *cinetus* Redt. (1872).

Ac.bg — Bourgeon transformé en une petite cécidie dure, ligneuse,

arrondie ou conique, jaunâtre, multiloculaire. Voir n° 2877.

Oligotrophus Bergenstammi WACHTL 2837

Del Guercio, 1897^b, p. 433-438; 3 fig., ⊕ ; Kertész, 1902, p. 72 ; Cecconi, 1906, p. 41, n° 36. I.

— A la place des bourgeons, excroissances subglobuleuses, de 5-50 mm. de diamètre, à surface mamelonnée, recouvertes d'une pilosité abondante, mais courte. **Ériophyide** 2838

Massalongo, 1891, p. 89-90, n° 19, pl. II, 9, ⊕ ; Frank, 1896, p. 72. I.

Pl.ra. — Nodosités. **Heterodera radicolica** GREEFF 2839

Frank, 1896, p. 20, fig. 4, c, ⊕. A.

Pl.ti. — Tumeurs irrégulières sur le tronc et les branches. Puceron fortement lanugineux. **Myzoxylus laniger** HAUSM. 2860

Kieffer, 1891, p. 234, n° 446 ; Martel, 1894, p. 5, n° 191. A, F.

— Minime bossette. **Lestes viridis** VAN DER LIND. 2861

Pierre, 1902, p. 185. F.

Pl.fe. { Enroulement marginal. A.
 { Déformation totale du limbe. B.
 { Autre déformation. C.

A. — Les feuilles ont leurs deux bords enroulés par en haut jusqu'à la nervure médiane, comme au sortir du bourgeon. Une larve jaunâtre à tête noire. **Anthonomus spilotus** REDT. 2862

Perris, 1877, p. 401 ; Bedel, 1888, p. 297, n° 7. F.

— Enroulement marginal par en haut, serré, sans pilosité anormale ; la partie enroulée n'est pas sensiblement épaissie et la feuille prend une teinte brun violet. **Epitrimerus piri** NAL. 2863

Nalepa, 1898, p. 64, n° 10 ; Kieffer, 1901^b, p. 380. E-C.

— Enroulement marginal par en haut ; la partie enroulée, épaissie, brillante, est verte ou jaunâtre. Larves grégaires blanc de lait. M. T. **Perrisia piri** BOUCHÉ 2864

Bouché, 1847, p. 144, n° 12 ; Winnertz, 1853, p. 242-244, n° 29 ; Focke, 1894^b, p. 435 ; Trotter, 1899, p. 289, n° 15 ; Hieronymus, Pax, etc., 1907, fasc. XV, n° 410, ⊕. E-C, E-O, I.

B. — Feuilles brunies, avec léger enroulement du limbe. **Phyllocoptes Schlechtendali** NAL. 2865

Schlechtendal, 1895, p. 5, n° 5, pl. I, 5 ; Nalepa, 1898, p. 52, n° 23. E-C.

— Feuilles enroulées en arrière, leur limbe étant crispé et froissé.

Psylla piri L. 2866

Rübsaamen, 1899, p. 243, n° 42; 1901, p. 123, n° 114.

A, B.

Psylla pirusuga FÖRSTER 2867

Liebel¹, 1889, p. 304, n° 374; Tavares, 1900, p. 81, n° 138; Stefani, 1906, p. 137, n° 67.

A, P, si.

Aphis Kochi SCHOUTEDEN 2868

Géhin, 1860, p. 269-272; Martel, 1894, p. 5, n° 192; Bezzi, 1899, p. 27, n° 73.

E-O, I.

Myzus mali FERRARI 2869

Foeken, 1890, p. 437; Liebel, 1892, p. 267, n° 104; Tavares, 1905, p. 48.

A, F, P.

C. — Bosselures faisant saillie à la face supérieure, teintées de jaune ou de rouge; quand l'attaque a lieu au bord du limbe, ce bord est replié, bosselé et coloré en rouge.

Myzus oxyacanthæ KOCH 2870

Schouteden, 1903, p. 185; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 276; Mariani, 1907 b, p. 305, n° 111.

B, F, I.

— Pustules d'abord vert clair, plus tard brun-rouille, sail-
lantes sur les deux faces, avec ostiole à la face inférieure.

Eriophyes piri PAGENST. 2871

Soraner, 1886, p. 814-825, pl. XVIII, ⊕; Berlèse, 1892, p. 71-95, pl. IV, ⊕; Jolicœur, 1892, p. 14-23, pl. II, 3-5, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. I, n° 17, ⊕; 1907, fasc. XVII, n° 418, ⊕ (sur var. *angustata* Arc.); Connold, 1901, pl. LIX, ⊕.

E-T.

A-M.

— Pustule brillante, translucide, visible des deux côtés du limbe, le plus souvent solitaire.

Micronematus abbreviatus HARTIG 2872

Dalla Torre, 1894, p. 201; Pierre, 1899, p. 145-148, fig. 1-3, ⊕; Konow, 1905, p. 71, n° 1.

E-C, E-O.

— Sur Pune des faces, et le plus souvent à la face inférieure, amas de poils formant feutrage, de teinte jaunâtre ou rougeâtre au début, plus tard brun-rouille. *Erineum pirinum* PERS.

Ériophyide 2873

Greville, 1823, pl. XXII, 1-2, ⊕; Fée, 1834, p. 110-111, n° 35, pl. III, 4, ⊕; Hieronymus, 1890, p. 79, n° 162.

E-T.

Pirus amygdaliformis VILL.

Pl. fe. — Pustules du limbe. Voir n° 2871. **Eriophyes piri** PAGENST. 2874

Stefani, 1901 b, p. 234, n° 30; Cecconi, 1901 c, p. 732, n° 12; Trotter, 1903, p. 32, n° 67.

I, G.

— Limbe enroulé. Voir n° 2864. **Perrisia piri** BOUCHÉ 2875

Stefani, 1901, p. 447, n° 17; 1906, p. 137.

si.

— Limbe enroulé. Voir n° 2867. *Psylla pirisuga* FÖRSTER 2876
Stefani, 1901, p. 446, n° 12; 1906, p. 137. *si.*

Pirus salicifolia LOIS.

Ac.bg. — Bourgeon transformé en une petite cécidie ligueuse, de la couleur de l'écorce, arrondie ou conique, pluriloculaire; chambres larvaires situées dans la zone ligueuse (fig. 764-766).
M.C. *Oligotrophus Bergestammi* WACHTL 2877

Wachtl, 1882 b, p. 289-291, pl. IV, 1, ⊕; Kertész, 1902, p. 72. *co.*

Pl.ti. — Renflement situé à la base des rameaux de première année.
Cécidomyide 2878

Niezabitowski, 1905 (jardin botanique). *E-G.*

Pirus cuneifolia GÜSSONE

Pl.fe. — Enroulement marginal serré, par en haut.
[*Epitrimerus piri* NAL.] 2879

Misciattelli, 1899, p. 25, n° 39; Kieffer, 1901 b, p. 380. *L.*

Pirus crategifolia OTT.

Pl.fe. — Enroulement marginal serré, par en haut.
[*Epitrimerus piri* NAL.] 2880

Misciattelli, 1899, p. 25, n° 38; Kieffer, 1901 b, p. 380. *L.*

Pirus Malus L. (*Malus communis* POIR.)

Ac.fl. — Boutons gonflés, demeurant fermés.
Anthonomus pomorum L. 2881

Decaux, 1892, p. 180-185; Lampa, 1897, p. 25, fig. 1, ⊕; Cecconi, 1906, p. 40, n° 24. *E-T.*

Pl.ra. — Tumeurs irrégulières sur les racines.
Myzoxylus laniger HAUSM. 2882

Ritter, 1902, p. 7-10, pl. I, ⊕; Connold, 1901, pl. XII, ⊕; Rübsaamen, 1902 b, p. 229-230. *L.*

Pl.ti. — Tumeurs irrégulières sur le tronc et sur les branches (fig. 767-768).
Myzoxylus laniger HAUSM. 2883

Prillieux, 1875, p. 896-899; 1875 b, p. 144-151; 1878, p. 39-49, pl. II-IV, ⊕; Massalongo, 1893, p. (61-63), n° 26, pl. IX, 1-3, ⊕; Lampa, 1897, p. 15-16, fig. 2, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc.


IV, n° 137, ⊕; Connold, 1901, pl. XXXV, ⊕; Thiele, 1901, p. 331-430; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XI, n° 263, ⊕; Bloomfield, 1906, p. 573-579, pl. XXXII, ⊕; Grevillius et Niesen, 1907, fasc. II, n° 41, ⊕.

Pl. fe. { Enroulement marginal..... A.
 { Autre déformation..... B.

A. — Enroulement marginal par en haut, serré, sans épaissement de la partie enroulée; la pilosité blanche interne s'étend irrégulièrement en dehors de l'enroulement et forme des taches sur le limbe.

Ériophyide 2884

Liebel, 1886, p. 556, n° 188; Schlechtendal, 1890, p. 71, n° 741; Lagerheim, 1905, p. 10, n° 1. E-N, F.



Pirus salicifolia

Oligotrophus Bergenstammi (n° 2877)

Fig. 764 (a). — Im. WAGNER.

Fig. 765 (b). — Im. WAGNER.

Fig. 766 (c). — Im. WAGNER.



Pirus Malus

Myzocylus laniger (n° 2883)

Fig. 767 (a). — Im. MASS.

Fig. 768 (b). — Im. MASS.

— Enroulement marginal par en haut et étroit; la partie enroulée, épaisse et brillante, est teintée de rouge. Larves gré-gaires rouges. M. T.

Perrisia mali KIEFF. 2885

Baldrati, 1900, p. 56, n° 33, pl. V, 4, ⊕; Kieffer, 1904, p. (17-18); Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIV, n° 340, ⊕. I, F, J.

B. — Limbe boursoufflé, crispé ou froissé, présentant parfois un enroulement par en bas assez lâche. **Myzus oxyacanthæ** KOCU 2886

Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVII, n° 420, ⊕; Trotter, 1907, p. 105, n° 11. I.

- Myzus mali** FERRARI 2887
 Focken, 1894^b, p. 437; Stefani, 1901, p. 444-445, n° 7; Tavares, 1905, p. 48. *E-T (e.c.c.E).*
- Aphis Kochi** SCHOUTEDEN 2888
 Focken, 1890, p. 437; Martel, 1894, p. 5, n° 192; Tavares, 1905, p. 48. *A.F.I.P.*
- Myzus pirinus** FERRARI 2889
 Tavares, 1905, p. 48. *P.*
- Myzus pirarius** PASS. 2890
 Tavares, 1905^b, p. 225, n° 52. *m.*
- Pustules saillantes sur les deux faces, de couleur d'abord vert pâle, plus tard brun-rouille; l'ostiole est à la face inférieure.
- Eriophyes piri** PAGENST. 2891
 Massalongo, 1891, p. 107-108, n° 55; Nalepa, 1898, p. 25, n° 73; Cecconi, 1901^a, p. 65, n° 41. *E-T (e.c.c.E).*
- A la face inférieure, ou plus rarement à la face supérieure, amas de poils à extrémité mousse formant un revêtement feutré, d'abord blanc rougeâtre, plus tard brun-rouille. *Erineum malinum* DC.
- Eriophyes malinus** NAL. 2892
 F. Löw, 1878, p. 141, n° 18; Lindroth, 1899, p. 18; Trotter, 1904, p. 9, n° 14; 1907^b, p. 30, n° 20 (sur var. *erioslyla* Gussone); Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVII, n° 419, ⊕. *E-T (e.c.c.E).*
- Feuilles décolorées. . . . **Phyllocoptes Schlechtendali** NAL. 2893
 Schlechtendal, 1895^b, p. 5, n° 5, pl. I, 5, ⊕; Nalepa, 1898, p. 52, n° 23. *A.*

Pirus Malus L. var. **silvestris** MÖNCH

- Pl. fe.** — Voir n° 2892. [**Eriophyes malinus** NAL.] 2894
 F. Löw, 1885, p. 468; Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 306, ⊕; Trotter, 1903^b, p. 15, n° 42. *E-C, I.*

Pirus paradisiaca BORKH.

- Pl. fe.** — Voir n° 2886. **Myzus oxyacanthæ** KOCH 2895
 Schlechtendal, 1890, p. 72, n° 747. *E-C.*
- Voir n° 2892. [**Eriophyes malinus** NAL.] 2896
 F. Löw, 1878, p. 141, n° 17; 1885, p. 468; Schlechtendal, 1890, p. 72, n° 746. *E-C.*

Pirus acerba DC. (**Malus acerba** MÉRAT)

- Pl. fe. — *Erineum malinum* DC. Voir n° 2892. | **Eriophyes malinus** NAL.] 2897
 Hieronymus, 1890, p. 79, n° 160; Schlechtendal, 1890, p. 71, n° 728. E-G.
- Enroulement ou repliement du bord par en bas. **Aphis piri** FONSC. 2898
 Hieronymus, 1890, p. 114, n° 336; Schouteden, 1903, p. 185. E-G.
- Limbe crispé et froissé, avec enroulement par en bas : jeun-
 nes pousses contournées. **Myzus mali** FERRARI 2899
 Schouteden, 1903, p. 185; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 278. F.
- Enroulement marginal serré, à surface rugueuse et de
 teinte jaunâtre; la cavité de la cécidie est remplie de poils
 blancs. **Ériophyide** 2900
 Hieronymus, 1890, p. 79, n° 161; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 74, ⊕; Martel, 1894, E-G.
 p. 6, n° 195. F.

Pirus torminalis DC. (**Sorbus torminalis** CRANTZ)

- Ac. ti. — Voir n° 2908. **Aphis sorbi** KALT. 2901
 Szépligéti, 1890, p. 23; Trotter, 1898, p. 33, n° 62. E-C, I.
- Pl. fe. — Pustules. Voir n° 2871. **Eriophyes piri** PAGENST. 2902
Eriophyes piri PAGENST. var. **variolata** NAL. 2903
 Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 92, ⊕; Rübsaamen, 1895, p. 419, n° 37, pl. XV, 30, ⊕; E-T.
 Nalepa, 1898, p. 25, n° 73-73α; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. III, n° 73, ⊕.
- [*Erineum sorbeum* PERS.], Voir n° 2911. . . . **Ériophyide** 2904
 Fée, 1834, p. 105-106, n° 24; Frank, 1896, p. 48. E-T.

Pirus domestica SMITH

(**P. Sorbus** GERTNER, **Sorbus domestica** L.)

- Pl. fe. — Pustules. Voir n° 2871. [**Eriophyes piri** PAGENST.] 2905
 Liebel, 1886, p. 571, n° 280; 1892, p. 282, n° 256; Rübsaamen, 1902, p. 16, n° 24. E-C, P-B, I.
- A la face inférieure du limbe, rangées de poils anormaux
 le long des nervures. **Ériophyide** 2906
 Kieffer, 1892, p. 143, n° 103. A.

Pirus Aucuparia GERTNER (**Sorbus Aucuparia** L.)

Ac.fl. — Boutons demeurant fermés. **Cécidomyide** 2907

Thomas, 1878, p. 706 ; Schlechtendal, 1890, p. 72, n° 749.

E.-C.

Ac.ti. — A l'extrémité des jeunes rameaux, bouquets de feuilles déformées, crispées et recourbées en arrière. **Aphis sorbi** KALT. 2908

Aphis Fitchi SANDERSON 2908A

Kaltenbach, 1874, p. 216, n° 69 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VI, n° 192, ⊕ ; Schouteden, 1903 b, p. 96 ; Tavares, 1905, p. 103 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 305.

E.-T.
(*ec. E.*)

Pl.fe. — Folioles repliées par en haut, en forme de gousse, sans épaissement ni décoloration ; il y a souvent torsion de la nervure médiane. Larves blanches grégaires. M.T.

Contarinia sorbi KIEFF. 2909

Kieffer, 1888, p. 114 ; Rübсаamen, 1890, p. 52, n° 199 ; Hieronymus, 1890, p. 175, n° 560 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 304 ; Mariani, 1907 b, p. 313, n° 155.

E.-C.
F.I.

— Enroulement marginal par en haut. . . . **Cécidomyide** 2910

Schlechtendal, 1883, p. 6, n° 15 ; 1890, p. 72, n° 751.

A.

— Sur le limbe, et généralement à la face inférieure, amas de poils courts, en massue ou cylindriques, mousses, d'abord blancs, plus tard couleur rouille. *Erineum sorbeum* PERS. (*aucupariae* KUNZE).

Ériophyide 2911

Greville, 1827, pl. CCLXIII, 1, ⊕ ; Fée, 1834, p. 109, n° 31, p. 111, n° 37, pl. III, 2, ⊕ ; Hieronymus, 1890, p. 94, n° 241.

E.-T.

— Pustules. Voir n° 2871. **Eriophyes piri** PAGENST. 2912

Eriophyes piri PAGENST. var. **variolata** NAL. 2913

Hieronymus, 1890, p. 94, n° 240 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 171, ⊕ ; Nalepa, 1898, p. 25, n° 73-73 z ; Lindroth, 1899, p. 18 ; Trotter et Cececoni, 1900, fasc. I, n° 16, ⊕ ; Connold, 1901, pl. XLVI, pl. LXXVI, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 102-103 ; Lagerheim, 1905, p. 11, n° 2.

E.-T.

— A la face inférieure du limbe, rangées de poils anormaux situés le long des nervures.

Ériophyide 2914

Kieffer, 1892 c, p. 143, n° 103.

A.

Pirus Aucuparia GERTNER var. **alpestris** WIMM.

Pl.fe. — Voir n° 2916. **Ériophyide** 2915

Hieronymus, 1890, p. 94, n° 241.

E.-T.

Pirus Chamemespilus DC. (**Sorbus Cham.** CRANTZ)

Pl.fe. — Dans le parenchyme, pustules de 1-2 mm. de diamètre au niveau desquelles le limbe peut atteindre jusqu'à trois fois l'épaisseur normale ; elles ont à la face supérieure une teinte plus claire, d'abord vert jaunâtre, mais qui plus tard devient brunâtre ; il existe une cavité interne avec ouverture épiphylle ou hypophylle. [Eriophyes piri PAGENST.] 2916

Thomas, 1876, p. 264, n° 6 ; Hieronymus, 1890, p. 94, n° 243 ; Dalla Torre, 1892, p. 163 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. XVI, n° 448, ⊕. E-C.

— Cécidie corniculée, de 3-4 mm. de hauteur, saillante à la face supérieure du limbe. Eriophyide 2917

Massalongo, 1893^c, p. 423, n° 21. I.

Pirus Aria ENRI. (**Sorbus Aria** CRANTZ)

Pl.fe. — Feuilles crispées et plissées ; la déformation atteint son maximum sur la feuille supérieure du rameau, qui est complètement repliée et dont la nervure médiane est légèrement convexe vers le dehors, la face inférieure du limbe étant recouverte d'un feutrage blanc pur ; sur les autres feuilles, l'attaque est limitée à une partie de la nervure, le repliement est partiel et le feutrage n'existe que sur les parties attaquées. Cécidomyide 2918

Thomas, 1892^b, p. 6-7, n° 5 ; Dalla Torre, 1892, p. 169 ; Corti, 1902, p. 267, n° 185. E-C, I.

— Pustules sur le limbe. Voir n° 2871. Eriophyes piri PAGENST. 2919

Eriophyes piri PAGENST. var. variolata NAL. 2920

Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 91, ⊕ ; Nalepa, 1898, p. 25, n° 73-73 a ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XI, n° 262, ⊕ ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 305 ; Lagerheim, 1905, p. 11. E-T.

— [*Erineum sorbeum* PERS.¹. Voir n° 2911 . . . Eriophyide 2921

Frank, 1896, p. 48. E-C.


Pirus scandica BABINGTON (**Sorbus scandica** FRIES)

Pl.fe. — Pustules. Voir n° 2871. . . . Eriophyes piri PAGENST.] 2922

Hieronymus, 1890, p. 94, n° 243 ; Corti, 1904, p. 127, n° 109 ; Lagerheim, 1905, p. 11. E-N, E-C.

Pirus meridionalis GUSSENE (**Sorbus græca** Lodd.)

- Pl.fe. — Pustules. Voir n° 2871. . . . **Eriophyes piri** PAGENST. | 2923
 Rübssaamen, 1902^c, p. 325, n° 136. A-M.

**Eriobothrya japonica** LINDL.

- Pl.fe. — Feuilles contournées en spirale avec enroulement lâche
 du bord par en bas. **Aphis eriobothryæ** SCHOUTEDEN | 2924
 Rübssaamen, 1899, p. 273, n° 93; Tavares, 1903^b, p. 182, n° 8; 1905, p. 20; 1905^b, p. 222, n° 36; I.P., m.
 Schouteden, 1903^b, p. 94; 1905, p. 164-165; Massalongo, 1906, p. 28, n° 45.

**Amelanchier vulgaris** MÖNCH (**Aronia rotundifolia** PERS.)

- Ac.bg. — Les bourgeons, normalement coniques, grêles et pointus,
 prennent une forme plus ramassée, plus courte et plus large
 ou deviennent plus ou moins globuleux. Leurs écailles se cou-
 vrent d'une pilosité blanche, à éclat soyeux, formant presque
 feutrage; elles sont élargies, épaissies et moins étroitement
 imbriquées. **Eriophyes calycobius** NAL. | 2925
 Schlechtendal, 1890, p. 69, n° 708; Nalepa, 1898, p. 26, n° 77. E-C.

- Pl.fe. — Feuilles pliées en forme de gousse. . . . **Cécidomyide** | 2926
 Thomas, 1878, p. 704; Dalla Torre, 1892, p. 107. E-C.

- Pustules. Voir n° 2871. . . . **Eriophyes piri** PAGENST. | 2927
 Nalepa, 1898, p. 25, n° 73; Bezzi, 1899, p. 15, n° 10; 1904, p. 16-17; Schlechtendal, 1903,
 p. 117-119. E-S.

Amelanchier vulgaris MÖNCH var. **cretica** DC.

(**A. cretica** LINDL.)

- Pl.fe. — Bords du limbe repliés par en haut parallèlement à la
 nervure médiane, fortement hypertrophiés et pubescents sur
 leur face externe. **Cécidomyide** | 2928
 Trotter, 1903, p. 14, n° 8. A-II.

Amelanchier canadensis MEDIK.]

- Pl.ti. — Minimes bosselettes. **Lestes viridis** VAN DER LIND.] 2929
Rocquigny-Adanson, 1903, p. 56 (parc). F.

Mespilus(y compris le genre *Crataegus*)**Mespilus germanica** L.

- Pl.ti. — Renflement de 7 mm. environ de diamètre, situé à l'extrémité des rameaux. **Sesia** 2930
Cecconi, 1904, p. 83-84. I.
- Pl.fe. — Bord du limbe replié vers la face supérieure, un peu décoloré et rugueux. **Ériophyide** 2931
Trotter, 1903, p. 29, n° 59, pl. I, 8, ⊕. A-M.
- Érinéum rouge situé à la face inférieure du limbe. *Eri-
neum mespilinum* DC. **Ériophyide** 2932
De Candolle, 1815, p. 13, n° 185 a ; Fée, 1834, p. 103, n° 19 ; Frank, 1896, p. 48. E-T.
- Feuilles supérieures des rameaux, enroulées, souvent crispées. **Aphis pomi** DE GEER 2933
Aphis Fitchi SANDERSON 2934
Schouteden, 1903, p. 178 ; 1903^b, p. 95-96 ; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 273 ; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n° 60, ⊕. A, B, F.

Mespilus coccinea WILLD. (**Crataegus coccinea** L.)

- Pl.fe. — Limbes courbés. **Aphis Fitchi** SANDERSON 2935
Schouteden, 1903^b, p. 95-96.

Mespilus Azarolus ALL. (**Crataegus Azarolus** L.)

- Ac.ti. — Rosette de feuilles. Voir n° 2942. **Perrisia cratægi** WINN. 2936
Trotter, 1903, p. 20, n° 26. A-M.

Pl.fe. — Limbe hypertrophié légèrement et replié.

Myzus mali FERRARI 2937

Stefani, 1901, p. 44^e, n° 4 ; 1906, p. 107, n° 22.

si.

— A la face inférieure surtout, nervures contournées, de teinte plus claire que le reste du limbe qui se montre déformé.

[**Acarien**] 2938

Trotter, 1907^b, p. 25-26, n° 6 ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVI, n° 399, ⊕.

I.

Mespilus Oxyacantha GERTNER (**Crataegus Oxyacantha** L.)

(**C. oxyacanthoides** THUILL., **C. monogyna** JACQ.)

Ac.fl. — Ovaire faiblement renflé. . . . **Anthonomus pomorum** L. 2939

F. Löw, 1877, p. 17 ; Schlechtendal, 1890, p. 70, n° 720 ; Liebel, 1892, p. 7, n° 57.

E-C.

— Ovaire gonflé, gibbeux, ou bien à surface irrégulièrement mamelonnée, dur, uniloculaire ; corolle non épanouie, desséchée. Larves blanches. M.T.

Cécidomyide 2940

Pierre, 1905, p. 154-155.

F.

— Fleurs gonflées demeurant fermées. Larves d'un jaune d'ivoire.

Contarinia anthobia F. Löw 2941

F. Löw, 1877, p. 16-17 ; Tavares, 1905, p. 12 ; Pierre, 1905, p. 115.

E-C, E, P.

Ac.ti. — A l'extrémité des pousses, agglomération de feuilles dressées ou étalées en rosette (fig. 769), déformées, couvertes de petites saillies vertes ou rouges (fig. 770). Larves grégaires rougeâtres. M.T. Adulte printemps II. **Perrisia cratægi** WINN. 2942

Massalongo, 1893, p. (83-84), n° 46, pl. XII, t. 2, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 63, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. III, n° 61, ⊕ ; Connold, 1901, pl. LXXIX, ⊕ ; Tavares, 1905, p. 12, pl. XIV, 11, ⊕.

E-T.

A-M.

Ac.bg. — Bourgeon légèrement hypertrophié, ne s'épanouissant pas.

Eriophyes calycobius NAL. 2943

Eriophyes cratægi CAN. 2944

Liebel, 1886, p. 541, n° 75 ; Lemée, 1902, p. (42), n° 183 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 253.

E-C.

* Ces deux cécidozoaires sont accompagnés par *Epirimerus armatus* Can. (Nalepa, 1898, p. 26, n° 76-77, p. 64-65, n° 11). Voir aussi le n° 2952.

E-O.

— Bourgeon foliaire non épanoui et transformé en une masse arrondie de petites feuilles fortement plissées dont les plus

externes constituent une sorte de capote qui enveloppe une coque résistante composée de feuilles mortifiées, agglutinées.

[*Anthonomus rosinae* DES GOZIS] 2945

Cecconi, 1902^b, p. 346-347, n° 10 ; Pierre, 1903, p. 44 ; 1905, p. 153-154 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 253. *I.F.*

Pl.ti. — Minimes bosselettes. *Lestes viridis* VAN DER LIND. 2946

Pierre, 1902, p. 185 ; Lemée, 1902, p. (42-43), n° 191 ; 1903^b, p. 32-33. *F.*




Crataegus Oxyacantha

Perrisia crataegi (n° 2942)
Fig. 769 (a). — D'ap. nat.
Fig. 770 (b). — D'ap. nat.



Crataegus Oxyacantha

Eriophyes goniothorax (n° 2948)
Fig. 771 (a). — D'ap. nat.
Fig. 772 (b). — D'ap. nat.



Crataegus Oxyacantha

Myzus oxyacanthae (n° 2953)
Fig. 773 (a). — D'ap. nat.
Fig. 774 (b). — D'ap. nat.

-- Rameau présentant une partie renflée dont l'épiderme est brun et se détache avec facilité ; pétiole de la feuille parfois attaqué. M. C.

[*Cécidomyide*] 2947

Rudow, 1875, p. 90 ; Bergenstamm et Löw, 1876, p. 96, n° 577 ; Schlechtendal, 1890, p. 70, n° 721. *A.*

- Pl.fe. {
 Bord du limbe épaissi et étroitement enroulé A.
 Surface du limbe pustuleuse, soulevée ou brunie B.
 Limbe crispé avec bosselures colorées en jaune ou en rouge vif. C.
 Limbe crispé, enroulé, mais de teinte normale D.

A. — Feuilles présentant sur leurs bords un enroulement marginal par en bas, à tours serrés (fig. 771), cachant un amas de poils bruns, courts et en forme de massue (fig. 772). *Erineum clandestinum* GREY. (*oxyacanthae* PERS.).

Eriophyes goniothorax NAL. 2948

Fée, 1834, p. 124-125, n° 68, pl. III, 3, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. I, n° 5, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. X, n° 281, ⊕; 1902, fasc. XI, n° 305, ⊕; Connold, 1901, pl. LIII, LXXVI, A, ⊕; Tavares, 1905, p. 12, pl. XIII, 18, 31, ⊕. E-T.

— Enroulement marginal du limbe. Larves grégaires rouges.

Cécidomyide 2949

Schrank, 1803; Kieffer, 1901^b, p. 299. E-G.

B. — Petites pustules sublenticulaires, faisant surtout saillie à la face supérieure, ouvertes à la face inférieure.

Eriophyes cratægi CAN. 2950

Thomas, 1893^b, p. 7; Nalepa, 1898, p. 26, n° 76; Connold, 1901, pl. L, ⊕.

E-T (ecc. E).

— Petit soulèvement coloré en rouge carmin.

Psylla cratægi SCHRANK 2951

Frauenfeld, 1864, p. 691; Kaltenbach, 1874, p. 213, n° 99; Dalla Torre, 1892, p. 118, a.

E-C.

— Limbe brun. **Epitrimerus armatus CAN. 2952**

Nalepa, 1898, p. 64, n° 11; 1903, p. 294; 1905, p. 143, pl. III, 7-8; Schlechtendal, 1903, p. 129.

A.

C. — Feuilles déformées isolées en général (fig. 773-774). Souvent le limbe se rabat le long de la nervure médiane, formant ainsi une sorte de poche bosselée. Pucerons aptères isolés ou en sociétés fort peu nombreuses. Puceron brun noir.

Myzus oxyacanthæ KOCH 2953

Kaltenbach, 1874, p. 212, n° 96; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. X, n° 280, ⊕; Molliard, 1899^b, p. 501-503, fig. 4, ⊕.

E-T.

— Feuilles déformées le plus souvent groupées en amas terminaux. Pucerons aptères en sociétés nombreuses. Puceron brunâtre ou verdâtre; région des cornicules rougeâtre.

Aphis piri FONSC. (cratægi KALT.) 2954

Kaltenbach, 1843, p. 66; 1874, p. 212, n° 94; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. III, n° 60, ⊕; Schouteden, 1903, p. 173.

E-T.

D. — Puceron vert à cornicules de même teinte, l'extrémité seule de ces cornicules étant noire. **Aphis cratægi BUCKTON 2955**

Buckton, 1879, p. 35-37, pl. XLVII, 1-3; Schouteden, 1903, p. 173; 1903^b, p. 93.

E-O.

— Puceron à corps piriforme, vert ou jaune; cornicules droits s'amincissant graduellement vers l'extrémité distale.

Aphis pomi DE GEER 2956

Passerini, 1862, p. 163, n° 19; Schouteden, 1903, p. 173; 1903^b, p. 93; Tavares, 1905, p. 12.

E-O, P.I.

— Puceron à corps ovalaire vert, le dos présentant des aires plus sombres ; cornicules légèrement renflés, évasés à l'extrémité. **Aphis Fitchi** SANDERSON 2957

Sanderson, 1902 ; Schouteden, 1903^b, p. 93. E-O.

— Puceron à corps globuleux ou ovalaire, pulvérulent, de couleur variable : gris noir, vert bleuâtre, saumon, etc. ; cornicules droits ou légèrement arqués. **Aphis sorbi** KALT. 2958

Sanderson, 1902 ; Schouteden, 1903^b, p. 93. E-O.

Mesplus (Crataegus) orientalis POIR.

Pl.fe. — Galles corniculées faisant saillie à la face supérieure du limbe. **Ériophyide** 2959

Foeken, 1892, p. 160 ; 1897, p. 9. SY.

— Sur le limbe ou le pétiole des feuilles de la partie terminale des jeunes rameaux, galles globuleuses, de forme plus ou moins régulière, pluriloculaires, de la grosseur d'un pois et souvent agglomérées (fig. 782, p. 529). **Insecte** 2960

Foeken, 1895, p. 501, pl. XVI, 1, ⊕ ; 1897, p. 33. SY.

— Pustules du limbe. **Ériophyide** 2961

Trotter, 1903^c, p. 30. R.



Rubus

Ac.fl. — Bouton ballonné, demeurant fermé. **Anthonomus rubi** HERBST Ru.1

Rubus ulmifolius var. *dalmatinus*, *rusticanus*.

— Fleurs gonflées, demeurant fermées. . . . **Cécidomyide** Ru.2

Rubus rusticanus.

— Ovaire épaissi. [**Trypeta centaureæ** MEIGEN] Ru.3

Rubus Idæus.

Plrc. { Sur tiges ou pétioles. A.
 { Déformation totale du limbe. B.
 { Déformation locale du limbe. C.

A. — Renflement de forme très allongée, pouvant atteindre 100

mm., à surface mamelonnée (fig.775-778); chaque mamelon correspond à une chambre larvaire de forme ovoïde, à contour très net (fig.776).


Diastrophus rubi HARTIG Ru.4

Rubus anchostachys, anisodon, corsius, cuneatus, discolor, fruticosus, Gilloti, hedycarpus, heteromorphus, Idoeus, pallescens, propinquus, subcatus, ulmifolius.

— Renflement un peu allongé, mesurant 30 mm. sur 20 mm. en moyenne; surface rugueuse et écorce éclatée (fig.779); cavités larvaires irrégulières (fig.780). Larves grégaires blanches.M.C.H.

Lasioptera rubi HEEGER Ru.5

Rubus assurgens, corsius, corylifolius, discolor, fruticosus, Gilloti, hedycarpus, Idoeus, ligerimus, nivalis, suberectus, thyrsoides, Wahlenbergi.



Rubus. — Ru. 4
Diastrophus rubi

- Fig. 775 (a). — D'ap. nat.
- Fig. 776 (b). — D'ap. nat.
- Fig. 777 (c). — D'ap. nat.
- Fig. 778 (d). — D'ap. nat.

Rubus. — Ru 5 et Ru. 7
Lasioptera rubi
Perrisia plicatricæ

- Fig. 779 (a). — D'ap. nat.
- Fig. 780 (b). — D'ap. nat.
- Fig. 781 (c). — Im. H. Löw

— Renflement local peu marqué.

Agrilus chrysoderes AB. var. *rubicola* AB. Ru.5'

Rubus fruticosus, Idoeus.

— Minimes bossettes. **Lestes viridis** VAN DER LIND. Ru.6

Rubus sp.

B. — Limbe épaissi le long de la nervure médiane et plissé (fig. 781). Larves grégaires blanches. M.T.H.

Perrisia plicatrix H.LÖW Ru.7

Rubus cirsius, fruticosus, Idæus, vestitus, villicaulis.

— Feuilles plus ou moins plissées, à nervure tordue ; le limbe est décoloré et devenu glabre par places.

Eriophyes gracilis NAL. Ru.8

Rubus cirsius, discolor, Idæus.

— Les deux moitiés du limbe, fortement tordues, se rabattent incomplètement vers le bas en tournant autour de la nervure médiane.

Nectarosiphum rubi KALT. Ru.9

Rubus fruticosus, Idæus, saxatilis.

— Limbe des feuilles terminales crispé, plus ou moins enroulé. Puceron vert foncé, marbré de clair.

Aphis urticæ FABR. Ru.10

Rubus fruticosus, Rubus sp.

C. — Renflement ovoïde, de 1,5 mm. de longueur, généralement axillaire, de teinte jaunâtre, renfermant une larve blanche qui sort en juin de la cécidie pour se nourrir de feuilles. M.T.

Tenthredinide Ru.11

Rubus villosus.

— Sur une des faces du limbe, petites cécidies, subglobuleuses ou ovoïdes, plus ou moins rugueuses, de 1-2 mm. de diamètre, s'ouvrant à la face opposée par une ouverture portée sur une saillie à peine sensible et entourée de poils ; cavité irrégulière, à parois un peu épaissies, subdivisée par des crêtes centripètes.

Eriophyes silvicola CAN. Ru.12

Rubus arcticus, saxatilis.

— A la face inférieure de la feuille, amas de poils situés dans une dépression, à laquelle correspond une boursofflure de la face opposée.

Eriophyes rubicolens CAN. Ru.13

Rubus cirsius, fruticosus, glandulosus, saxatilis, tomentosus.

— Sur toutes les parties vertes de la plante, feutrage anormal, à éclat soyeux, gris blanchâtre ; poils cylindriques, effilés à la pointe. *Phyllerium rubi* FRIES.

Eriophyes gibbosus NAL. Ru.14

Rubus amurens, Banningii, bifrons, Blondini, Bloxami, cirsius, Caldasiensis, can-

dicans, corylifolius, Coutinhi, crassus, discreptus, fissus, fruticosus, fusco-ater, fuscus, Grenlii, Henriquesi, horridus, Idarus, incultus, Köhleri, longithyrstiger, macrophyllus, nitidus, rhomnifolius, rudis, saltuum, scanicus, serpens, suberectus, sulcatus, tardiflorus, ulmifolius, vagabundus, vestitus.

— Déformation locale du limbe. . . **Trioza tripunctata** F.LÖW Ru.13

Rubus fruticosus.

Rubus Idaeus L.

- Ac.fl.** — Ru.3. [**Trypeta centaureæ** MEIGEN] 2962
Schlechtendal, 1890, p. 73, n° 772 ; Kieffer, 1901^b, p. 482. A.
- Plrc.** — Ru.4. **Diastrophus rubi** HARTIG 2963
Mayr, 1876, p. 14-15, n° 11 ; Cecconi, 1901^c, p. 743, n° 108 ; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 294. E-C, I.F.
- Ru.5. **Lasioptera rubi** HEEGER 2964
F.Löw, 1874^b, p. 156 ; Hieronymus, 1890, p. 160-161, n° 504 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 165. ⊕ ; Corti, 1902, p. 255, n° 170. E-C, I.F.
- Ru.5'. **Agrilus chrysoderes** AB. var. **rubicola** AB. 2965
P. Marchal et Vercier, 1906. F.
- Ru.7. **Perrisia plicatrix** H.LÖW 2966
Schlechtendal, 1890, p. 74, n° 778 ; Dalla Torre, 1895, p. 155. E-C.
- Ru.8. **Eriophyes gracilis** NAL. 2967
Schlechtendal, 1890, p. 74, n° 779 ; Hieronymus, 1890, p. 86, n° 202 ; Lagerheim, 1903, p. 340. A.
- Ru.9. **Nectarosiphum rubi** KALT. 2968
Rübsaamen, 1901, p. 128, n° 182. A.
- Ru.14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 2969
Hieronymus, 1890, p. 86, n° 201 ; Schlechtendal, 1895, p. 31. A.

Rubus suberectus ANDERS.

- Plrc.** — Ru.5. **Lasioptera rubi** HEEGER 2970
Hieronymus, 1890, p. 161, n° 507 ; Kieffer, 1901^b, p. 482. A.
- Ru.14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 2971
Thomas, 1877, p. 350 (note 1) ; F.Löw, 1887, p. 32 ; Kieffer, 1901^b, p. 482-483. A, S.C.

Robus fissus LINDL.

Plrc. — Ru.14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 2972
 F.Löw, 1887, p. 32 ; Kieffer, 1901^b, p. 482-483. A.

Robus sulcatus VEST

Plrc. — Ru.4. **Diastrophus rubi** HARTIG 2973
 C. Marchal et Chateau, 1903, p. 389, n° 20. F.
 — Ru.14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 2974
 Hieronymus, 1890, p. 87, n° 205 ; Schlechtendal, 1895, p. 31. A.

Robus fruticosus L. (**R. plicatus** WEIHE et NEES)

Plrc. — Ru.4. **Diastrophus rubi** HARTIG 2973
 Mayr, 1876, p. 14-15, n° 11 ; Dalla Torre, 1892, p. 151 ; Connold, 1901, pl. XL. ⊕. E-C, F, I-B.
 — Ru.5. **Lasioptera rubi** HEEGER 2976
 Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 94, ⊕ ; Connold, 1901, pl. XXXI, pl. CXVII, A. ⊕. E-C, E-O, I.
 — Ru.5'. **Agrilus chrysoderes** AB. var. **rubicola** AB. 2977
 P. Marchal et Vercier, 1906. F.
 — Ru.7. **Perrisia plicatrix** H. LÖW 2978
 Hieronymus, 1890, p. 161, n° 506 ; Trotter, 1903^b, p. 19, n° 51 ; Stefani, 1903, p. 104-105, n° 20. E-C, I.
 — Ru.9. **Nectarosiphum rubi** KALT. 2979
 Rübsaamen, 1901, p. 128, n° 181. A.
 — Ru.10. **Aphis urticae** FABR. 2980
 Rübsaamen, 1901, p. 128, n° 180. A.
 — Ru.13. **Eriophyes rubicolens** CAN. 2981
 Canestrini, 1891, p. 140 ; Nalepa, 1898, p. 28, n° 83. I.
 — Ru.14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 2982
 F.Löw, 1885, p. 458 ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VIII, n° 186, ⊕. E-C, I.
 — Ru.15. **Trioza tripunctata** F. LÖW 2983
 F.Löw, 1877^b, p. 123 ; 1888, p. 21 ; Dalla Torre, 1892, p. 151. E-C.

Rubus nitidus WEIHE

- Plc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 2984
 F.Löw, 1887, p. 32 ; Kieffer, 1901 b, p. 482-483. A.

Rubus Banningii FÖCKE

- Plc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 2985
 F.Löw, 1887, p. 32 ; Kieffer, 1901 b, p. 482-483. A.

Rubus rhamnifolius WEIHE et NEES

- Plc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 2986
 F.Löw, 1887, p. 32 ; Kieffer, 1901 b, p. 482-483. A.

Rubus thyrsoides WIMM.

- Plc. — Ru. 5. **Lasioptera rubi** HEEGER 2987
 Massalongo, 1893, p. (129), n° 93, pl. XX, 1-2, ⊕. I.

Rubus caudicans WEIHE

- Plc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 2988
 F.Löw, 1887, p. 32 ; Kieffer, 1901 b, p. 482-483. A-H.

Rubus discolor WEIHE et NEES

- Plc. — Ru. 4. **Diastrophus rubi** HARTIG 2989
 Darboux, 1902 b, p. 33. F.
 — Ru. 5. **Lasioptera rubi** HEEGER 2990
 Misciattelli, 1895 c, p. 121, n° 37 ; Baldrali, 1900, p. 60, n° 147 ; Darboux, 1902 b, p. 33. F, I.
 — Ru. 8. **Eriophyes gracilis** NAL. 2991
 Misciattelli, 1899, p. 28, n° 54. I.

Rubus rusticanus MERC.

- Ae.fl. — Ru. 1. **Anthonomus rubi** HERBST 2992
 Pierre, 1905, p. 170. F.

— Ru. 2. **Cécidomyide** 2993
 Pierre, 1905, p. 170. *F.*

Rubus ulmifolius SCHOTT

Plrc. — Ru. 4. **Diastrophus rubi** HARTIG 2994
 G. Marchal et Chateau, 1905, p. 294. *F.*

— Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 2995
 Thomas, 1877, p. 350 (note 1) ; Kieffer, 1901 b, p. 482-483 ; Tavares, 1905, p. 89-90. *E-C, P.*

Rubus ulmifolius SCHOTT var. **dalmatinus** TRATT.

Ac. fl. — Ru. 1. [**Anthonomus rubi** HERBST] 2996
 Trotter, 1907 c, p. 105, n° 12. *I.*

Rubus hedycarpus FOCKE

Plrc. — Ru. 4. **Diastrophus rubi** HARTIG 2997
 G. Marchal et Chateau, 1903, p. 389, n° 19 ; 1905, p. 294. *F.*

— Ru. 5. **Lasioptera rubi** HEEGER 2998
 G. Marchal et Chateau, 1903, p. 389, n° 19 ; 1905, p. 294. *F.*

Rubus amoenus PORT.

Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 2999
 Hieronymus, 1890, p. 86, n° 199 ; Schlechtendal, 1895, p. 31. *S.*

Rubus bifrons VEST

Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3000
 Tavares, 1905, p. 89-90. *P.*

Rubus villicaulis KÖHLER

Plrc. — Ru. 7. **Perrisia plicatrix** H. LÖW 3001
 Hieronymus, Pax, etc., fasc. IV, n° 141, ⊕. *E-C.*

Rubus macrophyllus WEIHE ET NEES

- Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3002
 Thomas, 1877 p. 350 (note 1) ; F. Löw, 1887, p. 32 ; Kieffer, 1901^b, p. 482-483. A.

Rubus Gremlii FOCKE

- Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3003
 F. Löw, 1885, p. 453 ; Kieffer, 1901^b, p. 482-483. E-G.

Rubus scanicus ARESCH.

- Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3004
 F. Löw, 1887, p. 32 ; Kieffer, 1901^b, p. 482-483. E-N.

Rubus vestitus WEIHE ET NEES

- Plrc. — Ru. 7. **Perrisia plicatrix** H. LÖW 3005
 Rostrup, 1896, p. 39, n° 252. D.
 — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3006
 F. Löw, 1887, p. 23 ; Kieffer, 1901^b, p. 482-483. A-F.

Rubus villosus LASCH.

- Plrc. — Ru. 11. **Tenthredinide** 3007
 Kieffer, 1892^e, p. 74, n° 542 ; 1901^b, p. 482. A.

Rubus rudis WEIHE ET NEES

- Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3008
 Kieffer, 1901^b, p. 482-483.

Rubus saltuum FOCKE

- Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3009
 F. Löw, 1887, p. 32 ; Kieffer, 1901^b, p. 482-483. S.

Rubus horridus HARTM.

Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3010
F.Löw, 1887, p. 32; Kieffer, 1901^b, p. 482-483. *SL.*

Rubus Bloxami BOREAU

Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3011
F.Löw, 1887, p. 32; Kieffer, 1901^b, p. 482-483. *F.*

Rubus fuscus WEIHE et NEES

Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3012
Thomas, 1877, p. 350 (note 1); Kieffer, 1901^b, p. 482-483. *E-G.*

Rubus longithyriger BABINGTON

Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3013
Tavares, 1905, p. 89-90. *P.*

Rubus fusco-ater WEIHE et NEES

Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3014
Thomas, 1877, p. 350 (note 1); Kieffer, 1901^b, p. 482-483. *E-G.*

Rubus Kochleri WEIHE et NEES

Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3015
Thomas, 1877, p. 350 (note 1); F.Löw, 1887, p. 32; Kieffer, 1901^b, p. 482-483. *E-G.*

Rubus serpens WEIHE

Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3016
F.Löw, 1887, p. 32; Kieffer, 1901^b, p. 482-483. *A.*

Rubus incultus WIRTIG

Plrc. — Ru. 14. **Eriophyes gibbosus** NAL. 3017
Thomas, 1877, p. 350 (note 1); Kieffer, 1901^b, p. 482-483. *E-G.*

Rubus glandulosus BELL.

- Plc. — Ru.13. Eriophyes rubicolens CAN. 3018
 Massalongo, 1893^c, p. 425, n° 27. *I.*

Rubus Wahlbergii ARRH.

- Plc. — Ru.5. Lasioptera rubi HEEGER 3019
 Rostrup, 1896, p. 39, n° 253. *D.*

Rubus crassus HOLUBY

- Plc. — Ru.14. Eriophyes gibbosus NAL. 3020
 Thomas, 1877, p. 350 (note 1). *E-C.*

Rubus corylifolius SMITH

- Plc. — Ru.5. Lasioptera rubi HEEGER 3021
 Massalongo, 1893, p. (128-129), n° 97, pl. XIV, 2-3, ⊕. *I.*
 — Ru.14. Eriophyes gibbosus NAL. 3022
 Fée, 1834, p. 111, n° 36; Thomas, 1877, p. 350 (note 1). *E-C.*

Rubus caesus L.

- Plc. — Ru.4. Diastrophus rubi HARTIG 3023
 Giraud, 1859, p. 369; Mayr, 1876, p. 14-15, n° 11, pl. II, 11, ⊕; Massalongo, 1893, p. (218-219), n° 166, pl. I, 8, ⊕; Rostrup, 1896, p. 39, n° 250; Jürgensen, 1906, p. 107-108, n° 38, pl. II, (*ecc.E*), 35, ⊕. *E-T*
 — Ru.5. Lasioptera rubi HEEGER 3024
 Hieronymus, 1890, p. 160, n° 563; Baldrati, 1900, p. 60, n° 146; Corti, 1903^b, p. 369, n° 163. *E-C, E-O, I.*
 — Ru.7. Perrisia plicatrix H. LÖW 3025
 Bergenstamm et Löw, 1876, p. 63, n° 341; Baldrati, 1900, p. 59, n° 145; Kieffer, 1900^c, pl. XXXV, 1, ⊕. *E-C, E-O, I.*
 — Ru.8. Eriophyes gracilis NAL. 3026
 Schlechtendal, 1890, p. 74, n° 779. *E-C.*
 — Ru.13. Eriophyes rubicolens CAN. 3027
 Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 83, ⊕. *E-C.*

— Ru.14. *Eriophyes gibbosus* NAL. 3028
 F.Löw,1881,p.5-6; Hieronymus,1890,p.86,n° 200. *E-C.*

Rubus assurgens BOULAY et BOUV. (*R. caesius* × *ulmifolius*)

Plrc. — Ru.5 *Lasioptera rubi* HEEGER 3029
 C. Marchal et Chateau,1903,p.389,n° 30. *F.*

Rubus saxatilis L.

Plrc. — Ru.9. *Nectarosiphum rubi* KALT. 3030
 Dalla Torre,1895,p.155. *E-C.*

— Ru.12. *Eriophyes silvicola* CAN. 3031
 Hieronymus,1890,p.87,n° 204; Rübsaamen,1895,p.415,n° 32,pl.XV,15-16,⊕. *N,E-C,
 R,I.*

Rubus arcticus L.

Plrc. — Ru.12. *Eriophyes silvicola* CAN. 3032
 Massalongo,1899,p.163-164; Lindroth,1899,p.19; Lagerheim,1905,p.11. *E-N.*

Rubus anchostachys RIPART

Plrc. — Ru.4. *Diastrophus rubi* HARTIG 3033
 C. Marchal et Chateau,1903,p.389,n° 24. *F.*

Rubus anisodon SUDRE

Plrc. — Ru.4. *Diastrophus rubi* HARTIG 3034
 C. Marchal et Chateau,1903,p.389,n° 25. *F.*

Rubus Blondæi RIPART

Plrc. — Ru.14. *Eriophyes gibbosus* NAL. 3035
 F.Löw,1887,p.32; Kieffer,1901^b,p.482-483. *F.*

Rubus Caldasianus SAMP.

Plrc. — Ru.14. *Eriophyes gibbosus* NAL. 3036
 Tavares,1905,p.89-90. *P.*

Rubus Coutinhoi SAMP.

- Plrc. — Ru.14. Eriophyes gibbosus NAL. 3037
Tavares, 1905, p.89-90, pl.XIV, 7, ⊕. P.

Rubus cuneatus BOULAY

- Plrc. — Ru.4. Diastrophus rubi HARTIG 3038
G.Marchal et Chateau, 1903, p.389, n°26. F.

Rubus discerptus MÜLLER

- Plrc. — Ru.14. Eriophyes gibbosus NAL. 3039
Tavares, 1905, p.89-90. P.

Rubus Gillotti BOULAY

- Plrc. — Ru.4. Diastrophus rubi HARTIG 3040
G.Marchal et Chateau, 1903, p.389, n°22 ; 1905, p.294. F.

- Ru.5. Lasioptera rubi HEEGER 3041
G.Marchal et Chateau, 1903, p.389, n°22 ; 1905, p.294. F.

Rubus Henriquesi SAMP.

- Plrc. — Ru.14. Eriophyes gibbosus NAL. 3042
Tavares, 1905, p.89-90. P.

Rubus heteromorphus RIPART

- Plrc. — Ru.4. Diastrophus rubi HARTIG 3043
G.Marchal et Chateau, 1903, p.389, n°27. F.

Rubus ligerimus GEN.

- Plrc. — Ru.5. Lasioptera rubi HEEGER 3044
G.Marchal et Chateau, 1903, p.389, n°28. F.

Rubus nivalis GEN.

Plrc. — Ru.5. *Lasioptera rubi* HEEGER 3045
 C.Marchal et Chateau, 1903, p.389, n° 29. F.

Rubus pallescens RIPART

Plrc. — Ru.4. *Diastrophus rubi* HARTIG 3046
 C.Marchal et Chateau, 1903, p.389, n° 23. F.

Rubus tomentosus BORKH.

Plrc. — Ru.13 [*Eriophyes rubicolens* CAN.] 3047
 Massalongo, 1891^b, p.480, n° 27. I.

Rubus propinquus MÜLLER

Plrc. — Ru.4. *Diastrophus rubi* HARTIG 3048
 C.Marchal et Chateau, 1903, p.389, n° 21. F.

Rubus tardiflorus FOCKE

Plrc. — Ru.14. *Eriophyes gibbosus* NAL. 3049
 F.Löw, 1887, p.32; Kieffer, 1901^b, p.482-483. S.

Rubus vagabundus SAMP.

Plrc. — Ru.14. *Eriophyes gibbosus* NAL. 3050
 Tavares, 1905, p.89-90. P.

Rubus sp.

Plrc. — Ru.6. *Lestes viridis* VAN DER LIND. 3051
 Pierre, 1902, p.185. F.

— Ru.10. *Aphis urticae* FABR. 3052
 Schouteden, 1903, p.186; Tavares, 1905, p.89. B.P.



Fragaria collina EHRH.

Pl.fe. — A la face supérieure du limbe, petits tubercules rouges pouvant atteindre 1,5 mm. de haut, couverts d'une pilosité blanche peu abondante ; l'ostiole hypophylle est entouré d'un bourrelet rouge carmin et fermé par des poils fins ; la cavité de la cécidie est glabre. On peut aussi trouver ces galles sur les sépales et les pétales.

Phylloctes setiger NAL. 3053

F.Löw, 1879, p. 718, n° 9 ; Hieronymus, 1890, p. 71, n° 98 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 68, ♂ ; Lagerheim, 1905, p. 7. E-T.

Fragaria clatior EHRH.

Pl.fe. — Voir n° 3053. [**Phylloctes setiger** NAL.] 3054

Szépligéti, 1895, p. 218, n° 99. A-H.



Cratægus orientalis
Insecte (n° 2960)
Fig. 782. — Im. FOCKER



Fragaria vesca
Aphelenchus fragariae (n° 3055)
Fig. 783 (a) . — Im. RITZ.-B.
Fig. 784 (b). — Im. RITZ.-B.



Sanguisorba minor
Eriophyes sanguisorber (n° 3103)
Fig. 785 . — D'ap. nat.

Fragaria vesca L.

Ac.ti. — Tige fortement épaissie (fig. 783-784), abondamment ramifiée et portant de nombreux bourgeons ; les rameaux anormaux sont très élargis, quelquefois fasciés ; en général ils

HOUARD, Zoocécidies.

demeurent séparés et la plante prend l'aspect d'un chou-fleur ; les feuilles sont plus ou moins anormales, toujours formées d'un seul lobe au lieu de trois. Le nématode vit dans les tissus.

Aphelenchus fragariæ RITZ.-B. 3055

Ritzema-Bos, 1891^b, p. 1-11, pl. I, 1-6, ⊕ ; Frank, 1896, p. 33.

I-B.

— Cécidie semblable à la précédente dans ses traits généraux, mais les parties épaissies de la tige sont blanches et les feuilles sont en partie jaunâtres ; les racines sont peu abondantes. Les nématodes vivent entre les gaines et la tige.

Aphelenchus Ormerodis RITZ.-B. 3056

Ritzema-Bos, 1891^b, p. 11-15, pl. I, 7-8, ⊕ ; Frank, 1896, p. 33.

I-B.

Pl.fe. — Voir n° 3053. [**Phyllocoptes setiger** NAL.] 3057

F.Löw, 1874, p. 9, n° 18 ; Rubsaaenen, 1895, p. 408, n° 18, pl. XV, 20, ⊕.

E-C, R.

— Déformation du limbe. **Tarsonemus fragariæ** ZIMM. 3058

H. Zimmermann, 1905, p. 91-102, 1 pl. ; Reuter, 1905, p. 136-140, n° 1, fig. 1, ⊕.

E-C, R.



Potentilla caulescens L.

Plc. — Voir n° 3075. [**Eriophyes parvulus** NAL.] 3059

Thomas, 1877, p. 357, n° 3 ; Dalla Torre, 1892, p. 145 ; 1895, p. 151.

E-C.

Potentilla reptans L.

Ac.bg. — Cécidie semblable à la suivante, mais formée aux dépens d'un bourgeon. **Xestophanes potentillæ** RETZ. 3060

Pl.ti. — Sur le stolon, la tige (ou plus rarement le pétiole, fig. 786), renflement arrondi de 3-5 mm. de diamètre ; en général de pareilles cécidies sont agglomérées et forment, par coalescence, un renflement fusiforme pouvant atteindre 35 mm. de long sur 15 mm. de diamètre (fig. 787) ; les renflements âgés ont leur surface fendillée. Dans chaque loge une larve. M.C. Maijuin H. **Xestophanes potentillæ** RETZ. 3061

Mayr, 1876, p. 12-13, n° 9, pl. II, 9, ⊕ ; Massalongo, 1893, p. 242-243, n° 192, pl. XXXI, 4-5, ⊕ ;

E-I.

Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 163, ⊕ ; Connold, 1901, pl. XLIV, ⊕ ; Houard, 1903^c, p. 278-291, fig. 208-228, ⊕ ; Darboux et Houard, 1907, p. 252-253, n° 85, pl. XXV, 1, ⊕.

- Pl. fe.** — Voir n° 3075. **Eriophyes parvulus** NAL. 3062
Liebel, 1886, p. 554, n° 175 ; Schlechtendal, 1890, p. 73, n° 771 ; Nalepa, 1898, p. 27, n° 80. A, F.

Potentilla Tormentilla SIBTH.

(**Potentilla silvestris** NECK., **Tormentilla erecta** L.)

- Pl. ti.** — Petit renflement unilatéral formant une minime saillie arrondie. M. T. Cécidomyide 3063

Schlechtendal, 1890, p. 73, n° 769 ; Kieffer, 1901^b, p. 395. A.

— Sur un stolon (ou plus rarement sur un pétiole), renflement ovoïde ou sphérique sous-cortical, atteignant 3 mm. de diamètre environ ; de semblables cécidies peuvent se trouver groupées, mais ne sont jamais fusionnées.

Xestophanes brevitarsis THOMS. 3064

Schlechtendal, 1880, p. 176-178 ; Thomas, 1893, p. 294, n° 2 ; Connold, 1901, pl. XLIII, ⊕ ; Houard, 1902^b, p. 44, n° 37 ; Tavares, 1905, p. 45, pl. IV, 5, ⊕. E, T (exc. E).

- Tige épaissie. **Coccide** 3065

Pierre, 1902^b, p. 95. F.

- Rameaux et pédoncules floraux courbés. . . **Aphide** 3066

Tavares, 1907^b, p. 122. P.

- Pl. fe.** — Voir n° 3075. [**Eriophyes parvulus** NAL.] 3067

Hieronymus, 1890, p. 82, n° 178 ; Schlechtendal, 1890, p. 73, n° 771 ; Lindroth, 1899, p. 18. R, A.

- [Feuilles languissantes. Puceron foncé, queue et cornicules de même longueur. **Aphis tormentillæ** PASS.] 3068

Schouteden, 1903, p. 189. I.

Potentilla procumbens SIBTH.

- Pl. rc.** — Voir n° 3064. **Xestophanes brevitarsis** THOMS. 3069

Kieffer, 1898^e, p. 99, n° 75 ; Tavares, 1902^b, p. 86, n° 5. F, A-H.

Potentilla rupestris L.

- Pl. fe.** — Pustules jaunâtres sur le limbe. **Hémiptère** 3070

Dalla Torre, 1892, p. 145 ; Schlechtendal, 1895, p. 31. E-C.

Potentilla recta L.

Pl.c. — Sur la tige, le pétiole ou même les nervures, petites bosselures ovoïdes ou fusiformes, groupées en séries (fig. 788) et correspondant chacune à une petite cécidie, de la grosseur d'un grain de chènevis, située sous la couche corticale.


Cynipide 3071

Kieffer, 1897 b, p. 70, n° 25, pl. VII, 5, ⊕; Corti, 1903 b, p. 361, n° 103.


A-H.J.



Potentilla reptans
Xestophanes potentillar (n° 3061)
Fig. 786 (a). — D'ap. nat.
Fig. 787 (b). — D'ap. nat.



Potentilla recta
Cynipide (n° 3071)
Fig. 788. — Im. KIEFF.



Potentilla argentea
Diastrophus Mayri (n° 3074)
Fig. 789 (a). — Im. KIEFF.
Fig. 790 (b). — Im. KIEFF.

Potentilla hirta L. var. pedata WILLD.

Pl.ti. — Renflement fusiforme de 25 mm. de longueur sur 5 mm. de diamètre transversal.

Coccide 3072

Houard, 1903 c, p. 154-157, fig. 14-21, ⊕.

F.

Potentilla argentea L.

Ac.fl. — Boutons hypertrophiés, boursoufflés, demeurant fermés et couverts de poils anormaux. Larves grégaires rouge orangé.
M.T.

Perrisia potentillæ WACHTL 3073

Brischke, 1881, p. 171, n° 2; Schlechtendal, 1883, p. 5-6, n° 11, fig. 4, ⊕; Wachtl, 1885, p. 193-195, pl. II, 1, ⊕; Hieronymus, 1890, p. 155-156, n° 487; Rübsaamen, 1901, p. 91, n° 16, p. 124, n° 130, p. 137.

E.C.

Pl.ti. — Renflement de 10-30 mm. de long sur 5-10 mm. de diamètre (fig.789), arrondi ou fusiforme, à surface ordinairement bosselée, pluriloculaire (fig.790). **Diastrophus Mayri** REINHARD 3074
 Mayr, 1876, p. 12, note, p. 13-14, n° 10, pl. II, 10; Hieronymus, 1890, p. 198-199, n° 619; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n° 209, ⊕; Jörgensen, 1905, p. 108, n° 3, pl. II, 36, ⊕. *D, E-G, F.*

Pl.fe. — Sur toutes les parties vertes de la plante, épais feutrage blanc jaunâtre. **Eriophyes parvulus** NAL. 3075
 Leonardi, 1894, p. 333, n° 127; Nalepa, 1898, p. 27, n° 80. *E-G.*

Potentilla canescens BESSER

Ac.fl. — Voir n° 3073. **Perrisia potentillæ** WACHTL 3076
 Kieffer, 1901 b, p. 395. *A.*

Pl.ti. — Voir n° 3074. **Diastrophus Mayri** REINHARD 3077
 Hieronymus, 1890, p. 199, n° 620; Schlechtendal, 1890, p. 73, n° 766. *A.*

Potentilla rubens GRANTZ (**P. opaca** AIT.)

Pl.fe. — Voir n° 3075. [**Eriophyes parvulus** NAL.] 3078
 Schlechtendal, 1890, p. 73, n° 771; Hieronymus, 1890, p. 82, n° 175; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 27, ⊕. *E-G.*

Potentilla aurea L.

Pl.fe. — Folioles plissées et contournées. **Eriophyide** 3079
 Thomas, 1886, p. 302-303, n° 30; Dalla Torre, 1892, p. 144; Schlechtendal, 1890, p. 73, n° 770. *E-G.*

Potentilla opaca L.

Pl.fe. — Feutrage. Voir n° 3075. [**Eriophyes parvulus** NAL.] 3080
 Schlechtendal, 1890, p. 73, n° 771. *E-G.*

Potentilla verna L.

Pl.fe. — Voir n° 3075. **Eriophyes parvulus** NAL. 3081
 Thomas, 1877, p. 357; Hieronymus, 1890, p. 82, n° 174; Massalongo, 1891, p. 114, n° 72; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 282; Lagerheim, 1905, p. 10. *E-T (var. E).*

Potentilla salisburgensis H. ENKE

Pl. fe. — Voir n° 3075. [Eriophyes parvulus NAL.] 3082
 Thomas, 1878, p. 708; Hieronymus, 1890, p. 82, n° 176. E-C.

Potentilla silesiaca UECHT.

Pl. fe. — Voir n° 3075. [Eriophyes parvulus NAL.] 3083
 Hieronymus, 1890, p. 82, n° 177; Schlechtendal, 1890, p. 73, n° 771. A.

Potentilla incana MÖNCH (**P. cinerea** CHAIX)

Pl. cr. — Voir n° 3075. [Eriophyes parvulus NAL.] 3084
 Thomas, 1877, p. 357. E-C.

Potentilla Kotschyana BOISSIER

Pl. ti. — Renflement de 6-10 mm. de longueur sur 6-8 mm. de diamètre transversal, situé à la base ou au sommet de la tige. Cynipide 3085
 Rübsaamen, 1902^c, p. 295, n° 69. A-M.

Potentilla collina WIBEL

Pl. cr. — Voir n° 3075. Eriophyes parvulus NAL. 3086
 Trotter, 1897, p. 169, n° 44. I.



Geum urbanum L.

Pl. fe. — Limbe crispé et plissé. Larves grégaires rouges. M.T. Cécidomyide 3087
 F. Löw, 1877, p. 34, n° 5; Hieronymus, 1890, p. 141, n° 441; Rübsaamen, 1891^b, p. 404-405, n° 5; Trotter, 1901^d, p. 363-364, n° 13; Lagerheim, 1905, p. 15. E-N, E-C.I.

— A la face inférieure du limbe, feutrage blanc situé généralement le long des nervures, avec bosselures colorées en rouge à la face opposée; souvent il y a pilosité blanche sur

les deux faces du limbe, sur la tige et même sur les sépales.

Erineum gei FRIES. **Eriophyes nudus** NAL. 3088

Massalongo, 1891^b, p. 479-480, n° 25 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n° 71, ⊕ ; Nalepa, 1898, p. 27, n° 81 ; Lindroth, 1899, p. 18-19 ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. V, n° 112, ⊕ ; Lagerheim, 1905, p. 8. E-N,
E-C,
F.I.

Geum rivale L.

Pl. fe. — *Erineum gei* FRIES. Voir n° 3088. . [**Eriophyes nudus** NAL.] 3089

Fée, 1834, p. 127, n° 76 ; F. Löw, 1888^c, p. 539-540, n° 7 ; Lindroth, 1899, p. 18-19 ; Rübssaamen, 1901, p. 118, n° 73 ; Lagerheim, 1905, p. 8. E-N,
E-C.

— Érinéum n'existant qu'à la face inférieure du limbe ; élevation à la face opposée. **Ériophyide** 3090

Rübssaamen, 1901, p. 118, n° 74. A.

— Feuilles crispées ; nervures hypertrophiées ; larves situées à la face supérieure du limbe. **Diplosine** 3091

Rübssaamen, 1891^b, p. 404-405, n° 5 ; Schlechtendal, 1895, p. 30. A.

Geum montanum L.

Pl. fe. — *Erineum gei* FRIES. Voir n° 3088. . **Eriophyes nudus** NAL.] 3092

Thomas, 1886, p. 301, n° 21 ; Dalla Torre, 1892, p. 130 ; 1893^b, p. 10 ; Massalongo, 1893^c, p. 419, n° 14 ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. X n° 245, ⊕. E-C, I.

Geum reptans × **montanum**

Pl. fe. — *Erineum gei* FRIES. Voir n° 3088. . [**Eriophyes nudus** NAL.] 3093

Dalla Torre, 1895, p. 144. E-C.

Geum molle VIS. et PANCH.

Pl. fe. — *Erineum gei* FRIES. Voir n° 3088. . [**Eriophyes nudus** NAL.] 3094

Hieronymus, 1890, p. 75, n° 128 ; Schlechtendal, 1895, p. 30. A-H, s.

Geum strictum AITON

Pl. fe. — Érinéum à la face inférieure du limbe. . **Ériophyide** 3095

Rübssaamen, 1902^c, p. 266, n° 35. A-M.



Dryas octopetala L.

Pl.fe. — Petites nodosités faisant saillie à la face supérieure du limbe ; il y a en même temps enroulement marginal, formation d'une pilosité anormale et coloration jaune ou rouge.

Tylenchus 3096

Thomas, 1880, p. 761-764 ; Dalla Torre, 1892, p. 119-121 ; 1893 b, p. 8.

E-G.



Alchemilla fissa SCHUMM.

Pl fe. — Feuilles contournées et décolorées, avec taches vert jaunâtre.

Ériophyide 3097

Thomas, 1877, p. 360 ; Schlechtendal, 1890, p. 72, n° 758.

E-G.

Alchemilla vulgaris L.

Pl.fe — Limbe ridé. **Trioza acutipennis ZETT. 3098**

F. Löw, 1888, p. 24 ; Dalla Torre, 1892, p. 104.

E-G.

— Limbe plissé avec çà et là, à la face inférieure, des fossettes arrondies et peu profondes ; pas de pilosité anormale.

Ériophyide 3099

Thomas, 1885 b, p. 27 ; 1886, p. 298, n° 4 ; F. Löw, 1888 c, p. 538, n° 1 ; Dalla Torre, 1892, p. 104 ; Mariani, 1907, p. 62, n° 1 ; 1907 b, p. 294, n° 63.

E-G,
N, J.



Sanguisorba officinalis L.

Pl.fe. — Folioles repliées en gousse par en haut, un peu épaissies, mais non boursoufflées ; l'intérieur est fréquemment coloré en rouge-pourpre brillant et l'extérieur en vert pâle. Larve d'un rouge brillant, teintée de jaunâtre aux deux extrémités.

M. T.

*** Perrisia sanguisorbæ Rüb. 3100**

Rübsaamen, 1890, p. 25-28 ; Hieronymus, 1890, p. 172, n° 550 ; Lagerheim, 1905, p. 3 ; Hieronymus, Pax, etc., 1907, fasc. XV, n° 423. ⊕.

E-N,
E-G.

* On rencontre aussi les larves jaunes de *Perrisia Peinei* Rüb. (Rübsaamen, 1890, p. 50, n° 184, pl. III, 14), que plusieurs auteurs considèrent comme cécidogènes (Schlechtendal, 1895, p. 31 ; Kieffer, 1901 b, p. 499).

— Folioles enroulées en spirale et transformées en une masse fusiforme, épaissies, ou encore froissées et plissées entre les nervures latérales; pétioles souvent renflés et tordus.

Tenthredinide 3101

Hieronymus, 1890, p. 259-260, n° 776; Hieronymus, Pax, etc., fasc. IV, n° 146, ⊕; Lagerheim, 1905, p. 3. E-N,
A.

-- Épais feutrage blanc. Voir n° 3103.

Eriophyes sanguisorbæ CAN. 3102

C. Marchal et Chateau, 1905, p. 300. E.

Sanguisorba minor SCOP. (**Poterium Sanguisorba** L.)

Plrc. — Sur toutes les parties vertes de la plante et sur l'inflorescence, épais feutrage blanc jaunâtre ou blanc (fig. 785, page 529), formé de poils très longs, diversement contournés.

Erineum poterii DC. **Eriophyes sanguisorbæ** CAN. 3103

Fée, 1834, p. 128, n° 181; Bremi, 1847, p. 30, n° 36, p. 59, n° 13, pl. II, 37, ⊕; F. Löw, 1874^b, p. 159-160; 1885, p. 464; Massalongo, 1891, p. 114, n° 73; Martel, 1894, p. 8, n° 206; Connold, 1901, pl. LXIV, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, n° 322, ⊕; Favares, 1905, p. 45. E-G,
E-O,
I.

— Inflorescence déformée, mais sans pilosité anormale.

Ériophyide 3104

Trotter, 1906, p. 120, n° 29 (var. *puberulum* DC.). I.

Sanguisorba muricata FRANCHET

(**Poterium muricatum** SPACH, **P. polygamum** WALDST. et KIT.)

Plrc. — Sur toutes les parties vertes de la plante, épais feutrage blanc jaunâtre ou blanc. *Erineum poterii* DC.

[**Eriophyes sanguisorbæ** CAN.] 3105

Hieronymus, 1890, p. 82-83, n° 180; Misciattelli, 1894, p. 223, n° 41; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 282; Rübsaamen, 1902^c, p. 295, n° 701. I, s. co.
E, A-M.

Sanguisorba Spachiana (**Poterium Spachianum** CLOSSON)

Plrc. — Feutrage. Voir n° 3103. **Eriophyes sanguisorbæ** CAN. 3106

Favares, 1905, p. 45, pl. XII, 9, ⊕. P.

— Folioles hypertrophiées à la base, repliées en gousse vers la pointe, crispées et un peu décolorées. **Cécidomyide** 3107
 Tavares, 1965, p. 45. P.

Sanguisorba (Poterium sp.)

Plrc — Feutrage. Voir n° 3103. . . . **Eriophyes sanguisorbæ** CAN. 3108
 Tavares, 1965, p. 45. P.



Rosa

Ac.fr. — Fruits boursoufflés, plus ou moins arrondis. M.T. Adulte printemps II. **Spilographa alternata** FALLÉN R.1
Rosa sp.

Ac.fl. — Boutons demeurant fermés. . **Clinodiplosis rosiperda** RÜBS. R.2
Rosa centifolia.

— On peut encore trouver sur les sépales ou les pétales des cécidies semblables à celles qui sont décrites sur les feuilles aux n°s R.8, R.9, R.15, R.17, et dues aux mêmes auteurs que celles-ci. Ce ne sont pas là de véritables acrocécidies.

Ac.bg. — Renflement subsphérique de 10-20 mm. de diamètre, à surface tuberculeuse, situé à l'aisselle des rameaux. [**Ériophyide**] R.3
Rosa arvensis, dumetorum, sp.

Plrc. { Galles ouvertes. A.
 { Galles fermées, à surface hérissée de prolongements. B.
 { Galles fermées, à surface sans prolongements. C.

A. — Enroulement par en haut des deux parties de la foliole jusqu'à la nervure médiane. Larve verdâtre, à tête noire ou brune. M.T., dans un cocon noir. **Blennocampa pusilla** KLEGG R.4
Rosa canina, centifolia, dumetorum, eglanteria, gallica, indica var. *semperflorens, montana, pomifera, sempervirens, tomentosa, villosa*.

— Folioles repliées. **Ériophyide** R.5
Rosa alpina, canina, spinosissima.

— Folioles brunies. **Callyntrotus Schlechtendali** NAL. R.6

Rosa canina.

— Les deux moitiés d'une foliole se relèvent en tournant autour de la nervure médiane et viennent s'appliquer l'une sur l'autre (fig. 791-792), de façon à former une cécidie en forme de gousse aplatie, un peu renflée au milieu, souvent teintée de roussâtre. Larves grégaires d'un rouge jaunâtre. M.T.

Perrisia rosarum HARDY R.7

Rosa agrestis, alba, alpina, apricorum, bibracteata, canina, carelica, dumetorum, farinosa, glauca, indica, montana, sempervirens, spinosissima, tomentella, tomentosa, villosa.



Rosa. — R.7

Perrisia rosarum

Fig. 791 (a). — D'ap. nat.

Fig. 792 (b). — D'ap. nat.



Rosa. — R.8

Rhodites rosa

Fig. 793 (a). — D'ap. nat.

Fig. 794 (b). — D'ap. nat.

Fig. 795 (c). — D'ap. nat.



Rosa. — R.9

Rhodites Mayri

Fig. 796 (a). — D'ap. nat.

Fig. 797 (b). — D'ap. nat.

B. — Cécidie hérissée de filaments longs, pinnatifides (fig. 793), de couleur vert clair ou plus ou moins teintés de rouge. La cécidie proprement dite est un amas de petites galles arrondies, uniloculaires, très dures, étroitement soudées entre elles et portant, à leur surface externe, le chevelu dont il vient d'être question (fig. 794). On trouve ces petites boules moussues sur les fruits, les tiges (à la place d'un bourgeon) et les feuilles (fig. 795). *Bédéguar*.

Rhodites rosæ L. R.8

Rosa andalusis, agrestis, apricorum, arvensis, bibracteata, canina, coriifolia, dumalis, dumetorum, fusiformis, gallica, glauca, globularia, graveolens, inodora, Jund-


silliana, micrantha, montana, pomifera, repens, rubiginosa, rubrifolia, scabrata, sempervirens, sepium, spinosissima, tomentella, tomentosa, trachyphylla, trichoneura, umbelliflora, villosa.

— Cécidie semblable à la précédente, mais beaucoup moins dure et de couleur roussâtre ; les filaments du chevelu sont ici remplacés par des épines plus ou moins développées (fig. 796-797). Sur les feuilles, les fleurs ou les fruits.

Rhodites Mayri SCHL.

R.9

Rosa acicularis, agrestis, canina, dumetorum, rubiginosa, sepium, Seraphinii, spinosissima, tomentosa.



Rosa. — R.10

Rhodites rosarum

Fig. 798 (a). — Im. MAYR

Fig. 799 (b). — Im. MAYR

Fig. 800 (c). — Im. MAYR

Rosa. — R.11

Liebelia Cavaia

Fig. 801 (a). — Im. MASS.

Fig. 802 (b). — Im. MASS.

Fig. 803 (c). — Im. MASS.

— Cécidie arrondie, un peu plus grosse qu'un pois, portant de petites épines dont le nombre et la disposition sont très variables (fig. 798) ; la teinte de la galle est blanchâtre ou, plus souvent, vert tendre à l'état frais, avec quelques taches de rose ou de rouge vif. Cavité unique (fig. 799). Souvent les cécidies sont déformées par des parasites (fig. 800). **Rhodites rosarum** GIRAUD

R.10

Rosa urvensis, canina, caucasica, coriifolia, dumetorum, eglanteria, glauca, micrantha, rubiginosa, sempervirens, sepium, spinosissima, tomentella, villosa.

— Sur les feuilles, cécidie compacte de 8-10 mm. de diamètre, couverte de longs poils blancs (fig. 801), entre lesquels se dressent des appendices plus courts et roussâtres, quelquefois

entourée par une portion du limbe soulevé en forme d'aile ; cette cécidie est en réalité un amas de galles élémentaires (fig.802) composées chacune d'un corpuscule central où se trouve la chambre larvaire, entouré lui-même par une expansion lamelleuse à bord régulièrement denté et longuement pileux (fig.803).


Liebelia Cavaræ KIEFF. R.11

Rosa Seraphinii.

- C. — Près de la pointe des rameaux, cécidies mesurant 5-40 mm. de long et accompagnées de torsion, repliement ou épaississement. Larves orangées.

Cécidomyide R.12

Rosa spinosissima.



Rosa. — R.15
Rhodites eglanteria
Fig.804 (a). — D'ap. nat.
Fig.805 (b). — D'ap.nat.



Rosa. — R.17
Rhodites spinosissima
Fig.806,807 (a,b). — D'ap. nat.
Fig.808 (c). — Im. MAYR

— Dans le parenchyme foliaire, très petite cécidie d'un jaune pâle, faisant saillie sur les deux faces, un peu plus cependant sur la face supérieure. Une larve vert pâle, à tête brune.

Tenthredinide R.13

Rosa sp.

— Sur le limbe ou le pétiole, cécidies ovoïdes ou sphériques, dures, à surface lisse, souvent groupées pour former des mas-

ses plurilobées. La cavité très petite contient une seule larve.

Hyménoptère R.14

Rosa canina.

— Cécidie arrondie, de 3-5 mm. de diamètre (fig.804), glabre, uniloculaire, à paroi très mince (fig.805), attachée par un point seulement au support qui est le plus souvent la face supérieure d'une feuille, plus rarement la face inférieure du limbe, le pétiole, une épine, l'écorce d'un rameau, un sépale ou enfin un des filaments de la cécidie du *Rh. rosæ*.

Rhodites eglanteriæ HARTIG R.15

Rosa agrestis, alpina, alpina × *tomentosa, arvensis, austriaca, bibracteata, canina, canina* × *gallica, cinnamomea, coriifolia, dumetorum, dumetorum* × *gallica, glauca, graveolens, inodora, micrantha, rubiginosa, scabrata* var. *ovifera, sempervirens, sepium, spinosissima, tomentella, tomentosa, umbelliflora, venusta, villosa.*

— Cécidie absolument identique à la précédente.

Rhodites centifoliæ HARTIG R.16

Rosa centifolia

— Sur feuilles, pétioles, tiges, sépales (fig.808) ou fruits, cécidies arrondies, ovoïdes ou réniformes (fig.806), couvertes de petites épines et teintes de vert, de rose et de rouge, pouvant atteindre et même dépasser le volume d'une olive; elles sont insérées sur le support par une large base et perforent la feuille (fig.807) lorsqu'elles sont produites sur cet organe; leur substance est spongieuse. — On cite comme variétés: *a*, renflement fusiforme du pétiole; *b*, renflement très aplati à peine saillant sur l'une et l'autre face du limbe d'une foliole, occupant parfois presque toute la surface de cette foliole, mais généralement limité au voisinage de la nervure médiane.

Rhodites spinosimæ GIRAUD R.17

Rosa agrestis, alpina × *glauca, alpina* × *venusta, andegavensis, arvensis, canina, cinnamomea, coriifolia, dumetorum, gallica, glauca, rubiginosa, sepium, sphaerica, spinosissima, spinosissima* var. *megalancha, tomentella, tomentosa, umbelliflora.*

— Renflement allongé de la tige (80-120 mm. sur 20-30 mm.), à surface légèrement craquelée.

Microlépidoptère R.18

Rosa gallica.

— Galle de tige. **Cynipide** R.19

Rosa spinosissima.

Rosa sempervirens L.

- Præ.** — R. 4. **Blennocampa pusilla** KLEGG 3109
 Stefani, 1906, p. 183. *si.*
- R. 7. **Perrisia rosarum** HARDY 3110
 Stefani, 1903, p. 103-104, n° 17 ; 1906, p. 183. *si.*
- R. 8. **Rhodites rosæ** L. 3111
 Trotter, 1900 b, p. 157, n° 36 ; Tavares, 1902, p. 100, n° 239 ; 1905, p. 87 ; Stefani, 1906, p. 183. *P, si.*
- R. 10. **Rhodites rosarum** GIRAUD 3112
 Trotter, 1899, p. 363, n° 38 ; 1900 b, p. 158, n° 37 ; Tavares, 1905, p. 87, pl. XI, 12, ⊕ ; Stefani, 1906, p. 183. *I, P.*
- R. 15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3113
 Darboux et Honard, 1901, p. 369, n° 2925 ; Tavares, 1905, p. 87 ; Stefani, 1906, p. 183. *F, P, si.*

Rosa arvensis HUDSON

- Ac. bg.** — R. 3. **Ériophyide** 3114
 C. Marchal et Chateau, 1903, p. 388, n° 10 ; 1905, p. 294. *F.*
- Præ.** — R. 8. **Rhodites rosæ** L. 3115
 Hieronymus, 1890, p. 236, n° 696 ; Misciattelli, 1895 b, p. 84, n° 1 ; Pigeot, 1902, p. 8-9, 21. *A, F, I.*
- R. 10. **Rhodites rosarum** GIRAUD 3116
 Giraud, 1859, p. 366-367, n° 1 ; Mayr, 1876, p. 18 ; Massalongo, 1893, p. 2101, n° 157. *D, E-C, I.*
- R. 15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3117
 Massalongo, 1893, p. 2101, n° 156 ; Pigeot, 1902, p. 10, 21 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 293. *F, I.*
- R. 17. **Rhodites spinosissimæ** GIRAUD 3118
 Dalla Torre, 1895, p. 154. *E-C.*

Rosa repens THUILL.

- Præ.** — R. 8. **Rhodites rosæ** L. 3119
 Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 817 ; Kieffer, 1901 b, p. 480. *A.*

Rosa bibracteata BASTIAN

Plrc. — R. 7.	Perrisia rosarum HARDY	3120
C. Marchal et Chateau, 1903, p. 389, n° 12.		F.
— R. 8.	Rhodites rosæ L.	3121
C. Marchal et Chateau, 1903, p. 389, n° 12.		F.
— R. 15.	Rhodites eglanteriæ HARTIG	3122
C. Marchal et Chateau, 1903, p. 389, n° 12.		F.

Rosa alba L.

Plrc. — R. 7.	Perrisia rosarum HARDY	3123
Hieronymus, 1890, p. 159, n° 499 ; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 816.		A.

Rosa gallica L.

Plrc. — R. 4.	Blennocampa pusilla KLUG	3124
Rostrup, 1896, p. 40, n° 263.		D.
— R. 8.	Rhodites rosæ L.	3125
Hieronymus, 1890, p. 240, n° 712 ; Massalongo, 1893, p. (218), n° 164.		E-C, L.
— R. 17.	Rhodites spinosissimæ GRAUD	3126
Paszlavscky, 1884 ^b , p. 224.		A-II.
— R. 18.	Microlépidoptère	3127
Del Guercio, 1903, p. 143-146, fig. 1-2, pl. IX, ⊕.		I.

Rosa centifolia L.

Ac. fl. — R. 2.	Clinodiplosis rosiperda RÜBS.	3128
Rübsaamen, 1892, p. 54-57, fig. 6-8, pl. II, 7-8 ; Kertész, 1902, p. 123.		A.
Plrc. — R. 4.	Blennocampa pusilla KLUG	3129
Slechtendal, 1890, p. 76, n° 814 ; Cecconi, 1902 ^b , p. 359, n° 41.		A, I.
— R. 16.	Rhodites centifoliæ HARTIG	3130
T. Hartig, 1840, p. 194, n° 2 ; Mayr, 1876, p. 19, n° 15, pl. III, 15, ⊕ ; Hieronymus, 1890, p. 239, n° 701 ; Kieffer, 1898 ^b , p. 266, pl. V, 3, ⊕.		E-X, E-C, H.

Rosa austriaca GRANTZ

- Plrc. — R. 15. Rhodites eglanteriæ HARTIG 3131
Szépligéti, 1890, p. 20; Kieffer, 1901 b, p. 478. A-II.

Rosa pomifera HERRM.

- Plrc. — R. 4. Blennocampa pusilla KLEGG 3132
Lagerheim, 1905, p. 20. E-N.
— R. 8. Rhodites rosæ L. 3133
Geisenheyner, 1902, p. 307-308, n° 54. A.

Rosa villosa L.

- Plrc. — R. 4. Blennocampa pusilla KLEGG 3134
Rostrup, 1896, p. 40, n° 262; Lagerheim, 1905, p. 20. E-N.
— R. 7. Perrisia rosarum HARDY 3135
Hardy, 1850, p. 186, n° 4; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 816; Kieffer, 1901 b, p. 480-481. E-C, E-O.
— R. 8. Rhodites rosæ L. 3136
Trail, 1878; Beijerinck, 1882, p. 163; Kieffer, 1898 b, p. 268; 1901 b, p. 480. A, I-B.
— R. 10. Rhodites rosarum GIRAUD 3137
Rostrup, 1896, p. 40, n° 262 b; Jørgensen, 1906, p. 106-107, n° 36. D.
— R. 15. Rhodites eglanteriæ HARTIG 3138
Trail, 1878; Kieffer, 1901 b, p. 478. I-B.

Rosa venusta SCHIEUTZ

- Plrc. — R. 15. Rhodites eglanteriæ HARTIG 3139
Hieronymus, 1890, p. 245, n° 735; Schlechtendal, 1890, p. 78, n° 823. E-C.

Rosa tomentosa SMITH

- Plrc. — R. 4. Blennocampa pusilla KLEGG 3140
Thomas, 1887, p. 27; Dalla Torre, 1892, p. 150; Schlechtendal, 1895, p. 32. E-C.
HOVARD, *Zoococcidies*. 35

— R. 7.	Perrisia rosarum HARDY	3141	
	Hieronymus, 1890, p. 160, n° 502; Bezzi, 1899, p. 29, n° 96; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 293.		<i>E-C, I, F.</i>
— R. 8.	Rhodites rosæ L.	3142	
	Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 817; Rübssaamen, 1901, p. 128, n° 174.		<i>A.</i>
— R. 9.	Rhodites Mayri SCHL.	3143	
	Kieffer, 1898 ^b , p. 272.		<i>A.</i>
— R. 15.	Rhodites eglanteriæ HARTIG	3144	
	Hieronymus, 1890, p. 244, n° 731; Rübssaamen, 1899, p. 246, n° 54; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 293.		<i>E-C, F, R.</i>
— R. 17.	Rhodites spinosissimæ GIRAUD	3145	
	Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 820; Rübssaamen, 1901, p. 128, n° 176.		<i>A.</i>

Rosa umbelliflora SWARTZ (**R. cuspidata** CHRIST)

Plrc. — R. 8.	Rhodites rosæ L.	3146	
	Hieronymus, 1890, p. 245, n° 733; Dalla Torre, 1892, p. 151.		<i>E-C.</i>
— R. 15.	Rhodites eglanteriæ HARTIG	3147	
	Hieronymus, 1890, p. 244-245, n° 732; Schlechtendal, 1890, p. 78, n° 823.		<i>E-C.</i>
— R. 17.	Rhodites spinosissimæ GIRAUD	3148	
	Hieronymus, 1890, p. 245, n° 734; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 820.		<i>E-C.</i>

Rosa farinosa BECHST.

Plrc. — R. 7.	Perrisia rosarum HARDY	3149	
	Thomas, 1892 ^b , p. 7, n° 8; Kieffer, 1901 ^b , p. 480-481.		<i>I.</i>

Rosa montana CHAIX

Plrc. — R. 4.	Blennocampa pusilla KLUG	3150	
	Stefani, 1906, p. 183.		<i>si.</i>
— R. 7.	Perrisia rosarum HARDY	3151	
	Thomas, 1892 ^b , p. 8, n° 9; Kieffer, 1901 ^b , p. 480-481; Stefani, 1906, p. 183.		<i>I, si.</i>
— R. 8.	Rhodites rosæ L.	3152	
	Stefani, 1902 ^b , p. 11, n° 11; 1906, p. 183.		<i>si.</i>

- R. 10. **Rhodites rosarum** GIRAUD 3153
Stefani, 1906, p. 183. *st.*
- R. 15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3154
Stefani, 1906, p. 183. *st.*

Rosa rubiginosa L.

- Plrc. — R. 8. **Rhodites rosæ** L. 3155
Schenck, 1863, p. 244, n° 57; Mayr, 1876, p. 15; Dalla Torre, 1892, p. 150; Pigeot, 1902, p. 8-9, 21. *E-C, F.*
- R. 9. **Rhodites Mayri** SCHUL. 3156
Beijerinck, 1882, p. 157-176; Hieronymus, 1890, p. 243-244, n° 724; Cecconi, 1897, p. 456; *E-C, H, F, I.*
- R. 10. **Rhodites rosarum** GIRAUD 3157
Schenck, 1863, p. 246, n° 59; Mayr, 1876, p. 18; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 818. *D, E-C.*
- R. 15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3158
Schenck, 1863, p. 245, n° 58; Mayr, 1876, p. 19; Rostrup, 1896, p. 49, n° 361; Pigeot, 1902, p. 10, 21; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 293. *D, A, F.*
- R. 17. **Rhodites spinosissimæ** GIRAUD 3159
Schenck, 1863, p. 246, n° 60; Mayr, 1876, p. 18; Szépligéti, 1895, p. 215, n° 37. *E-C.*

Rosa apricorum REPART

- Plrc. — R. 7. **Perrisia rosarum** HARDY 3160
G. Marchal et Chateau, 1903, p. 389, n° 13. *F.*
- R. 8. **Rhodites rosæ** L. 3161
G. Marchal et Chateau, 1903, p. 389, n° 13. *F.*

Rosa eglanteria L.

- Plrc. — R. 10. **Rhodites rosarum** GIRAUD 3162
Cameron, 1893, p. 44; Kieffer, 1898^b, p. 263; 1901^b, p. 479. *I, B.*

Rosa micrantha SMITH

- Plrc. — R. 8. **Rhodites rosæ** L. 3163
Massalongo, 1893, p. 218, n° 165; Schlechtendal, 1895, p. 32; Cecconi, 1902^b, p. 359, n° 42. *I.*

Rosa sepium THUILL.

Plrc. — R. 8.	Rhodites rosæ L.	3164
	Beijerinck, 1882, p. 163; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 817; Kieffer, 1901 ^b , p. 480.	A.
— R. 9.	[Rhodites Mayri SCHL.]	3165
	Hieronymus, 1890, p. 244, n° 729; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 293.	E-C, F.
— R. 10.	Rhodites rosarum GRAUD	3166
	Hieronymus, 1890, p. 244, n° 727; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 818.	A.
— R. 15.	Rhodites eglanteriæ HARTIG	3167
	Hieronymus, 1890, p. 244, n° 726; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 293.	A, F.
— R. 17.	Rhodites spinosissimæ GRAUD	3168
	Hieronymus, 1890, p. 244, n° 728; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 820.	E-C.

Rosa Scraphini VIV.

Plrc. — R. 9.	Rhodites Mayri SCHL.	3169
	Cecconi, 1901 ^f , p. 1038, n° 20; Kieffer, 1901 ^b , p. 479.	s.
— R. 11.	Liebelia Cavareæ KIEFF.	3170
	Massalongo, 1895 ^b , p. 99-102, pl. III, ⊕; Kieffer, 1897 ^b , p. 72, n° 35, pl. VI, 3, ⊕; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VIII, n° 185, ⊕; Cavara, 1903, p. 117-119; Cecconi, 1903, p. 27-28, n° 14.	s.

Rosa graveolens GRENIER et GODRON var. **genuina**
(**R. fallax** GRENIER)

Plrc. — R. 8.	Rhodites rosæ L.	3171
	Hieronymus, 1890, p. 241, n° 716; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 817.	E-C.
— R. 15.	Rhodites eglanteriæ HARTIG	3172
	Hieronymus, 1890, p. 241, n° 717; Schlechtendal, 1890, p. 78, n° 823.	E-C.

Rosa inodora FRIES

Plrc. — R. 8.	Rhodites rosæ L.	3173
	Hieronymus, 1890, p. 241, n° 719; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 817.	A.
— R. 15.	Rhodites eglanteriæ HARTIG	3174
	Hieronymus, 1890, p. 241, n° 718; Schlechtendal, 1890, p. 78, n° 823.	E-C.

Rosa tomentella LÉMAN

- Plrc. — R. 7. **Perrisia rosarum** HARDY 3175
 Massalongo, 1893, p. (128), n° 90; Baldrati, 1900, p. 59, n° 144; Schlechtendal, 1895, p. 32. *I.*
- R. 8. **Rhodites rosæ** L. 3176
 Baldrati, 1900, p. 86, n° 224. *I.*
- R. 10. **Rhodites rosarum** GIRAUD 3177
 Baldrati, 1900, p. 86, n° 225. *I.*
- R. 15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3178
 Baldrati, 1900, p. 86, n° 223. *I.*
- R. 17. **Rhodites spinosissimæ** GIRAUD 3179
 Hieronymus, 1890, p. 244, n° 730; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 890. *E-C.*

Rosa caucasica PALLAS

- Plrc. — R. 10. **Rhodites rosarum** GIRAUD 3180
 Girard, 1859, p. 479; Mayr, 1876, p. 18; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 818. *A-II.*

Rosa Jundzilli BESS.

- Plrc. — R. 8. **Rhodites rosæ** L. 3181
 C. Marchal et Chateau, 1903, p. 389, n° 16. *I.*

Rosa trachyphylla RAV

- Plrc. — R. 8. **Rhodites rosæ** L. 3182
 Geisenheyner, 1902, p. 307-308, n° 54. *I.*

Rosa canina L.

- Plrc. — R. 4. **Blennocampa pusilla** KLUG 3183
 Bouché, 1846, p. 290-291, n° 3; Hieronymus, 1890, p. 248, n° 740; Trotter et Cecconi, 1902, *E-T*
 fasc. VIII, n° 184, ⊕; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 293; Lagerheim, 1905, p. 19, n° 1. (*ecc. E.*)
- R. 5. **Ériophyide** 3184
 Leonardi, 1894, p. 334, n° 150. *I.*

-- R. 6. **Callyntrotus Schlechtendali** NAL. 3185
 Schlechtendal, 1895^b, p. 6; 1903, p. 134-135; Nalepa, 1894, p. 71; 1898, p. 68, n° 2; 1905, p. 140-141, pl. III, 1-2. A.

-- R. 7. **Perrisia rosarum** HARDY 3186
 Bremi, 1847, p. 27, n° 30, pl. II, 31, ⊕; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 93, ⊕; Connold, 1901, pl. LXXXVII, ⊕; Tavares, 1905, p. 86, pl. X, 1, ⊕. E-T.

-- R. 8. **Rhodites rosæ** L. 3187
 Mayr, 1876, p. 15-16, n° 12, pl. II, 12, ⊕; Paszlavszky, 1881, p. 198-216, p. 277-296, pl. I, 1-7, ⊕; Massalongo, 1893, p. (212-214), n° 159, pl. XXXI, 6 b, ⊕; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n° 42, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n° 218, ⊕; Tavares, 1905, p. 86, 87, pl. XI, 2, 16, ⊕; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 46, ⊕. E-T.

-- R. 9. **Rhodites Mayri** SCHL. 3188
 Beijerinck, 1882, p. 157-176, pl. VI, ⊕; Rübsaamen, 1895, p. 474, n° 107, pl. XIV, 1, ⊕; Tavares, 1905, p. 87-88, pl. IV, 18, ⊕. E-C, R, H, F, P, J.

-- R. 10. **Rhodites rosarum** GIRAUD 3189
 Giraud, 1859, p. 366-367, n° 1; Mayr, 1876, p. 18-19, n° 14, pl. III, 14, ⊕; Massalongo, 1893, p. (214), n° 160, pl. XXXII, 3, ⊕; Connold, 1901, pl. CXXIII, ⊕; Darboux et Houard, 1907, (ecc. E), p. 255-256, n° 87, pl. XXIV, 3-4, ⊕. E-T.

-- R. 14. **Hyménoptère** 3190
 Föcken, 1895, p. 503-504, pl. XV, 1-2, ⊕; 1897, p. 36. SY.

-- R. 15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3191
 Mayr, 1876, p. 19-20, n° 16, pl. III, 16, ⊕; Massalongo, 1893, p. (210-212), n° 158, pl. XXXI, 6a, ⊕; Küstenmacher, 1894, p. 94-98, 130, pl. V, ⊕; Connold, 1901, fig. 7-8, pl. CXXII, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n° 219, ⊕; Darboux et Houard, 1907, p. 256-257, n° 88, pl. XXIV, 5, ⊕. E-T.

-- R. 17. **Rhodites spinosissimæ** GIRAUD 3192
 Giraud, 1859, p. 367-368, n° 2; Mayr, 1876, p. 16-17, n° 13, pl. III, 13, ⊕; Hieronymus, 1890, p. 238, n° 699; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n° 220, ⊕; Pigot, 1902, p. 10, 21; Lagerheim, 1905, p. 19, n° 3. E-T.

Rosa canina × **gallica** KRAUSE

Plrc. -- R. 15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3193
 Hieronymus, 1890, p. 239, n° 700; Schlechtendal, 1895, p. 32. E-C.

Rosa dumalis BECUST.

Plrc. -- R. 8. **Rhodites rosæ** L. 3194
 Misciattelli, 1895^b, p. 84, n° 1; Gatta, 1901, p. 398. I.E.

Rosa andegavensis BASTIAN

- Prc. — R.17 *Rhodites spinosissimæ* GIRAUD 3193
Gatta, 1901, p. 400. *E.*

Rosa globularia

- Prc. — R.8. *Rhodites rosæ* L. 3196
Gatta, 1901, p. 398. *E.*

Rosa sphaerica GRENIER

- Prc. — R.17. *Rhodites spinosissimæ* GIRAUD 3197
Gatta, 1901, p. 400. *E.*

Rosa dumetorum THUILL.

- Ac. bg. — R.3. [*Ériophyide*] 3198
Massalongo, 1904, p. 120, n° 36, fig. 2, ⊕. *I.*

- Prc. — R.4. *Blennocampa pusilla* KLUG 3199
Hieronymus, 1890, p. 248, n° 741 ; Schlechtendal, 1890, p. 76, n° 814 ; Stefani, 1906, p. 183. *A, si.*

- R.7. *Perrisia rosarum* HARDY 3200
Stefani, 1906, p. 183. *si.*

- R.8. *Rhodites rosæ* L. 3201
Hieronymus, 1890, p. 240, n° 708 ; Massalongo, 1893, p. (216), n° 162, pl. XXXII, 4, ⊕. *E-G, I, E.*

- R.9. *Rhodites Mayri* SCHIL. 3202
Kieffer, 1898^b, p. 272 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 293. *A, F.*

- R.10. *Rhodites rosarum* GIRAUD 3203
Hieronymus, 1890, p. 240, n° 709 ; Massalongo, 1893, p. (216-218), n° 163. *A, I.*

- R.15. *Rhodites eglanteriæ* HARTIG 3204
Hieronymus, 1890, p. 239, n° 707 ; Bezzi, 1899, p. 29, n° 95 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 293 ; Stefani, 1906, p. 183. *A, F, I.*

- R.17. *Rhodites spinosissimæ* GIRAUD 3205
Hieronymus, 1890, p. 240, n° 710 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 293. *A, F.*

Rosa dumetorum × **gallica** CHRIST

- Plrc. — R.15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3206
 Hieronymus, 1890, p. 240, n° 711; Schlechtendal, 1895, p. 39. *E-C.*

Rosa trichoneura RIPART

- Plrc. — R.8. **Rhodites rosæ** L. 3207
 C Marchal et Chateau, 1903, p. 389, n° 17. *F.*

Rosa coriifolia FRIES

- Plrc. — R.8. **Rhodites rosæ** L. 3208
 Hieronymus, 1890, p. 239, n° 704; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 817. *E-C.*
 — R.10. **Rhodites rosarum** GIRAUD 3209
 Hieronymus, 1890, p. 239, n° 705; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 818. *E-C.*
 — R.15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3210
 Hieronymus, 1890, p. 239, n° 703; Schlechtendal, 1890, p. 78, n° 823. *E-C.*
 — R.17. **Rhodites spinosissimæ** GIRAUD 3211
 Hieronymus, 1890, p. 239, n° 706; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 820. *D, E-C.*

Rosa glauca VILL.

- Plrc. — R.7. **Perrisia rosarum** HARDY 3212
 Hieronymus, 1890, p. 160, n° 501; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 816. *E-C.*
 — R.8. **Rhodites rosæ** L. 3213
 Hieronymus, 1890, p. 241, n° 714; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 817. *E-C.*
 — R.15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3214
 Hieronymus, 1890, p. 241, n° 713; Misciattelli, 1895^b, p. 84, n° 4. *E-C, I.*
 — R.17. **Rhodites spinosissimæ** GIRAUD 3215
 Hieronymus, 1890, p. 241, n° 715; Misciattelli, 1895^b, p. 84, n° 3. *E-C, I.*

Rosa rubrifolia VILL.

- R.8. **Rhodites rosæ** L. 3216
 Hieronymus, 1890, p. 244, n° 725; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 817. *A.*

Rosa cinnamomea L.

- Plrc. — R. 15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3217
 Hieronymus, 1890, p. 239, n° 702 ; Schlechtendal, 1890, p. 78, n° 823. *E-C.*
 — R. 17. **Rhodites spinosissimæ** GIRAUD 3218
 Rubsaamen, 1895, p. 477, n° 108. *R.*

Rosa alpina L.

- Plrc. — R. 5. **Eriophyide** 3219
 Kieffer, 1901^b, p. 481. *E-C.*
 — R. 7. **Perrisia rosarum** HARDY 3220
 Thomas, 1892^b, p. 7, n° 7 ; Dalla Torre, 1892, p. 150 ; Schlechtendal, 1895, p. 32. *E-C.*
 — R. 15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3221
 Hieronymus, 1890, p. 235, n° 692 ; Szépligéti, 1890, p. 20. *E-C.*

Rosa alpina × **glauca** UECHT.(**R. salicivensis** RAP. forma **sudetica** STREHLER)

- Plrc. — R. 17. **Rhodites spinosissimæ** GIRAUD 3222
 Hieronymus, 1890, p. 236, n° 693 ; Schlechtendal, 1895, p. 32. *E-C.*

Rosa alpina × **venusta** UECHT.(**R. spinulifolia** DEM. forma **Uechtritziana** STREHLER)

- Plrc. — R. 17. **Rhodites spinosissimæ** GIRAUD 3223
 Hieronymus, 1890, p. 236, n° 695 ; Schlechtendal, 1895, p. 32. *E-C.*

Rosa alpina × **tomentosa** STREHLER

- Plrc. — R. 15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3224
 Hieronymus, 1890, p. 236, n° 694 ; Schlechtendal, 1895, p. 32. *E-C.*

Rosa carlica FRIES

- Plrc. — R. 7. **Perrisia rosarum** HARDY 3225
 F. Löw, 1888^c, p. 545, n° 26. *N.*

Rosa agrestis SAVI

Plc.	— R. 7.	Perrisia rosarum HARDY	3226
	C. Marchal et Chateau, 1903, p. 389, n° 15.		<i>F.</i>
	— R. 8.	Rhodites rosæ L.	3227
	Massalongo, 1894 ^b , p. 87, n° 13; Cecconi, 1897, p. 455-456.		<i>I.</i>
	— R. 9.	Rhodites Mayri SCHL.	3228
	Massalongo, 1893, p. (205-206), n° 154, pl. XXXII, 1, ⊕; Martel, 1894, pl. IV, 6, ⊕; Baldrati, 1900, p. 85, n° 221.		<i>I. F.</i>
	— R. 15.	Rhodites eglanteriæ HARTIG	3229
	Massalongo, 1893, p. (248), n° 199.		<i>I.</i>
	— R. 17.	Rhodites spinosissimæ GIRAUD	3230
	Massalongo, 1893, p. (206-209), n° 155, pl. XXXII, 2, ⊕.		<i>I.</i>

Rosa acicularis LINDL.

Plc.	— R. 9.	Rhodites Mayri SCHL.	3231
	Bejerinck, 1882, p. 163 (note); Kieffer, 1898 ^b , p. 272; 1901 ^b , p. 479.		<i>II.</i>

Rosa spinosissima L. (R. pimpinellifolia DC.)

Plc.	— R. 5.	Ériophyide	3232
	Frauenfeld, 1865, p. 897; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 815; 1895, p. 32.		<i>E-C.</i>
	— R. 7.	Perrisia rosarum HARDY	3233
	F. Löw, 1885 ^a , p. 494; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 816.		<i>E-C.</i>
	— R. 8.	Rhodites rosæ L.	3234
	Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 817; Liebel, 1892, p. 277, n° 198.		<i>A.</i>
	— R. 9.	[Rhodites Mayri SCHL.]	3235
	Hieronymus, 1890, p. 241-242, n° 721; Liebel, 1892, p. 277, n° 199.		<i>A.</i>
	— R. 10.	Rhodites rosarum GIRAUD	3236
	Hieronymus, 1890, p. 242, n° 722; Schlechtendal, 1890, p. 77, n° 818.		<i>A.</i>
	— R. 12.	Cécidomyide	3237
	Kieffer, 1901 ^b , p. 480.		<i>I-B.</i>
	— R. 15.	Rhodites eglanteriæ HARTIG	3238
	Focken, 1889, p. 159; Hieronymus, 1890, p. 241, n° 720; Liebel, 1892, p. 277, n° 201.		<i>E-C, E-O.</i>

— R.17. **Rhodites spinosissimæ** GIRAUD 3239

Giraud, 1859, p. 367-368, n° 2; Mayr, 1876, p. 16-18, n° 13, pl. II, 13, ⊕; Hieronymus, 1890, *E-T*
p. 242-243, n° 723; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. X, n° 295, ⊕; Connold, 1901, pl. XLII, (*err. E*).
⊕; Darboux et Houard, 1907 p. 253-255, n° 86, pl. XXV, 2, ⊕.

— R.19. **Cynipide** 3240

Rostrup, 1896, p. 40, n° 259 (*Cynips tuberculosa* Osten-Sacken?); Kieffer, 1901^b, p. 477. *D.*

Rosa spinosissima L. var. **megalancha** BOBBAS

Plrc. — R.17. **Rhodites spinosissimæ** GIRAUD 3241

Paszlavszyk, 1883^b, p. 257-266. *E-G.*

Rosa indica L.

Plrc. — R.7. **Perrisia rosarum** HARDY 3242

Tassi, 1902, p. 91, n° 26. *I.*

Rosa indica LINDE. var. **semperflorens** SERINGE

Plrc. — R.4. **Blennocampa pusilla** KLUG 3243

Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VI, n° 137, ⊕. *I.*

Rosa scabrata CRÉPIN

Plrc. — R.8. **Rhodites rosæ** L. 3244

Gatta, 1901, p. 398. *E.*

Rosa scabrata var. **ovifera** BOBBAS

Plrc. — R.15. **Rhodites eglanteriæ** HARTIG 3245

Paszlavszyk, 1883^b, p. 257-266; Kieffer, 1898^b, p. 260. *A-II.*

Rosa aduensis DES. et GILLOT

Plrc. — R.8. **Rhodites rosæ** L. 3246

C. Marchal et Chateau, 1903, p. 389, n° 18. *E.*

Rosa fusiformis CRÉPIN

Plrc. — R.8. Rhodites rosæ L. 3247
 Gatta, 1901, p. 400. E.

Rosa sp.

Ac.fr. — R.1. Spilographa alternata FALLÉN 3248
 Kaltenbach, 1874, p. 224, n° 89. E-C.

Ac.bg. — R.3. [Ériophyide] 3249
 Trotter, 1904^c, p. 74, n° 13. I.

Pl.fe. — R.13. Tenthredinide 3250
 Kieffer, 1898^e, p. 98, n° 71 ; Schlechtendal, 1901^b, p. 145-147 (*Monophadnus elongatulus* Klug). E-C, F.



Prunus

(y compris les genres *Amygdalus*, *Cerasus*, *Persica*)

Plusieurs Pucerons vivant dans les limbes crispés, boursoufflés ou enroulés des feuilles de divers Pruniers, nous croyons utile de rappeler ici, d'après H. Schouteden (1903, p. 159, 183-184; 1903^b, p. 92; 1905, p. 163-164), leurs caractères distinctifs.

I. Pucerons déformant les espèces du genre *Prunus* qui appartiennent aux sections *Prunophora*, *Padus* et *Cerasus* :

Aptère vert, fortement pulvérulent. *Hyalopterus pruni* FABR.

△ Aptère peu ou point pulvérulent, vert ou brun ou noir.

≡ Aptère vert, au moins en dessous :

○ Premier article des antennes denté en dedans.

Phorodon humili SCHRANK

○ Premier article des antennes non denté :

□ Aptère à dos rougeâtre dans la région des cornicules.

Aphis padi L.

□ Aptère à dos d'un vert mat, à trois lignes horizontales d'un vert plus foncé.

Myzus mahaleb KOEN

□ Aptère à dos très brillant, à taches noires plus ou moins étendues.

Aphis pruni KOEN

= Aptère brun ou noir :

○ Feuilles plus ou moins régulièrement enroulées sur elles-mêmes. *Myzus cerasi* FABR.

○ Feuilles terminales crispées, formant des amas. *Aphis cerasi* SCHRANK (*prunicola* KALT.)

H. Pucerons déformant les espèces du genre *Prunus* qui appartiennent aux sections *Amygdalus* et *Persica* :

⊂ Puceron brunâtre ou verdâtre, le dos en majeure partie d'un noir ou d'un brun foncé brillant *Aphis persica* FOSSÉ.

⊂ Puceron vert à cornicules longs et légèrement renflés. *Rhopalosiphum dianthi* SZILVER

△ Puceron vert, à marbrures noires ou d'un brun foncé ; pubescence rare ; cornicules courts. *Aphis amygdalius* SCHOUTEDEN

Prunus armeniaca L.

Pl.ti. — Voir n° 3271. [Eriophyes phlœoceptes NAL.] 3251
Schlechtendal, 1890, p. 74, n° 784 ; Kieffer, 1892 c, p. 128, n° 86. A.

Pl.fe. — Limbe crispé ou boursoufflé. Hyalopterus pruni FABR. 3252
Kaltenbach, 1874, p. 176, n° 223 ; Mariani, 1907, p. 66, n° 15 ; 1907 b, p. 308, n° 125. A. J.

— Voir n° 3279. Eriophyes similis NAL.] 3253
Thomas, 1869, p. 331 ; Schlechtendal, 1890, p. 74, n° 786 E. C.

— Bord du limbe enroulé. [Perrisia sodalis F. LÖW] 3254
[Perrisia tortrix F. LÖW] 3255
H. Löw, 1851, p. 376 ; Kieffer, 1901 b, p. 397. E. C.

Prunus insititia L.

Ac.ti. — Voir n° 3269. Perrisia tortrix F. LÖW 3256
Kieffer, 1901 b, p. 397. A.

Ac.bg. — Voir n° 3270. Asphondylia prunorum WAGHTEL 3257
Mik, 1899, p. 208, n° 88 ; Kieffer, 1901 b, p. 396. E. C.

Pl.ti. — Voir n° 3271. [Eriophyes phlœoceptes NAL.] 3258
Liebel, 1886, p. 555, n° 182 ; Schlechtendal, 1890, p. 75, n° 797. A.

Pl. fe. } Limbe crispé ou enroulé par en haut A.
 } Cécidie céphatonéiforme B.
 } Autre forme C.

A. — Limbe crispé ou boursoufflé. **Aphis prunina** WALK.-PASS. 3259
Aphis cerasi SCHRANK 3260
Phorodon humuli SCHRANK 3261

Schlechtendal, 1890, p. 75, n° 798 ; 1895, p. 32 ; Rostrup, 1896, p. 41, n° 265 ; Tavares, 1905, p. 46 ; Lagerheim, 1905, p. 22. E-T.

— Enroulement marginal par en haut. **Perrisia sodalis** F. LÖW 3262
Perrisia tortrix F. LÖW 3263

Kieffer, 1901 b, p. 397. E-C.

B. — Voir n° 3280. [Eriophyes padi NAL.] 3264

Liebel, 1892, p. 271 ; Kieffer, 1901 b, p. 398-399. A.

— Voir n° 3279. **Eriophyes similis** NAL.] 3265

Liebel, 1886, p. 555, n° 180 ; Hieronymus, 1890, p. 83, n° 183 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 28, ⊕. E-C.

C. — Voir n° 3281. **Putoniella marsupialis** F. LÖW 3266

Kieffer, 1901 b, p. 397. A.

— Le long de la nervure médiane, rangées de poils gris semblables aux poils normaux. **Eriophyide** 3267

Kieffer, 1901 b, p. 398. A.

Prunus domestica L.

Ac. fl. — Boutons déformés. . . . **Asphondylia pruniperda** RONDANI 3268

Rondani, 1867, p. 37, fig. 1-2 ; Schlechtendal, 1890, p. 75, n° 790 ; Kertész, 1902, p. 65. I.

Ac. ti. — Cécidie fusiforme, terminale, formée de feuilles rapprochées par suite de l'arrêt de développement des entre-nœuds et enroulées les unes dans les autres. M. T. Larves grégaires blanches. **Perrisia tortrix** F. LÖW 3269

Trotter, 1904, p. 10, n° 15 ; Kieffer, 1901 b, p. 397. A, I.

Ac. bg. — Bourgeon transformé en une cécidie ovoïde, haute de 4-5 mm., entourée à sa base d'écaillés brunes, verte ou pon-

tuée de jaune ou de rouge au voisinage de la petite pointe apicale, qui est brune. Une larve jaune rougeâtre. M.C.

Asphondylia prunorum WACHTL 3270

Kieffer, 1889, p. 149-150; Schlechtendal, 1890, p. 75, n° 791; Kertész, 1902, p. 65. A.

Pl.ti. — Sur les rameaux, cécidies formées par hypertrophie de l'écorce au point où les écailles d'un bourgeon ont, en tombant, laissé un anneau cicatriciel. **Eriophyes phlœocoptes** NAL. 3271

Thomas, 1869, p. 354, n° 31; Schlechtendal, 1882, p. 28 n° 23, pl. 1, 4 b, ⊕; Nalepa, 1898, p. 29, n° 88; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVII, n° 423, ⊕. E-C, F, J.

— Tumeurs sur le tronc et sur les branches. Puccron fortement lanugineux. **Myzoxylus laniger** HAUSM. 3272

Schouteden, 1903, p. 183-184. B.

Pl.fe. { Feuilles crispées ou à bords enroulés. A.
 { Autres déformations. B.

A. — Enroulement marginal par en haut. **Perrisia sodalis** F. LÖW 3273

Perrisia tortrix F. LÖW 3274

Kieffer, 1901^b, p. 397. E-C.

— Limbe crispé ou boursoufflé. . . . **Hyalopterus pruni** FABR. 3275

Kaltenbach, 1874, p. 176, n° 223; Liebel, 1892, p. 271, n° 140; G. Marchal et Chateau, 1905, p. 283. E-T.

Aphis pruni KOCH 3276

Kaltenbach, 1874, p. 177, n° 227. E-C.

Aphis cerasi SCHURANK 3277

Stefani, 1898^c, p. 112, n° 3; 1906, p. 141, n° 79. E-S.

— Limbe crispé ou diversement contourné et brun.

Phyllocoptes Fockeui NAL. et TROUËSS. 3278

Schlechtendal, 1895, p. 32; 1895^b, p. 5, n° 6; 1903, p. 134; Nalepa, 1898, p. 52, n° 26. E-C.

B. — Sur le bord ou, plus rarement, vers le milieu du limbe ou, tout à fait exceptionnellement, sur le pétiole ou le fruit, cécidies blanchâtres ou rosées, saillantes sur les deux faces, de 2-3 mm. de long sur 1,5-2 mm. de large et 0,5 mm. de hauteur, couvertes de poils à la face supérieure; sur cette face il existe une dépression au fond de laquelle se trouve une ouver-

ture allongée. *Cephaloneon hypocrateriforme* BREMI et *Ceph. confluens* BREMI.

Eriophyes similis NAL. 3279

Thomas, 1869, p. 330, n° 3 ; Martel, 1891, p. 32-33, n° 66, pl. IV, 12, ⊕ ; Rostrup, 1896, p. 40, n° 264 ; Nalepa, 1898, p. 29, n° 89.

E-T
(c.c.c.E).

— A la face supérieure du limbe, et surtout à l'aisselle des nervures, saillies arrondies, rouges, de 1-2 mm. de diamètre, couvertes de poils anormaux ; elles s'ouvrent à la face inférieure par un petit orifice. *Cephaloneon molle* BREMI. On a aussi signalé des formes allongées, de 2-3 mm. de haut, sur 1 mm. de diamètre.

Eriophyes padi NAL. 3280

Thomas, 1869, p. 330, n° 2 ; Martel, 1891, p. 33, n° 67, pl. IV, 12, ⊕ ; Nalepa, 1898, p. 29, n° 90 ; Trotter, 1900, p. 196, n° 11.

E-C,
F,I.

— Le limbe présente, le long d'une nervure, un plissement formant une poche ventrue, verte, jaune ou rouge ; la partie attaquée est épaissie au quintuple, coriace, glabre à la face externe. Cécidie pouvant atteindre 25 mm. de long et s'ouvrant, à la face supérieure, par une fente allongée, à bords étroitement appliqués. Larve jaune orangé. M.T. Adulte printemps II.

Putoniella marsupialis F.LÖW 3281

F. Löw, 1875, p. 30, n° 3, pl. II, 3, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. I, n° 23, ⊕.

E-C, F,I.

Prunus spinosa L.

Ac.ti. — Amas terminal fusiforme de feuilles déformées. Voir n° 3269.

Perrisia tortrix F.LÖW 3282

F. Löw, 1875, p. 31, n° 7, pl. II, 5, ⊕ ; 1877, p. 6-7 ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. IX, n° 267, ⊕ ; Baldrati, 1900, p. 57, n° 137, pl. V, 3, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIV, n° 345, ⊕.

D,E-C,
F,I.

Ac.bg. — Voir n° 3270. **Asphondylia prunorum** WACHTL 3283

Schlechtendal, 1883, p. 6, n° 12 ; Wachtl, 1888, p. 205-206 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n° 211, ⊕.

E-C.

Pl.ti. — Cécidies corticales. Voir n° 3271. **Eriophyes phlæocoptes** NAL. 3284

Liebel, 1886, p. 555, n° 182 ; Schlechtendal, 1890, p. 76, n° 807.

A.

— Minimes bossettes. **Lestes viridis** VAN DER LIND. 3285

Pierre, 1902, p. 185 ; Lemec, 1903 b, p. 32-33.

F.


- Pl. fe. { Limbe crispé ou à bord enroulé..... A.
 { Cécidie céphalonciforme..... B.
 { Autre forme de cécidie..... C.

A. — Enroulement marginal par en haut. *Perrisia sodalis* F. Löw 3286

Perrisia tortrix F. Löw 3287

— Enroulement marginal par en bas. . . . Tenthredinide 3288

Rübsaamen, 1890, p. 258, n° 274 ; Schlechtendal, 1890, p. 76, n° 809 ; Corti, 1903 b, p. 363, n° 112. A. J.



Prunus spinosa

Eriophyes padi (n° 3293)

Fig. 809 (a). — D'ap. nat.

Fig. 810 (b). — D'ap. nat.

Fig. 811 (c). — D'ap. nat.




Prunus spinosa

Eriophyes similis (n° 3294)

Fig. 812 (a). — D'ap. nat.

Fig. 813 (b). — D'ap. nat.

Fig. 814 (c). — D'ap. nat.



Prunus spinosa

Patoniella marsupialis (n° 3295)

Fig. 815 (a). — D'ap. nat.

Fig. 816 (b). — D'ap. nat.

Fig. 817 (c). — D'ap. nat.

Fig. 818 (d). — D'ap. nat.

— Limbe crispé et boursoufflé. . . . *Hyalopterus pruni* FABR. 3289

Kaltenbach, 1874, p. 176, n° 223 ; Martel, 1891, p. 32, n° 63 ; Bezzi, 1899, p. 96, n° 70. D. A. F. I.

Aphis cerasi SCHRANK 3290

Kaltenbach, 1874, p. 176-177, n° 225 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 164, ⊕ ; Trotter E. C.
 et Cecconi, 1902, fasc. V, n° 124, ⊕ ; Schouteden, 1903, p. 184 ; Grevillius et Niessen, E. O. I.
 1908, fasc. III, n° 59, ⊕.

Aphis padi L. 3291

Schlechtendal, 1890, p. 76, n° 808 ; Schouteden, 1903, p. 184. E. C.

Phorodon humuli SCHRANK 3292

Kaltenbach, 1874, p. 176, n° 221 ; Schlechtendal, 1890, p. 76, n° 808 ; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n° 59, ⊕. E. C.

- B. — *Cephaloneon molle* BREMI (fig. 809 à 811). Voir n° 3280. **Eriophyes padi** NAL. 3293
 F. Löw, 1885, p. 464-465 ; Rubsaamen, 1895, p. 413, n° 29, pl. XV, 22, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1905, fasc. XIII, n° 359, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVIII, n° 427, ⊕. E-T.
- *Cephaloneon hypocrateriforme* BREMI et *Cephaloneon confluens* BREMI (fig. 812 à 814). Voir n° 3279. **Eriophyes similis** NAL. 3294
 Rubsaamen, 1895, p. 413, n° 30, pl. XV, 21, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. IV, n° 138-138a, ⊕ ; Connold, 1901, pl. LXXV, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. V, n° 125, ⊕. E-T.
- C. — Cécidie en poche, saillante à la face inférieure (fig. 815 à 818). Voir n° 3281. **Putoniella marsupialis** F. Löw 3295
 F. Löw, 1875, p. 30, n° 3 ; Massalongo, 1893, p. (117-119), n° 81, pl. XV, 8-11, ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VI, n° 194, ⊕ ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XI, n° 269, ⊕. E-T
(e.rc.E).
- Le long de la nervure médiane, rangées anormales de poils gris semblables aux poils normaux. **Ériophyide** 3296
 Liebel, 1892, p. 271 ; Kieffer, 1901^b, p. 398. A.
- A l'aisselle des nervures, à la face inférieure, touffes anormales de poils dans une dépression à laquelle correspond une saillie de la face supérieure. **Ériophyide** 3297
 F. Löw, 1879, p. 724, n° 26 ; Schlechtendal, 1890, p. 76, n° 810. E-C.
- Petite pustule du limbe. **Ériophyide** 3298
 Misciattelli, 1894, p. 223, n° 37 ; Kieffer, 1901^b, p. 399. I.

Prunus Amygdalus STOKES (**Amygdalus communis** L.)

- Pl. fe. — A la face inférieure, ou plus rarement à la face supérieure, amas de poils d'abord blanchâtres, plus tard d'un rouge vif, minces à la base et fortement renflés en massue à leur extrémité distale. *Erineum amygdalinum* DUBY. **Eriophyes padi** NAL. 3299
 Fée, 1834, p. 121, n° 63, pl. VI, 3, ⊕ ; Massalongo, 1896, p. 54, n° 11 ; Trotter, 1900^c, p. 196, n° 10. I.
- Feuilles de l'extrémité des rameaux enroulées, fortement crispées ou plissées. **Aphis persicæ** FONSC. 3300
 Stefani, 1901, p. 441, n° 2 ; 1906, p. 93 ; Schouteden, 1903, p. 169. B.F.I.
- Feuilles de l'extrémité des rameaux enroulées par en bas,

jaunâtres, avec taches rouges, fortement crispées, plus larges qu'à l'état normal. **Aphis amygdalinus** SCHOUTEDEN 3301

Tavares, 1903, p. 161, n° 4 ; 1905, p. 3 ; Schouteden, 1905, p. 163-164. P.

— Feuilles à bords enroulés par en bas et crispées.

Rhopalosiphum dianthi SULZER 3302

Schouteden, 1903^b, p. 92. B.

Prunus persica SIEB. et ZUCC.

(**Persica vulgaris** MILLER, **Amygdalus persica** L.)

Ac.ti. — A l'extrémité des jeunes pousses, les feuilles sont crispées et présentent un enroulement marginal par en bas très accentué.

Aphis persicæ FOSSC. 3303

Trotter, 1899^b, p. 198, n° 4 ; Schouteden, 1903, p. 169 ; Tavares, 1905, p. 39 ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 275 ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVII, n° 425. ⊕. E-T.

Pl.fe. — Érinéum. **Ériophyide** 3304

Unger, 1833, p. 377, 378 ; Frank, 1896, p. 49. E-G.

Prunus avium L. (et var. **duracina**)

Pl.fe. — Limbe crispé, boursoufflé ou enroulé. . **Myzus cerasi** FABR. 3305

Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n° 77. ⊕ ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. IX, n° 265. ⊕ ; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 283 ; Massalongo, 1907, p. 39, n° 23. E-T.

— Limbe crispé ou diversement contourné et bruni.

Phyllocoptes Fockeui NAL. et TROFESS. 3306

Schlechtendal, 1895^b, p. 5, n° 6 ; Nalepa, 1898, p. 52, n° 26. A.

Prunus Cerasus L.

Pl.ti. — [Minimes bosselettes. . . . **Lestes viridis** VAN DER LIND. 3307

Pierre, 1902, p. 185. F.

Pl.fe. — Limbe crispé, boursoufflé ou enroulé. **Myzus cerasi** FABR. 3308


Kaltenbach, 1874, p. 176, n° 222 ; Martel, 1891, p. 32, n° 65 ; Trotter, 1903, p. 38, n° 93 ; Tavares, 1905, p. 45-46. E-T.

Prunus Chamaecerasus JACQ.


Pl. fe. — Voir n° 3279. **Eriophyes similis** NAL. 3309
Thomas, 1869, p. 331; Schlechtendal, 1890, p. 75, n° 789. E.-C.

Prunus Mahaleb L.



Pl. fe. — Limbe crispé ou boursoufflé (fig. 819). **Myzus mahaleb** Koch 3310
Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc. IX, n° 266, ⊕; Molliard, 1899, b. p. 498-499; Trotter et
Cecconi, 1902, fasc. V, n° 123, ⊕. E.-T.



Prunus Mahaleb
Myzus mahaleb (n° 3310)
Fig. 819. — D'ap. nat.



Prunus Padus
Eriophyes padi (n° 3314)
Fig. 820 (a). — D'ap. nat.
Fig. 821 (b). — D'ap. nat.



Prunus Cocomilio
Asphondylia prunorum (n° 3318)
Fig. 822 (a). — Im. Mik
Fig. 823 (b). — Im. Mik
Fig. 824 (c). — Im. Mik

— Feuilles brunes et recourbées.

Phylloctes Fockeui NAL. et TROUËSS. 3311

Nalepa, 1898, p. 52, n° 26; Schlechtendal, 1903, p. 132. A.

— Le long de la nervure médiane, rangées anormales de poils gris. **Eriophyide** 3312

Koeller, 1901, b. p. 398. I.

Prunus Padus L.

- Pl.fe.** — Feuilles recourbées en arrière, crispées ou encore boursoflées. **Aphis padi L.** 3313
 Kaltenbach, 1874, p. 176, n° 224; Rübsaamen, 1890, p. 42, n° 110; C. Marchal et Chateau, 1905, p. 283; Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, n° 37, ⊕. *E-C, F.*
- Cécidies corniculées (fig. 820), formant à la face supérieure du limbe une saillie glabre de 3-4 mm. de hauteur sur 1 mm. de diamètre, de teinte verte, jaune ou rouge; ouverture arrondie à la face inférieure (fig. 821). Ces cécidies se rencontrent parfois sur les rameaux et les pétioles. *Ceratoneon attenuatum* BREML. **Eriophyes padi NAL.** 3314
 Thomas, 1899, p. 332, n° 4; Hieronymus, Pax, etc., fasc. I, n° 29, ⊕; Rübsaamen, 1895, p. 412, n° 28, pl. XV, 34, ⊕; Lagerheim, 1905, p. 10; Trotter et Ceccconi, 1907, fasc. XVII, n° 424, ⊕. *E-T.*
- A la face inférieure du limbe, taches irrégulières formées de poils anormaux en massue, d'abord blancs, puis bruns. *Erineum padinum* DUV. **Eriophyes padi NAL.** 3315
 Fée, 1834, p. 125, n° 69; Corda, 1842, p. 48, n° 4, pl. I, 4, ⊕; F. Löw, 1878, p. 140, n° 15; Rostrup, 1896, p. 41, n° 266. *E-T.*
- A la face inférieure du limbe, amas axillaires de poils semblables aux poils normaux. **Ériophyide** 3316
 Dalla Torre, 1892, p. 146, c; Kieffer, 1892, p. 128; 1901 b, p. 398. *E-C.*

Prunus Padus L. var. petraea (P. petraea TAUSCH)

- Pl.fe.** — Voir n° 3314. **Eriophyes padi NAL.** 3317
 Hieronymus, 1890, p. 83-84, n° 185; Hieronymus, Pax, etc., fasc. III, n° 108, ⊕; Dalla Torre, 1895, p. 151. *E-C.*

Prunus Cocomilio TEN.

- Ac.bg.** — Petite cécidie ovoïde (fig. 822), de 5 mm. de diamètre, entourée à la base par les écailles du bourgeon (fig. 823); elle est colorée en rouge du côté du soleil et surmontée par une

petite pointe munie d'un fin canal. La grande loge (fig. 824) contient une larve jaune rougeâtre. M.C.

Asphondylia prunorum WACHTL 3318

Mik. 1896, p. 209-212, pl. II, ⊕.

A-H.

Prunus Myrobalana LOIS.

Ac. bg. — Voir n° 3318. . . . **Asphondylia prunorum** WACHTL 3319

Trotter, 1900, p. 197-199, n° 13, pl. IX, 6, ⊕; Trotter et Cececoni, 1900, fasc. I, n° 24, ⊕; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n° 339, ⊕. I.



Pages		Pages		Pages	
Desmarestia	22	Hesperis	478	MONOCOTYLÉDONES	57
Desmarestiacées	22	Hierochloa	61	Moracées	368
Dentzia	488	Holcus	69	Moricandia	479
Dianthus	411	Homalothecium	99	Morus	369
Dicranacées	25	Hordeum	90	Mousses	25
Dicranum	25	Humulus	371	Musa	106
DICOTYLÉDONES	110	Hutschinsia	468	Musacées	106
Didymodon	26	Hyacinthus	103	Muscinées	24
Diellenbachia	99	Hyloconium	30	Myagrum	451
Dioscorea	105	Hypericum	438	Myrica	112
Dioscoréacées	105	Hypnacées	29	Myricacées	112
Diplachne	74	Hypnum	30	Narcissus	105
Diptotaxis	453	<i>Hypnum</i>	29	Nasturtium	463
Disa	107	Isatis	451	Némastomacées	23
Draba	469	Juglandacées	110	Nephrodium	31
Dracana	104	Juglans	111	Nuphar	419
Dryas	536	Juncacées	99	Nyctaginacées	401
Elymus	91	Juncaginacées	57	Nymphæa	419
Elyna	92	Juncus	99	Nymphéacées	419
Ephedra	56	Jungermanniacées	25	<i>Obione</i>	395
Epimedium	434	Juniperus	47	Ochrademus	480
Eriobothrya	511	Koehia	396	Odontoglossum	110
Erisimum	474	Koeleria	75	Orchidéacées	107
<i>Erisimum</i>	446	Lalia	109	Ostrya	189
Eruca	452	Larix	39	Osyris	374
Erucastrum	454	Lauracées	436	Papaver	439
Eucharis	105	Laurus	436	Papavéracées	438
Eurhynchium	29	Lepidium	442	Parietaria	373
Fagacées	204	Leskéacées	28	Persea	436
Fagopyrum	386	Leucodon	28	<i>Persica</i>	563
Fagus	205	Leucodontacées	28	Phalaris	60
Festuca	78	LICHENS	24	PHANÉROGAMES	35
Ficus	369	Liliacées	101	Philadelphus	488
FILICINÉES	31	Lilium	102	Phleum	63
Fragaria	529	Liquidambar	493	<i>Phoebe</i>	436
Fucacées	22	Lolium	83	Phragmites	72
Fumaria	440	Lophocolea	25	Picea	39
Furcellaria	23	Loranthacées	373	Pinus	37
Galtonia	103	Lychnis	408	<i>Pinus</i>	39
<i>Gehebia</i>	26	<i>Lychnis</i>	403, 409	Pirus	501
Geum	534	LYCOPODIINÉES	35	Pittosporacées	492
Gigartinacées	23	Magnolia	420	Pittosporum	492
Glyceria	78	Magnoliacées	490	Plagiobryum	27
Gnétacées	56	<i>Malachium</i>	412	Pleurotus	18
Graminées	58	<i>Mytus</i>	505	Poa	76
Grimmiacées	26	Matthiola	478	Pogonatum	27
<i>Gymnogongrus</i>	23	Melandryum	409	Polygonacées	376
GYMNASPERMES	35	Mespilus	512	Polygonum	382
Gypsophila	410	Milium	63	<i>Polygonum</i>	386
Hamamélidacées	493	Mirabilis	401	Polypodiacées	31
Heleocharis	92	Mniacées	27	Polyporacées	18
Heliconia	107	Mnium	27	Polyporus	18
Helleborus	421	Mohringia	418	Polystichum	32
Hemerocallis	101	Molinia	75	Polytrichacées	27
HÉPATIQUES	25			Populus	115
				<i>Porotrichum</i>	30

Pages		Pages		Pages	
Portulaca	402	Rosa	538	Stellaria	412
Portulacacées	402	Rosacées	493	Stenophragma	471
Potamogeton	57	Rubus	516	Stipa	61
Potamogetonacées	57	Rumex	377	Strefitzia	106
Potentilla	530	Sagina	417	Suaeda	400
<i>Poterium</i>	537	Sagittaria	58	Tamus	106
Pottiacées	26	Salicacées	113	Taxus	55
Prunus	556	Salicornia	397	Thalictrum	431
<i>Psamma</i>	68	Salix	132	TRALLOPHYTES	17
Pseudoleskea	28	Salsola	368	Thamniun	30
Pterigynandrum	28	Sanguisorba	536	Thesium	374
Pteris	32	Santalacées	374	Thlaspi	445
Pterocarya	111	Saponaria	412	Tofieldia	101
<i>Pulsatilla</i>	424	Saxifraga	486	Tricholoma	19
Quercus	211	Saxifragacées	486	Triglochin	57
Ramalina	24	Scilla	103	Triticum	87
Ranunculus	428	Scleropodium	29	<i>Tunica</i>	410
Raphanistrum	461	Secale	89	Turritis	471
<i>Raphanistrum</i>	460	Sedum	481	Ulmacées	361
Raphanus	460	Selaginella	35	Ulmus	361
Rapistrum	461	Selaginellacées	35	<i>Umbilicus</i>	485
Renonculacées	420	Sempervivum	484	Urtica	372
Reseda	480	<i>Senebiera</i>	443	Urticacées	371
Résédacées	480	Setaria	60	Usnéacées	24
Rhacomitrium	26	Silene	404	Vaucheria	20
Rheum	381	Sinapis	452	Vauchériacées	20
<i>Rhodiola</i>	481	<i>Sinapis</i>	457	Viscaria	403
Rhodymenia	23	Sisymbrium	446	Viscum	373
Rhodyméniacées	23	<i>Sisymbrium</i>	446, 471	<i>Woroninia</i>	20
Rhynchosstegium	29	<i>Sorbus</i>	508	Zea	60
Ribes	488	Spergula	419	<i>Zieria</i>	27
<i>Rodetia</i>	401	Spinacia	389	Zilla	452
		Spiraea	495		

RECTIFICATIONS

Page 26	lire JURATZKA.
Page 53	intervertir les clichés des figures 56-58 et 59-61.
Page 55	intervertir les clichés des figures 67 et 68.
Page 85	figure 94, lire Agropyrum .
Page 145	à S. 58, supprimer <i>Erineum effusum</i> .
Page 151	au n° 593, lire S. 57.
Page 159	au n° 694, lire Corti, 1901, p. (94) n° 76.
Page 194	au n° 1078, lire Chaitophorus .
Page 197	au n° 1094, lire H. betulinus .
Page 205	ligne 40, lire 1897 ^b .
Page 257	au n° 1337, lire var. histrion KIEFF.
Page 259	au n° 1344 : cécidie à supprimer, d'après le récent article de Trotter in Marcellia, 1908, p. 98-100, n° 23.

Ouvrage complet couronné par l'Académie des Sciences (Prix Demazières) et
par la Société de Géographie (Prix Milne-Edwards) :

E. G. Paris

**Index Bryologicus, sive enumeratio
muscorum ad diem ultimam anni 1900
cognitorum, adjunctis Synonymia distri-
butioneque geographica locupletissimis.**

Editio Secunda

5 volumes grand in-8 formant près de 1900 pages
avec une carte bryologique du monde au 1/95.000.000^e.

PRIX : 70 francs

(Franco dans toute l'Union postale)

Ce magnifique ouvrage qui vient d'être terminé comble
une lacune considérable dans la littérature bryologique, et
sera certainement bien accueilli de tous les botanistes.

Pour faciliter l'acquisition de cet important ouvrage nous acceptons des
paiements mensuels de 10 francs.

RIVIÈRE (A. et Ch.)

LES BAMBOUS

Végétation, culture, multiplication en Europe, en Algérie et dans tous le bassin méditerranéen, nord de l'Afrique, Maroc, Tunisie, Egypte.

Paris, 1879, in-8, avec 62 figures 6 fr. 50

NYLANDER (W.)

SYNOPSIS METHODICA LICHENUM OMNIUM HUCUSQUE COGNITORUM

Præmissa introductione lingua gallica tractata.

Paris, 1858-64, gr. in-8. Tomes I et II, fascicules 1^{er} (tout ce qui a paru), 490 pages, in-8, avec 9 planches gravées et coloriées au pinceau. 40 fr.

Nous avons pu, par une réimpression partielle du texte, reconstituer un nombre très limité d'exemplaires de cet ouvrage. Les planches ont été tirées avec les cuivres originaux de Nylander.

Vient de paraître :

LATREILLE

PRÉCIS DES CARACTÈRES GÉNÉRIQUES DES INSECTES

disposés dans un ordre naturel. 1796.

Réimpression fac-similé tirée à 200 exemplaires. Prix. 7 fr.

Cet ouvrage était extrêmement rare. C'est le travail fondamental de Latreille.

Nous pouvons fournir à un prix réduit quelques exemplaires de l'ouvrage suivant devenu fort rare :

V. RAULIN

DESCRIPTION PHYSIQUE ET NATURELLE DE L'ILE DE CRÈTE

2 forts volumes in-8 de 1078 pages avec atlas comprenant 2 cartes géologiques, 1 planche de coupes et 18 planches.

AU LIEU DE 50 FRANCS 20 FR.


L'ouvrage est presque exclusivement consacré à la Géologie, la Paléontologie, la Zoologie et la flore de l'île de Crète avec 18 planches de botanique.

Nous pouvons fournir quelques exemplaires de l'ouvrage épuisé de :

L.-G. GENEVIER

MONOGRAPHIE DES RUBUS DU BASSIN DE LA LOIRE

Deuxième édition, in-8 de X-394 pages. 8 fr.



SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00090 6156